

YALE
MEDICAL LIBRARY



HISTORICAL
LIBRARY

TRANSFERRED FROM
YALE UNIVERSITY LIBRARY

LEHRBUCH

DER

KINDERKRANKHEITEN.

" Jena - Dec '83
" Berlin Nov '84
" LEHRBUCH
" Wien Dec 84

DER

KINDERKRANKHEITEN

VON

DR. ALFRED VOGEL,

PROFESSOR DER MEDICINISCHEN KLINIK IN DORPAT.

MIT SECHS LITHOGRAPHIRTEN TAFELN.

ACHTE AUFLAGE.

STUTTGART.

VERLAG VON FERDINAND ENKE.

1880.

RJ44
880 V

Vorwort zur ersten Auflage.

Der Hauptzweck dieses Buches ist, meinen Zuhörern einen Leitfaß in die Hand zu geben, welchen sie ihren häuslichen Studien zu Grunde legen können.

In einem von zahlreichen Kranken frequentirten Ambulatorium ist es nicht immer möglich, über alle Fälle die gehörige, erschöpfende Belehrung zu geben. Man muss sich meist damit begnügen, nach einem bündigen Krankenexamen die Diagnose zu stellen, das Sichtbare sehen, das Hörbare hören und das Greifbare fühlen zu lassen. Die ausführlichere Schilderung und Deutung der Symptome kann bei gehörigem Fleisse auch aus Büchern erlernt werden.

Obgleich nun die Zahl der schon bestehenden Lehrbücher keine geringe ist und jedes derselben viel Gutes und Wahres enthält, so wird man mir es doch nicht vorargen, wenn ich mit keinem derselben vollkommen einverstanden bin. Es soll dieses keineswegs als Tadel, sondern nur als Beweis angesehen werden, dass Manches in der Podiatrik noch Hypothese ist und namentlich die Therapie von verschiedenen Aerzten verschieden behandelt wird.

Die hier angegebene Behandlung mag sceptisch oder selbst einseitig genannt werden. Sie mag es stellenweise auch sein. Jeder Arzt kann sich leren, keiner aber sollte sich herbeilassen, Mittel zu rühmen, die ihn selbst schon oft im Stiche gelassen haben. Hätte man von jeher streng an diesem Grundsatz festgehalten, so stünde es gewiss besser um unsere Therapie und um den ganzen Stand der Aerzte überhaupt.

Die ziemlich allgemein gewordene Sitte, jedem Abschnitte eine möglichst grosse Anzahl von Quellen aus Handbüchern, Monographien und Journalartikeln voranzuschlecken, ist unterlassen, weil sich diese Citate schon in den meisten andern Lehrbüchern finden, z. B. bei Rélliet und Barthex, bei Canstatt, in Virchow's Pathologie, und weil dieselben nur dann einen Sinn haben, wenn auch ihr Inhalt in der folgenden Schilderung confirmirt und kritisch beleuchtet wird. Eine derartige Bearbeitung ist jedoch für das Anfangsstadium nicht zweckmässig, indem hierbei die nothige Kürze und Klarheit verloren geht.

München, im Juli 1860.

Alfred Vogel.

Vorwort zur achten Auflage.

Die Anerkennung, welche mein Lehrbuch bei Fachgenossen und Studierenden findet, die Uebersetzung desselben in alle Hauptsprachen der civilisirten Welt und das schnelle Vergriffensein der letzten Auflage verschaffen mir die beruhigende Gewissheit, dass dasselbe nicht ohne allen Nutzen geblieben ist.

In dieser neuen Auflage haben die Capitel von der künstlichen Ernährung, von den Dentitionsbeschwerden und den Nervenkrankheiten längere Zusätze erhalten. Besonders wurde die für die Pädiatrik so wichtige Frage von der vermeintlichen Gefährlichkeit der Kuhmilch wegen möglicher Tuberculoen der Thiere erörtert. Ausserdem wurden an verschiedenen Stellen moderne Arzneimittel, Salicylsäure, Apomorphin, Eucalyptus und deren subcutane Application erwähnt und die Vor- und Nachtheile derselben in der Kinderpraxis besprochen.

Im Uebrigen möchte ich an die Worte des Satyristen erinnern:

*Sunt bona, sunt quaedam relictoria, sunt mala plura
Quae legiis hic, aliter non fit recte liber.*

Dorpat, im Januar 1880.

Alfred Vogel.

Inhalt.

Vorwort	Seite	Vorwort	Seite
	V	Mikroanalyse	29
I. Allgemeiner Theil.		Ernährung	37
1. Capitel.		Kunstliche Ernährung	38
Physiologisch-anatomische Bemerkungen über das kindliche Organismus	I	Reinigung, Kleidung, Wohnung	45
A. Respiration und Circulation.		II. Specießer Theil.	
Ductus venosus Arterii	1	1. Capitel.	
Ductus arterialis Botalli	2	Krankheiten direct in Folge der Geburt entstehend	47
Foramen ovale	2	A. Asphyxia neonatorum	47
Arteriae umbilicales	2	B. Atelectasis pulmonum	50
Thymusdrüse	3	C. Ophthalmia neonatorum	51
B. Secretiones.		D. Krankheiten des Nabels	54
Mecorum	4	1) Entzündung der Nabelgegend	55
Harnsäureabsatz	5	2) Ulceration der Nabelhöhle	55
Hautsecretion, Gese	6	3) Brand des Nabels	56
C. Wundheilen.		4) Der ulcerirende Nabelstumpf	59
Allgemeines Wundheilen	8	5) Nabelblutung	57
Furchenheilen	7	6) Nabelbruch	58
Zahndurchbruch	10	E. Trianus neonatorum	59
2. Capitel.		F. Zellgewebsverhärtung	62
Allgemeine Regeln für die Fütterung der Kinder	12	G. Mastitis neonatorum	64
Puls	15	H. Melanch neonatorum	66
Bronchitis	16	I. Icterus neonatorum	67
Bauchbläh	21	K. Congestiva Hämorrhoe	68
Stuhlgang und Harn	22	2. Capitel.	
3. Capitel.		Krankheiten des Digestionsapparates.	
Ernährung und Pflege der Kinder	26	A. Mastitis.	
Ammenstuhl	27	1) Mastitis	74
		2) Mastitis	77
		3) Defectus Lactis	77

	Seite		Seite
4) Prolagus hygicus	78	15) Infectionskrankheiten mit vor-	
5) Adhucio hygicus	78	wiegender Localisation auf dem	
6) Rongia	79	Darmkanal	
7) Stomatitis catarrhalis	80	a) Typhus abdominalis	181
8) Epithelitis	82	b) Cholera asiatica	178
9) Stomatitis	84	16) Entzündungen	184
10) Stomatitis trochanica	88	E. Leber.	
11) Noma	90	1) Syphilitische Leberentzündung	192
12) Scur	92	2) Fettleber	194
		3) Angeborene Anomalien	196
Anhang.		F. Milz.	
a) Bedeutung des Zungenbeines	97	Wachsthum	197
b) Dentitionbeschwerden	97	G. Rachenhöhle.	
B. Parotis.		1) Peritonitis	201
1) Parotitis	103	2) Abscess	203
2) Hypertrophie der Parotis	107	3) Krankheiten d. Meibom'schen Drüsen	205
C. Pharynx und Oesophagus.		3. Capitel.	
1) Angina tonsillaris	108	Krankheiten der Respirationsorgane.	
2) Hypertrophie tonsillaris	110	A. Nasenhöhle.	
3) Retropharyngealabscess	111	1) Epistaxis	208
4) Oesophagitis	112	2) Coryza	208
5) Pectus calli compressa	115	3) Neubildungen in der Nase	209
6) Sklerose des Sternocleidomastoideus	114	4) Fremde Körper in der Nase	211
D. Magen- und Darmkanal.		B. Larynx und Trachea.	
1) Die wichtigsten Symptome der		1) Krup	211
Magen- und Darmkrankheiten	115	2) Pseudokrup	216
a) Dyspepsie	115	3) Neuron	228
b) Halma	118	a) Spasmus glottidis	229
c) Erbrechen	118	b) Paralysis glottidis	236
d) Flatulenz und Colik	121	C. Schilddrüse.	
e) Diarrhöe	124	Struma	237
f) Verstopfung	127	D. Thyreoidae	238
2) Catarrhes ventriculi	129	E. Lungen.	
3) Todache Entzündung d. Magens	131	1) Catarrhus bronchialis	239
4) Ulcus perforans	135	2) Pneumonia	244
5) Hämorrhagische Erosionen	133	3) Erweiterte Alveolae	254
Magenverwundung	134	4) Emphysema	257
6) Catarrhas intestinalis	139	5) Oedema pulmonum	259
7) Enteritis folliculosa	144	6) Hämoptoe	261
8) Dysenteria	147	7) Hämoptoischer Infarkt	262
9) Intussusception	150	8) Gangraena pulmonum	263
10) Hernia inguinalis	152	9) Tuberculosis pulmonum	265
11) Fibrosa uteri	155	10) Carcinoma pulmonum et me-	
12) Polypus des Mastdarmes	156	dullae uteri	271
13) Prostatitis	156	11) Tumor convulsiva	272
14) Bildungsfehler des Atlas	158	12) Periodischer Nictitieren	281

V. Pleura

- 1) Pleuritis 284
2) Hydrothorax 290

4. Capitel.

Krankheiten der Circulationsorgane.

A. Herz- und Gefäßkrankheiten.

- 1) Abgelorene Aneurysse 292
2) Herzentzündung u. Rheumatis-
mus acutus 295
3) Hydrops cardiacus 305

B. Arterien und Venen.

- 1) Nasus vasculosus 307
2) Thrombosen des Sinus d. Dura-
mater 309

5. Capitel.

Krankheiten des Nervensystems.

A. Gehirn.

- 1) Hydrocephalus acutus 310
2) Meningitis und Enzephalitis 327
3) Sonnenstich 330
4) Hydrocephalus und Irritatio
cerebri 331
5) Hydrocephalus chronicus 332
6) Angeborener Gehirndrüs-
sen 337
7) Sclerose des Gehirns 339
8) Neoplasmen des Gehirns.
a) Tuberkel 343
b) Krebs 343
c) Ependym 343
9) Angeborene Bildungsfehler 342

B. Rückenmark.

- 1) Entzündung des Rückenmarkes
und seiner Hülle 343
2) Spina alba 347

C. Störungen der Nervenleitung.

- 1) Eclampsia infantum 350
2) Paralyse 357
3) Chorea minor 361
4) Chorea major 369
5) Epilepsie 372

Anhang.

- A. Sucklingspneumonie, Wurmsaugen 382
B. Gesteirkrankheiten 383

D. Höhere Sinnesorgane.

I. Gesichtssinn.

- 1) Epimorbia 385
2) Oculopie 388
3) Bildungsfehler d. höheren Auges 388

II. Gehörssinn.

- 1) Bildungsfehler am Gehörorgane 388
a) Mangel des Ohrschel 388
b) Verschluss d. Gehörganges 389
2) Otitis externa 389
3) Abscessbildung im Gehörgang 392
4) Otitis interna 395
5) Fremde Körper im Ohr 398

6. Capitel.

Krankheiten der Harn- und Ge-
schlechtsorgane.

A. Nieren.

- 1) Bildungsfehler der Nieren 400
2) Harnkreisläufe 403
3) Nephros Brightii 402
4) Nierensteine, Nierentuberkel,
Nierenzysten 407

B. Harnblase.

- 1) Bildungsfehler 408
2) Cystitis 410
3) Incontinentia urinae 412
4) Ichthura 413
5) Blasensteine 415

C. Bluthier Gesäßes.

I. Penis.

- 1) Bildungsfehler 417
2) Balanitis 420
3) Fermentöse Paraphimosis 421
4) Ostris 422

II. Hoden.

- 1) Cryptorchidie 424
2) Hydrocele 425

D. Weibliche Geschlechts.

- 1) Bildungsfehler 427
2) Leukorrhoea 428
3) Oophoritis und Ovar-
Vaginalblutung 432

7. Capitel.

Hautkrankheiten.

- 1) Scharlach 433
2) Masern 445
3) Röteln 450
4) Blattern 454
Vaccination 457
5) Modifizierte Blattern 462
6) Erythema necraliforme 465
7) Erysipelas 469

	Seite		Seite
8) Isotripsy	407	2) Tuberculosis und Streptothorax	489
9) Furunculosis	408	A. Tuberculosis.	
10) Phosphigae Infection	409	B. Streptothorax	
11) Krätze	410	a) Haut	497
12) Mollusca	413	b) Schleimhäuten, Strömungsorgane	500
13) Verhensung	414	c) Lymphdrüsen und Zellgewebe	505
14) Erbsenring	425	d) Knochen	508
3. Capitel.		e) Gelenke	511
Unkrone.		3) Hereditäre Syphilis	534
1) Miliaria	436		

I. Allgemeiner Theil.

I. Capitel.

Physiologisch-anatomische Bemerkungen über den kindlichen Organismus.

A. Respiration und Circulation. Der erste Akt des Neugeborenen ist eine Inspiration. Unmittelbar nach der Geburt contrahiren sich die Inspirationsmuskeln, und es dringt zum ersten Male atmosphärische Luft in die Lungenbläschen. Die hierauf erfolgende Volumszunahme der Lungen bedingt einerseits nach aussen Vergrösserung des Brustkorbes, andererseits aber auch nach innen eine Compression der neben den Lungen in der Brusthöhle befindlichen Organe — Herz, grosse Gefässe und Thymusdrüse, — und ferner ein Herabklappen des Zwerchfells, wodurch ein beträchtlicher Druck auf die Baucheingeweide entstehen muss. Diese plötzliche Volumsveränderung sämtlicher Brust- und Baucheingeweide trägt neben andern physiologischen Vorgängen jedenfalls dazu bei, die Circulationsverhältnisse der einzelnen Organe zu ändern und es schliessen sich in der That folgende fötale Bluthahnen unmittelbar oder bald nach der Geburt:

1) Der Ductus venosus Arantii, Tafel I. 4. Aus der Placenta entspringt die Nabelvene, Tafel I. 8, läuft nach ihrem Eintritt durch den Nabelring zwischen dem Bauchfell und dem Musc. transversus zur Leber und gelangt durch die Fossa longitudinalis anterior sinistra rückwärts zum linken Ende der Fossa transversa. Sie theilt sich hier in 2 Aeste, von welchen der grössere in den linken Ast der Pfortader geht, der kleinere Ast als Ductus venosus Arantii aber in die untere Hohlvene, Tafel I. 4. einmündet. Der Ductus venosus Arantii verbindet also die Nabelvene mit der V. cava ascendens, und diese Verbindung sowie jene mit der Pfortader wird aufgehoben, sobald die Placenta vom Uterus abgestossen, das Blut in der Nabelvene stagnirt, und die erste Inspiration geschehen ist.

2) Der Ductus arteriosus Botalli, Tafel I. 2, am Fötus ein Verbindungskanal zwischen der Arteria pulmonalis und der Aorta. Er entspringt da, wo die Arteria pulmonalis sich in die beiden Aeste spaltet, doch mehr nach dem linken Aste hin, läuft dann schräg aufwärts nach dem unteren Rande des Aortabogens, und verbindet sich unter einem stumpfen Winkel mit demselben an der Stelle, wo nach oben die linke Arteria subclavia herorkommt. Er dient dazu, das Blut von den Lungen abzuhalten und es sogleich wieder aus dem rechten Herzen in den grossen Kreislauf zu bringen. Je näher die Geburt heranrückt, desto dünner wird der Ductus arteriosus B., desto stärker die beiden Aeste der Pulmonalarterie. Je weiter der Ductus arteriosus B., desto enger ist der Theil der Aorta, welcher aus dem Herzen bis zur Einmündungsstelle dieses Ductus geht. Die durch die Inspirationsmuskeln ausgedehnten Lungen saugen nicht nur Luft, sondern auch Blut aus den Gefässen an, nicht blos das luftführende, auch das blutführende Röhrsystem erweitert sich. Es entsteht ein stärkerer Blutstrom von der Lungenarterie zu den Lungen und die letztere gibt weniger Blut an ihren fıtalen Zweig, den duct. Botalli ab. Die Ausdehnung der Lungen bewirkt aber auch eine Lageveränderung, selbst Knicung des duct. Botalli, in welchem gleichzeitig eine Gewebewucherung der longitudinalen Schichten der tunica media und intima eintritt und die Innenfläche des Gefässes fältig und buckelig macht. An diesen Unebenheiten schlagen sich feine Fibringerinnsel nieder, welche ebenfalls zur Verstopfung des Lumens beitragen und ein constantes Vorkommen von Haematoiden in dem später sich daraus bildenden ligam. arteriosum bedingen. Der fıtale ductus Botalli obliterirt hiedurch so schnell, dass man bei einem Kinde, das 2—3 Tage gelebt hat, kaum mehr eine feine Sonde durch denselben führen kann.

3) Das Foramen ovale. Das Septum der Vorhöfe hat im Fötus eine Oeffnung, For. ovale, da wo beim Erwachsenen die Fossa ovalis liegt. An dieser Oeffnung findet sich eine häutige, halbmondförmige Klappe, Valvula foraminis ovalis, die nach oben einen ausgeschweiften freien Rand hat. Im Fötus verschliesst diese Klappe das For. ovale nur sehr unvollständig, so dass ein Theil des Blutes aus dem rechten Vorhof direkt in den linken Vorhof und mit Umgehung der Lungen sogleich wieder in den grossen Kreislauf gelangt. Je näher die Geburt heranrückt, um so kleiner wird das For. ovale und um so grösser und entwickelter seine Klappe. Nach der Geburt wandeln sich die Lungen plötzlich zu einem Sanguiferen an, es wird eine grössere Blutzufuhr zu denselben nöthwendig, der rechte Ventrikel erweitert sich und hienit wird die Blutbahn vom For. ovale abgelenkt. Der freie Rand der halbmondförmigen Klappe besteht zwar gewöhnlich noch einige Monate fort, die Klappe ist aber so entwickelt, dass sie alleseitig sufficient schliesst. Bei Kindern über 8—10 Monate findet man in der Regel den Klappenrand total mit dem entsprechenden Rande des For. ovale verwachsen.

4) Die Nabelarterien, Art. umbilicales, Tafel I. 3. Nachdem schon bei Verschluss des Ductus venosus Arantii der Nabelvene gedacht worden, erübrigt noch die Beschreibung des Verschlusses der Nabelarterien. Die beiden Nabelarterien entspringen aus der entsprechenden Arteria hypogastrica, übertreffen an Dicke alle übrigen

Aeste der Hypogastrica und steigen neben der Harnblase aufwärts. Beide fassen den Urachus zwischen sich und geben mit ihm zwischen den Bauchmuskeln und dem Bauchfell in die Höhe bis zum Nabel. Sie laufen nun gewunden durch den Nabelstrang und erreichen die Placenta, in der sie sich verästeln. Sobald die Verbindung zwischen Uterus und Placenta aufgehört hat, entsteht in diesen Umbilicalarterien ein Thrombus, der sich fast bis zu ihrem Ursprunge aus der Arteria hypogastrica erstreckt. Nur eine kurze Strecke von diesen Ursprungsstellen bleiben sie wegsam, und geben einige Arter. vesicales, beim weiblichen Geschlecht ausserdem die Arter. uterina ab. Der übrige Theil von da bis zum Nabelring obliterirt und bildet einen feinen weissen Strang.

Neben diesen grossen mechanischen Veränderungen gehen durch den Eintritt der atmosphärischen Luft in die Lungen noch bedeutendere chemische Prozesse vor. Durch Wechselwirkung von Luft und Blut, und durch den Austausch von Gasen, welche die Wand der dem Lungen-Alveolen anliegenden Capillaren und die Alveolenwandung selbst in zwei entgegengesetzten Richtungen zu durchdringen haben, wird Luft und Blut so verändert, dass erstere irrespirabel, letzteres arteriell und somit nahrungsfähig gemacht wird. Der Neugeborene bekommt hellrothes und dunkelrothes Blut.

Eines dem kindlichen Organismus allein zukommenden Organes muss hier noch Erwähnung geschehen, der Thyreasdrüse. Die Thyrea zeichnet sich durch grosse Verschiedenheit in Bezug auf Grösse, Gewicht, Consistenz und Gestalt aus.

In das Mediastinum anticum eingebettet, beschränkt sie sich bald auf den oberen Theil des Herabenteils und auf die Ursprünge der grossen Gefässstämme, in der Breite kaum $\frac{1}{2}$ Zoll messend, bald wieder reicht sie von der Schilddrüse bis zum Zwerchfell herab und übersteigt $2\frac{1}{2}$ Zoll in der Breite. Nach Jendrassik sind ihre Hauptabzweigungen unmittelbare Zweige der grossen Gefässstämme, welchen sie aufliegt. Nach demselben Autor, dem wir noch die meiste Aufklärung über dieses räthselhafte Organ verdanken, besteht die Thyrea aus zwei oft sehr ungleichen Hälften, welche durch eine aus mehreren zarten Blättern zusammengesetzte Membran mit einander verbunden sind, in der die Hauptabzweigungen verlaufen. Die häufiger vorkommende Gestalt einer solchen Thyreahälfte ist eine längliche, das obere Drittel beiläufig schwach, abgerundet, während der übrige Theil mehr abgeflacht und breiter ist; oft krümmt sich noch vom unteren Ende der Drüse ein mehr oder weniger grosser Abschnitt hornartig am äusseren Rande nach aufwärts. Abweichend von dieser Form ist die Thyreahälfte nur in Gestalt eines durchgehends dünnen und schmalen strangartigen Streifens vorhanden, oder sie zerfällt bei bedeutendem Volumen in mehrere abgerundete Lappen, die durch dünne Parenchyothelle verbunden neben oder über einander gelagert sind.

In allen Fällen ist die vordere dem Sternum zugewendete Fläche convex, die hintere dem Herzbeutel aufliegende schwach concav. Der äussere und untere Rand ist dünn, oft saumartig, der innere stumpfer, mit tiefen Furchen versehen, in welche wie in einen Hilus die Blutgefässe sich einsenken.

Am Anfange solid und festköinig, verwandelt sich die Thyrea

mit der Zeit in eine viele Halden bergende, weichere Masse, deren Saft immer sauer reagirt. Die Erweichung schreitet von der Centralaxe, wo in einem ausgebreiteten Bindegewebelager die Hauptvenen verlaufen, nach der Peripherie vor. Nach und nach wird die Drüse immer fächer, die Halden treten dichter an einander, so dass von einem Drüsenparenchym eigentlich nichts mehr zu bemerken ist, und zur Zeit der beginnenden Pubertät ist sie in der Regel vollkommen verschwunden. Ausnahmsweise jedoch findet sie sich auch noch bei älteren Individuen, zuweilen sogar von beträchtlichem Umfang und Gewicht. Bei tuberculösen Kindern findet man sie von Tuberkeln durchsetzt. Der Krebs des Mediastinum anticum, der bei Kindern verhältnissmässig öfter vorkommt als bei Erwachsenen, nimmt wahrscheinlich von ihr seinen Ausgang. Die vielfach nachgezählte Angabe, dass bei syphilitischen Kindern sich Abscesse in der Thymus finden, beruht nach Jendrassik auf einem Irrthum: denn die vermeintlichen Abscesse sind meistens nichts anderes, als die in der Rückbildung regelmässig entstehenden Hohlräume, welche sich bei vielen nicht im mindesten syphilitischen Kindern auch finden.

B. Secretionen. Sämmtliche Schleimhäute, die im Fötalzustande nur sehr wenig functionirten, fangen nach der Geburt an, das ihnen eigenthümliche Secret zu secretiren. Die Mund- und Nasenhöhle werden schüppig, letztere oft nur sehr mangelhaft, so dass häufig Kunststoffe nöthig wird, um die angetrockneten Schleimkrusten zu entfernen. Die Speicheldrüsen secretiren zwar auch eine Flüssigkeit, dieselbe hat aber noch nicht ganz die chemischen Eigenschaften des Speichels der Erwachsenen, indem sie Stärkemehl nur sehr langsam in Zucker umzuwandeln im Stande ist. Der Magen beginnt einen Saft zu secretiren, der den in der Muttermilch enthaltenen Käsestoff löst. Die den grössten Theil der Bauchhöhle ausfüllende Leber secretirt hellbraune Galle, die den Fäces, nach Entleerung des dunkelbraunen Meconiums (Kindspeches), eine orangegelbe Farbe verleiht.

Die weit verbreitete Ansicht, das Meconium sei ein Gemisch von Galle, Darmschleim und Darmepithel, hat sich durch Förster's Untersuchungen als irrig erwiesen. Es besteht vielmehr aus platten Schüppchen, die alle Charaktere verhornter Plattenepithelien an sich tragen, daher aus dem Tractus intestinalis nicht herkommen können, vielmehr vollkommen genau mit den Hornschüppchen des Vernix caseosus übereinstimmen. Daneben finden sich constant Härchen in derselben Menge wie im Vernix caseosus und ausserdem Fetikugeln von verschiedener Grösse — offenbar Hauttalg, dem Vernix caseosus angehängt — Cholesterinkrystalle, die theils aus der Galle stammen, theils Rückbildungsproducte des Vernix caseosus sein mögen, und unregelmässige gelbe und bräunliche Klümpchen und Schollen, welche die dunkle Färbung des Meconium verursachen und ohne Zweifel Gallenfarbstoffe sind. Es besteht demnach das Meconium ausser den allerdings von der Galle herrührenden letztgenannten Substanzen hauptsächlich aus Vernix caseosus; und es geht daraus hervor, dass der Fetus von Zeit zu Zeit — und zwar, aus der gewöhnlichen Quantität Meconium zu schliessen, nach und nach eine ziemlich grosse Menge — Amnionwasser mit dem in ihm schwimmenden Vernix caseosus verschluckt, wovon das Wasser im Magen rasch aufgesogen wird, da man es nie in demselben findet,

die Haare und Hornschuppen aber als unverdaulich durch den ganzen Tractus intestinalis wandern.

Der Darm secretirt nach der Geburt eine gewisse Quantität Schleim, dessen vermehrte oder verminderte Secretion, als Diarrhöe oder Verstopfung, die häufigsten und ersten Erkrankungen des Säuglings bedingt.

Den Nieren wird gleich nach der Geburt eine etwas zu grosse Aufgabe zugemuthet. Die Kinder trinken in den ersten Tagen noch zu wenig, das Blut kann deshalb nur wenig Wasser abgeben, und so kommt es, dass in den geraden Harnkanälchen die harnsauren Salze, welche in Folge der grossen Umwälzungen des Stoffwechsels sich schnell ansammeln, nicht gelöst bleiben, sondern aus der zu concentrirten Lösung herausfallen und den sog. Harnsäureinfarkt der Neugeborenen bilden. Der Harnsäureinfarkt ist eine gelbrothe oder hochrothe Streifung der Pyramiden, nahe an den Papillen. Er erscheint gewöhnlich erst am zweiten Tage nach der Geburt, wurde aber in einzelnen Resten von mir noch bei Kindern gefunden, welche schon länger als vier Wochen gelebt hatten. Da er, freilich nur sehr ausnahmsweise, bei todgeborenen Kindern gefunden worden sein soll, und eine beträchtliche Menge von Kindern, die zwischen dem 2—14. Lebenstage sterben, denselben nicht aufweist, so lässt er sich gerichtlich medicinisch nicht verwerten. Man findet ihn häufig als carminrothes Pulver in den Windeln der Neugeborenen, was auch einzelnen aufmerksamen Hebammen schon bekannt ist. Die microscopische Untersuchung ergiebt cylindrische, aus amorphen, harnsaurem Ammoniak und Epitheliumzellen bestehende Säulehen, denen auch einzelne rhomboëdrische Harnsäurekrystalle beigemengt sind. Am 2. Tage, wo dieses Pulver sich in den Windeln findet, sind die Kinder meist unruhig, schreien beim Uriniren und haben eine geröthete Harnröhrenmündung. Wenn gleich seine Entstehung und Ausscheidung als ein physiologischer Vorgang zu betrachten ist, so lässt sich doch nicht läugnen, dass der so häufige Nierengries kleiner Kinder ebenso wie das Auftreten der Blasensteine im Kindesalter mit ihm in Verbindung zu bringen ist. —

Die Haut, welche während des Fötuslebens anhaltend die Temperatur des mütterlichen Blutes genoss, tritt mit dem Momente der Geburt in ein kälteres Medium, sie ist von nun an der Einwirkung der Luft, des Lichtes und des Temperaturswechsels ausgesetzt und übernimmt die Functionen der Aussenberührung. Sie hat zuerst eine gleichmässige, rothe Färbung, welche am 2.—6. Tage einer goldlichen Platz macht, um dann in die gewöhnliche rosenrothe überzugehen. Diese gelbliche Färbung wird oft irthümlich für Gelbsucht gehalten. Die neugeborenen Kinder sind fast am ganzen Körper mit Ausnahme der Handteller und Fusssohlen mit weichen oft ziemlich langen Haaren, Lanugo, besetzt, welche in den ersten Lebenswochen anfallen. Auch die starken Kopfhaare, welche viele Kinder mit auf die Welt bringen, fallen in den ersten Lebenswochen wieder aus und werden nur sehr langsam durch feinen, meist heller gefärbten Nachwuchs ersetzt. Schwächliche Kinder von langsamer Entwicklung ohne derbe Fettpolster behalten diese ersten Haare viel länger, als die schnell und gehörig zunehmenden. Die Schweissdrüsen funktionieren in den ersten Lebenswochen nur sehr wenig, es gelingt fast nie, ein Kind unter vier Wochen

in eine solche Transpiration zu bringen, dass der Schweiß sich in Tropfen sammelt.

Hingegen kommt an den Talgdrüsen der behaarten Kopfhaut fast bei allen Kindern eine vermehrte Secretion vor, der Gneis, *Seborrhoea capillitia*, die vom Beginn des zweiten Lebensmonats an bis zu Ende des ersten Jahres zu den physiologischen Vorgängen zu rechnen ist. Der Gneis entwickelt sich sehr allmählig; am Anfange sieht die Haut aus, als wenn sie mit Talg oder Cerat eingeschmiert worden wäre; auf dieser schmierigen Haut bleibt am aller Stenb und Schmutz kleben und vertrocknet mit dem Hauttalge zu weissgrauen oder gelblichen, später braunen und selbst schwarzen Schuppen, die zwischen den Fingern sich leicht zerreiben und, abgelöst, die Kopfhaut unversehrt, nicht einmal congestionirt durchblicken lassen. Er wird von keinem Jucken, keiner Nässe und keiner Hautinfiltration begleitet. Durch häufiges Einölen des Kopfes mit Olivenöl und Abwischungen mit Seifenwasser kann man diese Schuppenbildung unbeschadet der Gesundheit leicht verhüten. An vielen Orten, z. B. in München, haben die Hebammen dem Gneis ein solches tangere vindicirt. Es gelingt nur selten eine Mutter zu der oben beschriebenen Behandlungswiese zu überreden. Die Mütter lassen meistens die braunen Schuppen unberührt, bis am Ende des ersten Lebensjahres die Seborrhoe von selbst nachlässt, die Schuppen von den fortwachsenden Haaren weiter und weiter von der Kopfhaut abgehoben werden und endlich ganz vertrocknen und zerbröckeln. Nach Ablauf jener Zeit kommt keine einfache *Seborrhoea capillitia* bei den Kindern mehr vor.

C. Das Wachsthum der Kinder im Allgemeinen, und das Wachsthum einzelner Körpertheile. Am schnellsten wächst das Kind in den ersten Lebenswochen, im ersten Lebensjahre 6—7 Zoll, im zweiten 3½ Zoll, im dritten kaum 3, im vierten 2½ Zoll. Vom vierten oder fünften Lebensjahre bis zum sechzehnten wird das Wachsthum ziemlich regelmässig und beträgt jährlich etwas über oder unter 2 Zoll. Von 16.—17. Lebensjahr nimmt der Körper nur mehr 1½, in den folgenden zwei Jahren nur um 1 Zoll zu. Die meisten Menschen wachsen nur bis zum 20. Jahre, bei einzelnen wird das völlige Wachsthum erst mit 25 Jahren beendet. Mangelhafte Ernährung, zu heisses und zu kaltes Klima beschränken das Wachsthum. Acute fieberhafte Krankheiten unterbrechen dasselbe in keiner Weise, befördern es vielmehr sehr bedeutend, was besonders für acute Exantheme gilt. Die Kinder wachsen in einer acuten fieberhaften Krankheit von wenigen Wochen oft ½—1 Zoll, während sie im physiologischen Zustand hierzu ½—1 Jahr Zeit brauchen. (Sie erscheinen übrigens noch dadurch viel grösser, dass die Fesselpolster bei allen diesen Krankheiten beträchtlich abnehmen). Knochenkrankheiten, Blachitis, Knochenscarafosse verzögern das Wachsthum. Wachsen die Kinder zu schnell, so mager sie ab, werden kraftlos, träge, blass. Nach 1½—2 Monaten fängt das Kind an, den Kopf aufrecht zu halten und willkürlich, besonders nach dem Lichte, zu drehen. Erst im siebenten bis achten Lebensmonate lernt das Kind sitzen und noch später im neunten bis zehnten entwickeln sich die Bewegungen der untern Extremitäten, es beginnt zu stehen und einige Wochen darauf zu gehen.

Das Wachsthum geht nicht immer an allen Körpertheilen gleich-

nässig von Statten, oft wächst der Kopf mehr als die übrigen Theile, oft die Extremitäten mehr als Rumpf und Kopf, am häufigsten bleibt bei unserer mangelhaften physischen Erziehung der Thorax in seiner Entwicklung nach der Breite zurück.

Zuweilen ist es von Interesse, das Maass der Schädelknochen genauer zu bestimmen, und man hat sich deshalb über folgende Messpunkte verständigt: 1) die grösste Peripherie des Kopfes. Hier wird das Maass am Hinterhauptbein und an der grössten Wölbung der Stirne angelegt. Bei bedeutenderen chronischen Wasserköpfen steht das Hinterhauptbein mehr horizontal, und es fällt daher die grösste Peripherie oberhalb des Hinterhauptbeckens. 2) Das Maass von einem Ohr zum andern. Es geht von der obersten Partise des Ohrmuschelansatzes über die grosse Fontanelle zur entgegengesetzten Seite. 3) Das Maass vom Hinterhaupt zur Nasenwurzel geht vom Hinterhauptbein über den Scheitel bis zur Glabella. Diese drei Maasse können mit jedem Papierstreifen oder noch besser mit einem in Centimeter getheiltem Lederstreifen genommen werden. Die Durchmesser müssen mit einem Messzirkel gesucht werden. Der Querdurchmesser hat seine Endpunkte an den beiden Seitenwandbecken, der Längendurchmesser an der kleinen Fontanelle und an der grössten Wölbung in der Mitte der Stirne.

Von Wichtigkeit für den Kinderarzt ist eine genaue Kenntnis der grossen Fontanelle und ihres physiologischen Verschlusses. Die Fontanellen sind durch die Entwicklung des Schädels bedingt. Indem der Verknöcherungsprocess des embryonischen Schädels von mehreren Ossificationspunkten ausgeht, welche durch Knochenanschluss an ihre Peripherie nach allen Seiten gleichmässig wachsen, so müssen die Ecken des Schädelknochen das Letztgebildete sein. Da also die Schädelknochen Anfangs eine rundliche Contour haben, so wird, wenn mehrere solche Knochenstücken zusammenstossen, zwischen diesen ein Raum übrig bleiben müssen, der so viele Ränder hat, als Knochenscheiben ihn begrenzen. Dieser nur durch häutige Bedeckung verschlossene Raum heisst Fontanelle. Weil nun das Seitenwandbein im entwickelten Zustand vier Winkel hat, so wird an jedem derselben im embryonalen Zustand eine Fontanelle vorkommen müssen, weil aber die obere Winkel beider Seitenwandbeine aneinanderstossen, somit ihre Fontanellen zusammenfliessen, so können nur sechs Fontanellen vorkommen, von denen die Stirn- und Hinterhauptfontanelle unpaarig, die vordere und hintere Seitenfontanelle dagegen paarig angebracht ist.

Am ausgetragenen Kinde existirt nur mehr die grosse viereckige Stirnfontanelle, deren Viereck eines Rhombus mit einwärts gebogenen, ungleich langen Rändern bildet. Sie entsteht durch Zusammenstoss der beiden Stirn- und Seitenwandbeine, der Winkel, unter welchem die Stirnbeine zusammenstossen, ist spitzer, als der der zusammenstossenden Seitenwandbeine. Ein vollkommener Verschluss der grossen Fontanelle tritt selten vor beendigten zweiten Jahre ein. Merkwürdig ist die Vergrösserung dieser Fontanelle bis nach zurückgelegtem neunten Lebensmonat, eine Erscheinung, auf die Elsässer zuerst aufmerksam gemacht hat. Zur Bestimmung ihrer Grösse wählte Elsässer eine Methode, die nebst möglichst annähernder und wenigstens relativ sicherer Bestimmung ihres Quadratinhalts zugleich einen kurzen Ausdruck lieferte. Er mass die Entfernung zweier einander parallel

gegenüberliegenden Seiten von der Mitte ihrer Länge aus, dasselbe wurde mit den zwei andern parallelen Seiten vorgenommen, die zwei hieraus resultirenden Zahlen wurden dann addirt und die Hälfte als Durchmesser der Fontanelle angenommen. Es liefert diese Methode exaktere Resultate, als wenn man von einer Ecke zur andern gegenüberliegenden messen wollte. Das Resultat ist in diesem letztern Falle ganz unsicher, weil die Ecken sich oft noch ziemlich weit in die Nahte hinein als schmale Streifen erstrecken, wobei die Grenze, von der aus gemessen werden will, der Willkür unterliegen muss.

Die Grössenverhältnisse der vorderen Fontanelle waren nach Trimestern folgende:

Trimester.	Zahl der Kinder	Durchschnittlicher Durchmesser der Fontanelle in Pariser Linien.
1.—3. Monat.	10	9,60
4.—6. „	10	11,93
7.—9. „	7	13,90
10.—12. „	13	14,68
1.—12. Monat	45	11,60

In diesem Zeitraum ist die Fontanelle immer offen.

13.—15. Monat	9	17,77.
---------------	---	--------

Unter diesen 9 Kindern ist die F. bei 3 geschlossen, bei einem 5, bei den übrigen 10—15 Linien weit.

16.—18. Monat: 8 Kinder. Bei 4 ist die F. geschlossen, bei den übrigen 2, 3, 9 und 10 Linien weit.

19.—21. Monat: 5 Kinder. Bei 2 geschlossen, bei den übrigen 6, 12 und 12 Linien weit.

22.—24. Monat: 7 Kinder. Bei 5 geschlossen, bei den übrigen 9 und 15 Linien weit.

Es geht aus dieser Tabelle hervor,

- 1) dass die vordere Fontanelle während des ersten Lebensjahres am kleinsten ist beim Neugeborenen und im Verlaufe des ersten Trimesters,
- 2) dass sie dann bis ins dritte Trimester an Grösse zunimmt und
- 3) erst im vierten wieder sich verkleinert.

Die hier sogleich sich aufdringende Frage: „Wie ist diese Zunahme der grossen Fontanelle an Umfang zu erklären?“ lässt sich nach ELKÄSSER auf folgende mechanische Weise beantworten. Die grosse Fontanelle bildet ein Viereck, dessen Spitzen nach vorn und hinten, rechts und links gestellt sind. Durch die Ecken laufen zwei Knochenspalten des Schädels, eine Querspalte (Kronnaht) und eine Längspalte (Stirn- und Pfeilnaht). Stellen wir uns nun vor, das Flächenwachsthum der Schädelknochen geschehe so, dass sich an ihren Rändern immer neue Streifen ansetzen, so werden durch die an den zwei Rändern jeder Spalte neu entstandenen Ansätze die betreffenden Knochen auseinander getrieben. Betrifft es nun die in die Fontanelle einmündenden Spalten, so muss dieselbe, wenn ihre Ränder nicht gleichzeitig auch wachsen, nach allen Seiten grösser werden. Die Fontanelleiränder wachsen nun allerdings, allein sie wachsen nur in demselben Verhältnisse wie die Spaltränder, und dies genügt schon, die mechanische Vergrößerung der Fontanelle zu erklären.

Denken wir uns nämlich weiter, dass nur eine der oben genannten Hauptspalten, z. B. die Querspalte, neue Flächenmasse ansetze, die andere aber, nämlich die Längenspalte, unverändert bleibe, denken wir uns ferner, dass an jedem Rande der Querspalte in einem gewissen Zeitraum ein 1 Pariser Linie breites Stück anwachse, so wird die Fontanelle am Schluss dieses Zeitraumes in diesem Falle wieder ihren alten Durchmesser haben, wenn auch ihre Ränder innerhalb desselben je um eine Linie gewachsen sind. So würde also, ein gleichmäßiges Wachstum aller Knochenränder vorausgesetzt, die Fontanelle in dem Falle ihren Durchmesser gar nicht verändern, wenn nur Eine Spalte durch sie hindurchginge, oder in der andern gar kein Stößansatz stattfindet. Nun findet aber dieser in der Längenspalte in demselben Verhältnisse statt, wie in der Querspalte. Wie nun beim Wachstum der Querspaltenränder um eine Linie die Fontanellenränder gleichfalls um eine Linie wachsen müssten, sollten anders ihre Durchmesser dieselben bleiben, so tritt dieselbe Consequenz bei der Längenspalte ein, wenn diese gleichzeitig mit der Querspalte eine Linie in die Breite wächst. Mit andern Worten, die Fontanellenränder müssen, sollen ihre Durchmesser dieselben bleiben, innerhalb eines Zeitraumes, in welchem die Quer- und Längenspaltenränder je eine Linie ansetzen, um das doppelte, nämlich um zwei Linien sich vergrößern. Letzteres thun sie aber nicht, sondern wachsen ungefähr in demselben Verhältnisse wie die Spaltränder (also in dem angenommenen Zeitraum auch nur um eine, nicht um zwei Linien) und deshalb muss die Fontanelle stetig an Umfang zunehmen. Dies ist nun auch wirklich annäherungsweise der Fall. Wenn verstandlich Erklärung nicht deutlich genug sein sollte, der gehe sich die kleine Mühe, die zwei Contouren Tafel II, Fig. 1 und 2 je viermal aus Papier ausschneiden und mit den stumpfen Winkeln so zusammenzusetzen, dass die kleinen Linien a und a' je einer Figur ein Viereck bilden.

Fig. II stellt die schematische Zeichnung eines bei der Bildung der grossen Fontanelle beteiligten Schädelknochen dar, der in einem gewissen Zeitraum allseitig um eine Linie aus Fig. I seiner ursprünglichen Grösse herangewachsen ist.

So lange nun die Spaltränder in demselben raschen Verhältnisse wie die Fontanellenränder fortwachsen, dauert natürlich die Vergrößerung der Fontanelle fort. Es kommt aber ein Zeitpunkt, wo die Ränder der Spalten knöchern verwachsen, Nähte im engeren Sinne bilden, und gleichzeitig der Gesamtkopf in einem langsameren Verhältnisse sich ansehn. Die Folge hiervon ist, dass die Knochenränder sich nicht mehr auseinander schieben können, und dass das unveränderte Fortwachsen der noch freien Fontanellenränder nun die allmähliche Verkleinerung der Fontanelle zum Resultate hat. Dieser Zeitpunkt der gleichzeitigen Nahtbildung und beginnenden Verkleinerung der Fontanelle tritt bei gesunden Kindern am den zehnten Monat ein. Die Fontanelle schliesst sich aber vollkommen erst nach dem fünfzehnten Lebensmonat.

Die Vergrößerung der grossen Fontanelle in den ersten drei Trimestern ist also kein pathologischer, kein rheumatischer, sondern ein physiologischer Vorgang.

Der Nutzen der grossen Fontanelle wird gewöhnlich zu einseitig

nur von seiner negativen Seite, der mangelnden festen knöchernen Hülle betrachtet, während ihre Form, Lage, Grössenabnahme, mit der ganzen Entwicklung des Kindes zusammengehalten, einen wirklichen positiven Zweck erkennen lässt.

Schädel und Wirbelsäule bilden zusammen eine feste unrückgängige Kapselfür Gehirn und Rückenmark, so dass die Gesamtmasse der Schädelhöhle und des Rückenmarkskanals an Raum weder ab- noch zunimmt. In dem ersten Lebensjahre nun, wo das Gehirn rasch wächst und zu Congestionen mehr als später geneigt ist, hätte eine absolute Starcheit des Schädels diesen physiologischen Eigenschaften nicht entsprochen, zu welchem Zwecke eine nach innen und aussen nachgiebige Stelle die grosse Fontanelle, gleichsam als eine Art Sicherheitsventil besteht.

Während sie bei Gehirncongestionen und Hydrocephalus sich nach aussen wölbt und so den Druck auf das Gehirn durch die strömenden Gefässe oder den hydrocephalischen Erguss mindert, wölbt sie anderer Seite sich bei Gehirn-Anämie und Atrophie nach innen und bildet auf dem Schädeldach eine Grube.

Das Gehirn wächst in den ersten Lebensmonaten am schnellsten, bei der Geburt wiegt es noch kein Pfund, im zweiten Jahre schon $\frac{1}{4}$ Pfund. Beim Neugeborenen ist die Gehirnsubstanz weich, fast homogen, nicht scharf in grau und weiss, im Rinden- und Marksubstanz geschieden. Im ersten Lebensjahre ist die Dura mater regelmässig, im zweiten noch häufig mit dem Schädelloch fest verwachsen, so dass bei Eröffnung der Schädelhöhle die Dura mater und das Schädeldach zugleich abgenommen werden müssen. Es erscheint demnach überflüssig, bei jeder Section eines Kindes unter einem Jahre diese Erscheinung eigens zu beschreiben, wie es in den meisten Sectionsbereichen mit einem besondern Nachdruck geschieht.

Der Durchbruch der Zähne.

Nach Hyrtl fängt schon im ersten Drittel des Embryolebens die Bildung der Zähne an. In der sechsten Schwangerschaftswoche entstehen nach Goodeir an der Stelle der zukünftigen Kinnladen erste Furchen zwischen den kaum angedeuteten Lippen und den rudimentären Kieferbogen. Die Ränder der Furchen erheben sich zu Wällen, wodurch die Furcha zu einem tiefen Graben wird. Die Wälle liegen sich mehrmals ein, wodurch der Graben tiefer wird. Auf dem Grunde der Buchten wachsen Warzchen empor, zwischen welchen die gebogenen Wälle sich berühren, und Zellen für die Warzchen bilden. Jede Zahnlängsmitte mit der Mundhöhle durch eine Oeffnung zusammen, welche sich durch Convexität der Ränder später schliesst. So entsteht das Zahnsäckchen, auf dessen Grund die Zahnpapille aufsteht. Die Zahnpapille dient als Modell für die Ablagerung des Zahnbeins, das Email wird durch das den Kopf der Papille überziehende und einhüllende Schleimorgan gebildet, in welches die Zahnpapille hineinwächst. Auf diese Weise entwickeln sich die Zahnsäckchen der zwanzig Milchzähne, deren Verknöcherung im fünften Schwangerschaftsmonat erfolgt. Die Säckchen für die bleibenden Zähne sprossen an der hintern Wand der Milchzahnsäckchen hervor, wahrscheinlich mit Höhlenscommunication. Sie

schränken sich beim zunehmenden Wachsthum von diesen ab, hängen aber mit ihnen durch einen Faden zusammen (Gubernaculum dentis). Beim Neugeborenen sind schon sämtliche Bläschen der Milchzähne und der bleibenden Zähne im Kiefer vorhanden. Die Milchzähne rücken allmählig gegen den durch einen Knorpel geschlossenen Zahnhöhlenrand des Kiefers empor. Die Ursache dieses Vorrückens ist die successive Ausbildung der Zahnwurzel. Zugleich schwindet der Zahnfleischknorpel und die obere Wand des Zahnsäckchens. Die Seitenwände des Zahnsäckchens werden zum Periost der Zahnwurzel. Zuweilen schwindet der Knorpel früher, als die Krone des Zahnchens die Oberfläche erreicht hat, der durchbrechende Zahn liegt dann in einer weichen Grube des Zahnfleischknorpels frei zu Tage, kann aber häufig nicht gesehen, sondern nur gefühlt oder durch Anschlagen mit einem Löffelstiel entdeckt werden. Ein Experiment, womit man den auf den ersten Zahn ungeduldig wartenden Eltern grosse Freude bereiten kann.

Unter vermehrter Secretion und Rührung der Mundschleimhaut und verschiedenen andern, im spec. Theile abzuhandelnden Symptomen beginnt der Durchbruch der ersten Milchzähne. Die zwanzig Milchzähne erscheinen bei den meisten gesunden Kindern in folgenden fünf Gruppen:

I. Gruppe.

Zwischen dem 4. u. 7. Monate erscheinen ziemlich gleichzeitig die zwei mittleren unteren Schneidezähne, worauf eine Pause von 3–9 Wochen eintritt.

II. Gruppe.

Zwischen dem 8. u. 10. Monate erscheinen die vier oberen Schneidezähne in kurzer Aufeinanderfolge von wenigen Wochen. Zuerst die beiden mittleren, dann die seitlichen. Die zweite Pause beträgt 6–12 Wochen.

III. Gruppe.

Zwischen dem 12. und 16. Monate erscheinen sechs Zähne auf einmal, nämlich die vier ersten Backenzähne und die zwei unteren seitlichen Schneidezähne; gewöhnlich zuerst die Backenzähne im Oberkiefer, dann die unteren Schneidezähne und zuletzt die Backenzähne des Unterkiefers. Pause bis zum 18. Monat.

IV. Gruppe.

Zwischen dem 18. und 24. Monate brechen die Eckzähne (die oberen auch Angenzähne genannt) durch. Pause zwei bis drei Monate.

V. Gruppe.

Zwischen dem 20. und 30. Monate endlich kommen die vier zweiten Backenzähne zum Vorschein.

Hiermit ist die erste Dentition geschlossen. Das Kind hat nun 20 Milchzähne. Im fünften oder sechsten Lebensjahre bricht der dritte Backenzahn durch und hiermit beginnt die zweite Dentition. Die Arterien der Milchzähne obliteriren und ihre Nerven schwinden; so werden

diese ihrer Lebensbedingungen beraubt und fallen, durch die Vergrößerung der Alveolen gelockert, endlich aus, ohne vorher caries geworden zu sein. Da der kindliche Kiefer nicht gross genug ist, auch die bleibenden Zähne in geschlossener Reihe sich entwickeln zu lassen, so kommt der bleibende Eckzahn vor den wässerren Schneidezahn und ersten Backenzahn zu liegen, und auf dieser Sonderstellung der Eckzähne beruhen auch ihre häufigen unrichtigen Stellungen nach dem Durchbruche. Die Scheidewand, welche die Alveoli der bleibenden Zähne von jenen der Milchzähne trennte, wird nach und nach resorbirt. Damit erstere in die Fuostapfen der letzteren treten können und damit sie ihren Weg nicht verfehlen können, verwandelt sich der abgeschnittene Strang zwischen jedem Milchzahn und dem correspondirenden bleibenden Zahn wieder in einen offenen Gang. Die Milchzähne fallen ungefähr in derselben Ordnung wieder aus, wie sie erschienen sind. Im zwölften Jahre erscheint der vierte Backenzahn und endlich im 16. bis 24. Jahre der fünfte Backenzahn, der sog. Weisheitszahn, dessen Krone erst im zehnten Lebensjahre zu verkümmern beginnt.

Wenn auch nicht behauptet werden kann, dass alle gesunden Kinder in der eben beschriebenen Ordnung und Zeit mahen, so steht doch wenigstens so viel fest, dass die Kinder, die diese Ordnung einhalten, die wenigsten Beschwerden und Folgekrankheiten vom Durchbruch ihrer Zähne zu leiden haben. Unter den Varietäten der physiologischen Dentition sind besonders folgende zu bemerken: 1) In der Zeitfolge. Es kommen zuweilen Kinder mit Zähnen auf die Welt, wie Ludwig XIV. und Mirabeau, ohne dass später eine allgemeinere raschere Entwicklung an ihnen bemerkt wurde. 2) In der Reihenfolge. Zuweilen erscheinen die oberen Schneidezähne früher als die unteren, und in diesem Falle die seitlichen meist vor den mittleren; nur sehr selten erscheinen die Eckzähne vor den Backenzähnen.

2. Capitel

Allgemeine Regeln für die Untersuchung der Kinder.

Ganz kleine, erst einige Wochen alte Kinder verhalten sich meist sehr indifferent gegen eine ärztliche Untersuchung, sie schlafen viel und föhlen sich, wenn man sie auf einige Minuten ihrer festen Wickeln und Kissen entlodigt, so behaglich, dass sie nur selten unruhig sind. Fangen die Kinder aber einmal an, ihre Umgebung zu kennen und zu unterscheiden, was oft schon deutlich im dritten Lebensmonate bemerkt wird, so erschreckt sie jedes fremde Gesicht, also auch das des herbeigerufenen Arztes. Diese Schüchternheit dauert bei einigen Kindern bloss bis zum 18. bis 24. Lebensmonate, ahnnet zuweilen ab, dann wieder zu, bei andern aber besteht sie bis zum vierten bis sechsten Jahre fort. Viel kommt hierbei auf die Verhältnisse an, unter welchen das Kind heranwachst; je weniger Menschen es zu sehen bekommt,

um so schlechter wird es; Kinder, die in Städten aufwachsen, leiden deshalb weniger daran als die auf dem Lande.

Drei Umstände sind es hauptsächlich, die dem Kinderarzt hindernd in den Weg treten; das Fehlen der Sprache, die bedeutende Agitation, welche die Untersuchung hervorruft, und endlich das Geschrei, das diese Agitation begleitet. Das erste Hinderniss lässt sich natürlich nicht beseitigen, kann aber durch ein geordnetes, eingehendes Examen der Angehörigen einigermaßen ersetzt werden, die beiden letzten hingegen müssen hinweggeräumt werden.

Wenn ein Kind gewaschen ist und dann getrunken oder gegessen hat, so schläft es ein; da aber diese Proceduren in einer ordentlichen Familie täglich um dieselbe Zeit vorgenommen werden, so ist es gar nicht schwierig, das Kind schlafend zu beobachten, wobei man nicht vergessen darf, es vor dem Einschlafen mit solchen Kleidern einhüllen zu lassen, die dann, ohne das Kind im mindesten zu belästigen, leicht aufgehoben werden können. Der Schlaf muss zu jenen Untersuchungen benutzt werden, welche nur bei vollkommener Ruhe richtig gewürdigt werden können. Die Untersuchungen, welche man ungeachtet der Agitation und des Geschreies vorzunehmen im Stande ist, können bis zum Erwachen des Kindes verschoben werden. Hieraus ergibt sich, dass die Untersuchung kranker Kinder in zwei verschiedenen Zeitabschnitten vorgenommen werden muss, nämlich während der Ruhe und während der Agitation. Nur während der Ruhe können beobachtet werden: die Gesichtszüge, die Stellungen und unwillkürlichen Bewegungen des Rumpfes und der Extremitäten, der Puls, die Art und Zahl der Respirationen und die Ergebnisse der Percussion. Während der Agitation kann man untersuchen: die Haut, deren Farbe, Temperatur und krankhafte Veränderungen, die Mundhöhle, das Abdomen, die Genitalien, den Anus, die Extremitäten, die Art zu weinen und vor allem das Geschrei. —

Der Ausdruck des Gesichtes verräth die Empfindungen auch der kleinsten Kinder ziemlich deutlich und kann für den geübten Beobachter allgemein viel zur Erkennung der Krankheit und Stellung der Prognose beitragen. Esäbe de Salle bemerkt ganz richtig, dass gesunde Säuglinge vollkommen ausdruckslose Physiognomien haben, worin ihm Jedermann, eine verblendete Mutter vielleicht ausgenommen, beistimmen muss. Um so wichtiger ist die Thatsache, dass kranke Kinder einen bestimmten Ausdruck bekommen, der grösstentheils vom Schwund des Fettes im Unterhautzellgewebe, zum Theil aber auch von eigenthümlichen Contractionen sonst relaxirter Gesichtsmuskeln abhängt.

Bei jeder profusen Diarrhöe, am schnellsten bei der asiatischen Cholera, verändern sich die Gesichtszüge eines vorher runden Kindes so rasch, dass es in 24 Stunden oft nicht mehr wieder zu erkennen ist. Die Augäpfel sinken zurück in die Orbita, so dass die Lider kaum mehr dem Bulbus alleinig folgen können und eine Falte (dem untern Rande der Orbita entsprechend) am untern Augenliße sich bildet, die Nase wird spitz und die vorher wulstigen Lippen werden scharfrandig.

Bei chronischer Atrophie schwinden auch die letzten Spuren von Fett aus dem Gesicht, die Haut wird überall zu weit und rauh, und

außerdem kommen noch in Folge von Gehirnreiz mannigfache Contractionen, besonders der Stirnmuskeln, dann des *Corrugator supercilii* und des *Levator alae nasi et labii superioris* vor, wodurch das Gesicht ein greisenhaftes Aussehen bekommt, weshalb die französischen Pädiatriker es sehr ungelernter Weise ein *Voltaire'sches Gesicht* nennen.

Jadelot hat drei Gesichtszüge aufgestellt, welche innere Krankheiten anzeigen sollten. Der erste Zug fängt am innern Augenwinkel an und verliert sich am Jochbein. Er nannte ihn *le trait sculo-zygomatique*, Augenwangenzug. Der zweite nimmt seinen Anfang an obern Theile des Nasenflügels und umfaßt in einem Halbkreis die äußere Linie des *Orbicularis oris*. Dieser zerfällt in zwei Theile, in den Nasen- (*le trait nasal*) und in den Backenzug (*le trait génal*). Der dritte Zug fängt am Mundwinkel an und verliert sich gegen das Kinn zu. Der erste soll Affektionen des Gehirns, der zweite des Unterleibes und der dritte der Brusthöhle anzeigen. Wir brauchen einem denkenden Leser wohl kaum hinzuzufügen, dass dies leere Hirngespinnste sind. So leicht wird es dem Arzte leider nicht gemacht, dass er gleich aus dem Gesichte eine jede Krankheit zu entdecken im Stande wäre. Ein einziges charakteristisches Zeichen für eine bestimmte Krankheit findet sich im Gesichte, nämlich das Heben der Nasenflügel während einer jeden Inspiration, wodurch wir mit größter Bestimmtheit eine entzündliche Affection der Lunge diagnosticiren können. —

Was die Stellungen und Bewegungen des Kindes betrifft, so pflegt das neugeborene Kind diejenige Körperhaltung wieder anzunehmen, die es in der Gebärmutter hatte. Der Rücken ist nach aussen gekrümmt, der Kopf senkt sich auf die Brust und die Glieder sind an den Rumpf gezogen. Liegt das Kind ruhig, hat es schaltenden und festen Schlaf, bewegt es sich im wachen Zustand mit gehöriger Kraft und Lust, so kann man auf ein entschiedenes Wohlbefinden schließen. Hiervon unterscheidet sich wesentlich der Zustand von Kraftlosigkeit und Betäubung. In jenem hört die Beweglichkeit des Kindes auf, es liegt apathisch da, in letzterem hingegen sind die Augen starr, verfolgen nicht mehr die Augen der Mutter oder der Amme, was schon ganz kleine, kaum vier Wochen alte, gesunde Säuglinge zu thun pflegen, die Augenlider bedecken die halbe Hornhaut, schliessen sich aber auch im Schlafe nicht vollständig.

Werfen sich die Kinder unaufhörlich umher und finden in gar keiner Lage Ruhe, so haben sie bestimmt erhöhte Hauttemperatur und beschleunigten Puls, werden sie hierauf ruhig, ohne dass das Fieber abnimmt, so ist dieser Nachlass die Folge zunehmender Schwäche und kann als ungünstiges Zeichen betrachtet werden. Bei exsudativen Processen im Gehirn heugen die Kinder häufig den Kopf nach rückwärts, bei Gehirnatrophie in Folge von allgemeiner Atrophie reiben sie mit dem Hinterhaupt fortwährend am Kopfkissen oder bohren in dasselbe hinein und reiben sich mit den Händchen an den Haaren und den Ohren. Gesunde Kinder schlafen, wenn sie müde sind, in jeder Position ein und ruhig fort, bei Pneumoniën aber wählen die Kinder meist die Rückenlage oder die Lage auf der erkrankten Seite und legen sich, wenn man sie auf die gesunde Seite lagert, gleich wieder auf die andere hinüber. Auf dem Gesichte liegen die Kinder mit scrophulösen Augenentzündungen und zweifeln mit cephalischen Schmerzen.

Wenn man Säuglinge während des Saugens oder kurze Zeit nachher auf die linke Seite legt, so pflegen sie unruhig zu werden und zu erbrechen, was auf der bedeutenden Schwere und Grösse der Leber, die in dieser Lage auf den Magen drückt, zu beruhen scheint. Daher kommt es auch, dass die Säuglinge am leichtesten an der linken Brust trinken, dass sie deshalb mehr an diese angelegt werden und dass sich deshalb in dieser gewöhnlich mehr Milch findet. An Wahrscheinlichkeit gewinnt diese Argumentation noch dadurch, dass Säuglinge, die sich hartnäckig sträuben, an der rechten Brust zu saugen, diese nicht selten eine Weigerung nehmen, sobald man ihre Beine unter den rechten Arm der Mutter bringt und sie auf der rechten Seite liegend trinken lässt.

Mit den Händen zeigen die Kinder häufig direct den Sitz des Schmerzes an. Während des Zahnens greifen sie sich in den Mund, bei Hydrocephalus und Gehirnerreiz zupfen sie an den Haaren (zweilen aber auch an den Genitalien), beim Krupp drücken und reiben sie sich am Hals, grössere Kinder drücken bei Colik sich auf den Unterleib, bei Blasenbeschwerden, häufig durch Vesicantien veranlasst, auf die Blase. Bei Würmern bohren sie sich in der Nase und in dem Anus. Atrophische Kinder haben die Daumen eingeschlagen und machen eine feste Faust. Das stossweise Anziehen und Strecken der Füsse mit Geschrei verbunden ist das gewöhnliche Zeichen von Blähungen und hört sogleich auf, wenn einige Blähungen abgegangen sind.

Die Untersuchung des Pulses kann mit Erfolg nur bei einem schlafenden Kinde angestellt werden. Bei einem Kinde, das plötzlich erwacht oder durch vieles Betasten bereits unruhig geworden ist, hat man natürlich mit unüberwindlichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Das Kind zieht sich auf jede Weise los zu winden, und je fester man den Arm fixirt, um so stärker spannt das Kind die Muskeln und macht das Pulsfühlen ganz unmöglich.

Man hat verschiedene Mittel angegeben, durch welche es auch beim wachenden Kinde gelingen sollte, den Puls zu befühlen, so bei einem an der Brust, an einem Sauglappen oder am Finger saugenden Kinde. Die Saugbewegungen beschleunigen aber immer die Respirations- und die Herzbewegungen, weshalb durch diese Untersuchungsmethode keineswegs brauchbare Resultate erzielt werden können. Man nähert sich also am besten einem schlafenden Kinde, berührt mit der Spitze des Zeigefingers leise die Art. radialis und folgt, wenn das Kind den Arm rührt, allen diesen Bewegungen ohne den geringsten Widerstand, es wird dann gewöhnlich bald wieder ruhig und schläft fort. Dauert die Unruhe des Armes aber fort, so muss man sogleich den tastenden Finger zurückziehen, weil es sonst unzweifelbar wach wird und für ein ärztliches Examen kein Kind ungünstigere Verhältnisse bietet, als ein eben aufgewecktes. In der Vernachlässigung dieser Vorsichtsmaassregeln mag wohl der Grund liegen, dass die meisten Autoren den Puls der Säuglinge etwas zu hoch, 130–140 Schläge in der Minute, angeben. Valleix, Arzt am Pariser Pindelhause, hat bei dreizehn ganz gesunden, schlafenden Säuglingen von 3–21 Tagen die Mittelzahl 87 (Minimum 76, Maximum 104) gefunden. Ich fand bei vierundzwanzig gesunden, schlafenden Säuglingen als Minimum 92, als Maximum 136, als Mittelzahl 109 Pulschläge. Noch schwieriger ist bei der Kleinheit

der Arterie die Bestimmung des harten und weichen Pulses. Das Hauptaugenmerk muss bei Säuglingen entschieden auf den Rhythmus der Pulschläge gerichtet werden, unrythmischer, aussetzender Puls kommt bei Herzerkrankungen und bei Gehirnkrankungen vor. Grosse Frequenz der Pulschläge hat eine viel geringere Bedeutung, als bei Erwachsenen, denn sie wird schon durch die geringste Aufregung und unbedeutende Schmerzen erzeugt. Verlangsamung des Pulses findet man bei Sklerem der Neugeborenen und bei Gehirndruck. In vielen Fällen ist der Puls einem oder selbst mehrere Tage vor dem Tode gar nicht mehr zu fühlen.

Die Temperaturmessungen, welche in neuerer Zeit mit Recht so sehr geübt werden und schon so schöne Resultate geliefert haben, können in der Kinderpraxis nicht immer so bequem, wie dies beim Erwachsenen der Fall ist, ausgeführt werden. Bei Säuglingen macht das Einlegen des Thermometers, während sie an der Mutterbrust saugen, selten Schwierigkeiten, ebensowenig bei schwachen Kindern jeden Alters. Bei leichteren Kranken aber von 1—3 Jahren stösst man sehr häufig auf Widerstand, wenn man den Arm des Kindes nur 5 Minuten lang an die Brust andrücken will. Einzelne wenige Messungen sind für die Diagnose, Prognose etc. von geringem Werthe, und längere Zeit hindurch mehrmals täglich bei einem schreienden, sich sträubenden Kinde diese Prozedur vorzunehmen, wird man, wenigstens in der Privatpraxis, von den Angehörigen verhindert. Abgesehen davon, dass auch die oft wiederholten Aufregungen und der Widerwille des Kindes eine rationelle Contradication abgeben müssen. Dasselbe gilt auch von der vielfach empfohlenen Einbringung des Thermometers in den After, welche nur von Kindern unter einem Jahre ohne Widerstand geduldet wird, bei älteren vielfach ein Zetergeschrei verursacht und also nicht häufig geübt werden kann. Immerhin bleibt die Thermometrie auch in der Pädiatrik ein sehr werthvolles diagnostisches Hilfsmittel. Gleichzeitig muss man sich aber auch gewöhnen, durch Auflegen der wohlverwärmten, trocknen Flachhand auf den Bauch eines jeden Kindes eine approximative Schätzung der Hauttemperatur zu erlernen. Was die gefundenen Thermometergrade betrifft, so sei hier vorläufig nur bemerkt, dass die Fiebertemperaturen bei kräftigen Kindern ausserordentlich hoch, bis zu 41.5° Cel., steigen können und deshalb doch die Prognose nicht lethal gestellt zu werden braucht.

Die Untersuchung der Respirationorgane bietet bei kleinen Kindern sehr bedeutende Schwierigkeiten, die ebenso durch die Kleinheit der betreffenden Organe als durch die Unruhe und Widerpenzigkeit des zu untersuchenden Kindes bedingt sind. Die physikalische Untersuchung zerfällt in die Inspection, Percussion, Auscultation und Palpation, von denen die ersten zwei Methoden bei vollkommenster Ruhe, die letzteren auch bei einem schreienden Kinde in Anwendung kommen können.

Inspection. Was zuerst die Art und Zahl der Respirationen bei kleinen Kindern, die das erste Lebensjahr noch nicht erreicht haben, betrifft, so leuchtet schon aus den sich widersprechenden Angaben der gewissenschaftlichen Autoren ein, dass sich hierüber keine bestimmten Normalzahlen finden lassen. Es schwanken diese Angaben der Respirationsbewegungen zwischen 18 und 35 in der Minute. Vor allem ist

zu berücksichtigen, dass auch bei gesunden Kindern die Respirationsbewegungen nicht gleich sind im Schlafe und wachen Zustande. Nur im Schlafe geht die Respiration vollkommen rhythmisch von Statten. 60 Zählungen, die ich an 22 schlafenden Kindern in einem Alter von 3—4 Wochen vornahm, gaben mir als Mittel 26,4 Inspirationen in der Minute. Sobald die Kinder erwacht und nur einigermaßen munter geworden sind, so wird durch jede Berührung, durch jeden ungewohnten Ton, durch jede Veränderung der Zimmerbeleuchtung die Respiration ungleich: sie setzt länger als gewöhnlich aus, dann folgen wieder einige sehr rasche oberflächliche oder tiefe und langsame Athemzüge nach. Heben die Kinder nun gar an zu schreien, so hört aller Rhythmus auf, im Allgemeinen aber nimmt während des Schreiens die Frequenz der Athemzüge zu. Wegen dieser grossen physiologischen Schwankungen lassen sich auf kleine Abweichungen von der Mittelzahl nicht wohl diagnostische Schlüsse bauen.

Bei Kindern, die das erste Lebensjahr überschritten haben, sind die Respirationsbewegungen im wachen Zustand schon viel gleichmässiger. Durch die so ausserordentlich häufigen Lungenerkrankungen, besonders die lobuläre Pneumonie und die rachitische Carnification, werden sie um das zwei- bis vierfache, also bis 50—80 in der Minute beschleunigt, ohne dass die mechanischen Hindernisse, Verstopfung grösserer Lungenparthien mit Exsudat, physikalisch nachweisbar sind. In späteren Jahren, bis nach vollendeter zweiter Dentition, heben nur noch gewisse Krankheiten den Rhythmus der Respiration auf, nämlich alle jene Gehirnerkrankungen, welche einen erheblichen Druck auf die Gehirnsubstanz ausüben vermögen, also vor allen Hydrocephalus scutis, ferner grössere Gehirntumoren, Gehirnkrebs und zuweilen auch Meningitis und Meningealblutungen, wenn die Eiter- oder Blutschichte über den Meningen eine gewisse Dicke erlangt hat. In diesen Fällen sind die Athembewegungen auffallend ungleich, abwechselnd langsam und wieder beschleunigt, tief, still oder mit einem Seufzer verbunden.

Was die Form der Athembewegungen betrifft, so haben wir beim gesunden Kinde unter einem Jahre vorherrschend die abdominale Respiration, d. h. das Zwerchfell contrahirt sich stärker und kräftiger als die Brustmuskeln, der Brustkorb wird nach oben fast gar nicht, nach abwärts aber um so bedeutender ausgedehnt, so dass vielmehr eine Formveränderung am Unterleibe als am Thorax zum Vorschein kommt. Die Art zu respiriren ist bei verschiedenen Brustkrankheiten eine sehr verschiedene: die einzelnen Abweichungen werden bei den betreffenden Krankheiten im speciellen Theile eigens besprochen werden. Eine aufmerksame Inspection des Thorax ist sehr wichtig und verschafft schon manche Aufschlüsse, bevor noch die eigentliche physikalische Untersuchung, welche ja beim unruhigen Kinde gar nicht ausführbar ist, begonnen hat.

Die Percussion des kindlichen Alters geschieht am besten ohne Plessimeter und ohne Hammer, Finger auf Finger. Der chirurgische Grundsatz, alle Instrumente, die durch die Hand ersetzt werden können, zu vermeiden, findet hier um so mehr seine Anwendung, als die Kinder, besonders die im zweiten und dritten Lebensjahre stehenden, eine unüberwindliche Scheu gegen die Hammer- und Plessimeterpercussion haben, während sie sich bei einer ausserdem ruhigen und sanften Be-

haltung gern die Fingerpercussion gefallen lassen. Kinder, die schon aufrecht getragen werden, percutirt man am besten auf dem Arm der Mutter. Es bietet sich so die Rückenfläche, auf welche immer das meiste Augenmerk zu richten ist, am bequemsten dar, und die Kleinen lassen sich in unmittelbarer Berührung ihrer Mutter noch am liebsten untersuchen. Wickelkinder percutirt man in der Seitenlage, wobei man selten Widerstand zu befürchten hat. Dass die Hände, bevor man sie auf den bloßen Leib des Kindes legt, gehörig gewärmt sein müssen, versteht sich von selbst. Aerzte, die an perpetuellen kalten und feuchten Händen leiden, werden in der Kinderpercussion nicht besonders reüssiren.

Die Percussionsanschläge vollführt man durchaus schwach, sanft und langsam, und setze sie so lange an einer Stelle fort, bis man im Moment der tiefsten Inspiration und vollkommensten Expiration zu percutiren Gelegenheit gehabt hat, wozu oft zehn und noch mehr Schläge nöthwendig sind.

Eine kräftige Percussion, wie sie am Rücken eines athletischen Mannes gefordert wird, ist bei der Elasticität des Thorax und der Kleinheit der zu untersuchenden Organe niemals am Platze. Man percutirt hiedurch nicht deutlicher, sondern macht entferntere Theile, des Darn, resonirend, und ausserdem wird das Kind durch stärkeres Klopfen sogleich und sicher unruhig.

Langsam muss percutirt werden, weil der Untersuckende nur eine gewisse Zeit braucht, den erzeugten Schall zu empfinden und über das Empfundene sich ein Urtheil zu bilden. Mit der gewöhnlichen, raschen trommelnden Bewegung ist es dem geübtesten Ohre nicht möglich, feinere Nuancen des Schalles zu unterscheiden.

An ein und derselben Stelle muss so lange fortpercutirt werden, bis der tiefste Expirations- und Inspirationsmoment erhascht worden ist, weil nur durch Vergleichung und gehörige Würdigung der beiden hiedurch entstehenden immer verschiedenen Percussionschälle eine wirkliche Erkennung der percutirten Parthie ermöglicht wird.

Auf eine Erscheinung muss ich speciell aufmerksam machen, die trotz ihres täglichen Vorkommens noch nirgends gehörig gestrichelt und noch weniger gelehrdet wurde. Percutirt man nämlich bei gesunden Kindern von der Geburt bis zum zweiten und selbst dritten Lebensjahre die beiden Lungen vergleichsweise auf dem Rücken, so findet man, so lange die Kinder ganz ruhig athmen und gar keinen Ton von sich geben, beiderseits einen sonoren, schwächer oder stärker tympanitischen Percussionschall; sobald sie aber unruhig werden, sich gegen die Untersuchung sträuben und ihrem Unwillen durch ein geschrei kundgeben, so wird der ganze Befund plötzlich ein anderer. Statt des beiderseits gleichen, sonor-tympanitischen Schalles tritt über der linken Lunge ein mässig gedämpfter Percussionschall ein, die Rückenfläche der rechten Lunge aber ist hinauf bis an die Spina scapulae vollkommen leer, gedämpft. Percutirt man nun an derselben Seite einige Secunden oder selbst Minuten ruhig fort, bis es sich trifft, dass ein Percussionsschlag gerade mit dem Moment zusammenfällt, wo das Kind wieder tief inspiriren und zu diesem Zwecke die Bauchpresse bis zum vollendeten Athemzuge aufgeben muss, so hört

man plötzlich wieder den ursprünglich normalen Percussionschall, der jedoch nur einen Augenblick währt und sogleich wieder durch vollkommen leere, gedämpfte Schläge ersetzt wird.

Die Kinder, einmal durch Percutiren unwillig gemacht, hören nämlich nicht mehr auf, mit kräftiger Bauchpresse zu schreien, und so lange dieses pressende Geschrei währt, kann man mit Bestimmtheit bei jedem Kinde im ersten Lebensjahre diese Erscheinung studiren.

Der nächst liegende Grund dieses verminderten tonen Schalles auf der ganzen Rückenfläche findet sich in der Wirkung der Bauchpresse, wodurch der Inhalt der Bauchhöhle nach oben comprimirt wird. Der Unterschied zwischen rechts und links, nämlich der vollkommen leere, gedämpfte Percussionschall rechts, erklärt sich vielleicht aus dem stärkeren Aufwärtadrängen der Leber, deren Grösse noch in einem bedeutenden Misseverhältnisse zu den übrigen Unterleibsorganen steht.

Auf der Vorderfläche des Thorax und zu beiden Seiten sind die durch Anwendung der Bauchpresse entstehenden Veränderungen des Percussionschalles wohl auch zu bemerken, erscheinen aber hier viel weniger frappant.

Die eben beschriebene merkwürdige Erscheinung zeitweiser vollkommener Dämpfung rechts hinten macht mein Vertrauen auf die Krankengeschichten von Pneumonien kleiner Kinder, wie sie in den Handbüchern und Journalartikeln sich so häufig finden, etwas schwankend, um so mehr, als in denselben gerade wieder rechts hinten die Dämpfung am häufigsten beobachtet wird. Nur solche physikalische Untersuchungen können Geltung behalten, bei welchen ausdrücklich erwähnt ist, dass das Kind während derselben vollkommen ruhig respirirte, die Bauchpresse nicht benutzte, und dass die dann aufgefunden Dämpfung auch bei der Inspiration und mehrere Tage hindurch noch deutlich zu untersuchen war. Ich bin überzeugt, dass eine grosse Anzahl einfacher Bronchitides, die in den ersten Tagen ihres Bestehens gewöhnlich von Fieber und etwas Dyspnoe begleitet sind, aus Unkenntniss dieser physiologisch normal eintretenden Dämpfung rechts hinten für Pneumonien gehalten werden, worin denn auch die meistens glückliche Befundung und schnell eintretende Genesung ihren Grund haben mag.

Bei der Percussion des Thorax eines schreienden Kindes ist noch eine andere Erscheinung zu bemerken, nämlich das sogenannte Münzenklirren. Dieses Geräusch kann man jeden Augenblick an sich selbst studiren, wenn man sich mit voller Faust an das Sternum klopft und zu gleicher Zeit lange Noten singt. Es wird hiedurch der Ton momentan von einem Geräusche unterbrochen, das metallisch klirrend ist und dieselbe Höhe hat als der gesungene Ton, welcher sogleich nach geschehenem Schläge in der ursprünglichen Reinheit wieder fort klingt. Es kann dieses Geräusch mit dem bei Erwachsenen vorkommenden cavernösen Münzenklirren und dem Brait de pöt *etc* nicht verwechselt werden, indem es nur während des Schreiens oder Sprechens hervorgebracht werden kann, während das bei Excavationen zuweilen beobachtete, auch ohne dass der Kranke einen Ton von sich gibt, gehört wird. Bei ruhig athmenden, nicht schreienden Kindern kommt niemals Münzenklirren vor, indem bekanntlich bei Kindern unter zwei Jahren Cavernen ausserordentlich selten sind, und selbst bei deren

Bestehen das Geräusch nur ausnahmsweise percutirt wird. Diagnostische Bedeutung kann ihm demnach nicht zugeschrieben werden.

Durch Percussion lässt sich in manchen Fällen die Grösse der Thymusdrüse ermitteln. Wenn man das Manubrium sterni möglichst aufmerksam und leise percutirt, so findet man eine Dämpfung, deren Umfang von Monat zu Monat abnimmt. Man kann sich durch diese Untersuchung häufig genug überzeugen, dass viele Kinder eine grosse Thymusdrüse haben und doch niemals an Spasmus glottidis leiden, und umgekehrt, dass viele Kinder, die von heftigem Spasmus glottidis (das sog. Asthma thymicum) befallen werden, keine percutirbare Thymus erkennen lassen.

Die Auscultation, bei Erwachsenen der wesentlichste Theil der physikalischen Untersuchung, bietet bei Kindern viel geringere Vortheile, woran theils die fettschleude Ursache und die ungleichmässigen Athembewegungen herrschen, theils die Kleinheit des Raumes und die durch die elastischen Thoraxwände begünstigte Schallleitung, theils endlich der Umstand, dass die Kinderstimme auf den Wunsch des Untersuchers weder erhoben noch verboten werden kann, die Schuld tragen.

Wenn bei abgemagerten Kindern die Intercostaleäume einmal bedeutende Vertiefungen darstellen, so ist eine vollständige Aufsetzung des Stethoscops geradezu unmöglich; mit dem blossen Ohre die Seitenflächen oder die vorderen Partheiten des Thorax zu auscultiren, duldet fast kein Kind, es bleibt uns also vernehmlich der Rücken für diese Untersuchung übrig. Während wir aber bei Erwachsenen den Raum des Trachealathmens genau begrenzt wissen, ist dies bei den Kindern nicht der Fall. Wir hören bei gesunden Kindern über den ganzen Rücken, oft sogar über den ganzen Thorax eine laute Expiration und eine tiefe Inspiration, so dass wir nach diesem Befunde, wenn er bei Erwachsenen vorkommt, eine ausgedehnte, unzweifelhafte Verdichtung des Lungengewebes diagnostizieren würden. Nicht so bei Kindern. Wir haben hier bei der Auscultation nicht die streng geschiedenen Geräusche des normalen Vesicularathmens einerseits und des Bronchialathmens andererseits, sondern an den meisten Stellen des Thorax ein dem Bronchialathmen sehr nahe, nur durch lange Uebung von diesem zu unterscheidendes Geräusch. So fällt der Hauptschluss, den wir aus dem Bronchialathmen bei Erwachsenen ziehen können, nämlich die Verdichtung des Lungengewebes, weg; es handelt sich bei Kindern meistens nur um eine Vergleichung der beiden Thoraxhälften, auf welcher von beiden das Bronchialathmen deutlicher vernommen wird. Gute Anhaltspunkte liefert die Auscultation der Stimme. Die Stimme resonirt zwar überall am ganzen kindlichen Thorax, wo aber verdichtetes Lungengewebe besteht, da ist ihre Resonanz so heftig, dass der Untersuchende glaubt, er habe sein Ohr am Munde des Kindes, und dieses schreie ihm direkt hinein. Es ist dieses Zeichen um so werthvoller, als es auch bei unruhigen Kindern, und zwar nur bei diesen wahrgenommen werden kann, und man sich also dem Kinde nicht mit besonderer Vorsicht und grossem Zeitaufwand zu nähern braucht.

Die Palpation ist die bequemste und einfachste Untersuchungsmethode des kindlichen Thorax. Legt man die Hand auf die Brust eines Kindes, so fühlt man zunächst den Temperatur- und Feuchtig-

keitsgrad der Haut. Da, wie schon oben bemerkt worden, bei der Unruhe der Kinder exacte Thermometermessungen nicht immer anwendbar sind, so muss man sich gewöhnen, mit der Hand allein die Hauttemperatur möglichst genau zu erforschen, indem die erhöhte Temperatur das wesentlichste Glied des Symptomencomplexes, den wir Fieber nennen, abgibt und hiernach unser therapeutisches Verfahren sich zum grössten Theile richtet.

Ausser diesen allgemeineren Wahrnehmungen fühlt die auf die Brust gelegte Hand noch den Fremitus der Stimme, d. h. die der Hand sich mittheilenden Vibrationen des Thorax, welche mit der Stimme entstehen und wieder verschwinden. Am stärksten werden die Vibrationen am Orte ihrer Entstehung, dem Larynx und der Trachea gefühlt, sehr deutlich längs der Wirbelsäule, in dem Räume zwischen den beiden Schulterblättern, d. h. in den Seitengegenden, dann über und unter den Schlüsselbeinen und dem Sternum. Da, wo das Herz und die Leber unmittelbar den Brustkorb berühren, ist der Fremitus vollkommen aufgehoben, Fettpolster schwächen die Vibrationen.

Diese bei jedem gesunden Kinde auftretenden Verhältnisse ändern sich nun, sobald ein Theil des Lungengewebes durch compacte tuberculoöse oder scirrhuöse Infiltrationen, lobäre Hepatisation oder Carnification verdichtet ist. Es wird nämlich, wenn die hierbei in verdichteten Stellen einmündenden grösseren Bronchien permacabel bleiben, die Stimme verstärkt gefühlt. Verstopfung eines Bronchus hebt allen Fremitus über der entsprechenden Lungenpartie auf. Flüssige Ergüsse in den Pleurasäcken verhindern uns ebenfalls da, wo die Flüssigkeit die Lungen von den Rippen trennt, die Stimme zu fühlen, hingegen ist bei der nothwendig dadurch erfolgenden Compression der Lungen, da wo sie am Thorax anliegen, der Fremitus verstärkt.

Durch die Palpation lassen sich ausser der Stimme noch die Rhenchi ermitteln. Bringt die in den Bronchien und der Trachea auf- und abströmende Luft zähe Schleimmassen, die membran- oder balkenartig deren Lumen ausfüllen, in Schwingungen, so theilen sich die so entstehenden Geräusche der Brustwand mit und pflanzen sich deutlicher und weiter als alle anderen Geräusche fort. Auf diesem letzteren Umstande beruht auch die irrthümliche Ansicht, dass diese Geräusche da entstehen, wo sie am deutlichsten gefühlt werden. Je höher oben gegen die Trachea zu die vibrierende Schleimlamelle aufsteht, um so vorläufiger fühlt man das hierdurch entstehende Geräusch über den ganzen Thorax, je kleiner der Durchmesser des schleimhaltigen Bronchus, also je näher der Peripherie, um so umschriebener wird es an der Brustwand fühlbar.

Die Palpation der Stimme und der Rhenchi darf nie unterlassen werden, und muss bei unruhigen Kindern sogar Percussion und Auscultation ersetzen.

Dies sind die Hauptpunkte, auf welche der Arzt bei einem schlafenden oder wenigstens ruhigen Kinde zuerst zu achten hat. Die Percussion muss immer zuletzt vorgenommen werden, weil man durch dieselbe am gewöhnlichsten den Schlaf stört.

Fast noch wichtiger als die Untersuchung der Brusthöhle ist die der Bauchhöhle, da die Krankheiten des Darmkanals bei weitem häufiger sind als die der Lungen. Wenn schon beim Erwachsenen die

Percussion des Abdomens wegen der schwankenden Gasmenge in den Gedärmen keine sehr exakten Resultate liefert, so tritt dieser Uebelstand beim Kinde noch viel schärfer hervor. Bei allen Arten von Darmcatarrhen wird der Darm meteoristisch aufgetrieben und Leber und Milz scheinen bei der dann vorgenommenen Percussion scheinbar an Volumen ab.

Valleix liess, wenn er den Bauch eines Kindes untersuchen wollte, dasselbe plötzlich zu ein helles Fenster oder in die Nähe eines Lichtes bringen, wodurch die Unruhe in der Regel sogleich aufhört, das Kind sieht unterwandt gegen das Licht. Einen solchen Augenblick muss man benutzen, um einen langsam zunehmenden Druck auf das Abdomen auszuüben, was das Kind ruhig verträgt, wenn der Druck keinen wirklichen Schmerz erzeugt. Man kann auf diese Weise den Bauch bei einem kleinen Kinde oft so stark drücken, dass man die Wirbelsäule berührt. Ist der Druck wirklich schmerzhaft, so stösst das Kind jedesmal einen schmerzhaften lauten Schrei mit Verzerrung der Gesichtszüge aus, der zuweilen gleich wieder aufhört, sobald der Druck nachlässt.

Seröse Ergüsse im Peritonealsack, die hauptsächlich häufig nach Scharlach und bei Tuberculosis des Peritoniums vorkommen, findet man schwer in liegender Stellung. Das Serum senkt sich nach hinten und an der vorderen Fläche des Abdomen findet sich überall Darm, so dass man nirgends Fluctuation entdecken kann. Lässt man die Kinder aufsitzen oder auf den Bauch legen, so senkt sich das Serum nach unten und vorne, und ist dann leicht durch Fluctuationsgefühl und Percussion zu constatiren.

Der Anus ist bei jedem Kinde genau zu besichtigen. Bei vielen Diarrhöen röthet er sich und gibt gewissermassen einen Massstab für die Heftigkeit und Dauer, an ihm erscheinen auch gewöhnlich die ersten Symptome der angeborenen Syphilis. Die innere Untersuchung ist gar keine Schwierigkeit: unter langsam rotirenden Bewegungen kann der kleine Finger wohl geröth auch eingeführt werden, es verursacht aber diese Proedur immer Schmerzen, und darf nur bei wirklichen Indicationen vorgenommen werden.

Die Genitalien verdienen auch in allen Fällen eine genaue Besichtigung. Sie sind bei Diarrhöen ebenfalls geröthet und das Secretum vornehmlich excurirt sehr schnell, die weiblichen Genitalien secretiren dann mehr Schleim. Die Harnröhre wird am einfachsten mit einer silbernen Sonde, beim Knaben catheterartig gebogen, untersucht, welche Proedur in vielen Fällen von Strangurie zugleich als Heilmittel die besten Dienste leistet.

Die Innenfläche der Schenkel ist der beste Anhaltspunkt für die Beurtheilung der Ab- oder Zunahme eines kranken Kindes, wie ja bekanntlich auch die Mästmag unseres Schlachtyiches von den Fleischern immer an dieser Stelle geprüft wird. Ein Unwohlsein und besonders eine Diarrhöe von wenigen Stunden macht die vorher feste, gespannte Haut schon weich und etwas locker, nach 24 Stunden entstehen kleine Fältchen auf ihr, und bei fortdauernder Krankheit schwinden die mächtigen Fettpolster so vollkommen, dass statt ihrer grauälfaltige, schlotternde Sacke sich bilden, die sich aber bei wieder aufgenommener Ernährung erstaunlich rasch füllen und der inneren Schenkelfläche ihre frühere Gestalt und Festigkeit wiedergeben.

Die Untersuchung der Mundhöhle darf nie unterlassen werden. Man drückt dem Kindern sanft auf das Kinn, worauf sie gewöhnlich den Mund weit aufzucken, oder man schiebt ihnen den Finger längs der Wangenschleimhaut bis an den hinteren Abschnitt des Unterkiefers, gelangt hier leicht zwischen Ober- und Unterkiefer hinein und kann nun die Mundhöhle beliebig weit öffnen. Bei einiger Geschicklichkeit und Uebung gelingt es sehr leicht, mit dem Zeigefinger die hintere Pharynxwand, den hinteren Ausgang der Nasenhöhle, den Kehldeckel und selbst die Stimmritze zu betasten, was in einzelnen Fällen von Diphtheritis, Retropharyngealabscessen, Larynxkrup etc. wichtige Aufschlüsse verschaffen kann.

Die Zunge ist bei Kindern noch viel weniger „der Spiegel des Magens“ als bei Erwachsenen. Kinder mit heftigen Darmkrankungen haben häufig eine ganz normale rothe Zunge, und umgekehrt gesunde Kinder mit gutem Appetit und regelmäßiger Verdauung zeigen häufig eine ganz weisse oder wenigstens mit weissen Inseln bedeckte Zunge. Viele Eltern richten ihre Kinder schon in der frühesten Jugend dazu ab, auf Befehl sogleich die Zunge heranzustrecken, und thun sich auf diese ihre unsichere Erziehung etwas zu Gute. Die Kleinen treiben aber dann ihre gute Erziehung so weit, dass sie auch auf der Strasse dem behandelnden Arzt, den sie häufig schon von weitem erkennen, zur allgemeinen Belustigung der Vorübergehenden die Zunge fortwährend heranzustrecken. Zahnende Kinder mit rothem Zahnfleisch lassen ihre Mundhöhle nur sehr ungern untersuchen, man muss sich deshalb gehören, mit einem einzigen Fingergriff so rasch als möglich beide Zahnreihen zu überstreichen, damit sie nicht gar zu unruhig werden.

Zweiterlei Geräusche sind es endlich, die wir bei der Untersuchung beobachten müssen: Das Geschrei und der Husten.

Die Kinder schreien nur während des Expirationsaktes. Während der Inspiration kommen zwar auch einzelne Schreie vor, z. B. beim Stimmkrampf. Diese lauten, gezeugten Inspirationen sind jedoch immer nur vereinzelt und lassen sich unter die Bezeichnung „Geschrei“ eigentlich nicht bringen, da wir hierbei eine Reihe schnell sich folgender Töne im Sinne haben. Das gewöhnliche Geschrei findet also nur während der Expiration statt, es ist laut klingend, langgedehnt und bei Kindern von gleichem Alter auch von ziemlich gleicher Höhe, doch hat der Ton des Geschreies fast bei jedem Kinde noch etwas Eigenthümliches, das sich ebenso wenig wie die Verschiedenheit der menschlichen Stimme genauer definiren lässt. Da während des Schreiens die Luft in den Lungen durch die Bauchpresse comprimirt wird, durch die gespannte Stimmritze aber nur langsam und nicht dem Grade ihrer Compression entsprechend entweichen kann, so muss eine momentane Circulationsstörung eintreten. Nach einer tiefen Inspiration hebt das Kind sein Geschrei damit an, dass es den Mund weit öffnet, wobei die Zunge, zwischen leichten convulsivischen Bewegungen auf dem Zahnfleischrande sichtbar wird, die Nasenlöcher sich erweitern, die Augen sich prestend schliessen und auf den Wangen und der Stirne sich zahlreiche Falten bilden. Es schreiet nun unter zunehmender Röthe und strotzenden Hals- und Kopfveuen so lange fort, als es ohne erneute Inspiration bestehen kann; tritt dieser Zeitpunkt ein, so nimmt

es rasch einen tiefen Athem, wobei die Verzerrung der Gesichtszüge einen Augenblick nachläßt. So lange die Unruhe des Kindes währt, bestehen auch diese Verzerrungen fort, sobald es sich aber beruhigt, tritt wieder ein Ebenmaas im Aus- und Einathmen ein, die Falten des Gesichtes schwinden, es folgen noch einzelne leichtere Schreie, der Mund schließt sich allmählig und es tritt dann bald eine kleine Erschlaffung ein, die sehr gewöhnlich in Schlaf überzugehen pflegt. Zwischen hiet man in einer Expiration drei bis fünf Schreie schnell aufeinander, worauf ein langgezogener anhaltender Schrei folgt, der in stürzenden Absetzen endet. Es hat dieses Geschrei mit dem Ziegegemecker grosse Aehnlichkeit. Zu bemerken ist noch, dass kleine Kinder unter $\frac{1}{2}$ Jahr, und nur für diese gilt die bisherige Beschreibung des Geschreies, normale Thränen vergiessen.

Die wesentlichsten Schlüsse, die wir von der Art des Geschreies auf die Art der Erkrankung selbst ziehen können, sind nun folgende: Kinder, die an Pneumonie, an Pleuritis oder an Atelectase der Lungen leiden, schreien niemals laut, noch viel weniger anhaltend, sie sind blos im Stande, ein leises klägliches Stöhnen hervorzu bringen. Kinder, die an catarrhalischer, diphtheritischer oder kroupöser Laryngitis erkrankt sind, können gar nicht schreien, sind aphonisch, die leichtesten Grade von catarrhalischer Kehlkopfentzündung hemmen das Geschrei nicht vollständig, machen es aber heiser. Hydrocephalische Kinder endlich bringen nur einzelne schrille Töne hervor und verfallen nach jedem einzelnen Aufschreien wieder in ihren Sopor. Ein fieberkrankes Kind schreit nie anhaltend und laut, selbst wenn es heftige Schmerzen hat. Am längsten schreien die Kinder bei Otitis, bei Abscessen in der Tiefe und nach Verwundungen.

Die Art des Hustens gibt uns für die Beurtheilung der Respirationsorgane sehr wesentliche Anhaltspunkte: Husten die Kinder laut, locker und ohne Schmerz, so hat man sicher nur einen einfachen Catarrh der Bronchien vor sich; verzerren sie aber bei jedem Hustenreiz das Gesicht, husten sie trocken, heiss und suchen sie den Husten möglichst zu unterdrücken, so hat man es eben so sicher mit einer entzündlichen Affectio der Lungen zu thun. Der Kroup beginnt mit einem trocknen, heissem Husten, der nur zu bald einem aphonischen Krächzen Platz macht. Der Keuchhusten besteht in einem langen, krampfhaften, stossweisen Aushusten, das durch eine gezogene, laut schlürfende Inspiration unterbrochen wird. Die tuberculösen Kinder husten meist trocken, aber in kurzen Intervallen Tag und Nacht fort. Der Husten der Typhösen endlich ist im Verhältniss zu den grossen Veränderungen, die wir an den Lungen physikalisch nachweisen und häufig in den Leichen finden, sehr unbedeutend und ohne Beschwerde.

Diese sind die Haupteigenschaften, auf die der Arzt bei Untersuchung eines kranken Kindes vernünftlich Rücksicht zu nehmen hat. Was nun das Benehmen des Arztes betrifft, so gehört zum Umgange mit kranken Kindern grosse Geduld und Sacftmuth. Am schwierigsten sind immer die Kinder von 1—3 Jahren zu behandeln. Säuglinge und Kinder unter einem Jahre sind selten sehr schen und lassen sich durch etwas Geklapper oder leichtes Klopfen auf ihre Knieen schnell beruhigen. Die Kinder von dem eben angeführten Alter haben oft gegen jedes fremde Gesicht eine unüberwindliche Schen. Man muss

zu solchen Kindern nicht direkt an's Bett gehen, sondern ihnen Anfangs den Rücken wenden, sie ganz ignoriren, entfernt vom Bettelohr mit den Eltern oder Kindermädchen ruhige Gespräche mit sanfter Stimme führen, und sich endlich langsam und ruhig mit etwas Glänzenbom oder einem Stückchen Zucker dem Kinde nähern. Sitzt man am Bett, so darf man das Kind nicht gleich abdecken, am Unterleib herumkneten und die physikalische Untersuchung beginnen. Man stellt erst einzelne dem Alter entsprechende Fragen an dasselbe und sucht ihm einige Ja oder Nein abzugewinnen, oder man bewundert sein Spielzeug, das am Bette steht, oder man erzählt ihm von einem andern Spielzeug, das es noch nicht besitzt und das man ihm zu zeigen verspricht etc. etc., kurz man muss mit dem Kinde befreundet sein, bevor man es untersuchen darf, an eine ordentliche gründliche Untersuchung zu denken. Auf diese Weise gelangt es aber fast immer und zwar sehr schnell, sich die Freundschaft der Kleinen zu erwerben. Lässt man nach so geschlossener Freundschaft auch etwas Ernst und Energie durchblicken, so gewinnt man plötzlich viel mehr Autorität über die Kinder, als diese die nächste Umgebung nur je zu ahnen gewagt hat. Die Kinder lassen sich dann ruhig untersuchen, legen sich auf jede Seite, die man wünscht, nehmen ohne Widerrede selbst die bittersten Medicamente ein und unterstützen die ärztliche Untersuchung auf alle mögliche Weise. Nur wenn die Umgebung die unglaubliche Bornirtheit begangen hat, dem Kinde den zu erwartenden Arzt als Pöganx vorzustellen, dauert es etwas länger, bis ihm diese einfältige Vorstellung wieder verwischt wird. Niemals und unter keiner Bedingung versuche man durch lautes Anfahren, Festhalten oder gar durch einen leichten Schlag widerspenstige Kinder zur Fügsamkeit zu bringen. Abgesehen davon, dass man hiedurch nur grössere Furcht und ein noch heftigeres Zetoreschrei bewirkt, zieht man sich hiedurch die Abneigung und selbst den Hass der meistens berührten Eltern — denn fast nur bei diesen findet man solche unbändige Kobbhe — zu. Behält man hingegen in solchen Fällen seinen Gleichmuth und ruhige Stimme, so überkommt die Eltern wegen der ganz vernachlässigten und verfehlten Erziehung des Kindes ein tiefes Schamgefühl. Sie stoßigen es hierauf oft so gewaltig, dass man vom ärztlichen Standpunkt aus dazwischen treten muss, worauf man dann gewöhnlich gewonnenes Spiel und einen ergebenen Patienten hat. Im Allgemeinen kann der Grundsatz aufgestellt werden: je kränker das Kind, um so leichter lässt es sich untersuchen.

Dem angehenden, in der Pädiatrik unerfahrenen Arzte mögen diese Bemerkungen kleinlich und unbedeutend erscheinen, wenn er sich aber einmal mehr auf diesem Gebiete bewegt hat, wird er bald einsehen, dass ohne diese Cautelen trotz aller Kenntnisse und Untersuchungsmethoden eine glückliche Behandlung rein unmöglich ist.

3. Capitel.

Ernährung und Pflege der Kinder.

Das beste Nahrungsmittel für ein neugeborenes Kind ist bekanntlich die Milch seiner eigenen Mutter, wenn diese nicht stillen kann, die Milch einer Amme, und wenn auch diese nicht bezuschaffen ist, die Milch eines Haushieres.

Bezüglich des Stillens durch die eigene Mutter entstehen zwei Fragen: 1) In welchen Fällen kann die Mutter nicht stillen? und 2) in welchen darf sie nicht stillen?

Sie kann nicht stillen, wenn sie keine oder zu wenig Milch hat, wenn die Warzen fehlen oder fehlerhaft gebildet sind, oder endlich wenn örtliche Krankheiten der Brust, Geschwüre oder Krebsläsionen vorhanden sind. Ob eine Mutter Milch bekommen und das Kind selbst zu säugen vermögen werde, ist, besonders bei Erstgebärenden, schwer vorherzusagen. Die Größe und Härte einer Brust gibt hierfür keinen sicheren Anhaltspunkt. Oft fehlt gesunden, jungen Frauen mit gutgeformten üppigen Brüsten die Milch, während sie bei schwächeren, mit rather sehr flachem Busen, oft wider Erwarten reichlich eintritt. Am wahrscheinlichsten sind die Schwangeren zum Selbststillen ihres zu erwartenden Kindes geeignet, denen schon während der Schwangerschaft viel Colostrum aus den Brüsten fließt. Bezüglich dieser Secretion theilt Dumas die Frauen in drei Klassen: In die erste gehören jene, die so wenig Colostrum secretiren, dass man am Ende der Schwangerschaft kaum einige Tropfen aus der Drüse zu drücken im Stande ist. Dieses Colostrum enthält mikroskopisch nur wenig Milchkügelchen und nur eine geringe Zahl Colostrumkörperchen. Man darf dann nur auf eine sparsame Milchsecretion nach der Entbindung rechnen.

Die zweite Klasse umfasst jene Frauen, die zwar viel Colostrum secretiren, das aber ganz die Eigenschaften des vorigen hat. Es ist oben so arm an Milchkügelchen und Colostrumkörperchen, und man kann dann mit Wahrscheinlichkeit eine zwar reichlich secretirte aber dünne, wenig nahrhafte Milch nach der Geburt erwarten.

Ist aber dreitens die Secretion des Colostrums am Ende der Schwangerschaft reichlich, milchweis und mit gelben Streifen und Klümpchen vermischt, und finden sich viel Milchkügelchen und Colostrumkörperchen vor, so kann man ziemlich bestimmt voraussagen, dass sich die Schwangere zum Selbststillen eignet und eine nahrhafte Milch in genügender Menge secretiren wird.

Vollkommener Mangel der Warzen findet sich selten, häufig aber kommen die eingedrückten Warzen vor, wozu gewöhnlich ein zu hoch heraufgehendes Corsette, dessen Brustausbuchtung zu klein ist, die Schuld trägt. Nach der Geburt ist es zu spät, diese eingedrückten Warzen zu verbessern; bis es gelingt, sie brauchbar zu machen, müht sich das Kind vergebens ab, die Milch herauszuziehen und hört endlich ganz auf zu saugen; während der letzten Schwangerschaftsmonate aber kann hierfür viel geschehen. Die Frauen müssen ganz weit gekleidet

sein und müssen täglich einmal den Kopf einer irischen sogenannten kölnischen Pfeife auf die Warze setzen und am andern Ende der Pfeife mit dem Mund saugen, oder man setzt ihnen noch besser täglich einmal eine Gutschukmilchpumpe auf. Den Vorschlag von Bouchout, wenn die Frauen diese Manipulation nicht ertragen, „den Mann hin und wieder den Säugling machen zu lassen“, habe ich noch keinem Ehrenmann gemacht, glaube auch nicht, dass sich bei uns in Deutschland viele so galante Gatten finden würden.

Mit dem Brustkrebs endlich darf man jene harten gnostigen Knoten nicht verwechseln, welche bei jungen Frauen und Mädchen sehr häufig vorkommen, aber unschmerzhaft sind. Sie sind ganz unschädlich und verlieren sich gänzlich nach dem ersten Wochenbette, wenn das Stillen einmal in Gang gekommen.

Die zweite Frage: In welchen Fällen darf eine Mutter nicht selbst stillen? ist schwieriger zu entscheiden. Schwächliche und art organisirte Frauen ertragen sowohl das Selbststillen gut, wenn sie sonst günstige äussere Verhältnisse und das zum Stillen sehr notwendige Phlegma haben. In andern Fällen hingegen wirkt das Stillen selbst auf kräftige robuste Frauen, wenn Armuth, Aerger, Groll, unglückliche eheliche Verhältnisse dazu kommen, höchst ungünstig, sie mager ab und altern ausserordentlich schnell. Absolut zu verbotenen ist das Selbststillen allen Müttern, welche an Syphilis, chronischen Hautausschlägen, Tuberculosis, oder auch nur hereditärer Anlage zu derselben, an Arthritis und Epilepsie leiden. Bei hysterischen Frauen hat das Selbststillen vermöge der Säftenzirkulation einen nachtheiligen Einfluss sowohl auf die Gesundheit der Mutter, als vermittelt der Herrschaft des Nervensystems auf die Milchabsonderung auch auf das Kind. Bei höherem Alter der Mutter, besonders wenn diese Erstgebärende ist, verbietet sich das Stillen wegen Mangel an Milch meistens von selbst, ist aber wegen jedenfalls dünner, magerer Milch in allen Fällen abzurathen. Acute Krankheiten, Exantheme, Typhus, Puerperalfieber etc. machen gewöhnlich die Milch versiegen, so lange sie aber secretirt wird, soll man die Kinder nicht abnehmen. Die Milch wirkt nicht direkt schädlich auf das Kind, ihre Entfernung aber in allen Fällen sehr wohlthätig auf die Mutter.

Liegt keiner dieser Uebelstände vor, so ist es einer jeden Mutter zur heiligen Pflicht zu machen, dass sie ihr Kind selbst stille. Zartheit und Kleinheit kann diese Pflicht nicht aufheben, sonst wären die meisten Frauen in unseren Städten davon dispensirt. Unter ausserordentlich günstigen Verhältnissen bekommt die Milch der eigenen Mutter den Kindern immer am besten, denn es ist eine oft gemachte Erfahrung, dass das Kind einer schwächlichen Mutter an deren Brust vortrefflich gedeiht und zunimmt, während ein fremdes Kind, dem man, verführt durch das gute Aussehen des ersteren, diese schwächliche Mutter als Amme gibt, durchaus nicht zunehmen will.

Kann oder will eine Mutter nicht selbst stillen, so ist das beste Surrogat eine Amme.

Es ist schwer über die Wahl einer Amme allgemeine Regeln aufzustellen, weil eine Menge localer Verhältnisse hier in Betracht kommt, die natürlich für verschiedene Städte und Länder verschiedene sein müssen.

Hat man die Wahl zwischen mehreren zum Annehmen sich anbietenden Personen, so erhält immer die den Vorrang, die schon einmal geboren und durch ihre Brust allein ein kräftiges Kind schon aufgezogen hat. Lässt sich dies durch eigene Anschauung oder glaubwürdige Zeugen beweisen, so hat man die grösste Garantie, dass nach den folgenden Geburten das Stillen in gleicher Regelmässigkeit vor sich gehen werde. Es ist immer gut, wenn die Amme 3—4 Wochen früher entbunden hat, als die Frau, deren Kind sie übernehmen soll, denn in den ersten drei Wochen hat fast eine jede Wöchnerin eine ziemlichliche Quantität Milch aufzuweisen, nach dieser Zeit aber nimmt bei vielen die Milchsecretion von Tag zu Tag ab, so dass, wenn man geschickt war, eine Amme zu engagiren, die erst vor wenigen Tagen entbunden hat, aus nach einigen Wochen diesen kostbaren Individuen wegen Milchmangel den Abschied geben muss. Ausserdem sind bei Ammen, die zehn einige Wochen gestillt haben, Nachkrankheiten des Wochenbettes und namentlich das lastige Wundwerden der Warzen nicht mehr zu befürchten. Dass hier aufgeführten Vortheile überwiegen jedenfalls den kleinen Nachtheil, dass die Milch einer solchen Amme eigentlich für ein mehrere Wochen älteres Kind gehört. Die chemische Zusammensetzung der Milch ist überhaupt bei ein und derselben Amme und noch mehr bei verschiedenen Individuen so wenig constant, dass es immer nur ein glücklicher Zufall ist, wenn einem Kinde die Milch einer fremden Person so gut wie die seiner eigenen Mutter bekommt und anschlägt.

Das beste Alter für eine Amme ist zwischen 20 und 30 Jahren, doch können häufig Ausnahmen hiervon gemacht werden. Mädchen unter 20 Jahren sind meist Erstgebärende, und haben also ihre Eigenschaften als Amme noch nicht decideret. Bei Personen, die älter als 30 Jahre sind, findet schon nicht mehr der rege Stoffwechsel statt, der zur Production einer qualitativ und quantitativ genügenden Milch gefordert wird. Die Franzosen behaupten, die Bretonnen hätten eine nahrhaftere Milch als die Bretonnen, wozu ich mich bei uns in Deutschland noch nicht habe überzeugen können. Was die Brustdrüsen selbst betrifft, so sehen sie häufig gross, von gesunder Haut bedeckt, die Warzen müssen wenigstens 2—3 Linien prominiren, und bei Druck auf die Mamma muss die Milch aus mehreren Milchgängen in feinen Strahlen hervorspritzen. Man pflegt bei den Ammen auch auf gute Zähne zu sehen, was übrigens bei der ungeheuren Verheerung, die jetzt die Zahnaries gewonnen hat, immer nicht vernachlässigt wird. Viel wichtiger scheint mir ein gesundes, rothes, festes Zahnfleisch zu sein. Blasses, bläuliches, leicht blutendes oder riechendes Zahnfleisch lässt immer Blutarmuth oder mangelhafte Verdauung vermuthen, zwei Zustände, die sich keinesfalls mit dem Säugen vertragen. Bei unserer Bevölkerung sind mir die plögnatischen und nachgiebigen Ammen immer die erwünschtesten, eine herrschsüchtige Person kann in einem Hause, wo mehrere Dienstboten sind, niemals Amme werden; denn sie wird, kaum angenommen, sogleich ihre Unentbehrlichkeit denselben fühlen lassen und sie nach wenigen Tagen aus dem Hause zu treiben suchen. Der Schluss der ganzen Scene ist dann immer, dass die Friesenatorerin wieder entfernt wird, und der für Alles Rath wissende Hausarzt eine neue Amme herbeschaffen muss. Gewöhnlich zieht man die Land-

mädchen den Städterinnen vor. Wenn es wahr wäre, dass die Moralität auf dem Lande grösser ist als in der Stadt, so wäre dies allerdings ein gewichtiger Grund, meine Erfahrungen jedoch können diese Behauptung nicht bestätigen. Bei Landmännern stellt sich aber meist noch der Uebelstand ein, dass sie starkes Heisswech bekommen, die städtische Kost und Lebensweise nicht vertragen und sich schwer acclimatilisiren, so dass sie trotz ihres stärkeren Knochenbaues und ihrer entwickelteren Brüste weniger gute Dienste leisten, als ein Fabrikmädchen oder eine städtische Dienstmagd.

Bevor man eine Amme annimmt, hat sie sich und ihr Kind am ganzen Körper untersuchen zu lassen; das Kind muss gut genährt sein, für sein Alter gehörige Fettpolster haben und darf an keinem Körperteile nur irgend verdächtige wunde Stellen zeigen. Die Amme muss die oben beschriebenen Eigenschaften der Mamma und des Zahnfleisches haben, die physikalische Untersuchung der Brusthöhle darf keine Anomalie ergeben, sie darf keinerlei Geschwüre haben, besonders sind Arme, Genitalien und Mundhöhle genau auf Syphilis zu untersuchen.

Diese Vorschriften finden aber zur ihre Anwendung, wenn man die Wahl zwischen mehreren Ammen hat. Wenn man aber, wie es so häufig in kleineren Städten der Fall ist, froh sein muss, überhaupt im ganzen Orte und seiner Umgegend eine Person, die sich zur Amme hergibt, aufzutreiben, so kann man eine jede nehmen, die an keiner fieberhaften Krankheit, keiner Syphilis und keiner nachweisbaren Tuberculosis leidet und eine hinlängliche Menge Milch aus gesunden Warzen secretirt.

Wir können nun zur Hauptsache, zur Milch und ihren chemischen und mikroskopischen Eigenschaften.

Das specifische Gewicht der Frauenmilch ist durchschnittlich 1,032. Lässt man sie einige Zeit ruhig stehen, so scheidet sich auf ihrer Oberfläche eine dicke, fettreiche, gelblich weisse Schichte, der sog. Rahm, ab, während die darunter befindliche Flüssigkeit, ärmer an Fett und deshalb specifisch schwerer, von bläulich weisser Farbe wird. Die frische Frauenmilch ist bläulich weiss oder rein weiss, von schwach säuerlichem Geschmacke und alkalischer Reaction, lässt man sie aber bei nicht zu niedriger Temperatur stehen, so fängt sie allmählig an neutral und endlich sauer zu reagiren und kleine Klümpchen auszuscheiden.

Der wesentliche Unterschied zwischen Frauenmilch und Kuhmilch besteht nicht in der Verschiedenheit der Milchezucker- und Butterquantität, sondern darin, dass das Casein der Kuhmilch beim Sauerwerden in grossen Klumpen und selbst zu einer zusammenhängenden Gallerte gerinnt, während das Casein der Frauenmilch sich nie anders als in kleinen Klümpchen und losen Flocken ausscheidet.

Bei der mikroskopischen Untersuchung stellt sich die frische Frauenmilch als klare Flüssigkeit dar, in welcher gleichwie in einer Emulsion Fettkügelchen, die sog. Milchkügelchen suspendirt sind. Die Grösse der Milchkügelchen ist verschieden, die meisten messen im Durchmesser 0,0012—0,0020", schüttelt man aber die Milch, lässt sie dann einige Stunden stehen und untersucht von der oberflächlichen

Schäbte, so findet man neben den gewöhnlichen Milchkügelchen viele grosse Fettkügel, deren Durchmesser bis zu $0,03-0,04^{\text{mm}}$ zunimmt. Siehe Tafel II. Fig. 3.

Durch das Mikroskop allein, ohne Beihülfe chemischer Reagentien, kann man sich nicht überzeugen, dass die Milchkügelchen eigene Membranen haben. Die Existenz einer Hüllmembran kann aber sehr leicht und zwar auf zweierlei Weise bewiesen werden. Die eine Methode, von Huxle, besteht in der Anwendung verdünnter Essigsäure und gleichzeitiger Beobachtung der angesäuerten Milch unter dem Mikroskope. Die Milchkügelchen erleiden hierdurch eine solche Veränderung, die ein, würde sie blosse Fetttropfen, niemals zeigen könnten. Sie werden vielfach gezerrt, einige wie geschwänzt, andere linsenförmig, an den meisten tritt aber ein kleines Tröpfchen hervor, welches fast wie ein Kern des Milchkügelchens erscheint, diesem Tröpfchen folgen an andern Stellen neue nach, so dass zuweilen um das ein verkleinerte Milchkügelchen ein ganzer Kranz von Tröpfchen entsteht. Bei Anwendung concentrirter Essigsäure fliessen die Milchkügelchen zu grossen Fetttropfen zusammen. Die zweite Methode ist von E. Mitscherlich und besteht darin, dass man frische Milch mit Aether schüttelt, wobei dieselbe fast unverändert bleibt und der Aether nur wenig Fett aufnimmt. Wäre die Milch eine einfache Emulsion, so müsste sie alles Fett an den Aether abgeben und sich hierdurch in eine durchsichtige, oder wenigstens durchscheinende Flüssigkeit verwandeln; setzt man nun eine Substanz zu, welche jene Hüllen auflösen vermag, z. B. ätzendes oder kohlensaures Kali, dann nimmt in der That der Aether alles Fett auf, und es bleibt eine fast durchsichtige Molke zurück.

Ausser den Milchkügelchen kommen in der Milch noch andere Formelemente vor, nämlich die Colostrinkörperchen oder *Corps granuleux* der Franzosen. Physiologisch finden sie sich nur in der ersten Woche nach der Entbindung, nehmen dann rasch ab und zeigen sich immer wieder, sobald dem Weibchen sich irgend eine Krankheit zugesellt oder eine Stillende von irgend einer acuten, febrilen Affection befallen wird. Sie bestehen aus unregelmässigen Conglomeraten sehr kleiner Fettbläschen, welche durch eine amorphe etwas granulöse Substanz zusammengelassen werden, und sind nach Huxle von $0,006$ bis $0,025^{\text{mm}}$ Durchmesser. Durch Aether werden die Fettkörnchen derselben weit leichter als die der Milchkügelchen aufgelöst, durch Essigsäure und Kali wird die granulöse Zwischensubstanz aufgelöst und die Fettbläschen zerstreut; durch Jodwasser werden die Colostrinkörperchen intensiv gelb gefärbt. Es kann also kein Zweifel sein, dass diese Körperchen nichts weiter sind, als sehr kleine, in eine albuminöse Substanz eingebettete Fettbläschen, ein Kern und eine Hüllmembran sind nicht nachzuweisen. Siehe Tafel II. Fig. 4.

Neben diesen beiden Hauptbestandtheilen der Milch finden sich noch darin sehr vermehrt: Epithelialzellen und Schleimkörperchen, sie treten in grösserer Quantität nur bei localen krankhaften Affectionen der Brustdrüsen auf.

Faserstoffgerinnsel kommen nur bei Blutgehalt der Milch vor.

Blutkörperchen werden selten in der Milch gefunden und

tingen sich derselben gewöhnlich nur bei Erosionen der Warzen bei Pilas und Infusorien finden sich in der frischen Frauenmilch niemals.

Was die chemische Zusammensetzung betrifft, so haben wir hier:

1) den Milchsucker ($C_{12}H_{22}O_{12}$), der in der Frauenmilch zu 3,2 bis 6,2 Procent enthalten ist. Im Colostrum ist am meisten Milchsucker (7%), seine Quantität vermindert sich nach Simon's Beobachtungen von Monat zu Monat, geht aber selten unter 4% herunter.

2) Die Fette, die Butter. Die Butter bildet den Inhalt der Milchkügelchen und kann durch Zerstörung der Hüllenmembranen dieser Kügelchen (Buttern) ziemlich gut isolirt werden. Die einzelnen Fette der Frauenmilch sind noch keiner genaueren Untersuchung unterworfen worden, nur so viel ist bekannt, dass sie sehr schnell ranzig werden und flüchtige Fettsäure bilden. Der Gehalt der Frauenmilch an Fett ist nicht constant. Simon fand 2,53 bis 3,88% Butter; Clemin und Scherer am vierten Tage nach der Geburt 4,3%, am zehnten Tage 3,5%, und am zwölften Tage 3,3%; Chevallier und Henry 3,6%. Im Colostrum fand Simon 5,0% Butter. Eine auffallende Erfahrung ist, dass die beim Melken oder künstlichen Säugen zuletzt auslaufende Milch bei übrigens gleicher Zusammensetzung immer viel fettreicher gefunden wird, als die zuerst auslaufende. Da diese Beobachtung zuerst an Kühen gemacht wurde, so glaubte man, dass schon in dem Uter die Milch anfangs sich abzunutzen, so dass die wässrigen Bestandtheile sich in den Zitzen vermehrt, höher oben vermindert finden, allein da Reiset dieselbe Erfahrung auch an der Frauenmilch, die in einzelnen Absätzen aus der Brust einer Frau gezogen wurde, machte, so muss, da hier diese einfache Senkung vermöge der Stellung der Betaste nicht angenommen werden kann, der Grund wohl in etwas anderem als in dem gewöhnlichsten mechanischen Verhältnisse zu suchen sein.

Nach meinen neuesten Untersuchungen schwankt der Fettgehalt der Frauenmilch ausserordentlich. Es ist mir gelungen, eine höchst einfache optische Milchprobe herzustellen, mit welcher man in 2—3 Minuten eine genaue Rahmbestimmung und zwar von einer ganz kleinen Quantität Milch machen kann. Die ausführliche Beschreibung des Instrumentes und seiner bisherigen Anwendung findet sich in einer eigenen Brochure: Eine neue Milchprobe. F. Enke 1862. Man kann auf diese Weise den Fettgehalt einer Frauenmilch augenblicklich, sicher und, was das wichtigste ist, mit ein paar Cubikcentimeter Milch anstellen. Die bisherige Methode, den Fettgehalt der Frauenmilch zu prüfen, bestand darin, dass man die ausgepumpte Milch in den Galaktometer goss. Der Galaktometer ist ein Probirglaschen, das eine Skala von 100 Theilstrichen trägt. Man füllt dasselbe bis zum 0 Striche mit Milch, lässt es 24 Stunden ruhig stehen und liest dann die Dicke der Rahmschicht ab. Gute Frauenmilch darf nicht weniger als drei Theilstriche Rahm geben. Dieser Galaktometer hat den Nachtheil, dass die Untersuchung erst nach 24 Stunden beendet werden kann, und dass es oft schwierig und schmerzhaft ist, eine so grosse Menge Milch aus der Brust einer Amme zu pumpen. Durch meine optische Milchprobe werden diese beiden Nachtheile vermieden.

Der Milchsucker und die Butter enthalten keinen Stickstoff und sind die sog. Respirationsmittel der Frauenmilch.

3) Der **Käsestoff**, das **Casoin** findet sich in der Frauenmilch gelöst, so lange sie nicht sauer reagirt, und fällt in fächigen Flocken heraus, wenn sich überschüssige Milchsäure durch Zersetzung des Milchzuckers gebildet hat. Die Milch einer guten Amme mass 3—3,5% Casoin enthalten, das Colostrum aber enthält etwas mehr, meist 4%. Die chemische quantitative Bestimmung des Casoins ist sehr schwierig und zeitraubend und kann deshalb bei der Wahl einer Amme füglich unterlassen werden. Das Casoin ist der einzige stickstoffhaltige Körper der Milch.

4) Die löslichen Salze der Frauenmilch bestehen aus Chlornatrium und Chlorkalium, phosphorsauren Alkalien und ausser diesen aus dem Kali und Natrium, welche an das Casoin gebunden sind.

Die unlöslichen Salze sind phosphorsaure Kalk- und Talgerde, welche hauptsächlich dem Casoin angeheften. Spuren von Eisenoxyd und Fluor. In der Frauenmilch kommen im Durchschnitt 0,16 bis 0,25% Salze, darunter 0,04 bis 0,06% lösliche vor. Der Salzgehalt des Colostrums ist grösser als der der Frauenmilch in einem späteren Stadium des Säugens.

Vernois und Becquerel untersuchten die Milch von 89 Ammen und stellten folgende Durchschnittszahlen auf.

Dichtigkeit	1032
In 1000 Theilen Milch finden sich:	
Wassermenge	889,08
Zucker	43,64
Käsestoff	39,24
Butter	26,66
Salze	1,38

Es gibt einzelne Verhältnisse, welche auf die Zusammensetzung der physiologischen Milch von Einfluss sind, nämlich 1) die Innervation, 2) die Zeit, welche seit der Entbindung verfloßen, 3) die Nahrungweise der Stillenden und 4) ihre Geschlechtsfunctionen.

1) Die **Innervation**. Der schädliche Einfluss, den Zorn, Schrecken, Schmerz, Nervenanfalle etc. auf die Milch ausüben, ist längst bekannt. Weniger genau sind die wirklichen, hiedurch entstehenden chemischen Veränderungen untersucht. Die Milchdrüse hat in dieser Beziehung Aehnlichkeit mit der Thränendrüse, die sich ja bei fast allen grösseren Gemüthsbewegungen betheligt. Factisch ist, dass die Kinder, welche an einer gemüthlich afficirten Amme getrunken haben, bald darauf leibig schreien, Coliken, Diarrhöen und zuweilen Convulsionen bekommen. Ob die Milch hiedurch so giftig werden kann, dass die Kinder sogleich nach dem Genuße sterben, muss bezweifelt werden. Bedenkt man, dass einerseits eine unverhältnissmässig grosse Zahl von kleinen Kindern überhaupt plötzlich stirbt und andererseits, dass es Ammen gibt, die sich fast täglich erschüren, so möchte man eher an ein zufälliges Zusammenreffen als an eine wirklich giftige Milch glauben. Ich behandelte eine hysterische Fran, die ihr Kind selbst stillte, und war nicht wenig erstaunt, als ich einmal nach einem hysterischen Anfall ihr einige Kaffeestoff Milch aus den Brüsten pumpte, diese Milch fast ganz durchsichtig wie Molke und ohne allen Zucker- geschmack zu finden. Sie liess hierauf an diesem Tage das Kind nicht mehr trinken und nach 24 Stunden war wieder die frühere, sehr dicke

gelbweisse, fettreiche Milch vorhanden, womit das Kind vortrefflich gedeiht. Es ist auch bekannt, dass die Kühe weniger Milch geben als gewöhnlich, wenn sie von einer fremden Person gemolken werden, sie sollen sogar in einzelnen Fällen gar keine Milch geben, wenn sie gequält oder durch fremde Zuschauer während des Melkens beunruhigt werden. Es muss diess auf einer plötzlichen Verminderung der Secretion und theilweisen Resorption der secretirten Milch beruhen; denn die Milch kann nicht willkürlich zurückgehalten werden, da durchaus kein entsprechender Muskelapparat existirt. Aus diesen Angaben geht jedenfalls zur Genüge hervor, dass der psychischen Stimmung einer Stillenden grosse Aufmerksamkeit gewidmet werden muss, und dass es vollkommen gesunde, gut entwickelte Frauen gibt, die nichtsdestoweniger zum Säuggeschäft durchaus unbrauchbar sind.

2) Die Zeit, welche seit der Entbindung verfloßen ist, hat einen grossen Einfluss auf die chemische Zusammensetzung der Milch. Das Colostrum, die erste Milch, enthält ausser den bisher angeführten chemischen Körpern noch Albumin, Schleim und die grossen granulirten Colostrumkörperchen. Die Grösse der Milchkügelchen ist noch viel ungleicher als diess später der Fall ist. Butter und Salz finden sich in grösserer Menge als in der späteren Zeit, und hiervon hängt die etwas abführende Wirkung des Colostrums ab. Die Quantität des Milchnuckers nimmt von Monat zu Monat ab und Weicht endlich auf 4% als Minimum stehen.

3) Die Nahrungsmittel der Stillenden vermindern, wenn sie unzureichend sind, die Milchquantität überhaupt, und die soliden Bestandtheile insbesondere, so dass eine hungrige Amme nur wenig und wässrige Milch von geringem specifischem Gewicht liefert. Am meisten nimmt die Butter und der Käsestoff ab.

Vernois und Bequerel haben in dieser Richtung zahlreiche Versuche gemacht und folgende Zahlenunterschiede gefunden:

	Bei guter Nahrung.	Bei unzureichender Nahrung.
Spec. Gewicht	1004,68	1031,91
Wasser	888,86	891,60
Feste Bestandtheile	111,14	108,20
Zucker	42,97	43,88
Butter	26,88	25,92
Casein	39,96	36,88
Salz	1,33	1,52

Ob einzelne Nahrungsmittel mehr Milch machen als andere, ist schwer zu entscheiden, und keinesfalls lassen sich hierüber allgemeine Gesetze aufstellen, weil die Assimilation verschiedener Nahrungsmittel bei einzelnen Individuen eine sehr verschiedene ist. So viel aber ist gewiss, dass die Milchqualität und Quantität nicht im geraden Verhältnisse zum Stickstoffgehalt der Nahrungsmittel steht. Eine Amme vom Land z. B. gibt mit einfachen Mehl- und Milchspeisen viel mehr und bessere Milch, als wenn man ihr täglich die grössten Stücke gebratenen Fleisches aufsticht. Genuss von Alkohol oder alkoholreichen Getränken verleiht der Milch eine betäubende Eigenschaft. Die Säuglinge schlafen viel, bekommen aber bald eine Gehirnreizung, verdauen schlecht und mageren ab. In Ländern, wo Bier das Nationalgetränk

ist, halten es die Frauen für unmöglich, ohne 2—4 Seidel Bier für den Tag zu stillen. Diejenigen, die schon früher im nichtschwangeren Zustande an grössere Mengen Bier gewohnt waren, mögen den Genuß desselben nur fortsetzen, sie werden hierdurch sich und dem Kinde keinen Schaden zufügen. Wenn aber Ammen erst während des Stillens Bier trinken lernen, und sich nun alle Mühe geben, auf einmal grosse Quantitäten davon in sich aufzunehmen, so treten hierdurch deutliche Congestionen nach dem Gehirn und Verdauungsstörungen auf, die jedenfalls nachtheilige Folgen für den Säugling haben. —

Von den Arzneimitteln hat man schon verschiedene in der Milch deutlich nachweisen können. Die meisten in Wasser löslichen Salze finden sich, wenn sie keine profuse Diarrhöe verursacht haben, in der Milch wieder, am leichtesten und schnellsten ist das Jodkalium nachzuweisen. Man schüttelt die Milch mit etwas Stärkemehl und gibt nun zu diesem Gemisch einige Tropfen Salpetersäure, worauf sogleich sich die ganze Stärke in den bekannten dunkelblauen Jodkleister verwandelt. Verschiedene Farbstoffe gehen in die Milch über, z. B. der Krapp. Bei Kühen, die mit Espasette gefüttert werden, bildet sich in der Milch ein blauer Farbstoff, der dem Indigo analoge Eigenschaften haben soll.

Abeynthium, Wermuth macht die Milch bitter, die ätherischen Oele des Kuchlauchs und des Thymians vertheilen ihr den Geruch nach diesen Pflanzen. Giebt man einer Amme ein Drastikum irgend welcher Art, so geht dessen purgirende Wirkung in den meisten Fällen auf die Milch und hiermit auf den Säugling über. Die Behandlung des Säuglings durch Medicamente, die man der Mutter eingibt, ist übrigens eine unnütze Quälerei der letzteren; wenn dergleichen Medicamente wirklich indicirt sein sollten, so verträgt sie der Säugling ebensogut, wenn man sie ihm in gehörig kleiner Quantität direkt aus dem Medicinglas eingibt, als wenn sie erst in dem Kreislauf der Mutter aufgenommen und dann in sehr kleinen und jedenfalls nicht genau bestimmbarer Quantitäten aus der Brustdrüse secretirt werden.

4) Die Geschlechtsfunctionen haben einen unverkennbaren Einfluss auf die Milchsecretion. Menstruirt eine Amme wieder, so wird ihre Milch im Allgemeinen sparsamer secretirt, aber die festen Bestandtheile derselben nehmen nicht ab, sondern vermehren sich im Gegentheil. Butter und Casein nehmen bedeutend, Milchzucker und Salze nachweisbar zu. Das Kind wird deshalb in der Regel etwas unruhig und läßt die Zeichen gestörter Verdauung erkennen. Nach beendeter Menstruation tritt aber häufig die frühere Beschaffenheit und Quantität der Milch wieder ein, weshalb es nicht gesegnet erscheint, eine menstruirende Amme sogleich zu entlassen, wie dies so häufig geschieht; es ist vielmehr rathlich, die Wiederkehr der Menstruation nochmals abzuwarten, und die Amme erst dann zu entlassen, wenn das Kind längere Zeit nach der Periode unruhig bleibt und nicht mehr in dem Maasse wie früher zunimmt.

Tritt neue Schwangerschaft ein, so verliert sich das Fortstillen in den meisten Fällen von selbst, weil die Milchsecretion sogleich bedeutend geringer wird und die Milch wieder die Eigenschaften des Colostrums annimmt. Tritt in Ausnahmefällen diese Veränderung nicht ein, so muss der Säugling abgenommen werden, weil sonst das Wachsthum des Fetus in hohem Grade beeinträchtigt wird. Ob ein Coitus,

auf den keine Schwangerschaft eintritt, an und für sich schädlich ist, ist mir nicht bekannt, aber auch nicht wahrscheinlich.

Rasch sich wiederholende Schwangerschaften üben einen ungünstigen Einfluss auf die Milchsecretion aus. Bei der hiedurch entstehenden Blutmuth und allgemeinen Hyperästhesie der Weiber wird nur sparsam und wenig nahrhafte Milch erzeugt.

Durch Krankheiten erleidet die Milch wesentliche Veränderungen. Gewöhnlich finden sich in der Milch fiebernder Ammen grössere Mengen von Colostrumkörperchen. Ihre Quantität nimmt hierbei sehr ab oder sie versiegt gänzlich. Die festen Bestandtheile schwinden aber nicht mit gleicher Schnelligkeit wie das Wasser, so dass im Anfange einer fieberhaften Erkrankung eine an allen festen Bestandtheilen sehr reiche Milch erzeugt wird, wesshalb leicht Verdauungsstörungen des Säuglings entstehen. Im Allgemeinen ist als Regel aufzustellen, dass man den Säugling an der Brust der erkrankten Stillenden lässt, so lange dieselbe Milch hat und der Säugling sich wohl befindet, wobei natürlich vorausgesetzt wird, dass die Krankheit keine ansteckende, kein scab. Exanthem, kein Petechialtyphus, und keine syphilitische ist. —

Für den praktischen Arzt genügt es vollkommen, folgende Eigenschaften der Milch zu prüfen. 1) Er füllt seinen in 100 Theile getheilten Galaktometer vid. pag. 39 bis zum obersten Theilstriche und lässt ihn 24 Stunden wohl zugedeckt und ruhig stehen; nach dieser Zeit muss die Rahmschichte mindestens 3 Theilstriche einnehmen. 2) Er untersucht die frische Milch mit blauem Lakmus- und gelbem Curcumapapier. Das Lakmuspapier darf sich in keinem Falle röthen, das Curcumapapier muss sich schwach bräunen. 3) Er bringt einige Tropfen der frischen Milch auf die Zunge. Die Milch muss fade und schwach süsslich schmecken. 4) Er bringt einen Tropfen Milch unter das Mikroskop. Wenn die Amme vor mehr als acht Tagen geboren hat, dürfen hier die Colostrumkörperchen und Epithelialzellen gar nicht oder nur sehr vereinzelt zum Vorschein kommen. Die Milchkügelchen sollen nicht gar zu ungleich von Grösse und in dichter Menge vorhanden sein.

Im Allgemeinen ist zu bemerken, dass der Gesundheitszustand der Amme, ihre Verdauung, ihr Schlaf, ihre Respiration, ihre Haut und ihre Genitalien eine viel grössere Aufmerksamkeit verdienen, als die chemische und morphologische Zusammensetzung ihrer Milch, und dass es viel wichtiger ist, sich von einer genügenden Quantität der Milch genau zu überzeugen, als ihre qualitativen Verhältnisse zu prüfen. Die Quantität einer Milchsecretion lässt sich dadurch bestimmen, dass man das Kind vor und nach dem Trinken wiegt, wobei es im Durchschnitt um 3—6 Unzen zugenommen haben muss. Da diese Wägungen aber umständlich und in der Privatpraxis nicht beliebt sind, so genügt es auch, den Säugling während des Trinkens zu beobachten. Strengt er sich dabei nicht bedeutend an, lüftet ihm die Milch zu den Mundwinkeln heraus, und lässt er nach $\frac{1}{2}$ Stunde die Brust zufrieden und ruhig los, so darf man überzeugt sein, dass er eine hinreichende Quantität Milch zu sich genommen hat.

Hat man nun das seltene Glück, eine in jeder Beziehung entsprechende Amme gefunden zu haben, so sind folgende Vorstichtsmass-

regeln zur Wahrung ihrer ferneren Gesundheit zu beobachten. Warme Bäder sind für Personen aus den unteren Ständen etwas so selbsten und ungewohntes, dass es nicht rathsam erscheint, eine nicht sehr reichlich ausschende Amme ein ganzes Bad nehmen zu lassen. Man thut besser, ihr mehrmals die Woche eine kleine Waanne mit warmem Wasser und ein Stück Seife zu verabreichen, wodurch bei gutem Willen eine genügende Reinlichkeit erzielt werden kann. Ist die Amme warme Bäder von früher gewohnt, so schaden sie ihr auch während des Stillens nicht. Das gleiche gilt auch von den kalten Fluss- und Seebädern. Als erste Regel muss immer aufgestellt werden: man andere nichts an den Gewohnheiten und der früheren Lebensweise der Amme, wenn anders sie nur einigermaßen mit einem vernünftigen Regime sich vereinigen lassen. Die Ammen können mit Ausnahme sehr gewürzreicher, salz- oder alkoholhaltiger Speisen Alles essen, was ihnen schmeckt, und es ist immer am besten, wenn ihre Lebensweise, ein paar Zwischenmahlzeiten abgerechnet, von der Lebensordnung der Familie, in der sie aufgenommen, gar nicht abweicht. Alle Speisen, die sie bekommt, müssen gut gekocht und nach ihrem Geschmack sein, im übrigen ist es wirklich überflüssig, sich auf detaillierte Küchensettel einzulassen.

Ihre Schlafzimmern muss gut ventilirt werden, und sie selbst muss täglich ohne Rücksicht auf das Wetter sich Bewegung in frischer Luft machen, wobei nur zu bemerken ist, dass sie, wenn man sie nicht schon lange und ganz genau kennt, nie allein ausgehen darf.

Ein grosses Vorurtheil herrscht im Publikum gegen menstruierende Ammen, und einige Blutspuren in ihrem Hende genügen gewöhnlich schon, die Eltern des Säuglings in die grösste Bestürzung zu versetzen. Die Gefahr ist aber bei weitem nicht so gross, als sie aussieht, die meisten Ammen menstruiren nur schwach und unregelmässig, haben während der Meneses etwas weniger Milch, die Kinder bekommen wohl auch darauf Colikschmerzen, in 1—3 Tagen ist aber die ganze Veränderung vorüber, und Amme und Säugling befinden sich wieder im besten Wohlbela.

Zwei Grundsätze müssen fest gehalten und täglich eingeharrt werden:

1) Die Brust ist kein Beruhigungsmittel für das schreiende Kind, sondern muss regelmässig entweder alle zwei oder drei Stunden gereicht werden. Während dieser Intervalle eintretende Uarube ist kein Zeichen von Hunger, sondern hat irgend einen andern Grund, der häufig in engen Kleidern oder durchnässten Windeln zu suchen ist. Zur Nachtzeit genügt eine vierstündige Pause, z. B. von Abends 9 Uhr bis 1 Uhr der Amme zum ersten Schlafe vollständig. Den Rath einiger Pädiatriker, vom Abend bis zum andern Morgen den Säugling nicht anzulegen, habe ich noch nie befolgen können.

2) Die Amme darf niemals das Kind bei sich im Bette haben. Ich bin überzeugt, dass viele von den räthselhaften, schnellen Todesfällen der Säuglinge durch Erstickung im Bette der Mutter oder Amme zu erklären sind. Die Ammen schlafen während des Stillens ein und ersticken dann durch ihren Körper oder durch das im Schlaf hinaufgezogene Federbett den Säugling. Eine aufmerksame Mutter darf sich deshalb die Mühe nicht sparen lassen, die Amme mehrmals in der

Nacht zu controliren, und ihr die Uebertretung dieses Gebotes mit der grössten Strenge zu verweisen.

Viele Ammen leiden an hartnäckiger Obstipation und ziehen sich durch Verschwägung dieses Uebels endlich wirkliche Verdauungsstörungen zu. Man hat sie deshalb zu belehren, dass sie dieselbe nicht verschweigen, sondern gleich davon die Eltern in Kenntniss setzen, man kann durch ein paar Löffelchen Latwerge oder gekochte Pflaumen die ganze Krankheit beseitigen.

Man komme einer Amme mit Theilnahme und freundlicher Ansprache entgegen, trotz ihres hohen Lohnes sind die armen Geschöpfe herzlich zu bedauern, die, freilich durch eigene Schuld, so weit gekommen sind, dass sie ihr eigenes Kind weggeben und ein fremdes dafür an die Brust nehmen: ein solcher Dienst ist, beim Lichte betrachtet, mit Geld überhaupt gar nicht zu bezahlen.

Es entsteht nun schliesslich noch die Frage: Wann und wie soll man ein Kind entwöhnen?

Nur selten hängt die Beantwortung dieser Frage vom Gutachten des Arztes allein ab, gewöhnlich influenziren eine Menge äusserer oder innerer Gesundheitsrückichten der Amme und des Kindes auf die Bestimmung des Termins zum Abgewöhnen. Auch hier, wie leider in so vielen Dingen der ärztlichen Praxis, ist die Sache nicht mit ein paar Zahlen abgemacht, sondern es müssen viele Verhältnisse einander gegenüber gestellt und erwogen werden. Das natürlichste ist offenbar, das Kind so lange fort trinken zu lassen, als es die Brust gerne nimmt, dabei gedeiht, und die Stillende hierdurch keinerlei Nachtheil an ihrer Gesundheit, Schwäche, Blässe, Abmagerung, allgemeine Hyperästhesie etc., verspürt. Dieses Verhältnis dauert bei einer gesunden Amme und einem kräftigen Kinde in unseren Climates durchschnittlich 4 bis 8 Monate fort. Hiernach verspürt die Amme, dass ihre Milchsecretion dem steigenden Appetit des Kindes entsprechend nicht weiter zunimmt, und dass der Säugling also nicht mehr genug bekommt. Nun ist der Zeitpunkt gekommen, wo man dem Kinde ausser der Brust noch andere Nahrungsmittel zukommen lassen muss. Auch hier kann man nicht sagen, diese oder jene Speise ist die zuträglichste, und die andern sind schädlich; denn die Kinder haben nicht alle denselben Magen und denselben Geschmack, die einen z. B. nehmen, so lange sie nur noch einmal im Tage die Brust bekommen, keine Kuhmilch und nichts damit bereitetes an, während sie verschiedene eingekochte Fleischsuppen ohne Sträuben geniessen, die andere nehmen kein Mehlmus, sondern bloss Zwieback- oder Semmelmus, andere wieder nehmen gar keine eingekochten Fleischsuppen, sondern bloss Milchsuppen an u. s. w. Ich lasse deshalb mit dünnem Semmelmus den Anfang machen, geht es in acht Tagen damit nicht, so versuche ich Mehlmus, und wird auch dieses nicht angenommen, so kommt dünne Fleischbrühe mit Semmel gekocht an die Reihe. Eines dieser drei Nahrungsmittel nimmt ein jedes Kind, wenn ihm die Brust der Amme nicht hinlänglich Sättigung bietet. Vier Wochen lang gibt man ein Mus, weitere vier Wochen zwei Mus und endlich drei Mus. Inessen lernt das Kind auch Weissbrodrindchen kauen und Wasser trinken, nimmt die Brust nur mehr einmal in der Nacht und vermisst sie nicht sehr lebhaft, wenn es schliesslich in der Nacht lauwarme Kuhmilch statt der Brust bekommt.

Dies ist die sicherste Methode, ein Kind ohne allen Schmerz abzugewöhnen. Oft genug muss es auf einmal oder in sehr kurzer Zeit die Amme verlieren. Da ist es dann besonders wichtig, auf die Zahnperioden zu achten. Hat das Kind gerade eine Zahnperiode glücklich überstanden, so dass sich mit Bestimmtheit voraussetzen lässt, dass es in den nächsten Wochen mit neuen Zahnbeschwerden nichts zu thun haben werde, so verträgt es in den meisten Fällen auch das plötzliche Abgewöhnen ohne Gefahr, im entgegengesetzten Falle aber tritt meistens eine sehr profuse Diarrhöe ein, die oft nicht mehr zu stillen ist oder in deren Folgen wenigstens die Kinder Monate lang laboriren. Wenn einem Kinde die oberen und unteren Schneidezähne durchgebrochen sind, so ist ihm von der Natur gewiss schon andere compactere Nahrung als die blassc Muttermilch angewiesen. Jedenfalls aber ist es unnütz und für die Mutter meistens schädlich, die Kinder bis über das erste Jahr hinaus zu stillen. Sie nehmen sich dann meistens selbst ab, weil ihnen beim Saugen zu wenig auf einmal in den Mund kommt. Ich behandelte eine amerikanische Dame, die ihren zwei und ein halbes Jahr alten Sohn immer noch stillte, bis ihr eines Morgens das geistig sehr entwickelte Kind, als es zum Trinken kommen sollte, ganz freundlich sagte: Ich danke, liebe Mama, das Saugen ist mir zu langweilig. —

Kann die Mutter nicht selbst stillen und hat sie nicht die Mittel, sich eine Amme zu leisten, so bleibt nichts übrig, als die künstliche Ernährung zu versuchen.

Zur künstlichen Ernährung sind folgende Bedingungen erforderlich. Sorgsame Auswahl und Zubereitung der Nahrungsmittel, grosse Geduld und Ausdauer, strenge Genauigkeit, manuelle Fertigkeit und der höchste Grad von Reinlichkeit.

Der beste Ersatz für die Frauenmilch ist die Kuhmilch, nicht weil sie in der Zusammensetzung ihr am ähnlichsten, sondern weil sie zu billigen Preisen am leichtesten und regelmässigsten zu haben ist. Nur wer selbst längere Zeit sich mit quantitativen Milchuntersuchungen abgegeben hat, wird mir beistimmen können, dass die paar Procente mehr Casein und Butter, und die paar Procente weniger Milchzucker die grosse Differenz allein nicht veranlassen können, die zwischen der Ernährung mit Frauenmilch und Kuhmilch allerdings besteht. Das Secret der Milchdrüsen hat eben auch, ähnlich dem der Nieren, ziemlich weite physiologische Grenzen, aus denen man recht schöne Mittelzahlen construiren kann. Aus diesen Mittelzahlen aber geht noch lange nicht hervor, dass die Milch die beste ist, welche dem physiologischen Mittel am nächsten steht.

Seitdem die Uebertragbarkeit der Tuberculosa so viel discutirt wird, hat man natürlich auch daran gedacht, dass die Tuberculosa der Kühe, die sog. Perlsucht, schon durch den Genuss der Milch allein auf den Menschen übertragen werden könnte. Durch einzelne Fütterungsversuche, in welchen Ferkel durch alleinige Darreichung von Perlsuchtmilch in der That tuberkulös gemacht wurden, hat man die Kuhmilch überhaupt als gefährlich verdächtigt. Wenn nun diese Thatsachen auch die höchste Beachtung verdienen, so kann durch dieselben doch niemals die unersetzliche Kuhmilch aus der Kinderstube verdrängt werden. Die mannigfachen Experimente mit Kaninchen, Meerschweinchen und Ferkeln dürfen vor allem nicht unbedingt auf den Menschen

übertragen werden, und dann lassen die wenigen Angaben, dass bei Menschen Tuberculosis durch Genuss von Milch und Fleisch peristichiger Thiere entstanden sei, immer noch den Zweifel einer hereditären Belastung, die ja einen grossen Theil der ganzen Bevölkerung ergriffen hat, zu.

Zugestanden aber, es sei die Kuhmilch nicht ungefährlich, so muss für die Ernährung durch eine Mühend aussehende Amme dieselbe Gefahr behauptet werden. Sieht man ja doch oft genug, dass scheinbar gesunde Ammen während des Stillens phthisisch werden, ohne dass der Säugling dadurch infectirt wird. —

Nach Göeings Bericht vermehren fast sämmtliche bairische Thierärzte die schädliche Einwirkung des Genusses von Milch und Fleisch tuberculöser Thiere auf den Menschen, und einzelne heben noch besonders hervor, dass alle Waisenmeistersfamilien solches Fleisch ohne Schaden genossen. Da in Bayern fast zwei pro mille aller Kinder tuberculös sind und namentlich sehr viele Melkkühe in gutem Ernährungsstande sich befinden, die nach dem Schlachten doch deutliche Tuberculose zeigen, so müssten ja schon längst alle Menschen, vor allem aber die Bauernkinder, deren Hauptnahrung nur in Milch besteht, tuberculös sein. Immerhin scheint es unter solchen Umständen ratsam, dass die alte Verordnung, nur gekochte Milch zu geniessen, strengstens aufrecht erhalten werde, denn durch Kochen werden alle Contagien, Pilze und Sporen getödtet. Hingegen ist die frühere Annahme, dass die Milch von einer einzigen Kuh zurüglicher sei, als die aus einer grösseren Zahl von Kühen gewonnene, gemischte Milch, nicht mehr zu halten. Da bei $\frac{1}{2}$ aller tuberculösen Kühe faktisch die Tuberculose bei Lebzeiten gar nicht erkannt, vielmehr erst nach dem Schlachten entdeckt wird, so genösst überhaupt ein grosser Theil aller Milchconsumenten täglich ein Gemisch von tuberculöser Milch mit gesunder, ungefähr im Verhältnisse von 1:1000.

Wenn aber Uebertragbarkeit einmal angenommen worden soll, so ist es minder schädlich, den Ansteckungsstoff in solcher Verdünnung, als möglicher Weise ganz concentrirt aufzunehmen.

Der wesentlichste Unterschied zwischen Frauen- und Kuhmilch ist, wie schon oben bemerkt, darin zu suchen, dass das Casein der Frauenmilch im Magen zu kleinen leichten Flocken in einer ganz lösen Gallerte, das der Kuhmilch aber zu grossen compacten Klumpen gerinnt, wovon man sich leicht überzeugen kann, wenn man ein künstlich aufgezogenes und ein Brustkind $\frac{1}{2}$ oder $\frac{3}{4}$ Stunde nach der Mahlzeit durch rasche Bewegungen, Reiben an der Magengegend etc. zum Brechen bringt. Die lockeren Flocken der Frauenmilch werden leicht verdaut und assimiliert, die festen Klumpen des Kuhmilchcaseins vermag der jugendliche Magensaft aber nicht zu lösen, sie werden wieder erbrochen oder wandern als grosse, saure, unverdaute Massen durch den ganzen Darmkanal, der dadurch allenthalben gereizt wird. Es kommt also darauf an, dem Casein der Kuhmilch diese Eigenschaft zu benehmen, was einigermaassen erzielt werden kann, wenn man sie etwas stärker alkalisch macht. Ich bediene mich von langer Zeit hierzu einer Lösung von kohlensaurem Natrium, 4 Grm. auf 200 Grm. Wasser, von der zur Milch jeder Mahlzeit ein Kaffeelöffel voll zugeschlitten wird. Wird die Milch zu Mus verkocht, so lasse ich die Lösung schon zur

kalten Milch aussetzen, und im Sommer wird gleich die ganze für 12 Stunden berechnete Milchmenge bei ihrer Ankunft im Hause in der Weise alkalisch gemacht, dass immer auf 5 Unzen Milch ein Esslöffel Natronlösung kommt. Bei kleinen Kindern lasse ich noch $\frac{1}{2}$ Wasser und auf jede Mahlzeit eine Messerspitze Milchsucker aussetzen, Kinder über drei Monate trinken die Kuhmilch, wie sie ist, aber immer mit dem Natronzusatz. Mit so präparierter Milch habe ich schon viele Hunderte von Kindern gross ziehen lassen, und bei der Mehrzahl durchaus keine Verdauungsstörungen bemerkt. Sind die Eltern vernünftig, so gibt man in den ersten drei Lebensmonaten nur diese Milch und keinerlei Mus und fängt zu Beginn des vierten Lebensmonats erst mit einem Mus an. Man lässt die Milch gewöhnlich gleich beim Empfang einmal aufkochen, weil dadurch auch die Gerinnung verzögert wird. Das beste Mus wird so bereitet, dass man ein hühnereigrosses Stück altgebackene Semmel $\frac{1}{4}$ Stunde lang in kaltem Wasser einweicht, worauf das Wasser gewöhnlich schwach sauer reagiert und dann die nicht weiter ausgepresste Semmel mit 200 CC alkalischer, nicht abgerahmter Milch und einer Messerspitze Milchsucker zu einem gleichmässigen Brei verkehrt. Bei weitem beliebter als der Semmelbrei ist, besonders in den unteren Volksklassen, der Mehlsbrei; auch bei diesem gedeihen unendlich viele Kinder vortrefflich und es ist noch sehr die Frage, ob er nicht ebenso unschädlich ist, als der Semmelbrei. Wenn $\frac{1}{2}$ der künstlich aufgezogenen Kinder Mehlnus bekommen und nur $\frac{1}{3}$ Semmelbrei, so werden bei ungenügender gleicher Verdaulichkeit beider Nahrungsmittel vier Mehlnuskinder an Verdauungsstörungen leiden müssen, bis endlich einmal ein Semmelbrinkind erkrankt.

Wer nun nicht weiss, dass wirklich 4 Mal mehr Kinder Mehlnus essen, der muss natürlich die Ansicht sich bilden, dass das Mehlnus bei weitem schlechter vertragen wird als das Semmelmus. Bevor aber nicht ausführliche, Jahre lang geführte statistische Zusammenstellungen diese Verhältnisse in klaren Zahlen darthun, kann Niemand behaupten, dass dünnes, nach tropfbares Mehlnus schädlicher sei als das Semmelmus. Statt des gewöhnlichen Weizenmehls nimmt man auch Reismehl oder das Mehl der Pfeilwurzel, Arrowroot, zwei sehr kleberarme Mehlsorten. Die Gebrauchsart für das Arrowroot ist folgende: Man schüttet einen Theelöffel voll in ein porcellanes Gefäss und setzt so viel kaltes Wasser hinzu, dass dasselbe einen feinen Teig gibt, hierauf giest man eine Tasse kochender Milch (oder auch Wasser, Fleischbrühe) zu, rührt es gut um und lässt es am Feuer einige Minuten aufkochen, bis es die Consistenz einer leichten Gallerte bekommt. Weitans das rationellste unter allen Surrogaten der Muttermilch ist jedenfalls die sogenannte Liebig'sche Suppe, durch welche sich der grosse Chemiker ein bleibendes Verdienst um die Pädiatrik erworben hat. Bekanntlich sind enthalten:

	Nährbildende Stoffe	Wärmebildende Stoffe
100 Frauenmilch	1	3,8
„ Kuhmilch, frisch	1	3,0
„ Kuhmilch, abgerahmt	1	2,5
„ Weizenmehl	1	6

Es lässt sich also leicht eine Mischung von Kuhmilch und Weizenmehl herstellen, die dasselbe Verhältniss der heiss- und wärmebildenden Bestandtheile hat wie die Frauenmilch; indess reagiert das Weizenmehl

sauer und enthält viel weniger Alkali als die Frauenmilch, weniger als zur normalen Bluthildung erforderlich ist, und endlich wird dem kindlichen Organismus durch Ueberführung des Stärkemehls in Zucker eine ganz unnöthige Arbeit aufgebürdet. Es ist also wünschenswerth, zuvor das Stärkemehl in die lösliche Form des Zuckers und des Dextrins überzuführen, dies geschieht leicht durch Zusatz von Malzmehl zu dem Weizenmehl. Wenn man Milch mit Weizenmehl zu einem dicken Brei kocht und diesem noch heissen Brei dann Malzmehl zusetzt, so wird die Mischung nach einigen Minuten flüssig und nimmt einen süßsen Geschmack an; darauf und auf einen Zusatz von Alkali, um die saure Reaction des Weizenmehls zu neutralisiren, beruht die Herstellung der Liebig'schen Suppe.

Die Vorschrift, die Liebig selbst gegeben hat, ist folgende: Man wiegt 15,0 Weizenmehl, 15,8 Malzmehl und 0,45 doppelkohlensaures Kali ab, mischt sie erst für sich, sodann unter Zusatz von 30,0 Wasser und zuletzt von 150 CC Milch, und erhitzt unter beständigem Umrühren bei sehr gelindem Feuer, bis die Mischung anfängt dicklich zu werden, bei diesem Zeitpunkte entfernt man das Kochgefäß vom Feuer und rührt 5 Minuten lang um, erhitzt aufs Neue und setzt wieder ab, wenn eine neue Verdickung eintritt, und bringt zuletzt das Ganze zum Kochen. Nach der Absonderung der Kleie von der Milch durch ein feines Sieb (feines Florzeug) ist die Suppe zum Gebrauche fertig. Zu beachten ist, dass man gewöhnliches, frisches Weizenmehl, nicht das feinste, weil reicher an Stärkemehl, nimmt. Gerstenmehl ist bei jedem Bierbrauer zu haben. Nachdem die Unkrautsamen ausgelesen, wird es leicht auf einer gewöhnlichen Kaffeemühle zu einem groben Mehl zermahlen. Von dem Kali bicarbon. crystall. löst man zwei Theile in elf Theilen Wasser auf und erhält so eine vollkommen bclle, klare Flüssigkeit. Das lästige Abwiegen der Stoffe kann man vermeiden, denn ein gehäufte Eßlöffel Weizenmehl wiegt ziemlich genau 15,0, ein eben solcher Eßlöffel Malzmehl zur Hälfte glatt abgestrichen wiegt ebenfalls 15,0 und ein gewöhnlicher Fingerhut, mit der Kalilösung gefüllt, fast nahe 0,90 des Salzes. Löst man sich noch in einem Becherglase vom Apotheker 30 CC und 150 CC Wasser abwiegen und notirt die Höhe der Flüssigkeiten durch einen aufgeklebten Papierstreifen, so ist Alles für eine vernünftige Mutter hinlänglich bequem eingerichtet. Das doppelkohlensaure Kali kann nicht durch das gleiche Natronsalz ersetzt werden, da in allen unsern Speisen, in der Milch, der Fleischflüssigkeit und den Eitkörperchen wesentlich Kalisalze enthalten sind. Die so bereitete Suppe schmeckt ziemlich süß und wird bei gehöriger Verdünnung mit Wasser auch von Neugeborenen vertragen. Nach meinen eigenen Erfahrungen und denen vieler deutscher Aerzte ist diese Suppe das beste Surrogat für Muttermilch und hat schon manchen, ganz atrophischen Kindern sichtlich das Leben gerettet.

Das schwierigste in grossen Städten ist immer, sich frische, unverfälschte Milch zu verschaffen. Die Milch der öffentlichen Milchniederlagen lässt immer viel zu wünschen übrig, und es ist unbedingt nöthwendig, wenigstens zu Anfang, bis man sich hinlänglich von dem realen Treiben des Milchlietcranten überzeugt hat, das Melken und Füttern im Kuhstalle selbst zu überwachen. Die Milch muss immer von Kühen genommen werden, die täglich mehrere Stunden sich

ausserhalb des Stalles im Freien befinden und fast ausschliesslich grünes Futter bekommen. Unsere weit verzweigten Eisenbahnverbindungen machen es übrigens jetzt fast jeder Familie möglich, sich von irgend einem befreundeten Gutsbesitzer oder Oekonomen, dessen Zuverlässigkeit man schon in andern Dingen mehrfach erprobt hat, den täglichen Milchbedarf kommen zu lassen. Wenn die Milch durch den Transport auch zwei- oder dreimal theurer als an Ort und Stelle wird, so ist diese Ernährung doch noch viel billiger als eine Aunee. In neuester Zeit ist es endlich gelungen, Milch mit Zusatz von Rohrzucker im Vacuum bei so niedriger Temperatur eindampfen, dass sich keine Haut bildet und ein dicker, weisser Syrup entsteht. Es ist diess die condensirte Milch aus der Fabrik der Anglo-Swiss condensed Milk Co. in Cham, Ct. Zug, nach deren Muster sich auch schon in Deutschland mehrere Fabriken etablirt haben. Die condensirte Milch löst sich im Wasser leicht auf und stellt, in der zehnfachen Menge Wasser gelöst, eine sehr wohlchmeckende verstärkte Milch dar, an welcher sogar noch das Aroma der frischen Milch wahrgenommen wird. Löst man grossere Mengen auf einmal, so bleibt eine Spur von Bodensatz zurück, welcher aus Crystallfädeln von milchsaurer Kalkseife besteht. Da der letztere sich im Magensaft jedenfalls wieder löst, so ist diese Erscheinung für den Ernährungswertb von keiner Bedeutung. Betrachtet man die condensirte Milch ohne Wasserzusatz unter dem Mikroskope, so findet man schon bei achtzigfacher Vergrösserung das ganze Sichtfeld mit schönen charakteristischen Crystallen von Milchnucker bedeckt und dazwischen einzelne Büschel von milchsaurer Kalkseife. Setzt man nun einen Tropfen Wasser zu, so entstehen wie mit einem Schlage unzählige Kugeln von verschiedener Grösse, die sich in keiner Weise von den frischen Milchkügelchen unterscheiden, während die Milchnuckerkrystalle rasch verschwinden. Dieses Wiederscheinen der ursprünglichen Milchkügelchen auf Wasserzusatz unterscheidet die condensirte Milch von allen früheren Milchpulvern und Conserven, ja man kann aus diesem Präparate sogar noch frische Butter darstellen, wenn man es mit der siebenfachen Menge Wasser löst und bei 17° R. auf die gewöhnliche Art buttert.

Die condensirte Milch hat sich in der Kinderstube vollkommen bewährt. Ich verdünne bei Neugeborenen 1 Theil mit 12 Theilen Wasser und steige bis zum Schlusse des ersten Lebensjahres bis auf 1:6 Theile. Mit diesem Präparate allein, ohne Zusatz von Amylaceum, habe ich schon Kinder vortreflich gedeihen sehen. Für die Bewohner grosser Städte und namentlich auf Reisen ist die condensirte Milch von grösstem, unersetzlichem Werthe.

In neuester Zeit hat das Kindermehl des Chemikers Nestlé sich viele Freunde erworben. Dasselbe ist ein gepulvertes Backwerk, bestehend aus Weizenmehl, Eigelb und condensirter Milch, und enthält 40 % Zucker und Milchnucker, 5 % Fett, 15 % Proteinstoffe und 30 % Dextrin. Die Stärke wird hier, nicht wie bei der Liebig'schen Suppe durch Malz, sondern durch überhitzten Wasserdampf bei hohem Atmosphärendrucke in Dextrin umgewandelt. Es hat diess Präparat vor der Liebig'schen Suppe den Vorzug grosser Bequemlichkeit, indem ein Esslöffel Mehl mit sechs Esslöffel Wasser einfach aufgekocht wird. Nimmt man mehr Wasser, so bekommt man eine angenehme schmeckende

Flüssigkeit, die aus der Flasche gereicht wird. Kinder von zwei bis drei Monaten vertragen diese Nahrung ganz gut und gedreien dabei, bei Neugeborenen ist dieses nicht immer der Fall. Vorzügliches Dienste leistet das Nestlé'sche Kindermehl bei stillenden Müttern, deren Muttermilch nicht vollständig zur Sättigung des Kindes genügt.

Ist man nun durch die Ungunst der Verhältnisse nicht im Stande, dem Kinde eine gute Kuhmilch zu verschaffen, so muss man zu Surrogaten greifen, deren Brauchbarkeit auf die Länge aber sehr problematisch ist. Hierher gehört Kalbsbrühe mit Eigelb, Schleimsuppen, Salepabkochungen, Carottenbrei. Der letztere machte vor einiger Zeit grosses Aufsehen und wird folgendermassen bereitet: 30,0 geriebene gelbe Rüben werden mit 200 CC Wasser gemischt und 12 Stunden stehen gelassen, worauf man dieses Gemisch durch ein Tuch presst. Der so gewonnene Saft wird mit geriebener Semmel (1 Theil Semmel auf 4 Theile Saft) an gelindem Feuer einige Male aufgekocht und zuletzt mit etwas Zucker versüsst. — Es gibt Kinder, welche durchaus keine Kuhmilch vertragen. Diese können mit Carottenbrei oder Schleimsuppe oder Fleischbrühe mit Eigelb mehrere Monate lang bestehen, sie wachsen aber nur langsam und setzen bei dieser Kost nie gehörige Fettpolster an, von vier zu vier Wochen muss man deshalb immer wieder einen Versuch mit recht frischer, starker Milch oder Liebig'scher Suppe machen, oft gelingt die Reception der Milch später, obwohl sie vorher durchaus nicht vertragen wurde.

Die Art, wie man kleinen Kindern die Nahrung beibringt, ist nicht gleichgiltig. Man kann ihnen schon von den ersten Lebenstagen an dieselbe mit einem Löffelchen oder einer Schnabelschale reichen, woran sie sich bald gewöhnen, besser aber gibt man ihnen ein Saugglas, weil hierbei die Gesichtsmuskeln auf ähnliche Weise geübt werden wie bei Kindern an der Mutterbrust.

Die einfachste Art von Sauggläsern ist wohl ein gewöhnliches vier bis fünf Unzen haltendes Fläschchen mit ziemlich engem Halse, auf welchem man mehrere Stöpsel aus gereinigtem feinem Badeschwamm schneidet und den eingepassten Schwamm dann durch ein darüber gebundenes Stückchen Flor oder Battist am Flaschenhalse befestigt. Diese Schwämmchen müssen täglich mehrmals gewechselt werden und lassen sich am besten in frischem Wasser aufbewahren. Ueberragen sie den Hals des Fläschchens um $1\frac{1}{2}$ Ctm. und ist das Stückchen Battist gehörig gespannt, so imitiren sie täuschend die Form und Consistenz einer Brustwarze.

Wenn diese Schwämmchen nicht gut und elegant genug sind, der kann die Gläser mit goldenen, silbernen, zinnernen, bleiernen oder calcinirten Mundstücken versehen lassen. Sehr gerne trinken die Kinder auch aus den in neuester Zeit Mode gewordenen durchlöchernten Gauthoukklappchen, welche sich besonders durch Reinlichkeit empfehlen.

Eine grosse Verbreitung hat der sog. Schnuller, Zalp oder Sauglappen. Derselbe wird bereitet, indem man stark gezeckerten, gestossenen Zwieback mit Milch oder Wasser zu einem dicken Teig formt, in einen leinenen Lappen schlägt und dann zubündet, wodurch ein Knopf von der Grösse eines kleinen Apfels entsteht. Dieser weiche, süsse Knopf wird den Kindern nun, wenn sie nicht zu beruhigen sind,

in den Mund gesteckt, sie fangen sogleich an zu saugen und halten sich Stunden lang hiebei ruhig. Im Allgemeinen lässt sich gegen reiliche, oft erneuerte Schauler nichts sagen, als dass die Wangen der Kinder durch das tagelange Sagen übermäßig ausgedehnt werden und hässliche Wülste bilden, wenn sie endlich einmal den Mund ohne Schnuller schließen. Gewöhnlich aber fängt der Inhalt des Schnullers, in Berührung mit der warmen Mundhöhle, rasch an in saure Gärung überzugehen. Der Mundhöhlenschleim wird sauer, und es entsteht dann sogleich gestörte Verdauung und eine Pilzbildung auf der Schleimhaut, die nur zu oft ein trauriges Ende nimmt. Es ist deshalb Pflicht eines jeden Arztes, die Schnuller möglichst zu beseitigen, was allerdings leichter gesagt als gethan wird. Man denke sich nur in die Lage einer armen Frau, die sich den ganzen Tag mit ihren Kindern geplagt hat, und nun in der Nacht, wenn sie und ihre ganze Familie der Ruhe dringend bedürfen, das schreiende Kind nicht vom Arme bringt. So wird sagen, der Arzt hat gut rathen, keinen Schnuller zu geben, so trägt das schreiende Kind in der Nacht doch nicht herum, und wird ihn dem Kinde unter hundert Fällen nicht einmal vorenthalten. In den untern Volksklassen wird es kaum je gelingen, diesen gärenden Knopf zu beseitigen, und in den bessern Klassen haben die Kinder eine Amme oder wenigstens eine reichliche Bedienung, die ihn oft genug erneuert, wodurch er dann gewöhnlich auch unschädlich gemacht wird. — Soviel von der Ernährung im ersten Lebensjahre.

Im zweiten Lebensjahre kann man schon anfangen, den Kindern etwas weiches, feingeschnittenes Fleisch zu geben. Wenn sie nicht Diarrhöe haben, auch nicht dazu geneigt sind, vertragen sie reifes Obst schon vortreflich, hingegen machen ihnen gekochtes grüne und Wurzelgemüse und Hülsenfrüchte sehr gewöhnlich Indigestion. Einem zweijährigen Kinde z. B. verordne ich folgende Lebensweise: Morgens, zwischen 6 und 7 Uhr im Sommer, zwischen 7 und 8 Uhr im Winter, Milchsuppe, zwischen 9 und 10 Uhr trockenes Weissbrot, höchstens etwas Butter darauf gestrichen, um 12 Uhr eingekochte Fleischsuppe, Fleisch mit etwas Sauce oder Kartoffelpüree, oder statt des Fleisches eine Mehlsuppe wohl mit Eiern, aber nur mit wenig Fett bereitet, am besten mit wenig grünes oder anderes Wurzelgemüse, Nachmittags zwischen 3—4 Uhr Milch mit Weissbrot, im Sommer Obst mit Brod, Abends um 7 Uhr Fleischsuppe oder Milchsuppe. Zucker bekommt den Kindern im Allgemeinen schlecht, und es ist für ihre ganze Verdauung höchst wichtig, sie so wenig wie möglich daran zu gewöhnen. Nach zurückgelegtem dritten Lebensjahre vertragen die Kinder auch alle Gemüse, und sie können, wenn sie ausserdem gut erzogen sind, recht wohl mit den Eltern am Tische essen; man hat ihnen bloss noch die gepöffernten, stark gesalzenen, gewürzten und sehr sauren Nahrungsmittel zu versagen, alle andern können sie mit Mass genossen. Wenn sollen die Kinder bis zum vierzehnten Jahre nicht zu kosten bekommen, auch Bier ist durchaus unnöthig. Ebenso Thee und Kaffee. Das Weissbrot wird vom dritten Jahre an sehr passend durch ausgebackenes, nicht zu frisches Roggenbrot, Haarbrot, ersetzt. Man thut gut, den Kindern die ganze Mittagkost von einem Teller essen zu lassen. Sie müssen zuerst die Suppe vollkommen aufessen, bevor sie Fleisch und Gemüse auf den leeren Suppenteller bekommen, und auch

dieses muss erst vollständig verzehet sein, bevor eine Mohlapreise oder Compot oder Braten etc. ihnen auf den wieder sauber abgewaschenen Teller gegeben wird. Abgesehen davon, dass der kleinere Verbrauch von Tellern eine Vereinfachung des Hauswesens bedingt, wird hiedurch noch die gute Eigenschaft erzielt, dass die Kinder alles essen lernen und nicht genäsig werden.

Geben wir nun von der Ernährung über zur Pflege der Kinder, so treffen wir zuerst auf die Cultur der Haut. Der Vernix caseosa, die Hautschmiere des Fötus, kann nicht durch Wasser abgewaschen werden, sondern muss zuerst mit einem Fett, frisches Butter oder einem geruchlosen, fetten Oel vermengt werden, worauf es sich mit jedem Tuche leicht abputzen lässt. Kleine Kinder müssen täglich zehn Minuten lang in einem Wasser von 27° R. gebadet werden, örtliche Leiden genügen nicht, diess Gebot zu umgehen, wohl aber muss das Baden unterbleiben bei einer allgemeinen fieberhaften Erkrankung. Der Aufenthalt im Wasser und die Temperaturverschiedenheiten, die beim Ausziehen und Abtrocknen der Kinder nicht umgangen werden können, vermehren in der Regel die Hitze der Haut und führen einen höheren Grad von Schwäche herbei.

Wenn die ersten Schneidezähne durchgebrochen sind, kann man gradatim bis auf eine Temperatur von 24° R. heruntersteigen. Kühlere Bäder im ersten Lebensjahre zu geben ist nicht rathsam. Im zweiten Lebensjahre, wo die Ausdehnungen der Kinder seltener werden und sie schon anfangen, sich an Reinlichkeit zu gewöhnen, ist es nicht mehr nothwendig, sie täglich zu baden, man gibt dann 3—4 Bäder die Woche von 23—24° R. Vom dritten Lebensjahre an genügen wöchentlich 2—3 Bäder, im Sommer täglich Fluss- oder Seebäder vollständig, die Haut gehörig offen zu erhalten.

Die Erlebung der Schwimmkunst ist für beide Geschlechter sehr nützlich und Gesundheit fördernd.

Zur Cultur der Haut gehört nicht nur deren Reinigung, sondern auch die Abhaltung zu grossen Temperaturwechseln von derselben, was durch Kleidung und Heizung bewerkstelligt wird.

Bei der ersten Bekleidung der Neugeborenen ist darauf zu achten: 1) dass die Nabelschnur in keiner Weise gezerrt werde; 2) dass Brust und Bauch mit Kleidungsstücken umgeben sind, die in keiner Richtung die vor = kurzer Zeit erst eingeleiteten Respirationsbewegungen hemmen können und 3) dass den oberen und unteren Extremitäten ihre natürliche Stellung, die Beugung gestattet ist. Das Fatschen oder Wickeln der Kinder kann sehr schädlich werden, wenn, wie es gewöhnlich geschieht, die Wickelschnur zur bessern Befestigung fest angezogen wird. Der aufmerksame Arzt hat bei jedem Wickelkind, bevor er es sich aufwickelt lässt, die Anlage der Wickelschnur zu prüfen und das zu feste Anlegen streng zu rügen. Die Hände sollen niemals mitgewickelt werden, sondern müssen, im Falle sie zum Kühlwerden geneigt sind, durch ein eigenes für sich bestehendes Tuch bedeckt werden. Aufrecht darf ein Kind erst getragen werden, wenn es den Kopf allein heben und in aufrechter Stellung wenigstens einmüssen dirigiren kann. Mit der frühzeitigen Abhärtung durch bescheidene Kleidung muss der Arzt sehr vorsichtig sein. Es lässt sich allerdings nicht läugnen, dass in der ersten Jugend abgehärtete Kinder

sich schneller und kräftiger entwickeln, seltener erkranken, und einmal requirirte Krankheiten leichter überstehen, andererseits müsse man aber auch zugestehen, dass viele Darre- und Lungenerkrankungen der Kinder von einem raschen Temperaturwechsel, oder einer überhaupt zu geringen Wärme der Brust- oder Bauchhaut hergeleitet werden müssen. Hat man nun ängstliche Eltern endlich zur Abhärtungsmethode gebracht, und es erkrankt darauf das Kind, so werden dem Arzte die bittersten Vorwürfe, und nicht mit Unrecht gemacht. Ich gebrauche deshalb immer den Ausweg, leichte Kleidung, wo ich sie vorfinde, nie zu tadeln, allein auch nie bestimmt darauf zu dringen. Unvernünftige Excesse in zu kühler oder warmer Kleidung können aber natürlich nicht geduldet werden. Lernen die Kinder laufen, so müssen sie Schuhe bekommen, die aber eine gehörig breite Sohle haben und so lang sein sollen, dass von dem Nagel der grossen Zehe bis zur Spitze der Schuhe wenigstens noch ein Zwischenraum von $\frac{1}{2}$ Zoll besteht. Viele Mütter fangen schon sehr frühzeitig an, auf die schlanken Taille der kleinen Mädchen ihr Augenmerk zu richten, was man natürlich nicht leiden darf, in vielen Fällen aber nicht verhindern kann; denn die mütterliche Eitelkeit ist ein arger Feind des rationellen Arztes.

Was endlich die Kinderstube betrifft, so muss das Kind in den ersten acht Tagen seines Lebens in einem halb dunkeln Zimmer gehalten werden, das man nach und nach heller werden lässt, bis die jungen Augen nach vierzehn Tagen endlich an das Licht vollkommen gewöhnt sind und ohne Schalen ihm ausgesetzt werden können. Von dieser Zeit an sei die Kinderstube freundlich, wenigstens von zwei Fenstern erhellt, der Boden sei mit Oelfarbe angestrichen oder mit Wachstuch bedeckt, dass kein Wasser eindringen kann, und der Ofen werde von innen geheizt und nicht zum Kochen der Speisen benützt. Zur gründlichen Ventilation müssen die Fenster täglich einmal $\frac{1}{2}$ bis 1 Stunde lang geöffnet sein, während welcher Zeit die Kinder sich natürlich in einem andern Zimmer aufzuhalten haben. Frische Luft ist unbedingt ein dringendes Bedürfniss einer kräftigen Entwicklung Neugeborener, die im Sommer das Licht der Welt erblicken, schon von der zweiten oder dritten Woche an täglich an's Freie getragen werden, im Winter aber muss man mindestens 8—10 Wochen warten, bis man es wagen darf, sie an einem sonnigen Mittag etwas zu die Luft zu bringen. Grössere Kinder können gar nie genug im Freien sein, je früher man sie hinausführt und je länger man sie vor Einbruch der Nacht sie aussen lässt, um so besser entwickeln sie sich. In den Städten hat deshalb der Arzt mit aller Energie darauf zu dringen, dass die Familien sich Gärten oder schattige Grasplätze miethen, wo die Kinder ungenirt den ganzen Tag hängen können. Dabei den Kindernägden so sehr beliebten Spaziergänge auf öffentlichen Promenaden können dem Kinde den ungenirten Aufenthalt in einem Privatgarten keineswegs ersetzen.

II. Specieller Theil.

I. Capitel.

Krankheiten direkt in Folge der Geburt entstehend.

Wenn es allerdings zweckmässig erscheint, bei einer Besprechung der Kinderkrankheiten, ebenso wie in den neueren speciellen Pathologien, die Krankheiten eines Körperteils nach dem andern einfach aufzuzählen und die Einteilung nicht auf das Wesen der pathologischen Veränderungen zu gründen, so treffen wir doch in der Pädiatrik eine Klasse von Krankheiten, welche einen bestimmten, physiologischen Zusammenhang haben und deshalb auch gemeinsam vor allen andern abgehandelt werden müssen. Es sind das die Krankheiten, die dem Geburtsakt und dem Ortswechsel des Kindes aus dem Uterus in die atmosphärische Luft allein ihren Ursprung verdanken. Hieher gehören: A) der Scheintod der Neugeborenen, B) die Atelektase der Lungen, C) die Kopfblutgeschwulst der Neugeborenen, D) die pathologischen Zustände des Nabels, E) der Trismus neonatorum, F) die Zellgewebsverhärtung, G) die Mastitis neonatorum, H) die Melæna, I) der Icterus der Neugeborenen und K) die Ophthalmoblepharorrhoe der Neugeborenen.

A. Asphyxia neonatorum.

Der Scheintod der Neugeborenen oder die Asphyxia (*α πρίβινον* und *ἀσφύξια* der Pulse) ist ein Zustand, bei welchem nach der Geburt die Inspirationsmuskeln sich nicht oder nur mangelhaft contrahiren, und das Aathmen also nicht beginnt. Die Herzbewegungen gehen hierbei ziemlich rhythmisch, wenn auch schwach und nicht immer fühlbar, sondern bloss auscultirbar fort, weshalb der Name Asphyxie gerade nicht sehr glücklich gewählt erscheint. Man unterscheidet zwei verschiedene Formen von schein-toöden Neugeborenen: bei der einen Form sind die Kinder cyanotisch, gewöhnlich sehr gross und entwickelt, die Haut ist infiltrirt, die Zunge dick und blau, aus der Mundhöhle ragend,

die Bulbi hervorgetrieben, der Herzschlag schwach und unrythmisch. Man nennt diese Form auch *Asphyxia apoplectica*, weil sie wahrscheinlich auf einer Congestion des Gehirns in Folge mangelhafter Herction beruht. Bei der andern Form sind die Kinder todtenblau, die Gliedmaßen hängen schlaff herunter, der Unterkiefer nähert sich dem Sternum, der Herzschlag und die Pulsation der Nabelschnur sind unregelmässig und schwach zu fühlen, die Respiration fehlt entweder ganz, oder es erhebt sich der Thorax in grossen Intervallen kurz und krampfhaft, das Meconium fliessen unwillkürlich ab. Die Respirationen werden immer seltener, der Herzschlag immer schwächer, und gewöhnlich tritt nach einigen Stunden der Tod ein. Zwischen diesen beiden Hauptformen gibt es einzelne Uebergänge, die keines der eben gezeichneten Bilder vollständig wiedergeben, im Allgemeinen aber sind diese Uebergänge selten.

Aetilogie.

Die Asphyxie hat verschiedene Ursachen. Sie kann durch Compression der Nabelschnur gegen die Beckenwände entstehen, oder die Nabelschnur kann um den Hals geschlungen sein, oder die Placenta kann sich vorzeitig gelöst haben. Es kann der Schadel durch ein zu enges Becken oder die geburtshilffliche Zange gelitten haben, oder es sind die Luftwege mechanisch durch Schleim und Blut verstopft. Endlich sind Frühgeburten, schwächliche Eltern, besonders schwächende Krankheiten der schwangeren Mutter als Ursache der Asphyxie bekannt. Eine Compression der grösseren Blutgefässe des Halses kann nur die apoplektische Form bedingen, weil kaum ein Druck entstehen dürfte, der die Halsarterien anwesam machte, während die oberflächlichen und dünnwandigen Halervenen bald darunter leiden werden. Die Zufuhr des Blutes zum Kopfe wird somit nicht beeinträchtigt, sondern nur dessen Abfluss.

Eine Compression des Halses hingegen übt früher einen Einfluss aus auf die Nabelvene als auf die Nabelarterien, es fließt deshalb vom Fetus mehr Blut ab als zu, und es kann hierbei nur Anämie und Blässe und endlich die sogenannte *Asphyxia nervosa* sich ausbilden.

Die pathologische Anatomie liefert hierbei keine constanten Resultate. Man findet in der Leiche nichts als einen noch ziemlich vollständigen Sitalen Kreislauf und bei besonders heftigen geburtshilfflichen Eingriffen oder sehr ungünstigen Beckenräumlichkeiten Blutextravasate zwischen den Meningen oder im Gehirn selbst.

Der Verlauf dieses Zustandes muss selbstverständlich ein sehr rascher sein; wenn sich nach einigen Stunden keine regelmäßigen Respirationsbewegungen und deutlichere Herzschläge einstellen, so hört das Leben auf, welcher Ausgang sich häufiger bei der sogenannten nervösen als bei der apoplektischen Form ereignet. Sehr häufig stellen sich nach einiger Zeit bei gehöriger Hülfeleistung die Athembewegungen ein, der Herzschlag wird kräftiger und rythmisch, und es verliert sich sowohl die Cyanose bei der einen als die abnorme Blässe der andern Form.

Therapie.

Die Behandlung richtet sich hauptsächlich nach den Ursachen. Vor allem ist die Mundhöhle gründlich zu reinigen, was am besten

mit dem Finger geschieht. Es entstehen durch Berührung des Gaumensegels und der Epiglottis leicht Würg- und Hustenbewegungen, wodurch allein schon die Respiration eingeleitet werden kann. Hat man durch Reinigung der Mundhöhle nichts effectuirt, so laßt man bei den cyanotischen Kindern sogleich aus der durchschnittenen Nabelschnur zwei Esslöffel Blut heraus. Bläset die Nabelschnur nicht mehr, so verzichte man auf fernere Blutentziehung. Blasse Kinder vertragen natürlich keinen Blutverlust, sind vielmehr durch genaue Unterbindung der Nabelschnur davor zu schützen. Ein sehr einfaches und immer bereites Mittel sind einige Schläge mit der flachen Hand auf den Steiß. Theils durch die Erschütterung, theils durch den Schmerz entstehen sehr nützliche Reflexbewegungen der Inspirationsmuskeln. Nützt auch dieses Verfahren nicht, so bringe man das Kind in ein warmes Bad, nehme es aus diesem nach einer Minute wieder heraus, schwenke es einige Male auf und nieder und setze es hierauf gleich wieder in das Bad. Durch diese abwechselnde Erwärmung und Abkühlung entsteht ein wohlthätiger Haustroica. Man kann auch reizende Flüssigkeiten auf die Brust träufeln, worunter Weissessig, Bräutwein, Aether, kölnisches Wasser die gebräuchlichsten Mittel sind. Ein sehr heilsames, oft gepriesenes, dann wieder verworfenes Verfahren ist das direkte Aufblasen. Man reinigt hiebei zuerst Mund und Nase, setzt dann die eigenen Lippen an den geöffneten Mund des Kindes und bläst hinein, worauf natürlich die Luft zu den Nasenlöchern des Kindes wieder hervorkommt. Nachdem man sich so von der Durchgängigkeit derselben überzeugt hat, hält man auch diese mit zwei Fingern zu, und bläst nun von Neuem Luft in den Mund. Man irrt sehr, wenn man glaubt, es komme auf diese Weise Luft in die Lungen, in den meisten Fällen wird durch das Aufblasen der Mundhöhle die Epiglottis nur noch fester auf den Kehlkopf aufgedrückt, so dass gar keine Communication der Mundhöhle mit den Lungen mehr stattfindet. Der durch die Spannung der Mundhöhle entstehende Reiz aber kann möglicher Weise günstig auf die Inspirationsbewegung wirken, und mag einen ähnlichen Effekt wie der die Epiglottis berührende, kitzelnde Finger hervorrufen.

Soll wirklich die Luft in die Bronchien geblasen werden, so muss man das von Chaussier hiezu eigens angegebene Instrument oder einen dünnen männlichen Catheter in die Trachea bringen, nachdem man mit der Spitze des Zeigefingers die Epiglottis in die Höhe gehoben hat. Viele und bewährte Geburtshelfer verwerfen aber das Aufblasen gänzlich, auch sprechen Versuche an neugeborenen Thieren, die man durch Untertanken in warmes Wasser künstlich schnittelft gemacht hat, gegen dasselbe. Rationell ist es, die Kinder auf die rechte Seite und etwas hoch zu legen, weil hierdurch der rechte Vorhof nach unten, der linke nach oben zu liegen kommt und hiermit das in den rechten Vorhof eingetretene Blut gerade nach aufwärts steigen muss, wenn es durch das noch offene Foramen ovale gleich in den linken Vorhof statt in den rechten Ventrikel gelangen will. Es mag durch diese Lagerung der Schluss der Klappe dieses fötalen Weges erleichtert werden. Das sicherste Mittel, die Inspirationsmuskeln zur Contraction zu bringen, wird immer die Electricität sein. Die Inspirationsmuskeln können den Thorax nur auf Kosten der Lungen erweitern, und es

müssen also die Alveolen Luft aufnehmen; sind sie einmal ordentlich mit Luft gefüllt, so kann dieselbe so rasch nicht mehr ganz austreten und wird fort und fort als Reiz für fernere Inspirationsbewegungen wirken; das schlimmste hierbei bleibt, dass hier Periculum in mora ist, und dass die Herstellung eines elektrischen Stromes immer eine gewisse Zeit und Sachkenntnis erfordert, die man von einer Hebamme kaum erwarten darf.

Alle diese Belüftungsversuche sind so lange fortzusetzen, als man noch durch Auscultation den Herzschlag ermitteln kann. Erst wenn dieser mehrere Minuten lang gar nicht mehr zu hören, kann man von weiteren Bestrebungen absehen und das Kind für todt erklären. Wenn es überhaupt gelingt, Asphyxie zu beheben, so geschieht dies gewöhnlich in einer oder höchstens 2–3 Stunden.

B. Atelektasis pulmonum.

Wenn nach der Geburt die Inspirationsmuskeln sich nicht genügend und gleichmässig contrahieren, so dehnen sich auch nicht alle Parthieen der Lunge gleichmässig aus, an einzelnen Stellen verharren die Alveolen in ihrem fetalen Zustande, sind luftleer und bleiben kollabirt. Dieser pathologisch anatomische Befund heisst Atelektasis (*a priv. rōlog*, das Ende. *ē lēraōg*, die Ausdehnung).

Selten ist eine ganze Lunge oder ein ganzer Lappen, meist sind nur einzelne zerstreute Lappchen, besonders nach hinten und unten atelectatisch, dieselben sind in den beiden Lungen scharf abgegrenzt, verflocht neben den lufthaltigen Theilen, sie sind bläuroth und hart, crepitieren nicht auf Druck und sinken im Wasser unter, die Schnittfläche ist gleichmässig, nicht körnig. Mit einem Tubulus lassen sich die atelectatischen Lungensparthieen vollkommen aufblasen, die aufgeblasenen Stellen bleiben aber noch immer etwas dunkler rosa als ihre Umgebung. Durch diese Möglichkeit sich aufblasen zu lassen, unterscheidet sich die Atelektase hinlänglich von der kroupösen Pneumonie. Ausserdem findet man bei diesen Kindern meist noch die fetalen Circulationswege offen, in den Lungen aber nirgends Spuren eines entzündlichen exsudativen Processes.

Symptome

Die Kinder kommen gewöhnlich sehr asphyctisch zur Welt oder athmen wenigstens von Geburt an oberflächlich und heben den Thorax nur unmerklich. Charakteristisch ist die Stimme dieser Kinder. Sie können nicht zusammenhängend und laut schreien, sondern gehen nur einzelne schwache, wimmernde Töne von sich, auch können sie nicht anhaltend und kräftig saugen und lassen die Brust bald wieder los, wodurch den Stillenden bedeutende Beschwerden bereitet werden. Zuweilen sind sie vorübergehend cyanotisch, sie schlafen viel und haben eine blass, kühle Haut. Die Pupillen reagieren träge, sind etwas erweitert, der Puls ist schwach und verlangsamt. Die Percussion des Thorax ist, wenn die Atelektase nicht sehr ausgedehnt ist, kaum verändert, im Allgemeinen etwas weniger sonor als bei gesunden Neugeborenen. Das Athmungsgeräusch ist bei der geringen Thoraxbewegung natürlich nur sehr schwach, Bronchialathmen bekommt man

auch über den atelectatischen Stellen fast nie zu hören, zuweilen aber knisternde Rhonchi. Hat dieser Zustand einige Tage bestanden, so stellen sich Krämpfe im Gesicht und am ganzen Körper ein, die Respirations- und Circulationsbewegungen werden immer schwächer und langsamer, die Haut immer kühler, und die Kinder verbleichen entweder nach und nach, oder der Tod tritt unter heftigen tonischen oder chronischen Convulsionen plötzlich ein.

Ursachen.

1) Asphyxie und alle dort angeführten Bedingungen. Die ganze Atelektase lässt sich auch als ein leichterer und länger fortgesetzter Grad der Asphyxie betrachten. 2) Unreife und schwächliche Kinder. 3) Die Autoren geben auch das Einathmen einer zu kalten Luft als Ursache an, viel wahrscheinlicher stellt sich aber auf kalte Luft lobuläre Pneumonie ein und 4) sollen zu schnelle und leichte Geburten Atelektase bedingen. Von der später erworbenen Atelektase soll weiter unten bei den Lungenkrankheiten gesprochen werden.

Behandlung.

Sie fällt ganz mit der des Scheintodes zusammen. Prophylaktisch ist es wichtig, jedes Kind in den ersten Minuten seines Lebens zu lüfteln, lautem Schreien zu bringen, wenn die beim Scheintod angegebenen Mittel die geeignetsten sind: Lufteinblasen hat bei Atelektase keinen Erfolg, hingegen ist die Galvanisirung der Brustmuskeln mit Vorsicht angewandt hier vollständig zu ihrem Platz. Was die allgemeinen Regeln betrifft, so müssen diese Kinder in einer gleichmäßigen Zimmertemperatur von mindestens 15° R. und durch Wärflaschen und warme Tücher möglichst warm gehalten werden; man wechselt häufig ihre Lage und trage sie umher. Man lässt den Kindern Nichts mit dem Löffel ein, sondern lässt sie mit einiger Anstrengung saugen, weil auch hierdurch tiefe Inspirationen entstehen. Das von Jörg empfohlene Emeticum aus Pulv. r. Ipecac. 0,120 habe ich einmal, aber mit unglücklichem Erfolge angewandt, und beschränke mich seitdem darauf, die Kinder täglich 2–3 Mal mit dem Finger am weichen Gaumen und der Epiglottis zu kitzeln, wodurch heftige Würgbewegungen und diesen entsprechende tiefe Inspirationen hervorgerufen werden.

Man hat auch versucht, durch Druck von aussen die Respirationsbewegungen nachzuahmen, indem man den sehr beweglichen Thorax der Neugeborenen kräftig und im langsamen Tempo mit den Fingern comprimirt, wobei der Rücken auf einer festen Unterlage sich befinden muss. Auch von diesem Verfahren habe ich noch keine günstigen Resultate gesehen, was sich übrigens leicht voraussehen lässt; denn dieses ruckweise Comprimiren des Thorax hat wirklich nicht mehr Ähnlichkeit mit den Inspirationsbewegungen, als das Zuspätseln einer Flasche mit deren Oeffnen.

C. Cephalæmatoma. Die Kopfgeschwulst.

Symptome.

Die Kopfgeschwulst, Cephalæmatoma (ἡ κεφαλή Kopf, τὸ αἷμα Blut), auch Thrombus neonatorum genannt, ist eine unachserzhafte,

weiche, elastische, deutlich fluctuirende Geschwulst am behaarten Theile des Kopfes und rührt von einem Bluterguss zwischen Pericranium und Knochen her, weshalb man es auch zur genaueren Bezeichnung Cephaloematoma sub pericranium genannt hat. Die Blutung ereignet sich höchst wahrscheinlich während der Geburt; denn man bemerkt schon am ersten Lebenstage, wenn die gewöhnliche Kopfgeschwulst sich zu senken anfängt, eine ziemlich bedeutende Erhabenheit, dieselbe dauert bis zum vierten, längstens sechsten Tage fort, wo dann ein reichlich apfelgrosser Tumor auf einem Parietalknochen sich findet. Gewöhnlich wird sie auf der rechten Seite beobachtet, ausnahmsweise kommen auf beiden Scheitelbeinen solche Geschwülste vor. Sie überschreiten niemals eine Naht.

Nachdem diese Geschwulst einige Tage bestanden hat, bemerkt man, wenn man mit dem Finger von der normalen Kopfhaut aus fest gegen die Geschwulst drückt, einen harten knöchernen Ring, der die ganze Basis der Geschwulst umgibt. Es ist dies eine Knochenwucherung, die sich zwischen Knochen und dem vom Blute abgelösten Periost entwickelt, Taf. II, Fig. 5, Nr. 6, und den Anfang der Resorption bezeichnet. Nach und nach verliert die Geschwulst ihre Weichheit und theilt dem aufdrückenden Finger ein eigenthümliches Gefühl oder Geruch mit, das davon herrührt, dass nun auch auf der der Blutung zugekehrten Fläche des Pericraniums Knochenbildung begonnen hat. Allmählig verliert die Geschwulst an Höhe, wird immer härter und flacher, und nach $\frac{1}{4}$ oder $\frac{1}{2}$ Jahre bemerkt man nur mehr bei genauem Zufühlen eine Unebenheit und ungleiche Erhabenheit des Knöcherns, über der die behaarte Kopfhaut sich aber gut verschieben lässt. Das Cephaloematoma ist eine ziemlich seltene Krankheit und kommt unter 1000 Neugeborenen höchstens 1—2 Mal vor.

Aetiologie.

Die Ursache derselben scheint nach Vallëix folgende zu sein: Man findet bei den meisten Leichen Neugeborener eine Ecchymose des Pericraniums von 3 Zoll Länge und 2 Zoll Breite, die sich zu beiden Seiten der Pfeilnaht erstreckt, auf dem rechten Scheitelbeine aber ausgebreiteter vorkommt, als auf dem linken. Sie rührt höchst wahrscheinlich von dem zirkelförmigen Druck des geöffneten Muttermundes her. Die Stellen, an denen man diese Ecchymose am häufigsten findet, sind nun gerade die, wo auch das Cephaloematoma am häufigsten vorkommt, so dass letzteres nur als der höchste Grad jener gewöhnlich auftretenden kleinen Blutung erscheint.

Bei der Häufigkeit schwerer Geburten und der Seltenheit des Cephaloematoms wird es jedenfalls nöthwendig sein, ausser diesen mechanischen Verhältnissen eine besondere Dünn- oder Brüchigkeit der Knochengefässe anzunehmen, und die von Nägele, Hüter und Meissner beobachteten Cephaloematome nach Steissgeburten beweisen zur Genüge, dass die Sache nicht so einfach ist, wie Vallëix sie sich gedacht hat, sondern dass noch andere Faktoren hier im Spiele sein müssen.

Ausser dieser eigenthümlichen Kopfknochenblutung kommen ebenfalls sehr selten nach schweren Geburten besonders in Folge der Zange noch Blutungen über und unter des Galen aponeurotica vor, sie sind

mehr diffus, bekommen nie einen Knochenring und resorbiren sich viel schneller als die echten Cephaloematome, mit grüner und brauner Färbung der behaarten Kopfhaut. Tafel II, Fig. 6 ein schematischer Durchschnitt einer solchen Cephaloematoma subaponeuroticum sive purum. —

Endlich findet man auch neben dem wahren Cephaloematom, aber auch ohne dasselbe, eine Blutung an der Innenseite des Schädelknochens zwischen Knochen und Dura mater. Taf. II, Fig. 7. In Folge des Gehirndruckes treten Convulsionen oder Lähmungen ein. Es lässt sich diese Meningealapoplexie nicht sicher diagnostizieren, wenn aber bei Cephaloematoma sub pericranium dergleichen Symptome vorkommen, so kann man mit ziemlicher Bestimmtheit die Complication eines Cephaloematoma meningium annehmen. Der Tod ist der gewöhnliche Ausgang dieses Processes.

Das wahre Cephaloematom kann wasser mit dem C. subaponeuroticum noch verwechselt werden:

1) mit Aem Caput succedaneum, der gewöhnlichen Kopfgeschwulst, dem sogenannten Vorkopfe. Derselbe ist ein Oedem der Kopfschwarte, fluctuirt nicht und hinterlässt auf Fingerdruck eine Grube. Er verschwindet schon in den ersten 12—24 Stunden, während das Cephaloematom, bei der Geburt kaum bemerkbar, von Tag zu Tag wächst, bis es nach acht Tagen seine grösste Ausdehnung erreicht hat und sich mit einem Knochenringe umgibt. Häufig wird in den ersten 24 Stunden das Cephaloematom vom Vorkopfe maskirt.

2) mit dem angeborenen Hirnbruche. Hernia cerebri congenita. Der Hirnbruch findet sich nie auf dem Scheitelbeine, sondern immer nur zwischen zwei Kopfknochen, also in den Nähten und Fontanelle. Er tritt beim Schreien und Husten der Kinder mehr hervor, lässt sich zum Theil reponiren, und verursacht hierbei leicht Convulsionen. Die ihn bedeckende Haut ist meistens verdünnt und haarlos.

3) mit vasculösen Geschwülsten. Dieselben sind bei Neugeborenen ziemlich selten, und wenn sie vorkommen, sehr selten an behaarten Theile des Kopfes; sie fluctuiren nicht, fühlen sich teigig an, haben keinen Knochenring, und die sie bedeckende Haut ist durch stark entwickelte Venengeflechte bläulich gefärbt.

Behandlung.

Aus unserer Schilderung des Verlaufes lässt sich die Behandlung leicht ableiten. Wenn man das Cephaloematom ruhig sich selbst überlässt, nicht quetscht, die deckende Haut nicht reizt und keine chirurgischen Eingriffe unternimmt, so resorbirt es sich, wie oben erwähnt, im Laufe von 3—6 Monaten vollständig, die Kinder entwickeln sich dabei ungehindert fort, haben keinen Schmerz, wenn man auf den uneben Knochen drückt, und überhaupt gar keinen Nachtheil von dem ganzen Prozesse und seinen Folgen.

Trotz dieser unumstößlichen Thatsache gibt es eine Menge von Behandlungsmethoden, die theils von operationsgerigen Chirurgen, theils von alltageschäftigen Aerzten erfunden worden sind. Man hat die Geschwulst mit allen möglichen aromatischen Wässern, mit Salmiak, grauer Salbe, Jodlinetur, Brantwein und Salz etc. etc. gewaschen und

gesalbt. Man hat durch Bestreichung mit Collodium oder durch Stanniolplatten, mit denen die Kinderhäubchen gefüllt wurden, einen gelinden Druck ausgeübt, man hat Aetzmittel aufgelegt, Setaceen durchgezogen, und man hat endlich die Geschwulst angestochen, aufgeschlitzt, oder gar durch einen Kreuzschnitt das Blut entleert.

Das Comprimiren, Aetzen, Stechen und Schneiden bringt nur Noththat und Gefahr durch Reizung der Kopfschwarte und durch die Berührung des vom Peristost entblößten Knochens mit der atmosphärischen Luft. Bei der sogenannten zerkleinernden Behandlung sind die unschädlichsten Mittel die besten; ich bediene mich lediglich eines indifferenten Fettes, das solaminis caeva täglich einmal auf die Geschwulst geschmiert wird. Zu meiner Genugthuung ersehe ich, dass nach einem Bericht Fürth's im Wiener Findelhaus seit mehreren Jahren 89 Fälle rein expectativ und zwar mit dem besten Erfolge behandelt wurden.

D. Die Krankheiten des Nabels.

Nach Durchschneidung der Nabelschnur beginnt das am Unterleibe des Kindes adhärende Stück einzutrocknen und fällt zwischen dem dritten und zehnten Tage ab. Die Zeit des Abfalls richtet sich nach der Beschaffenheit der Nabelschnur; ist diese dünn und schlank, so fällt sie schnell ab, ist sie dick oder, wie die Hebammen sagen, fett, so dauert es natürlich länger, bis alles Wasser der Wharton'schen Sulze verdunstet ist. In Folge des üblichen Einschlagens in einen Leinwandlappen und des Einkindens in die Nabelbinde nimmt die so Harn vertrocknete Nabelschnur die Gestalt eines flachen Bandes an, auf dem die Nabelarterien und die Vene sich als drei dunklere Streifen markiren. An der Stelle, wo die Wharton'sche Sulze mit der Bauchwand sich vereinigt, faltet sich bei Schrumpfung der Nabelschnur die Cutis sternförmig, und bei endlichem Abfall der Schnur findet man eine ziemlich feste trockene Narbe. In einzelnen Fällen wächst im Fötus die Cutis eine kleine Strecke an den Nabelstrang hinauf, wodurch nach Abfall desselben unverhältnissmäßig grosse Wülste und ein tiefer Trichter entstehen, was man mit dem Namen „Fleischnabel“ bezeichnet, wie Tafel II, Fig. 9 a u. b schematisch darthut.

Bei fetten Nabelsträngen ist jener Vernarbungsprocess weniger vorgeschritten, statt der Narbe erscheint eine geröthete, entzündete, nässende oder wirklich eiternde Fläche, die zu verschiedenen pathologischen Processen Veranlassung gibt. Nur im Zusammenhange mit einem lebenden Kinde geht der Nabelstrang diese Vertrocknung ein, stirbt das neugeborene Kind bald nach der Geburt, so vertrocknet er nicht an der Leiche, sondern beginnt zu faulen, was bei gerichtlichen Sectionen einen Anhaltspunkt für den Eintritt des Todes abgeben kann.

Behandlung des normalen Nabels.

Um ein regelmässiges Eintrocknen und Abfallen des Nabelstranges zu erzielen, ist es nöthwendig, ihn vor jeder Zerrung und Misshandlung zu schützen. Er werde etwas zusammengedrückt oder gebogen, in ein feines Leinwandlappchen geschlagen und scitlich, ohne Zerrung, mit

der Nabelbinde befestigt. Beim Aus- und Ankleiden der Kinder, sowie im Bade muss jede Berührung des immer steifer werdenden Nabelschlaunders vermieden werden, und niemals darf man versuchen, durch Anziehen oder rüttelnde, zupfende Bewegungen ein vorzeitiges Abfallen zu bewerkstelligen.

Folgende pathologische Prozesse kommen während oder nach dem Abfall vor.

1) Die Entzündung der Nabelgefäße. Phlebitis und Arteriitis umbilicalis.

Es kommt zuweilen, zum Glück jedoch selten vor, dass die Gerinnsel, welche unter den Bauchmuskeln die Nabelgefäße ausfüllen, eiterig zerfallen und eine eiterig jauchige Secretion des Nabels veranlassen. Durch Druck auf die Umgebung desselben kann man einzelne Tropfen Jauche auf einmal entleeren. In Folge der Röthung und des Schmerzes sind die Kinder sehr unruhig, bewegen die Bauchmuskeln so wenig als möglich und febern regelmäßig. Bald treten pyämische Entzündungen der serösen Haute oder Erysipel der Bauchwand hinzu, und die Kinder sterben im längsten Ende der dritten Woche. Tritt ausnahmsweise keine Jaucheresorption ein, so wird die Eiterung geringer, und der Nabel vernarbt nach einigen Wochen zu einer harten Narbe. Da aber diese Venenentzündung besonders in Gebärläusern, in welchen Puerperalfieber herrscht, beobachtet wird, so erfolgt gewöhnlich Pyämie und der Tod.

Behandlung.

Die Behandlung ist sehr einfach; man deckt keine Krusten auf der jauchigen Fläche, indem man sie fortwährend mit warmen feuchten Compressen bedeckt und 2—3 stündlich mit warmem Wasser ausspült. Die Hauptsache bleibt immer schleimige Entfernung aus dem inficirten Gebärlaume und eine kräftige gesunde Nahrung, welche natürlich nur bei den wenigsten Frauen, die im Gebärlaume entbinden, zu beschaffen ist. Ist man gezwungen, die Kinder künstlich zu ernähren, so genügt während dieses Processes Milch und Wasser oder Milch und Thee zur Fristung des Lebens. Diarrhöen müssen so schnell als möglich durch Mucil. gi. arab. 30,0 mit TR. Oppli. ozor. gtt. j, wovon man ein oder selbst zwei Kaffeeöffel reicht, gestillt werden.

2) Blennorrhoe und Ulceration der Nabelfalte.

Bei fettem Nabel oder in Folge von Unreinlichkeit und Miss-handlung der jungen Narbe fängt diese wieder an, nach Art der Schleimhaut zu secretiren, was man durch Bleiwassercompressen oder Bestreichung mit Hollenstein wieder sistiren kann. Besteht aber dieser Zustand länger, so bilden sich kleine Excoriationen auf der Bauchwand, die ganze Umgebung wird heftig geröthet, schmerzhaft bei Berührung und es entwickelt sich ein rundes Geschwür bis zur Grösse eines Groschens. In den schlimmsten Fällen kann Perforation dieses Geschwüres, Peritonitis und Tod eintreten.

Behandlung.

Durch die Behandlung mit feuchter Wärme und später mit reinen Höllensteinstrichen gelingt es meist eine Verwundung herbeizuführen, wenn anders die Kinder gut genährt und keine Verdauungsstörungen vorhanden sind, im entgegengesetzten Falle tragen die Schmerzen und die Eiterung des geschwulstigen Nabels natürlich zur Beschleunigung der Atrophie das übrige bei.

3) Brand des Nabels.

Bei schwächlichen Kindern oder in Gehäusen, wo Puerperalfieber herrscht, kann eine Nabelphlebitis oder das eben besprochene Nabelgeschwür auch gangränös werden, indem sich aus demselben eine granbraune, sphacelöse Masse entwickelt; der Brand greift rasch auf die Bauchwand über, die Epidermis wird lose, lässt sich abziehen, und die darunter befindliche Cutis hat eine graue, bläuliche Farbe. Zuweilen sickert zwischen den sphacelösen Massen noch jauchig gemischtes Blut in ziemlicher Menge hervor. In den meisten Fällen tritt rasch Peritonitis, nach Anheftung eines Darmstückes auch Darmperforation und Entleerung von Faeces aus dem sphacelösen Geschwür ein. Sehr selten nur genesen diese Kranken, indem der Schorf sich begrenzt, abstößt und eine granulirte Fläche zurücklässt; der gewöhnliche Ausgang ist der Tod nach 8—14 Tagen.

Bei der Behandlung ist Reinlichkeit und eine Amme das Wichtigste; zur Vertilgung des brandigen Geruches ist ein Charpieverband mit Chamäleonlösung zu empfehlen. Zur Aufrechterhaltung der sehr gesunkenen Kräfte bediene ich mich immer eines reinen Kaffees mit Milch und Zucker, oder einiger Kaffeestübe rothen Weines.

4) Der exulcerirende Nabelstumpf, der Nabelschwamm, *Fungus umbilicalis*.

Wenn nach Abfall der Nabelschnur noch keine Verwundung eingetreten ist, so wuchert zuweilen aus der wunden Fläche eine gestielte Excrescenz, die die Grösse einer Erbse und darüber erreichen kann, hervor und verhindert natürlich die Bildung einer Narbe. Die aufliegende Bauchhaut wulstet, röthet und exoriirt sich, und bei Vernachlässigung dieser Symptome liegt die Gefahr des Brandes sehr nahe. Sind einmal Excoriationen vorhanden, so muss man sie erst genau reinigen und die Nabelfalte auseinanderziehen, bis man sich von der Ursache, dem exulcerirenden Stumpfe, überzeugen kann, indem derselbe häufig von der gewulsteten Falte überdeckt wird, wie der schematische Durchschnitt, Taf. II, Fig. 8, zeigt. Ist der Stumpf und die Nabelfalte exulcerirt, so glaubt man eine wunde Fläche vor sich zu haben und kann sich nur durch Auseinanderziehen der Falte von dieser irrthümlichen Anschauung befreien. Die Behandlung besteht in Abschneidung oder Abbindung des Stumpfes. Die Abschneidung kann man ohne Assistenz vornehmen, indem man mit der linken Hand die Nabelfalte auseinanderhält, dann mit einer Cooper'schen Schere den Stiel abschneidet und die blutende Wundfläche mit Höllenstein tupft. Zur Abbindung braucht man beide Hände, weshalb ein Assistent mit

einer Hand die Nabelalte spannt und mit einer Sonde in der andern die gemachte lose Fadenschlinge möglichst tief an den Grund des Stieles schiebt. Zieht man die Schlinge fest an, so durchschneidet sie sogleich den Stumpf, und auch hier tritt eine kleine Blutung ein, die durch Höllenstein gestillt wird. Aus dem Gesagten geht hervor, dass das Abschneiden weit leichter, einfacher und ebenso gefahrlos ist als das Abbinden. Ich vermüthe, dass dieser gestielte Stumpf, wenn man ihn sich ganz selbst überlässt, nach und nach verjaucht und abstirbt, so dass schliesslich eine spontane Heilung eintritt.

b) Die Nachblutung.

Nach Abfall der Nabelschnur, bevor vollständige Verwundung eingetreten, entsteht zuweilen eine gefährliche Blutung, der man nur höchst selten Meister zu werden im Stande ist. Plötzlich ohne alle Veranlassung findet man die Nabelwunde löthig und löst man sie nun, so sieht man Tropfen auf Tropfen langsam aus der Nabelgrube heraussickern. Fängt man das Blut in einem Uhrglase auf, so dauert es Tage lang, bis sich ein Fibrincoagulum bildet, und dieses Coagulum bleibt lose und flockig. Die Kinder bluten nun so fort und fort und gehen nach einigen Tagen anämisch zu Grunde, nachdem sich zuletzt noch Petechien und Ecchymosen der Haut, die man bei der Section auch auf Pleura und Pericardium trifft, eingestellt haben. Die Krankheit, überhaupt ausserordentlich selten, indem sie bei 10,000 Neugeborenen nur einmal vorkommt, wurde von mir erst einmal beobachtet, bei der Section fand man Nabelvene und Nabelarterien mit vollständigen Thromben ausgefüllt. Der Vater dieses am elften Tage verstorbenen Kindes will der Sohn eines Blutes sein, indem er mir unaufgefordert versicherte, dass sein Vater aus jeder Schnittwunde am Finger mehrere Tage lang blutete und einmal nach einer Zahnoperation so viel Blut verloren hatte, dass er mehrere Monate lang blass und schwach blieb. Die Nabelblutung ist also mit Wahrscheinlichkeit als die erste Aeusserung der Bluterdykrasie anzusehen und ist dann wohl auch mit Ursache, dass die Bluter so selten vorkommen.

Therapie.

Die gewöhnlichen blutstillenden örtlichen Mittel, auch der so sehr gerühmte Liqueur ferri sesquichlorati, bleiben erfolglos, auch die von Dabois und Szanconi empfohlene Ligature en masse, welche darin besteht, dass man zwei Insektenzenden über's Kreuz tief durch den Nabel steicht und mit Achtertoursen umwickelt, leistete in meinem Falle nichts, indem aus den Nadelstichen selbst das Blut wieder heraussickerte. Thomas Hill hat einen Fall geheilt, indem er auf den eben abgetropften Nabel einen Gypskeil goss und die später entstehenden Risse immer wieder mit Gyps ausfüllte, ein Verfahren, das jedenfalls gefahrlos und leicht auszuführen, eine fernere versuchsweise Anwendung verdient. Die von einzelnen Chirurgen vorgeschlagene Aufsuchung und Unterbindung der Nabelarterien und der Nabelvene geht von der unrichtigen Prämisse aus, dass die Blutung aus diesen Gefässen herrührt, was sich in meinem Falle nicht bestätigt hat. Hält man an der Theorie der Bluterkrankheit, welche bisher die meiste Wahrscheinlichkeit für sich hat, fest, so sind natürlich alle operativen Eingriffe zu verwerfen.

6) Der Nabelbruch, *Hernia umbilicalis*.

Unter Nabelbruch kurzweg versteht man zweierlei Zustände, die fast gar keine Aehnlichkeit mit einander haben, nämlich den angeborenen und den erworbenen Nabelbruch (*Exomphalus*, *Omphalocele congenita*, Nabelschnurbruch — *Hernia umbilicalis*, *Omphalocele acquisita*, Nabelringbruch).

Der angeborene oder Nabelschnurbruch beruht auf einer Hemmungsbildung der Bauchdecken, in deren Spalte der Bruch zu Tage kommt. Die Bauchplatten des Embryo, die links und rechts von den Primäirstreifen auszuwachsen, sind die ersten Rudimente der Bauchwand, die wachsen zu die Keimblase hinein, nähern sich mit ihren Rändern und umgreifen dadurch eine Höhle — die zukünftige Bauchhöhle, in welcher ein Theil der Keimblase abgeschnürt wird. Dieser abgeschnürte Theil der Keimblase wird zum Darmkanal, welcher mit dem ausserhalb des Bauchs liegenden Theile der Blase (Nabelbläschen) durch einen Gang communiziert. Dieser Gang ist der Darminabel, die ihn umgebenden Ränder der noch nicht vollständig verwachsenen Bauchplatten bilden den Hautnabel. Findet nun diese Abschnürung, welche zu die sechste bis achte Woche des Fötuslebens fällt, nicht gehörig statt, so entwickelt sich der Darm in der offenen Blase, schließt sie dadurch Meibend offen und die Leber hat grosse Neigung in die weite Blase zu treten, wahn sie durch die Nabelvene direkt geleitet wird.

Wenn der Theil des Darms, welcher normal in der Basis der Nabelschnur enthalten ist, nicht zur rechten Zeit in den Unterleib zurücktritt, sondern sich in der Nabelblase fortentwickelt, so erreicht er am Ende einen Umfang, der ihn auch nach der Geburt den Rücktritt in die Bauchhöhle verbietet, gleich Früchten, die frühzeitig als Blüten in den Hals einer Flasche hineingebracht, im reifen Zustand denselben nicht mehr passieren können.

Wenn sich aber neben dem Darms auch ein Theil der Leber bei der Nabelöffnung betheiligt, so hält die Leber gemäß ihrer Dichtigkeit den Ring weit offen und der in der Blase enthaltene Darm kehrt bei seiner zunehmenden Grösse in die Bauchhöhle zurück. Die angeborenen Nabelbrüche, wo kein Theil der Leber vorliegt, lassen sich niemals reposiren, die vorliegenden Darmeschlingen werden toll nach der Geburt nach Abstossung der Nabelschnur brandig, es tritt Peritonitis und der Tod ein. Die angeborenen Nabelbrüche, welche ein Stück Leber enthalten, sind möglicher Weise einer spontanen Heilung fähig. Es bedeckt sich der Peritonäalüberzug der Leber mit Granulationen, die grosse Oeffnung contrahirt sich nach und nach und es entsteht eine dicke Narbe. Dehont hat auf diese Weise Heilung zu Stande kommen sehen. Die Behandlung ist hierbei sehr einfach, man bedeckt die granulirende Fläche mit einem Cretatappen und nährt die Kinder möglichst gut.

Der erworbenene Nabelbruch, der Nabelringbruch entsteht erst einige Wochen oder Monate nach der Geburt, nachdem die Nabelnarbe sich zur rechten Zeit und in normaler Weise gebildet hat, und wird hauptsächlich bei etwas mageren Kindern, die viel an Flatulen leiden und anhaltend schreien, beobachtet. Der Nabelring gibt nach, durch die Bauchpresse wird ein Stückchen Dünndarm in den Ring

gepresst und schiebt das Peritonäum und die sich ausdehnende Nabelnarbe vor sich her, so dass statt der Vertiefung eine Hervorragung von der Grösse einer Kirsche bis zu der eines halben Apfels zum Vorschein kommt. In der Mitte des Nabels findet sich eine weisse, glänzende Stelle, welche dem Punkte entspricht, wo die drei Nabelgefässe nach dem Abfallen des Nabelstranges mit einander verwachsen, diese Stelle heisst der Gefässnabel. Sie dehnt sich weniger aus, als der Hautnabel und findet sich deshalb auch gewöhnlich nicht auf dem Gipfel des Nabellentes, sondern nach unten oder seitwärts. Der Inhalt des Beuches ist meist eine kleine Dünndarmschlinge, die nur sehr selten das Netz vor sich her schiebt. Die Reposition gelingt in allen Fällen ohne Mühe, auch derselben kann man mit der Fingerspitze leicht die Grösse des Ringes untersuchen. Bei gehörigem Verband verkleinert sich der Nabelring nicht einfach, sondern wird, wie ich oft beobachtet habe, zuerst eine Querspalte, deren Ränder sich dann mehr und mehr nähern. Incarcerationen sind mir noch niemals vorgekommen.

Die Behandlung dieses meist auch spontan heilenden Bruches besteht darin, dass man sich aus Leinwand oder Charpie oder Korkholz einen Pfropf macht, der etwas grösser als der Nabelring ist, ihn mit einem 6—8 Quadratzoll grossen Stück Heftpflaster auf den reponirten Bruch aufklebt, und mit einer breiten Nabellinde diesen Verband unterstützt. Wenn die Angehörigen des Kindes dieses einfache Verfahren einmal gelehrt haben, so kann das Kind auch täglich wieder gebadet werden, worauf dann der Verband jedesmal erneuert werden muss. Der Ansicht vieler Aelteren, es müsse der Nabelbruch durch lange, um den ganzen Leib gehende, vorne gekrenzte Heftpflasterstreifen zurückgehalten werden, kann ich nicht beistimmen; denn die abdominale Respiration wird hiedurch sehr beeinträchtigt, ferner gibt es kein Heftpflaster, das nicht mit der Zeit erodirte, und die Erneuerung dieses Verbandes ist den Angehörigen schwieriger zu lehren, als das einfache Ankleben eines viereckigen Pflasters, wesshalb gewöhnlich zum grossen Schaden der Kinder das Baden lange unterbleibt. In 3—6 Monaten kann man, wenn obiges Verfahren consequent fortgesetzt wird und das Kind ausserdem geduldet, einen jeden noch so erweiterten Nabelring zum Verschlusse bringen.

E. Triemus und Tetanus der Neugeborenen.

Symptome.

(*krampic, das Krarren; k rinevaz, Starrkrampf*) 1—5 Tage nach Abfall der Nabelsehnur, niemals früher noch später, kommt bei Kindern Triemus vor. Gewöhnlich gehen Vorboten voraus, als Unruhe, Weinen, ein eigenthümliches Zittern des Unterkiefers, Auffahren im Schlaf und Begierde nach der Brust, die das Kind schnell wieder los lässt. Nachdem diese Vorboten einige Stunden, höchstens Tage gedauert, können die Kinder plötzlich den Mund nicht mehr öffnen. Die Kaumuskeln fühlen sich hart an, die Haut darüber aber ist zum Unterschiede von der Zellgewebsverhärtung leicht verschiebbar. Die Gesichtszüge verlieren die den Neugeborenen eigene Ausdruckslosigkeit, der Mund spitzt sich zu, die aufeinander gepressten Lippen sind von strahlenförmigen

Falten gefurcht, es bilden sich Falten auf der Stirne und den Wangen, die von bläulichen Ringen umgebenen Augen sind fest geschlossen, der Kopf ist stark nach hinten gezogen, der Nacken steif, die Haut ist turquoise, geröthet. Die Kinder vermögen nicht mehr zu schlucken; wenn man ihnen nach mit ständlicher Gewalt die Kiefer geöffnet und etwas Getränk eingeführt hat, so kommt es doch regelmässig nach kurzer Zeit wieder zum Munde heraus. Anfangs hat dieser Zustand noch Intervalle, die Krämpfe lassen Stunden lang nach, so dass man an eine Genesung glauben könnte. Sie kehren aber regelmässig wieder, werden immer anhaltender und dauern meist bis zum Tode, nur zuweilen tritt vor der Agonie wieder eine Relaxation der contrahirten Muskeln ein. Im höchsten Grade der Krankheit werden alle Muskeln so vollkommen steif, dass man die Kinder wie ein Stück Holz emporheben kann. Nach 1—8 Tagen tritt der Tod ein und zwar durch Erstickung oder durch Erschöpfung. Die Kinder ersticken entweder in Folge von Verschlüssung der Stimmritze während eines convulsivischen Paroxysmus, oder in Folge der durch die allgemeine Starre gänzlich aufgehobenen Thätigkeit der Inspirationsmuskeln. Im zweiten Falle, dem Tode durch Erschöpfung, ist es die häufige Wiederkehr der Convulsionen, welche ein rasches Sinken der Kräfte bedingt. Bei längerer Dauer bringt der Mangel an Schlaf und Nahrung die Auflösung zu Stande. Ingerslev in Kopenhagen, welchem es einmal gelang, den Harn aufzufangen, fand deutlichen Albuminhalt, reichliche Harnzylinder und viele Krystalle von Harnsäure und oxalsaurem Kalk.

Aetiologie.

Bei wenig internen Krankheiten kann man die Ursache mit solcher Bestimmtheit angeben als beim Trismus neonatorum. Eine Krankheit, die nur 1—5 Tage nach dem Abfallen der Nabelschnur auftritt, hat doch ganz gewiss einen Zusammenhang mit dem Verwundungsprocess des Nabels. Es ist auch sehr natürlich, dass bei einer so raschen Contraction von Geweben, wie sie hier stattfindet, hier und da in der Narbe ein Nerv gereizt oder geknietzt werde, und so alle Reflexcontractionen veranlassen kann, wie wir sie beim traumatischen Tetanus durch einen fremden Körper erzeugt finden. Dass wird um so eher geschehen, wenn die Nabelschnur dick war, roh behandelt wurde und in Folge dessen eine Ulceration sich entwickelte. Man findet bei vielen Sectionen an Trismus verstorbener Kinder bedeutende Veränderungen der Nabelarterien und der Venen, Erweiterung, Röthung, Erweichung, Verschwärung der Gefässhaut, Eiter und Jauche im Innern und in der Umgebung dieser Gefässe.

Bei uns in Deutschland kommt die Krankheit nur sehr sporadisch vor; dass sie zu gewissen Zeiten und bei gewissen Witterungsverhältnissen häufiger sein soll, war mir nicht möglich zu entdecken. Ich sah sie schon in allen Jahreszeiten und Barometerständen, bei kühlem und heissem, feuchtem und trockenem Wetter. Im Dubliner Gebärhause und in Mailand wurde der Trismus epidemisch beobachtet, endemisch ist er in Triest, Spanien, auf Minoë, in Westindien, Jamaica, auf Cayenne. In einzelnen Colonien Guyana's soll die Hälfte der dort geborenen Kinder davon weggerafft werden. Nicht bloss im Süden, auch im hohen Norden tritt er endemisch auf, z. B. in Island, wo

ihn die Eingebornen mit dem Namen „Chinclose, Kinnbackenschluss“ bezeichnen, und auf den Westmanna-Inseln an der Südküste von Island soll nach Mackenzie diese Krankheit so heftig unter den Neugeborenen herrschen, dass sich die kleine Bevölkerung nur durch die Einwanderung erhält.

Die pathologische Anatomie liefert ausser den schon besprochenen Veränderungen der Nabelgefässe keine charakteristischen Merkmale. Die Blutüberfüllung des Rückenmarks und die ausweilen blutigen Ergüsse im Rückgratkanal sind jedenfalls secundäre Processe. Die Leichen behalten ihre holzartige Steifheit und fühlen sich auch in warmer Jahreszeit wie gefroren an.

Die Prognose ist ausserordentlich ungünstig. Göllis und Heim haben in ihrer langen Praxis keinen einzigen Fall genesen sehen. Hufeland stellt das Verhältnis der Sterblichkeit = 50:1. Alle meine Kranke, es waren deren wenigstens sechs bis zwölf, sind mir unter den best empfohlenen Methoden gestorben.

Behandlung.

Da nach meinen Erfahrungen und denen der beschäftigten Kinderärzte überhaupt der einmal entwickelte Trismus neonatorum zum Tode führt, so ist es doppelt wichtig, die prophylaktische Behandlung scharf in's Auge zu fassen; denn es wird nicht leicht ein Fall vorkommen, wo man nicht bei genauer Nachforschung irgend eine Vernachlässigung in der Pflege der Nabelschnur entdecken kann. Wo freilich das Leiden so endemisch herrscht, dass regelmässig ein grösserer Bruchtheil der Neugeborenen daran zu Grunde geht, ist Frank's Rath zu befolgen, wonach die Schwangeren den gefährlichen Landstrich verlassen müssen und erst nach vollendeter Vernarbung des Nabels ihres Neugeborenen zurückkehren dürfen.

Eine sorgsame Pflege der Nabelschnur, wie sie sich pag. 54 schon angegeben findet, und eine reinliche, schonende Behandlung der noch nicht vollkommen gebildeten Nabelnarbe, wenn hauptsächlich auch gleichmässige Temperatur von 15—16 Graden, reine Luft und gesunde Muttermilch gehört, sind also auf das strengste zu empfehlen.

Da ich zoch nie ein Kind mit Trismus geheilt habe, so kann ich selbstverständlich auch kein Mittel gegen die einmal entwickelte Krankheit hervorheben, sondern muss mich begnügen, die verschiedenen als nunmehr erkannten Behandlungsmethoden aufzuzählen. Man hat 1) eine antiphlogistische Behandlung, namentlich Blutentleerungen versucht, 2) hat man Antispasmodica und Narcotica, 3) Diaphoretica und Hautreize und 4) die auferende Methode in Anwendung gebracht. Jede dieser Behandlungsweisen hat ihre Fürsprecher und jede hat ihre Verächter.

Am meisten hoffte ich noch von den Narcoticis: In einem Falle gab ich Opiumtinctur, stündlich einen Tropfen, in einem andern dreistündlich einen Tropfen Opiumtinctur, in einem andern wieder chloroformirte ich das Kind alle zwei Stunden. Während jeder Narcose liess bei diesem Kinde die Steifheit nach und kam erst nach $\frac{1}{2}$ bis 1 Stunde wieder. Am nächsten Tage waren die Symptome dieselben, als ich aber das Kind, um es zum siebenten Male zu narcotisiren, aufsuchte, war es todt. Das Vernünftige scheint zu sein, dass man die

Kinder wenigstens nicht verschmachten lässt, indem man ihnen täglich zwei Mal mittelst eines elastischen Catheters, der sich sehr leicht durch den Oesophagus in den Magen bringen lässt, Milch oder Fleischbrühe mit Eigeln in den Magen injicirt, und dass man des Ort, von dem der Trismus ausgeht, die Nabelnarbe, mit einem kleinen Ferrum candens cauterisirt. Eine Behandlung, die bei dem nächsten sich mir bietenden Falle versucht werden soll.

F. Skleroma (πρὸς σκλήρυνσιν, die Verhärtung). Induratio testae cellulosae. Zellgewebsverhärtung.

Das Sklerom, von andern auch Oedema neonatorum, oder Oedema compactum durum genannt, besteht in einem Hartwerden einzelner Hautstellen, welches sich in dieser Weise nur bei Neugeborenen in den ersten Lebenswochen findet.

Symptome.

Die Infiltration der Haut beginnt an den unteren Extremitäten, deren Rothe zunimmt, während zu gleicher Zeit die Temperatur sinkt. Zuerst schwellen die Waden hart an und werden ganz steif, die Geschwulst ergreift hierauf auch die Füße, wobei die Fußsohlen eigenthümlich convex werden, und erstreckt sich aufwärts über das Knie an die Oberschenkel bis zu den Genitalien, dem Schamberg, den Nates und zum Nabel: die Brust bleibt auffallender Weise immer verschont, hingegen werden die oberen Extremitäten und das Gesicht, vorzüglich die Lippen und Wangen, die dann einen eigenthümlichen Glanz bekommen, sehr gewöhnlich von Sklerom befallen. Die anfangs dunkel-rothe Farbe der ergriffenen Stellen erbleicht bald und macht einer gelblichen Platz, die Haut wird trocken und die Epidermis, die sich sonst immer abblättert, kommt hier nicht zur Abschuppung. Bei den höchsten Graden des Skleroms liegen die Kinder hochgeschwollen, kalt und starr, gleich einer ecfrorenen Leiche da. Die harten, glänzenden Wangen, die aufgetriebenen, nach vorwärts geschobenen Lippen, die mehr ödematösen als verhärteten Augenlider, welche sich nur wenig öffnen können, verstellen das Gesicht zur Unkenntlichkeit. Zu Anfang der Krankheit lassen sich die einzelnen Hautparthien noch etwas verschieben, und man vermag mit dem Finger einen längeren Zeit bleibenden Eindruck in das Sklerom zu machen, später aber gelingt beides nicht mehr. Sehr charakteristisch ist die Temperaturniedrigung solcher Kinder, nicht nur an der Oberfläche, sondern auch in der Mundhöhle, wo sie nach Légar's Messungen bis auf 28° C. sinken kann. Durch künstliche Erwärmung mittelst Wärme-flaschen, warmer Tücher, heisser Bäder kann man die kalten Glieder nur vorübergehend, wie eben jeden andern leblosen Gegenstand auch, erwärmen.

Sämmtliche physiologische Functionen sind hierbei unterdrückt oder nur sehr schwach entwickelt. Die Respiration oberflächlich und selten, die Stimme schwach und wimmernd, niemals wird lautes anhaltendes Geschrei gehört. Die Kinder saugen nur wenige Minuten und ziehen nur sehr geringe Quantitäten Milch aus den Brüsten. Das Mercenium stolpert sich lange nicht, die Urinsecretion ist sehr ver-

mindert. Der Puls ist immer sehr klein und langsam, nach Valleix 60—72 Schläge in der Minute, später bei überhandnehmendem Sklerom wegen des Hautexsudates an keiner Extremität mehr zu fühlen. Die Herzbewegungen sind ausserordentlich schwach, der zweite Ton ist kaum zu hören. Die Sensibilität in den erkrankten Hautstellen ist fast vollständig verschwunden, wovon man sich durch leichte Nadelstiche leicht überzeugen kann.

Indem alle diese oben beschriebenen Symptome nur allmählig überhandnehmen, so ist eine Stadieneintheilung nicht möglich und auch nicht nöthig. Je mehr das harte Oedem fortschreitet, desto tiefer wird die Lethargie, desto langsamer die Respiration, desto merklicher die Kälte. Endlich fließt ein blütiges Serum aus Mund und Nase und es erfolgt der Tod ohne Convulsionen einfach unter langsamer werdenden Athemzügen.

In den seltenen Fällen, welche in Genesung übergehen, bemerkt man zuerst freiere und tiefere Athemzüge, Zunahme und Kräftigung der Herzbewegungen, vermehrten Appetit und zuletzt eine Abnahme der geschwellenen Partheen. Nach Valleix werden zuerst die Augenlider und die Vorderarme dünn und geschmeidig, dann die Hinterbacken und das Hypogastrium, später die Hände; Unterschenkel und Füße bleiben so lange noch lange ödematös, wenn die übrigen Theile schon normal sind. So lange die Füße noch geschwellen sind, darf man die Kinder noch nicht ausser Gefahr erklären, sie pflegen schläfrig zu sein und wenig zu trinken und sterben dann noch nach zwei bis drei Wochen.

Ist das Oedem ganz verschwunden, so behalten die Theile noch eine Zeit lang eine violettrothe Farbe, die Haut ist schlaff, weich und ruzzlich und bekommt erst spät ihre normale Beschaffenheit wieder.

Die häufigste Complication ist lobuläre Pneumonie, die Valleix unter 25 Fällen fünf Mal beobachtete; sehr selten sind Darmcatarrhe, was bei der mangelhaften Zufuhr der Nahrungsmittel wohl erklärlich ist. Gelbe Färbungen der Neugeborenen kommen natürlich häufig vor, wirkliche Gelbsuchten mit gelber Sklera, gallenfarbstoffhaltigem Harn und grauen Faeces sind bei Kindern überhaupt sehr selten und haben auch zum Sklerom keine besonderen Beziehungen.

Sectionsbefund.

Die vom Sklerom befallenen Theile werden nach dem Tode schnell blan und behalten ihre Steifigkeit und Härte, die übrige Haut, besonders am Rumpfe, ist normal, gelblich weiss. In Folge der Senkung nach den abhängigsten Stellen ist die Infiltration am stärksten auf der Seite, auf welche die Leiche gelegt wurde. Schneidet man auf die erkrankte Haut ein, so fließt zunächst schwarzes flüssiges Blut ab, aus dem Unterhautzellgewebe aber, das gewaltig angeschwollen ist und die Vergrößerung der Extremitäten bedingt, sickert eine grosse Menge einer gelben oder von blutgemischtem Blute noch rothgefärbten Flüssigkeit aus, die sich weder chemisch noch morphologisch vom gewöhnlichen hydropischen Serum unterscheidet. Nach Abfluss desselben werden die vorher harten Theile weich und wolk. Das Bindegewebe über den Aponeurosen ist zu einer zwei bis vier Linien dicken gallertartigen Masse umgewandelt, unter der Aponeurose, im Zwischenmuskel-

gewebe findet sich niemals Oedem. Nicht zu verwechseln mit diesem Befunde ist die Verhärtung des Fettes, wenn die Leichen der Kälte ausgesetzt waren. Hier fühlen sich die Extremitäten wohl noch hart an, sind aber nicht geschwollen und nicht so blau, und auf dem Einschnitt findet man das Unterhautbindegewebe normal, trocken, nicht gallertig infiltrirt.

Wie haben es also beim Sklerom im Wesentlichen mit einem neuen Haisfiden zu thun, dessen Veranlassung in allgemeinen Verhältnissen zu suchen sein dürfte. Die übrigen Organe sind nicht constant verändert, am häufigsten finden sich noch verstreute Ergüsse im Peritoneum oder in den Pleurasäcken, und zuweilen entwickeln sich lobuläre Pneumonien. Die fötalen Circulationswege sind bald geschlossen, bald noch offen, wie man das überhaupt bei Kindern, die in den ersten Lebenstagen sterben, häufig trifft, so dass das Sklerom mit größeren Veränderungen der Circulation nicht in Zusammenhang gebracht werden kann.

Ätiologie.

Das Sklerom befällt vorzugsweise nicht ausgetragene Kinder. Es lässt sich übrigens viel leichter bestimmen, woher das Sklerom nicht kommt, als woher es kommt. Es entsteht nicht durch Offenbleiben der fötalen Wege, und nicht durch lobuläre Pneumonie. An die Verlangsamung der Respiration und des Pulses, die mit Ausnahme jener Fälle, welche mit Pneumonie complicirt sind, eine constante ist, muss vor allen erinnert werden. Es fehlt also wahrscheinlich an der Innervation des Herzmuskels, der sich zu selten contractirt und nur die Kälte und periphere Translocation bedingt. Im Winter ist die Krankheit entschieden häufiger als im Sommer.

Behandlung.

Valleix hat zwei Kinder genesen sehen, von denen einem jeden zwei Blutegel hinter die Ohren gesetzt worden waren. Andere Kinder starben unter dieser Behandlung. Das Wesentlichste scheint eine fortwährend sehr hohe Temperatur zu sein, die man durch Würmfaschen, heiße Krüge, Sandsäcke, warme Tücher zu erhalten sucht. Auch ist es rationell durch Alcoholica die Herzcontractionen zu beschleunigen, wobei freilich nicht zuarguen ist, dass alle diese Versuche in der Regel misslingen und nur in Ausnahmefällen bei wenig verbreiteten Sklerom zu einem günstigen Resultate führen.

6. Die Entstehung der Brustdrüsen. *Mastitis neonatorum.*

Zum Verständnisse dieses eigenthümlichen, nur in den ersten Lebenswochen zu beobachtenden Processes muss vorausgeschickt werden, dass die Brustdrüsen Neugeborener in den meisten Fällen auf sanfter Druck etwas dünne Milch entleeren, die erst nach 8–14 Tagen, bei männlichen auf immer, bei weiblichen bis zur ersten Schwangerschaft, versiegt.

Nach den Untersuchungen Guillot's reagirt sie neutral oder alkalisch, wird nach längerem Stehen sauer und theilt sich hierbei in zwei Theile. Mikroskopisch findet man in ihr vorherrschend Colostrum-

kugeln. Sie schmeckt, wie ich mich selbst öfters überzeugt habe, durchaus nicht süß, sondern entweder fade oder gar etwas salzig.

Diese vorübergehende Milchsecretion macht die Brustdrüsen der Neugeborenen ebenso zu Entzündungen geneigt, als wir dies oft genug bei stillenden Frauen beobachten. Ein Druck, eine Quetschung, die ja bei der Geburt schon unvermeidlich sind, genügen, die Brustdrüse zur Schwellung und Abscedirung zu bringen. Häufig tragen geschäftige Hebammen die Schuld an dieser Krankheit, indem sie den unerfahrenen Müttern glauben machen, man müsse die Milch sorgfältig ausdrücken. Es entsteht hierauf fast regelmäßig eine Schwellung und Rötzung der Brustdrüse. Die Kinder erheben ein klagliches Geschrei, wenn man sie berührt, die Geschwulst nimmt mehr und mehr zu, flostrirt an einzelnen Stellen und bricht unter Entleerung einer grösseren Menge dicken Eiters auf. Nachdem die Eiterung einige Tage gedauert, schliesst sich der Abscess, die Drüse blüht noch einige Zeit indurirt, nach einigen Wochen aber ist eine völlige Restitutio in integrum eingetreten. Bei kachectischen Kindern, die zu gleicher Zeit an Scur und Durchfall leiden, erstreckt sich die erysipelatöse Rötze über einen grossen Theil der Brust, es stossen sich nach spontaner oder künstlicher Eröffnung des Abscesses grössere Fetzen Zellgewebes ab und längere Zeit hindurch bleiben Fistelgeschwüre zurück. Die einzige schlimme Folge der eiterigen Mastitis bei Mädchen ist, dass durch die Eiterung die Brustwarze und selbst die ganze Drüse schrumpfen kann, worauf die so veränderte Mamma zur Zeit, wo das Geschäft des Stillens beginnen sollte, gar nicht oder nur unvollkommen functionirt.

Therapie.

Die Hauptsache ist eine vernünftige Prophylaxis. Sind die Brustdrüsen geschwollen, jedoch noch nicht geröthet und schmerzhaft, so kann man den Uebergang in Eiterung meistens verhüten, wenn man mit Sorgfalt allen Druck, jede Reibung vermeidet und der Verstopfung der Milchgänge durch sanfte Oelbepinselung vorbeugt. Zur Erfüllung der ersteren Indication legt man auf die Brust eine feine, geölzte Leinwand und über dieselbe etwas Baumwolle. Auf diese Weise gelingt es in den meisten Fällen, die Drüsen ohne Eiterung zum Schwinden zu bringen und auf ihre normale Beschaffenheit zurückzuführen. Geht sie dennoch in Eiterung über, so ist der Oeffnen nichtsdestoweniger am Platze, die Baumwolle vertauscht man passender mit trocknen, gewärmten Kleiensäckchen, weil dadurch die Reifung des Abscesses beschleunigt wird. Fühlt man nach 2—4 Tagen deutliche Fluctuation, so ist es räthlicher, den Abscess zu öffnen als ihn der Natur zu überlassen, indem im letzteren Falle die Oeffnung meistens zu klein und der Eiterabfluss somit gehindert wird. Man hat beim Einstiche die Brustwarze zu meiden, denn die hierauf folgende Narbencontraction muss dieselbe in allen Fällen verkleinern und verzerren, was bei Mädchen in späterer Zeit sehr ungünstigen Einfluss auf das Stillen ausüben könnte. Der Schnitt falle in einen Radius der Mamma. Nach Entleerung des Eiters legt man am einfachsten feuchte, warme Compressen auf, wodurch Krustenbildung und vorzeitige Verklebung der Wundränder verhütet wird. Die Wunde schliesst sich bei sonst gesunden Kindern nach wenigen Tagen, bei atrophischen, wo durch die Eiterung

der Collaps nur beschleunigt wird, wird der Eiter fleckig, dünnflüssig und die Wunde bleibt offen bis zum Tode.

H. *Melaena neonatorum*.

Am ersten bis dritten Lebenstage kommen bei Kindern zuweilen Darm- und Magenblutungen vor. Das Erbrechen des Blutes ist seltener, als eine blutige Färbung der Fäces. Fast immer sind die blutigen Stühle sehr reichliche und kehren in kurzen Zwischenräumen wieder. Das Blut ist bald flüssig, bald mit grossen geronnenen Klumpen vermischt. Die Kinder collabiren hierbei sehr schnell, bekommen blasse Lippen, kühle Haut, kaum fühlbaren Puls, und die Symptome von grosser Gehirnämie. Gewöhnlich verläuft die Blutung in 24 Stunden, doch kann sie auch 3—5 Tage dauern. Die Stühle behalten noch mehrere Tage eine schwarze Farbe. Nach Billiet genest die Hälfte der davon ergriffenen Kinder.

In der Section findet man noch grosse Mengen flüssigen oder geronnenen Blutes im Magen und Darmkanal, und in den anderen Organen die höchste Anämie. Die fötalen Blutwege sind offen, was übrigens auch bei vielen andern nicht an Melaena verstorbenen Neugeborenen vorkommt. Als Ursache dieser Krankheit lässt sich die schon im physiologischen Zustand eintretende Turgescenz der Mesenterialarterien und ihres Capillarsystems betrachten, welche durch den pöthlichen Verschluss der unmittelbar aus der Arteria hypogastrica entspringenden, im Fötus sehr bedeutenden Nabelarterien bedingt ist. Eine besondere Dünnwandigkeit oder Brüchigkeit des betreffenden Gefässsystems muss freilich noch dabei im Spiele sein, weil sonst diese in Wirklichkeit sehr seltene Blutung viel häufiger vorkommen müsste. Auch der Verschluss des Ductus venosus Arantii und namentlich des in die Pfortader mündenden Arms der Nabelvene verdiente zur Aufklärung dieser Blutung eine öftere, genauere Untersuchung.

Ausser durch diese Darmblutungen können die Fäces noch blutig gefärbt werden durch in den Mund gekommenes und verschlucktes Blut. Dieses kann sich ereignen bei allen Operationen an den Lippen und der Zunge, nach Nasenbluten durch Anstossen der Nase auf eine harte Fläche, durch Verschlucken mütterlichen Blutes während der Geburt, und endlich kann das neugeborene Kind auch aus den Brüsten der eigenen Mutter Blut saugen, wenn sich hier blutende Risse gebildet haben oder wenn ein starkes Kind aus milchleeren Brüsten lange Zeit zu saugen sich bemüht hat. Alle diese zufälligen Beimischungen von Blut sind sehr selten, das Blut findet sich hierbei nicht in grosser Quantität und wird gewöhnlich nicht durch den Darm entleert, sondern wieder erbrochen. Dabei collabiren die Kinder nicht so wie bei einer wirklichen Darmblutung.

Behandlung.

Die einzige Darmblutung, die ich bisher bei einem Neugeborenen zu behandeln hatte, trat 36 Stunden nach der Geburt ein. Es wurden in 24 Stunden 10 blutige Windeln mit Blutcoagulis von der Grösse einer Haselnuss verbraucht. Das kräftige Kind wurde alsbald wachbleich, kühl an den Extremitäten und der Puls war kaum mehr zu

fühlen. Ich liess die Temperatur des Zimmers bis auf 18° R. erhöhen, legte um das Kind drei Krüge mit heissem Sande gefüllt und liess es alle Stunden an der Mutterbrust trinken. Als nach zwölf Stunden die Blutung nicht nachliess, gab ich ihm

Rp. Liq. Ferri sesquichlorat. 1, 2

Aq. destillat.

Aq. cinnamom.

Syr. simpl. ana 15,0

wovon das Kind nach zwölf Stunden ohngefähr die Hälfte genommen hatte und hierauf kein Blut mehr entleerte. Zu der von Billiet vorgeschlagenen Behandlung mit eiskalter Milch und kalten Umschlägen auf den Bauch konnte ich mich nicht entschliessen wegen der Abkühlung der Prominenzen und halte es für rationeller bei diesen Darmblutungen der Neugeborenen einen möglichst starken Turgor nach der äusseren Haut zu erzeugen, was am besten durch hohe Temperatur erreicht wird. Nachdem die blutigen Stühle aufgehört hatten, erholte sich das Kind in wenigen Tagen vollständig und gedeiht seit jener Zeit vortreflich. —

I. Icterus neonatorum. (δ ιερπερ, Gelbnekt.)

Ausser der pag. 5 angegebenen physiologischen gelben Färbung der Haut, wohn in der That die meisten für Icterus gehaltenen Hautveränderungen gehören, gibt es noch eine wirkliche Zurückhaltung des Gallenfarbstoffes im Blute, in vielen Fällen ein sehr bedenklicher Zustand. Die Sclerotica ist hierbei gelb gefärbt, der Eiter der Ophthalmoblenorrhoe, die zufälliger Weise daneben vorkommt, wird orangegelb, der Harn färbt die Windeln dunkelgelb. Die Fäces werden aber fast nie so grau, wie bei Erwachsenen, sondern behalten eine hellgelbe oder grünliche Färbung. Bei der Section findet man die zerissen Haut, die Muskeln, Knochen etc. von Gallenfarbstoff durchtränkt, wie diese bei Erwachsenen Ictericen auch vorkommt. Viele icterische Kinder haben Fieber und leiden an einem noch nicht vernarhten, exulcerirten Nabel, womit der Icterus neonatorum im engsten Connex steht, und dem entsprechend man in den lethal ausgehenden Fällen gewöhnlich Phlebitis der Nabelvene und zuweilen der Pfortader, im Leberparenchym aber kleine Abscesse findet. Est ist demnach der wahre Icterus neonatorum in diesen Fällen als eine Theilerscheinung oder Complication der Phlebitis umbilicalis zu betrachten, ohne dass jedoch behauptet werden darf, dass nicht eine hochgradige Stauung im Gebiete der Lebervene, ein Duodenalcatarrh oder eine mechanische Verschlussung der Gallenausführungsgänge auch hier und da einen Icterus verursachen könnten. Alle günstig verlaufenden Icterus der Neugeborenen gehören wohl in diese Kategorie. Ihre gewöhnliche Veranlassung dürfte nach Freerichs in der verminderten Spannung der Capillaren des Leberparenchyms zu suchen sein, welche beim Aufhören des Zuflusses von Seiten der Umbilicalvene sich einstellt und vermehrten Uebertritt von Galle in's Blut veranlasst.

Was den Verlauf betrifft, so gilt für die erste Kategorie alles, was bei der Phlebitis umbilicalis pag. 49 gesagt worden: die Kinder leben selten länger als 14 Tage, atrophiren sehr rasch und gehen meist

mit Diarrhöe zu Grunde. Die letztere Art, der einfache Icterus, dauert zwischen 8—14 Tage. Die gelbe Färbung wird niemals sehr saturirt und das Allgemeinbefinden ist während des ganzen Verlaufes kaum merklich getrübt.

Behandlung.

Die Behandlung des pernicious Icterus ist eine höchst unthunbare. Es findet sich meines Wissens in der ganzen Literatur kein einziger Fall von Heilung. Um so dankbarer dagegen ist die der glücklich Icterus genannten gelben Hautfärbung bei frühgeborenen Kindern oder nach schweren Geburten. Dieselbe schwindet regelmäßig nach einigen Tagen von selbst, und man hat nichts zu thun, als die Verdauung des Kindes zu beaufsichtigen. Neugeborene Kinder sind sehr selten wirklich obdunpft und es wird daher auch der so allgemein beliebte Ktharbarwaß auf diese Fälle zu reduciren sein.

E. Conjunctivitis blepharorrhoea neonatorum.

Unter blepharorrhoeischer Bindehautentzündung (*glaucome*, Schleim, Eiter) verstehen wir eine Entzündung, welche nicht nur mit profuser Eiterung an der freien Oberfläche der Conjunctiva, sondern auch mit Erguss eines plastischen Exsudates in deren Parenchym verläuft. Der eocernirte Eiter ist ansteckend und wird von der ganzen Oberfläche der Lidbindehaut eocernirt. Das ansteckende, reichliche Secret und das überall gleichmässige und gleichzeitige Erkranken des Papillarkörpers charakterisiren diese Krankheit vor allem.

Je nach der Heftigkeit des Verlaufes unterscheiden wir nach Art zweierlei Arten von Blepharorrhoeen.

Erste Art. Fälle, welche gleich vom Anfang an einen sehr raschen Verlauf und die Tendenz, rasch den höchsten Grad zu erreichen, darbieten.

Im ersten Grade dieser Art ist die Bindehaut der Lider geheckert, geschwollen, gleichmässig geröthet und eocernirt eine ziemliche Menge Eiter, alle diese Symptome sind sehr ausgetreten. Oft tritt die einfach eiterige Secretion rasch und macht einem durchflüssigen, milken- oder Eischwasserähnlichen Secrete Platz, in welchem constantere Flocken und Fäden herumschwimmen und sich häufig an der Conjunctiva ziemlich fest ankleben. Es findet hierbei eine merkliche Schwellung, ein acutes Oedem der Lider statt. Gewöhnlich dauert dieser Zustand nur so kurze Zeit (12—24 Stunden), dass der Arzt ihn selten zu Gesicht bekommt.

Im zweiten Grade dieser Art ist die Lidbindehaut dunkelroth und sehr geschwollen, so dass die innere Lidkante nicht mehr scharf erscheint und die Aufsaugung der Thränen wegen Wegdrängung des Thränenpunktes gehindert ist. Die Bindehaut der Sclera ist auch schon bedeutend infiltrirt und injicirt, das Secret ist meist fleischwasserartig, selten eiterig dickflüssig und exocert die nächstgelegenen Hautpartien. Die Geschwulst der Lider ist schon so stark, dass die Eröffnung der Lidspalte höchst schmerzhaft und schwierig ist.

Im dritten Grade endlich sind alle Erscheinungen des zweiten nur noch in erhöhtem Maasse zugegen und dann kommt noch eine er-

höchste Geschwulst der *Conjunctiva bulbi*. Die Geschwulst der äusseren Lidhaut steigt über den Augenbrauenbogen nach oben und über das Wangenbein nach unten und ist vom äusseren bis zum inneren Augwinkel gleichmässig, weil sie eben nur eine secundäre Erkrankung der gleichmässig entzündeten *Conjunctiva* ist. Das Secret ist ausserordentlich reichlich, flusst fast unauflöslieh über die Wangen herab und ist bald dünn- bald dickflüssig, wässrig oder eiterig, zuweilen bräunlich von beigemischtem Blute gefärbt. Die *Conjunctiva bulbi* ist entweder gleichmässig infiltrirt und umgibt die tieferliegende Cornea als ein rother, wallartiger Kranz oder erhebt sich in selteneren Fällen ungleichmässig in Form von schlaffen, blasenähnlichen Wülsten.

Zweite Art. Fälle mit mehr chronischem Verlauf und ohne blennorrhöische Secretion von vorn herein. Die letztere nimmt erst nach einigen Tagen zu, die Veränderungen der *Conjunctiva* aber sind bedeutend, sie wuchern allenthalben und bilden kleine Wärrchen, die an der Uebergangsfalte sich zu hahnenkammartigen Höckern vereinigen.

Im ersten Grade dieser zweiten Art ist die Secretion sehr unbedeutend, die rothe Färbung und die höckerige Beschaffenheit der *Conjunctiva*, verbunden mit etwas Lichtsehen, sind ihre einzigen charakteristischen Merkmale. Dieser Zustand kann mehrere Tage dauern, ohne dass namhafte Veränderungen eintreten.

Im zweiten Grade ist die Erkrankung der *Conjunctiva palpebrarum* folgende: So weit der Papillarkörper reicht, also am unteren etwa $\frac{1}{3}$ “, am oberen gegen 1“ über den Orbitalrand des Tarsus hinaus, erscheint die hochrothe Bindegewebshaut mit dicht aneinander gedrängten, gleichhohen und gleichgrossen Wärrchen besetzt. Am Anfang bluten diese Wärrchen fast bei jeder Berührung, nach längerem Bestehen — sie wahren, nicht behandeln, oft Monate lang — erlassen sie an der Oberfläche, werden durch den Druck des Bulbus etwas abgeplattet, und bluten dann nicht leicht mehr. Gegen den Orbitalrand hin zeigt sich immer die stärkste Tendenz zur Wucherung, es bilden sich dort hohe kammartige Wülste.

Das Oedem und die Röthung der Lider ist hierbei unbedeutend und vergeht früher als die *Conjunctivalerkrankung*.

Zum dritten Grade kommt es bei dieser Art Blennorrhöie selten; in der Regel nur dann, wenn während der Krankheit noch weitere schädliche Einflüsse auf das Auge einwirken. Die anatomischen Charaktere sind übrigens dieselben wie die des dritten Grades der acuten ersten Art.

Verlauf. Es ist nicht nothwendig, dass die Blennorrhöie immer alle drei Grade durchläuft, sie können auch auf dem zweiten, zuweilen auch auf dem ersten stehen bleiben. Es müssen auch nicht immer beide Augen ergriffen werden, gewöhnlich aber steckt der Eiter des erst ergriffenen Auges das andere an, weshalb dem weiter unten näher zu beschreibenden Verschluss des noch gesunden Auges die höchste Wichtigkeit beizulegen ist. Hat eine wirkliche Uebertragung blennorrhöischen Eiters stattgefunden, wie dies bei Neugeborenen eben meistens der Fall ist, so durchläuft der Process den ersten und zweiten Grad so schnell, dass der schon nach 24 Stunden zugerufene Arzt den dritten Grad vollkommen ausgebildet findet und das Auge zu dieser

Zeit schon merklich verloren sein kann durch ausgedehnte Zerstörung der Hornhaut.

Reicht die Affection auf dem ersten Grade stehen, so verläuft sie langsam und spontan und ohne gefährliche Folgen. Durch Einwirkung unserer Schädlichkeiten kann sie zu einem höheren Grad sich steigern.

Der zweite Grad ist fast ohne Ausnahme durch Berührung mit inficirtem Eiter veranlaßt. Hier ist schon viel weniger Tendenz zur spontanen Heilung zu gewärtigen, indem die Wucherung des Papillarkörpers und die daraus hervorgehende Eiterung unbehandelt viele Monate lang bestehen können. Die Lider verdicken und vergrößern sich bei diesem chronischen Verlaufe beträchtlich; trotz der später erfolgenden Vernarbung der Conjunctiva verkürzen sie sich aber niemals nach innen, es entsteht vielmehr häufig ein Ectropium des oberen und unteren Augenlides. In anderen Fällen kann sich durch Excoriationen eine Verkleinerung der Lidspalte, Blepharophimosis, bilden. Die Hornhaut wird beim zweiten Grade nur wenig gefährdet, nur kleine und oberflächliche Hornhautgeschwüre kommen vor.

Der dritte Grad, der zu jeder Zeit sich aus dem ersten und zweiten entwickeln, aber auch sehr zeit ohne länger vorangehende Erkrankung auftreten kann, ist immer ein höchst gefährlicher Zustand.

In der Regel wird die Cornea ergriffen. Man kann bei der ersten Untersuchung die Hornhaut ganz rein, durchsichtig und glänzend gefunden haben, untersucht man nach wenigen Stunden wieder, so ist sie erweicht, stierig infiltrirt und zum grossen Theil zerstört. Zur Erhöhung des Unglückes findet dieser Process fast regelmässig in der Mitte, gerade der Pupille gegenüber, statt, während die Peripherie der Cornea bei unversehrtm Centrum nur höchst selten zerstört wird. Eigenthümlich ist bei diesen Hornhautgeschwüren, dass sich eine Eiterung zwischen die Schichten der Hornhaut, ein Unguis, bildet. Sie haben eine ausserordentlich grosse Neigung zu perforiren, die Iris tritt alsdann vor und bedeckt sich schnell mit grauem Exsudate, woran sich dann später die Staphylome entwickeln. Ist die Iris und das sie bedeckende Exsudat nicht im Stande, die Perforationsöffnung zu verschliessen, so tritt Phthisis bulbi ein. Im Allgemeinen kann als Regel gelten, dass die Hornhautaffection, je später sie nach überschrittenem Hestadium der Blennorrhoe auftritt, um so weniger eine destructive Tendenz an den Tag legt. Bilden sich nach längerem, 2—3wöchentlichem Bestehen der Blennorrhoe noch Geschwüre, so greifen sie zwar bei weitem weniger um sich, können aber doch noch häufig genug zu begrenzten Hornhautperforationen und deren Folgen, Vorfall der Iris und undurchsichtigen Narben, vorderen Synechien, Verzerrung der Papille, Centralkapselfaar, Staphyloom etc. Veranlassung geben. Bei diesem dritten, höchsten Grade haben die Kinder in Folge des Schmerzes und der Schlaflosigkeit gewöhnlich heisse Haut und Fieber.

Ursachen.

Die Fälle, welche in der Privatpraxis vorkommen, müssen von jenen in den Gehär- und Findelhäusern gewondert betrachtet werden. Das ausserordentlich häufige Vorkommen der Blennorrhoe in den ersten 6—8 Lebenstagen kann unmöglich auf allgemeine Ursachen, grelles

Licht, Kälte, unreine Luft, unreinliche Behandlung der Augen etc. allein zurückgeführt werden, indem diese Momente in den folgenden Wochen doch auch noch einigermassen einwirken, während die Entstehung einer Bleennorrhöe nach überstandenen achten Lebenstage in der Privatpraxis zu dem grössten Seltenheiten gehört.

Man nimmt deshalb ziemlich allgemein eine Ansteckung durch idemorrhöisches Vaginalschleim beim Durchgange des Kindskopfes durch die Geburtswege an, wobei nicht notwendig Syphilis im Spiele zu sein braucht. Die Infectionsbedingungen sind dann dieselben wie die eines Trippers, der nach einem unreinen Beischlaf entstanden ist. Nicht jeder Fluor albus erzeugt beim Coitus einen Tripper und noch viel weniger während der Geburt eine Bleennorrhöe der Conjunctiva. Wäre das letztere der Fall, so müssten die meisten Neugeborenen erkranken; denn fast alle Weiber haben in den letzten Schwangerschaftswochen eine vermehrte Vaginalsecretion, deren höherer Grad eben eine Vaginalblennorrhöe darstellt. Die Neugeborenen sind übrigen durch die während der Geburt fest zugeklebten Augenlider und eine gehörige Decke von Vernix caseosa gut gegen Ansteckung geschützt, woraus sich der zur Vaginalblennorrhöe der Mutter verhältnissmässig seltene Zutritt der Conjunctivalblennorrhöe erklären lässt. Dass diese Ansteckungsart während des Durchtrittes des Kindes durch die Geburtswege eine nicht gar intensive ist, geht daraus hervor, dass die neugeborenen Knäbchen niemals einen Harnröhrentripper und die Mädchen nie eine Vaginalblennorrhöe in den ersten Lebenstagen acquiriren. Sei dem nun wie ihm wolle, so viel steht fest, dass wenigstens 80 bis 90 Procente aller Conjunctivalblennorrhöen bei uns auf Neugeborene treffen, und dass immerhin der Geburtsakt selbst als das wichtigste etiologische Moment zu betrachten ist.

Wo viele Kinder bekommen sind, in Findel- und Gebärhäusern, kommt die Bleennorrhöe auch epidemisch vor, besonders, wenn in den Gebärhäusern Puerperalfieber herrscht. Hier ist es nun äusserst schwierig zu entscheiden, auf welche Weise die Verbreitung stattfindet. Da man weiss, dass Schwämme, Handtücher, Windeln und die Hände der Wärterinnen, wenn sie mit bleennorrhöischem Eiter beschmutzt sind, die Bleennorrhöe auch auf gesunde Augen zu übertragen vermögen, so wird der Gelegenheit zur Ansteckung so viele und mannigfache gegeben, dass man wahrscheinlich nicht die Luft etc. zur Erklärung bedarf.

Die Prognose richtet sich lediglich nach dem Verhalten der Hornhaut. Mögen die Granulationen und Wucherungen der Conjunctiva auch noch so grässlich aussehen, mag die Eitersecretion auch noch so profus sein, alles dies geht spurlos vorüber, die Hornhautveränderungen aber lassen für das ganze Leben ihre Spuren zurück. Je früher die Cornea ergriffen wird, um so grösser ist die Gefahr gänzlicher Zerstörung. Primär oder secundär syphilitische Vaginalblennorrhöen bedingen in der Regel stich intensive Hornhautbetheiligung. Die Geschwulst der Augendeckel steht in der Regel in geradem Verhältnisse zur Gefährlichkeit des Processes.

Behandlung.

Eine Prüfung und Kritik der verschiedenen anempfohlenen und von Anderen wieder verworfenen Behandlungsmethoden wird dadurch

schr. erwirkt, dass erstaunlich viele Blennorrhöen ohne alle Medicamente und ohne minutöse Reinigung von selbst heilen und keine Hornhautveränderungen zurücklassen.

In München, wo in den untersten Volksschulen eine große Sorglosigkeit bezüglich des Aufkommens und Gedeihens der Neugeborenen herrscht, kommt es oft genug vor, dass die Mütter 3—4 Wochen alte Kinder mit heftigen Blennorrhöen wegen irgend eines anderen Leidens zum Arzte bringen, und auf genaueres Befragen über die Augenaffectio ganz nicht bemerken, „es habe sich gleich in den ersten Lebenstagen die Gelbsucht auf die Augen geschlagen, jetzt sei es schon wieder viel besser, am Anfangs aber wären die Augen stark geschwollen gewesen. Der Eiter und blutiges Wasser sei fortwährend über die Wangen heruntergetropft“. Untersucht man nun solche nicht behandelte Augen, so findet man sehr häufig die Cornea vollkommen rein und intakt. Die Genesung erfolgt ohne alle Behandlung. In andern Fällen freilich findet man zur grossen Bestürzung der Angehörigen beide Bulbi auch vollständig zerstört. Diese Thatsache muss offenbar vorausgeschickt und bei Beurtheilung der am folgenden Heilmethoden im Auge behalten werden.

Als Prophylacticum gegen das Uebergreifen der Blennorrhö von dem einen erkrankten Auge auf das andere noch gesunde ist ein Schutzverband besonders zu empfehlen. Man beklebt zu diesem Zwecke das gesunde Auge mit einem leichten Peltor von trockener Charpie und hält dieselbe durch mehrfache Heftpflasterstreifen fest. Zweimal täglich muss dieser Verband abgenommen und das Auge genau untersucht werden. Hat sich dennoch auch auf diesem Blennorrhö eingestellt, so muss behufs der Eiterentfernung dieser Verband, der seinen Zweck hiemit verfehlt hat, ganz weggelassen werden.

Der wesentlichste Theil der ganzen Behandlung besteht in einer gehörigen Reinigung des Auges. In Spitälern und Gebäuhäusern, wo die Kinder fortwährend unter der Aufsicht von Sachverständigen sind, heilt man sich am besten eines an der Wand hängenden Wasserbehälters, aus welchem mit einem Gummischlauch ein Wasserstrahl in das Auge des Kindes geleitet wird. Die Temperatur des Wassers braucht nicht höher als die des Zimmers zu sein. In der Privatpraxis bei ordentlicher Pflege kann man das Wasser auch mittelst eines einguldrigen Kännchens oder einer Spritze in das Auge bringen, was wenigstens stündlich einmal geschehen muss. Es gehört zu dieser Manipulation schon ziemlich viel Geschick, gewöhnlich spritzen die Wirthfrauen das Wasser auf die fest zugeklebten Augenlider und der Eiter bleibt vor wie nach auf dem Bulbus liegen. Bei jeder Reinigung die Lider mittelst Löffelhalter auseinander zu zerren, halte ich für sehr ungeeignet, weil dadurch in der kürzesten Zeit ein so gewaltiges Oedem derselben entsteht, dass das obere Augenlid weit über das untere sich hinaushängt und man auf keine Weise mehr den Bulbus zu Gesicht bekommt. In Anbetracht dieser Schwierigkeiten, und weil die Leute mit den Spritzen sich gelegentlich auch den blennorrhöischen Eiter in ihr eigenes Auge spritzen, auf welche Weise ein Freund von mir sein Auge durch Blennorrhö verloren hat, begabte ich mich damit, einen kleinen, schon gebrauchten Badeschwamm in scharfkantige Stückchen zu schneiden und mit diesem die Reinigung halbtäglich oder wenig-

stets stündlich vorzunehmen zu lassen. Die Wartfrauen müssen mit Daumen und Zeigefinger der linken Hand die Lidspalte etwas öffnen und dann mit der scharfen Kante des wohl angefeuchteten Schwammchens die Conjunctiva abtupfen. Es ist das eine Manipulation, die eine jede Person mit gutem Willen lernen kann, die auch vollkommen zur Reinigung der Conjunctiva genügt, und bei der nicht das ganze Kopfkissen und die Leibwäsche des Kindes durchnässt wird, wie dies bei den Einspritzungen zu geschehen pflegt.

Die locale Behandlung. Seit v. Graefe die Cauterisation mit Höllenstein so dringend empfohlen hat, cauterisirt man die blennorrhoeischen Conjunctiva fast allenthalben. Vor allem ist dabei zu bemerken, dass man zu einer ordentlichen Cauterisation einen Assistenten nöthig hat, der den Kopf ordentlich fixirt und die zu cauterisirenden Lider auch gehörig unthülpt. Zur Cauterisation bedient man sich des gewöhnlichen Höllensteins oder eines aus gleichen Theilen Salpeter und Höllenstein zusammengeschmolzenen mitigirten Stiftes. Durch Oel- oder Salzwasser muss die Weiterverbreitung des Cauterismus verhindert werden. Nach der Cauterisation wird die Secretion in der Regel etwas vermindert, tritt aber häufig am nächsten Tage nur um so profusier auf. Man cauterisirt nur täglich, oder einen um den andern Tag fort, bis sie nach und nach abnimmt. Es müssen jedesmal beide Augenlider bis zur Orbitalfalte bestrichen werden, weil die Erkrankung eben die ganze Conjunctiva palpebrarum betrifft. Dass diese Behandlungsweise eine sehr schmerzhaft ist und viele Frauen ihre Kinder zu einer zweiten Cauterisation deshalb nicht mehr bringen, kann nicht geleugnet werden. Auch habe ich trotz genau befolgter Vorschriften schon mehrmals Perforation der Cornea entstehen sehen. Die Blennorrhöe der Conjunctiva scheint ein dem Tripper der Harnröhre analoger Process zu sein. Beim Tripper war man vor wenigen Jahren auch von den Höllensteininjectionen ganz entzweit. Jetzt wendet sie Niemand mehr an.

Weniger schmerzhaft und ungefähr von demselben Erfolge ist statt der Cauterisation mit dem Höllensteinstift ein Collyrium von Sublimat oder schwefelsaurem Zink oder Kupferviolol, von erstere 1 : 1000, von beiden letzteren 2 : 1000 Wasser. Man bringt von diesen Collyriis täglich 6–8 Mal einen Tropfen in den inneren Augenwinkel und öffnet dann die Lidspalte ein wenig, wobei der Kopf des Kindes so gelagert sein muss, dass der angebrachte Tropfen vermöge seiner eigenen Schwere in die Lidspalte rinnt. Das souveränste Mittel in den ersten Tagen der Blennorrhöe ist die

Kälte. Anhaltende Kälte auf einer Stelle der Haut erzeugen, ist nicht so leicht als man glaubt. Compressen, in kaltes Wasser getaucht und auf die Haut gelegt, nehmen in der kürzesten Zeit, in weniger als einer Minute, die Temperatur der Haut selbst an. Man müsste sie also in der Stunde 60 Mal, in einem Tage 1440 Mal erneuern, wozu mindestens zwei Personen nöthwendig wären. Bringt man aber zwischen die einzelnen Blätter der angefeuchteten Compressen 2–3 Stückchen Eis von der Grösse einer Erbse, so werden die schmelzenden Eistückchen 6–10 Minuten dem Auge eine sehr niedrige Temperatur verlihen. Eine so kleine Quantität Eis erzeugt auch beim langsamen Schmelzen nicht so viel Wasser, dass es über das Gesicht

herunterfließt, sondern von der Compressse aufgezogen wird. Zur sicheren Wahrung des Rumpfes vor Durchnässung kann man den Hals mit einem trockenen Tuche, das man dann leicht wechseln kann, umgeben. Durch unaufhörlich fortgesetzte Kälte kann gewöhnlich die äussere Geschwulst der Lider beseitigt und die Blennorrhoe in mässigen Schranken gehalten werden. Bei fortgesetzter fleissiger Reinigung, einem adstringirenden Augenwasser, und, dauert die profuse Secretion länger, bei Einreibungen von grauer Salbe auf die Stirne wird die Hornhaut selten perforiren. Hahnenkammartige Wucherungen an der Umschlagstelle der Conjunctiva, die die Blennorrhoe ausserordentlich lang unterhalten, trägt man am besten mit der Schere ab. Ist Perforation und Irisvorfall eingetreten, so lässt sich wenigstens die Bildung eines Staphyloms durch energische Cauterisation der Hornhaut und anhaltende Compressen sicher vermeiden. Bei circumscripten centralen Leukomen kann in späteren Jahren durch künstliche Pupillenbildung das Sehvermögen bedeutend verbessert werden. Ist Phthisis eingetreten, so muss man die Entstellung durch ein künstliches Auge, u. deren Anfertigung die Technik jetzt gewaltige Fortschritte gemacht hat, zu beheben suchen.

2. Capitel.

Krankheiten des Digestionsapparates.

A. Mundhöhle.

1) Hasenscharte und Wolfsrachen, *Labium leporinum*, *Palatum fissum*.

Die Hasenscharte ist eine angeborene Spaltung der Oberlippe, der Wolfsrachen eine angeborene Spaltbildung des harten Gaumens. Zum gründlichen Verständnisse dieser Bildungsfehler muss man auf die Entwicklungsgeschichte zurückgehen.

So lange beide Oberkiefer in der Mittellinie noch nicht mit dem aus dem mittleren Stirnfortsatz entstandenen Internasillarknochen zur Bildung des harten Gaumens verwachsen sind, so lange steht Mund- und Nasenhöhle in weiter offener Communication.

Bei dem Wolfsrachen unterbleibt nur diese Verwachsung auf einer Seite, bei der Hasenscharte kommt wohl eine Verwachsung der Knochen zu Stande, scheint aber retardirt worden zu sein, wodurch sich die ursprünglich aus zwei seitlichen und einem Mittelstück bestehende Oberlippe nicht mehr vereinigt, sondern der der verspäteten Verwachsung entsprechende Spalt der Oberlippe sich gleich dem Lippenrand überhäutet und dann nachträglich nicht mehr verengt. Aus dieser Angabe erhellt auch, warum niemals eine Hasenscharte in der Mitte der Oberlippe, deren Rinne, sondern immer etwas seitlich, in ein Nasenloch mündend, beobachtet wird.

Je nach der Zeit, in welcher während des Fötallebens dieses Bildungshemmniss sich einstellt, haben wir verschiedene Grade von Spaltungen. Die Spalte des harten Gaumens kann so weit sein, dass man einen Finger bequem hineinlegen und alle Chancen ohne Mühe überschauen kann. Bei diesem hohen Grade ist fast gar keine Oberlippe ausgegen, und ein oder beide Nasenlöcher sind ungeheuer in die Breite gestreckt. Oder der Internasillarknochen kann nach vorn gewuchert sein und bildet unter der Nase einen mit etwas Haut überzogenen Knopf. Zu beiden Seiten dieses Knopfes gehen Lippenspalten in die Nasenlöcher. Oder es findet sich nur eine schmale Spalte von der Breite eines Messerrückens im harten Gaumen, der entsprechend dann auch die Spalte der Oberlippe weniger klappt. Oder es sind die beiden Oberkiefer vollkommen normal gebildet und nur in der Oberlippe ist eine schmale Spalte, deren Ränder sich fast berühren und entweder bis in ein Nasenloch hinauf, oder bloss bis zur Hälfte der Oberlippe sich erstrecken.

Es gibt Familien, wo mehrere Glieder mit Hasenscharten behaftet sind, so dass man eine Art Prädisposition oder Erblichkeit anzunehmen geneigt ist.

Die Folgen dieses Uebels sind zun:

1) Erschwertes Saugen, besonders bei gespaltenem Gaumen. Der Akt des Sagens besteht darin, dass die Lippen sich hermetisch um die Brustwarze herum anschliessen, und dass dann durch Erweiterung des Thorax die Luft in der Mundhöhle verdünnt und auf diese Weise die Milch ausgesaugt wird. Ist nun die Continuität der Lippen unterbrochen, so ist auch ein genaues Anschliessen derselben an die Warze, und damit das Milchsaugen unmöglich. Wenn der harte Gaumen nicht mit gespalten ist, so fassen die Kinder die Warzen statt mit den Lippen zwischen die Kiefer und saugen so ziemlich ungeniert. Bei Gegenwart von Wulfrachen aber sind sie niemals im Stande, ordentlich zu ziehen, die strotzenden Brüste entleeren wohl etwas Milch in den Mund, sie fliessen aber zum grössten Theil zur Nase wieder heraus, was durch Hochhalten des Kopfes noch am besten vermieden werden kann.

2) Schiefstellung der Zähne. Werden die Kinder nicht vor Durchbruch der ersten Zähne operirt, oder ist die Operation misslungen, so wachsen die Zähne an der Stelle, wo der Kiefer von den Lippen nicht bedeckt ist, nach auswärts statt nach abwärts, was, besonders bei Gegenwart von Wulfrachen, eine schauderhafte Entstellung des Gesichts bedingt.

3) Undeutliche Sprache. Einzelne Buchstaben, zu deren Bildung die Oberlippe unumgänglich notwendig ist, hauptsächlich B, P, M, W, werden nur undeutlich bei der Hasenscharte, und höchst unvollkommen beim Wulfrachen ausgesprochen. Bei letzterem verlieren übrigens auch alle anderen Consonanten wegen des mangelhaften Gaumens an Deutlichkeit.

Behandlung.

Nur die Operation kann diesen Bildungsfehler heben. Ueber die Zeit derselben ist schon viel geschrieben und gestritten worden. Ist die Ernährung des Kindes sehr erschwert, lernt es in den ersten

Lebenswecken nicht ordentlich saugen und schlucken, so bleibt es natürlich in seiner Entwicklung zurück, und die Operation muss so schnell als möglich gemacht werden. Ist dies aber nicht der Fall, so wartet man besser bis nach zurückgelegtem vierten Lebensmonat. Jedenfalls aber muss vor Durchbruch der ersten Zähne operirt werden; denn sowie die Zahnung einmal begonnen, sind die Kinder viel häufigeren Erkrankungen ausgesetzt und der Erfolg ist deshalb ein getrübler. Auch fangen sie nach überstandnem erstem Halbjahre schon an, ihre Hände zu gebrauchen, mit denen sie nach der Operation die Pflaster herunterreissen, an der Nadelspitzen hängen können und den ganzen Erfolg vereiteln können.

Vor der Operation muss das Kind mehrere Stunden wach erhalten werden; damit es nachher in einen um so längeren Schlaf verfällt, und die Brust genüsslich haben, damit der Durst es nicht so bald aufweckt. Am besten schlägt man es in ein grosses Leinwand bis zum Halse hinauf fest ein und setzt es einem Assistenten auf den Schooss. Zur Operation bedarf man nichts als ein scharfes Haken, eine scharfe, starke Schere, den Nähapparat und einige Streifen Heftpflaster. Ein zweiter Assistent fasst nun mit Daumen und Zeigefinger den einen Theil der gespaltenen Oberlippe und comprimirt die Gefässe. Der Operateur, der dem Kinde gegenüber sitzt, fasst den Rand der Lippe, da wo er in die Spalte nach oben übergeht, mit dem scharfen Haken, schiebt die Schere längs der Spalte hinauf und trägt mit einem Schnitt den ganzen Rand der Spalte ab. Dasselbe Manoeuvre wird auf der anderen Seite wiederholt. Nach Anfräschung der Ränder werden 2—3 Insektennadeln, die unterste zuerst, angelegt, und mit Fäden umschlungen.

Bei breitem Wolfsrachen, wo fast gar keine Oberlippe vorhanden, muss man die Wangen weit nach hinten vom Knochen trennen, um eine gehörige Strecke dehnbarer Theile zu erzielen. Allenfalls vorhandene Zähne oder Knochenauswüchse müssen schon vor der Operation entfernt und deren Vernarbung muss erst abgewartet werden. Man darf die Fäden nicht zu fest anziehen, weil sonst die Circulation der Wundränder gar zu sehr leidet und so wenig Wundsecret ausgeschieden wird. Bei meiner ersten Hasenschartenoperation zog ich, um eine recht exakte Vereinigung zu bewirken, die Fäden sehr fest an, das Kind bekam nach 24 Stunden Trismus und Tetanus, und die Nadeln mussten natürlich so schnell als möglich entfernt werden. Der Trismus schwand darauf wieder, der Erfolg der Operation war aber vereitelt.

Nach 48—60 Stunden entfernt man die vorher etwas mit Öl bestrichenen Insektennadeln, die Fäden selbst lässt man möglichst lange noch kleben. Bei doppelten Hasenscharten, mit grossem Mittelstück, sucht man dasselbe zu erhalten. Bei Wolfsrachen, wo häufig der eine Schartenrand kürzer ist als der andere, macht man an dem kürzeren einen Bögenschnitt, wodurch dann die Wundränder auch gleich lang werden.

Wenn die Operation auch noch so schön gelungen ist, so entsteht mit der Zeit durch Narbencontraction doch wieder eine seitliche Einkerbung der Oberlippe. Für die fernere Gestaltung des Wolfsrachsens ist das Gelingen der Operation von grosser Wichtigkeit. Die in-

sammengewachsene Oberlippe wirkt fortwährend als ein gelinder Druckverband auf die klaffende Oberkiefer, nähert sie mehr und mehr, bis sie endlich sich berühren und die Schleimhaut durch leichtes Cauterisiren oder Aufreiben zur Vereinigung gebracht werden kann.

2) Verengung des Mundes, Microstoma. (*μικρὸν*, klein *τὸ στόμα*, Mund.)

Eine überaus seltene Krankheit. Die Kinder kommen entweder mit einem sehr kleinen Mund oder mit vollständig verwachsenen Lippen zur Welt, in welcher letzterem Falle selbstverständlich die Operation der Mundbildung in den ersten Stunden des Lebens vorgenommen werden muss. Häufiger kommt Verengung des Mundes nach syphilitischen Schleimhautplaques und Geschwüren vor. Es contrahiren sich die Narben mehr und mehr, bis endlich die Einführung eines kleinen Löffels und selbst eines Röhrchens unmöglich wird. Ist die Syphilis durch eine mercurielle Behandlung getilgt, so muss die Mundbildung nach Dieffenbach gemacht werden. Man schneidet zu beiden Seiten des verengten Mundes ein myrthenblattförmiges Stück Haut aus der Narbe, ohne die Schleimhaut zu verletzen, und bildet hiedurch die zukünftigen Mundwinkel, dann schneidet man mit der Schere die bisher ganz gelassene Schleimhaut gerade nach dem Winkel hin durch, so dass die Schleimhaut nach aussen gestülpt, mit dem äusseren Wundrand durch Nähte vereinigt werden kann. Sind die Kinder nicht marastisch, was auch überständiger Syphilis freilich ihr gewöhnliches Leos ist, so gelingt die Operation sehr leicht. Im entgegengesetzten Falle heilt die Schleimhaut nicht an, bedeckt sich mit Soormembranen, und die Kinder gehen atrophisch zu Grunde.

3) Bildungsmangel der Zunge, Defectus linguae.

Statt der ovalen Form zeigt die Zunge an ihrer Spitze entweder eine Einkerbung und selbst eine tiefere Spalte. Als grösste Rarität findet sich eine vollkommene Spaltung der Zunge, wobei bloss noch am Boden der Mundhöhle zwei etwas bewegliche Warzen oder Leisten bemerkt werden. Die hienüt behafteten Kinder vermögen nach Bednar zu schreiben und der Geschmackssinn soll vorhanden sein. Aus der Entwicklungsgeschichte lässt sich dieser Bildungsfehler folgendermassen erklären: Die Entwicklung der Zunge geht vom ersten Visceralbogen aus. Wenn nämlich die kolligen Enden der Visceralbogen sich schon in der Mitte erreicht und mit einander vereinigt haben, so bemerkt man an dem unteren Rande der hinteren Flosse des ersten Kiemenbogens, gerade an der Vereinigungsstelle seiner beiden Hälften, die Entwicklung einer kleinen Anschwellung, welche anfangs eine dreieckige, später mehr rindliche Form hat und sich allmählig zu einem nach vorn gebogenen, fleischigen Kegel (der Zunge) ausbildet. Hat aber die Vereinigung der Visceralbogen nicht vollständig und zu rechter Zeit sich eingestellt, so muss auch jener fleischige Kegel, die Zunge, gespalten bleiben, worauf sie in ihrer allgemeinen Entwicklung überhaupt zurückbleibt.

4) Hypertrophie und Vorfall der Zunge. *Prolapsus linguae.*

Nach der Geburt sieht die Zungenspitze nur wenig zwischen den Lippen vor, das vorragende Stück nimmt aber von Tag zu Tag an Größe zu, wenn nichts gegen dieses Uebel geschieht. Die Kinder vermögen nicht zu saugen und sind auch am Schlingen gehindert, weil die Zunge nicht nur nach vorne, sondern auch nach der Breite und Dicke vergrößert ist. Gewöhnlich ist diese Zungenvorgrößerung mit Kretinismus verbunden. Kommen die Zähne zum Durchbruch, so verhindert die vorgestreckte Zunge die Schneidezähne am senkrechten Durchbruch und gibt ihnen eine Richtung nach vorne. Durch den Druck der Zähne wird die Infiltration der Zunge immer beträchtlicher, sie exsoriirt, wird rissig, der Mundschleim fließet fortwährend über sie herunter, zersetzt sich und verbreitet einen widerlichen Fettsäuregeruch. Bei mehrjährigem Bestande bildet der Unterkiefer eine Rinne, in welcher die geschwürige, trockne Zunge liegt. Die Unterlippe stülpt sich um, und von artikulierter Sprache kann natürlich nicht die Rede sein.

E erworben kommt dieser Zustand auch bei sonst gut entwickelten Kindern vor, die an häufigen Convulsionen gelitten haben, wodurch eine Schwäche oder partielle Lähmung einzelner Zungenmuskeln zurückgeblieben kann.

Behandlung.

Ist das Uebel neu und die Zunge reponibel, so gelingt die Heilung sehr bald, wenn man das vorgestreckte Stück mit etwas Alantpulver oder Tinct. amara betupft. Ist die Zungenspitze aber auf diese Weise nicht zurückzubringen und hat die Schleimhaut schon Eise und Geschwüre, so muss das heraushängende Stück auf chirurgischen Wege entfernt werden. Früher bediente man sich hiezu der Ligatur oder des Messers, jetzt wird die Operation am einfachsten mit dem *Ecraseur*, am schnellsten und elegantesten durch Galvanokauterik verrichtet.

b) Abnorme Anheftung der Zunge. *Adhaesio linguae.*

Es gibt Kinder, bei denen das Zungenbündchen kurz und doch weit vorne an der Zungenspitze inserirt ist, wodurch die Zunge in ihrer Bewegung, besonders im Vorstrecken und Sagen gehindert wird. Auch kommen Knoten und Verdickungen am Zungenbündchen vor, welche denselben Effect ausüben. So beschaffene Bündchen müssen durch einen Seherenschnitt getrennt werden, wenn das Sagen hierbei wirklich beeinträchtigt wird, was gewöhnlich nicht der Fall ist. Das Treiben des Zungenbündchens wird viele hundert Mal ausgeübt, bis es einmal dringend indicirt ist. Da die Operation, von starker Hand ausgeführt, durchaus unschädlich ist, so braucht man es bei der Indication nicht zu streng zu nehmen, wenn den Angehörigen hienit eine besondere Beruhigung verschafft werden kann. Die kleine Operation wird auf folgende Weise gemacht: Man lässt den Kopf des Kindes, gegen das Fenster gewendet, fixiren, schiebt den Zeigefinger der linken Hand unter die Zunge neben das Zungenbündchen, das hierbei gespannt wird, und schneidet nun dasselbe mit einer nach abwärts gerichteten

Cosper'schen Schere durch, soweit es membranös ist. Die Bistung ist gleich Null.

Ausser dieser Verkürzung des Zungenbändchens kommt aber noch eine wirkliche allgemeine Verwachsung der ganzen unteren Zungenfläche mit dem Boden der Mundhöhle vor, entweder angeboren, als ein Fortbestehen der embryonischen Verwachsung der Zunge mit dem Mundboden, deren normaler Ueberrest die Schleimhautfalten zu beiden Seiten des Frenulum, die sog. *Plica timbrata*, darstellt, oder erworben durch Syphilis und Mercurialgeschwäre. Es ist diese zum Glück ein ziemlich seltenes Ereigniss. Die Trennung der ganzen Zunge mit dem Messer ist eine sehr blutige Operation, und führt, wenn die Nachbehandlung, bestehend in fortwährender Einlegung von Charpockagein und häufigen passiven Bewegungen der Zunge, nicht sehr sorgfältig geleitet wird, gewöhnlich nicht zum Ziele. Die Galvanokautik verspricht günstigere Resultate.

b) Die Ranula.

Unter Ranula, Froschgeschwulst, versteht man eine blasige Geschwulst mit flüssigem Inhalt, die sich unter der Zunge am Boden der Mundhöhle befindet. Sie kommt entweder nur auf einer oder zu beiden Seiten des Frenulum linguae vor, ihre Grösse schwankt zwischen der einer Erbse und eines Taubeneies, in letzterem Falle ist sie auch von aussen unter dem Kinn zu fühlen. Die sie bedeckende Schleimhaut ist oft so atrophirt, dass die Cystenwandung frei zu Tage liegt. In anderen Fällen hingegen liegt die Geschwulst viel tiefer am vorderen und seitlichen Theile des Halses unter dem Musc. mylohyoideus. Die Folgen dieses Uebels sind je nach der Grösse verschieden. So lange die Geschwulst nicht grösser als eine Erbse ist, macht sie gar keine Erscheinungen. Bei zunehmendem Wachsthum aber wird die Zunge gegen den harten Gaumen gedrängt und hienit das Sprechen, Schlucken und Respiriren erschwert. Im höchsten Grade des Uebels entstehen Stickenfälle, die mit denen des Krup's einige Aehnlichkeit haben können. Gewöhnlich nimmt man an, dass nur auf chirurgischem Wege abgeholfen werden könne, es kommt aber auch eine spontane Heilung durch Verwitterung der Cyste und ihrer Umgebung vor, wofür mich vor kurzem folgender Fall belehrte:

Eine Mutter stürzt athemlos mit ihrem 1 1/2-jährigen Knaben auf dem Arme in mein Zimmer. Sie erzählt, das Kind sei immer wohl gewesen, habe aber in letzterer Zeit im Schlafe eigenthümlich geröchelt, und seit acht Tagen habe es Stickenfälle, die nach ihrer Meinung mit dem Zahnen zusammenhängen, weil das Kind viel geifere und die Händchen oft zum Munde führe. Während die Frau diese Angaben machte, lag ich an, das Kind zu untersuchen. Die Stirn war heiss, der Puls sehr beschleunigt, die Respiration laut, ähnlich wie bei Krup, der Gesichtsausdruck war leidend und ängstlich. Als ich den Finger in den Mund führte, um die Zäuseln und den Pharynx zu untersuchen, bekam das Kind einen heftigen Stickenfall und als ich deshalb die Zunge mit dem Finger niederdrückte, füllte ich plötzlich etwas platten und das Volumen der Zunge sich vermindern. In demselben Momente floss weisslich meiner Hand aus dem Boden der Mundhöhle eine schleimige

eitrige Flüssigkeit in ziemlicher Menge ab, die aus einer geplatzten Cyste unter der Zunge herührte. Ich cauterisirte die collahirte Cystenwand intensiv mit Höllenstein, worauf ein hartnäckiges Geschwür entstand, das sich erst nach mehreren Monaten mit einer weissen Narbe schloss.

Ueber die Natur der Ranula bestehen verschiedene Ansichten. Abgesehen von der etwas zu kühnen Anschauung des alten Paré, der sie von einer kalten, feuchten, klebrigen Materie, die sich vom Gehirn auf die Zunge versetzte, ableitete, hielten die einen sie für ein Balggeschwulst unbekannter Ursprungs, während die andern eine Verstopfung und nachfolgende Ausdehnung des Ausführungsanges der Submaxillardrüse, des Ductus Whartonianus, annahmen. Diese letztere Ansicht, von Munizcks irdacht und von Vielem adoptirt, hat zu gewichtigen Gründe gegen sich, als dass sie fernere Geltung behaupten könnte. A priori stünde dieser Anschauung nichts im Wege, sie findet im Gegentheil in der Dacryocystostomastasis eine gerechtfertigte Analogie, die chemische Untersuchung hat aber gezeigt, dass der Inhalt der Ranula kein Speichel ist, indem darin sich Eiweiss findet, das im Speichel nicht vorkommt, während das den Speichel charakterisirende Blausäurekalium hier vollkommen fehlt. Die Entgegnung, dass die chemische Zusammensetzung nicht massgebend sein könne, weil der Speichel, lange abgesperrt, neue chemische Körper aufzunehmen und ursprüngliche osmotisch abgeben könne, wird durch das anatomische Messer entkräftet. Man hat nämlich nach Hyrtl neben der Ranula schon den gesunden, nicht erweiterten Speichelgang gefunden. Die Ranula also ist kein erweiterter Ductus Whartonianus, sondern eine Cyste, und da nach Fleischmann sich unter der Zunge ein Schleimbeutel findet, wahrscheinlich ein hydropischer Schleimbeutel, ein Ganglion.

Die Prognose ist nach diesen anatomischen Verhältnissen und nach erfahrungsgemäss nicht ungünstig, zumal die erkrankten Stellen leicht zugänglich sind.

Therapie.

Die Behandlung besteht in Abtragung des vorderen Theils der Cystenwand und öfter wiederholter Cauterisation der blossgelegten Höhle mit Höllenstein. Eine einfache Incision in die Cystenwand mit Entfernung des Inhaltes genügt nicht, weil die Cysten grosse Neigung zur Wiederverwachsung haben, die durch den Druck der aufliegenden Zunge nur begünstigt wird. Aus der blossgelegten Höhle entsteht ein sehr torpides Geschwür, das erst auf öfter wiederholte, intensive Cauterisation sich langsam schliesst.

7) Die catarrhalische Entzündung der Mundschleimhaut. Stomatitis catarrhalis.

Symptome.

Unter catarrhalischer Stomatitis versteht man Rötzung, Schmerz und vermehrte Secretion der Mundschleimhaut. Die Rötzung erreicht an Schleimhautstellen, die ein schlaffes und reichliches unterliegendes Bindegewebe haben, einen viel höheren Grad als an solchen, die direkt

über den Knechten liegen, z. B. am harten Gaumen, wo sie gewöhnlich nur unbedeutend vermehrt ist. Am intensivsten ist sie auf der Zunge, die wir mit einer dicken Schleim Hineersyrup bestrichen aussieht. Wenn der Zustand länger dauert, bedeckt sich die rathle Zunge mit einem weissen Belege. Es tritt hierbei wohl auch Schwellung der Schleimhaut ein, dieselbe ist aber so gering, dass sie keine Formveränderung der Wangen und Lippen veranlasst, wie dies zum Beispiel bei der Stomatocoe, der Mundfäule, der Fall ist.

Der Schmerz ist hierbei sehr deutlich zu erkennen. Die Kinder saugen ungern, nehmen überhaupt sehr wenig und immer nur kalte Nahrungsmittel zu sich und lassen sich nicht mit dem Finger in den Mund greifen. Da die Stomatitis catarrhalis nur selten idiopathisch, sondern die gewöhnliche Begleiterin anderer, größtentheils febriliter Processen ist, so ist es schwer, ihren Einfluss auf das Allgemeinbefinden zu bestimmen. Reizbare Kinder fielen auch bei einfacher Stomatitis ohne alle weitere Organerkrankung. Wenn die Entzündung sich über die Mundschleimhaut hinaus auch auf den Larynx, die Nasenschleimhaut und die Eustachische Trompete fortpflanzt, so bedingt sie die bekannten Erscheinungen der catarrhalischen Laryngitis, der Coryza und des Catarrhus der Eustachischen Ohrtrumpete und der Paukenhöhle, von denen eine jede einzelne schon genügt, Fieberbewegung hervorzurufen. Der Schmerz beim Saugen und Trinken ist zuweilen so gross, dass die Kinder mehrere Tage lang fast gar nichts über die Lippen bringen, wodurch die Ernährung und Entwicklung merklich beeinträchtigt wird.

Die Secretion einer so veränderten Schleimhaut ist immer vermehrt, der Schleim fließt fortwährend über die Mundwinkel herab, trocknet dieselben, röthet das Kinn und durchnässt die Kleiderchen. Dieser Schleim riecht wohl etwas säuerlich, reagirt auch schwach sauer, hat aber nie den ekelhaften Geruch, den man bei wirklichen Eiterungen der Schleimhaut wahrnimmt.

Hat die Rötung und Schmerzhaftigkeit einige Tage bestanden und dauert die Ursache derselben immer noch fort, so erheben sich als wirkliche Exsudation kleine wasserhelle Bläschen auf der Zunge, dem Zahnfleisch und der Lippen- und Wangenschleimhaut, die in Aussehen und Verlauf viel Ähnlichkeit mit dem Herpes labialis haben — Stomatitis ulcerosa. — Dieselben platzen sehr bald und hinterlassen kleine flache Geschwürchen mit gelbweissem Grunde, welche sich in den ersten Tagen nach allen Richtungen vergrößern, confluiren und so ziemlich ausgedehnte geschwürige Flächen, besonders am Zungenrande und an der Schleimhaut der Unterlippen darstellen. Auch diese Bläschen hat man, wie fast alle Krankheiten der Mundhöhle, „Aphthen“ genannt, eine Benennung, die eine so heillosse Verwirrung in der Bezeichnung der Mundkrankheiten angerichtet hat, dass es rathsam erscheint, sie ganz zu verlassen.

Nachdem diese Geschwüre sich einige Tage vergrößert und bei Berührung lebhaften Schmerz verursacht haben, verschwindet die gelbliche Farbe ihres Grundes, derselbe röthet sich wieder und bedeckt sich, wie es scheint, unmittelbar mit Epithel, wenigstens geschieht die Heilung so schnell, oft in 2—3 Tagen, dass man nicht an eine Heilung durch Vernarbung, durch Contraction, denken kann.

Niemals verbreiten diese Geschwüre einen besonders Geruch. Das Athem der damit Belegten riecht nur sehr schwach säuerlich, niemals ekelhaft wie bei Stomatoc.

Die gewöhnlichste Veranlassung ist der Durchbruch der Zähne. Die Stomatitis tritt hierbei so regelmäßig auf, dass man sie als physiologische bezeichnen muss. Eine weitere häufige Ursache bilden die Sauglappen mit ihrem meist gährenden Inhalt. Bei älteren Kindern zu heisse oder zu kalte Nahrungsmittel, cariose Zahnpfeifen, gewürzreizende Speisen, bei manchen Kindern die Antimonial- und Jodpräparate. Sie kommt auch in kleinen Epidemien vor, hauptsächlich im Sommer, vielleicht durch übermäßigen Genuss saurer Früchte bedingt und ist übrigens auch die Begleiterin vieler fieberhafter Krankheiten, besonders der acuten Exantheme.

Therapie.

Die Behandlung ist ausserordentlich einfach. Man entfernt die Ursachen, den Schmuß etc., so gut als möglich, schützt die Bist durch ein Stückchen Guttapercha, das unter dem Jäckchen bedeckt wird, vor Durchlässigkeit und gibt den Kindern nur kühle Milch und Wasser zu trinken.

Da der übermässig secretirte Schleim rasch sauer wird, so ist es rathsam, die Mundhöhle mit einer schwach alkalischen Lösung, z. B. Borax 1,20, Wasser 30,0, stündlich auszuspülen, damit die überschüssige Säure neutralisirt werde. Die schmerzhaften Geschwüre kann man mit dem Höllenstomatite auf mehrere Stunden und sogar für immer schmerzlos machen, die Cauterisation selbst aber ist ziemlich schmerzhaft. Nach 8, längstens 14 Tagen tritt spontane Heilung der idiopathischen Stomatitis ein. Die symptomatische Stomatitis bei fieberhaften Krankheiten wird gewöhnlich nicht der Gegenstand einer speciellen Behandlung.

8) Diphtheritis der Mundhöhle. (§ 849 (p. 1. Haut.)

Unter Diphtheritis oder Diphtherie, Angina membranacea, Angine couenneuse der Franzosen, versteht man eine erst in den letzten Jahrzehnten wieder häufiger auftretende acute Allgemeinerkrankung, dem auffälligsten Symptom in einer ausgedehnten Membranbildung auf den hinteren Parttheilen der Mundhöhle besteht.

Historische Forschungen haben ergeben, dass die Krankheit keineswegs neu ist, sondern schon Aretius (zweite Hälfte des ersten Jahrhunderts nach Chr.) bekannt war. Es liegen ferner verschiedene Schilderungen von Epidemien in Holland (14. Jahrh.), in Paris (16. Jahrh.) in Spanien (17. Jahrh.) vor und in diesem Jahrhundert kam sie am häufigsten in Amerika, dann aber auch in England und Frankreich und zuletzt bei uns in Deutschland und zwar vorherrschend im nördlichen Theile desselben zur Beobachtung.

Man unterscheidet eine primäre und eine secundäre Diphtherie, welche letztere namentlich zu Masern und Scharlach gesellt und sporadisch vorkommen kann, während die primäre keine Ausnahme sich epidemisch zu verbreiten pflegt und entschieden contagios ist.

Symptome.

Die primäre Diphtherie beginnt regelmässig mit Fieber, beträchtlicher Pulsbeschleunigung, Temperaturerhöhung und allgemeiner Abgeschlagenheit. Doch sind diese Erscheinungen bei den verschiedenen Individuen ausserordentlich verschieden stark entwickelt. Wie es überhaupt eine Eigenthümlichkeit dieser Krankheit ist, dass ihr ganzes Auftreten und ihr Verlauf unter gleichen Verhältnissen und bei gleichem Lebensalter ein sehr verschiedener ist.

Nachdem diese allgemeinen Erscheinungen einige Stunden, oder längstens 1—2 Tage bestanden, stellen sich die örtlichen Symptome ein. Die Kinder bekommen Schlingbeschwerden, nieselnde, etwas belegte Stimme und Steifigkeit des Halses, die beiden erstgenannten Symptome rühren von dem diphtheritischen Belege auf der Mandeln, dem Gaumensegel und der Nasenhöhle, das letzte von der nicht fehlenden Drüsenanschwellung der benachbarten Lymphdrüsen des Halses her.

Untersucht man nun bei guter Beleuchtung die Mundhöhle, so sieht man die Schleimhaut der Lippen, des Zahnfleisches, der Wangen und des harten Gaumens vollkommen intakt, das Gaumensegel aber, die Mandeln und die hintere Pharynxwand mit weissen Membranen bedeckt, welche besonders auf den Mandeln die Dicke einer halben und selbst einer ganzen Linie erreichen können. Die Farbe dieser Membranen ist Anfangs vollkommen weiss, geht nach einigen Tagen aber in eine gelblichweisse oder grauweisse über. Wenn durch Aetzungen oder unvorsichtige Untersuchung die betroffenen Theile verletzt werden, so entstehen kleine Blutungen, in Folge deren diese Häutchen eine braunrothe, sogar schwärzliche Färbung annehmen können. Der Verlauf dieser Membranbildung ist nun je nach dem Charakter der Epidemie ein verschiedener. Es gibt Fälle, wo die Membranen nach 2—3 Tagen sich abtössen und die Schleimhaut darunter unversehrt zum Vorschein kommt, dann wieder andere, und diese bilden die Regel, wo die Membranen und ihre Nachschübe 2—3 Wochen bestehen, die Schleimhaut dabei in einen Ulcerationsprocess gezogen wird und erst nach längerer Zeit heilt, und endlich bösartige Fälle, in denen sich alsbald Gangrän und allgemeiner Collaps einstellt, so dass die Schleimhaut in schwarzen Fetzen zu Grunde geht. In diesem letzten ungünstigen Falle kommen beträchtliche Zerstörungen zu Stande, worauf gewöhnlich rasch der Tod, nur ganz ausnahmsweise noch Genesung eintritt.

Wenn die Membranen an den genannten Stellen zu sehen sind, so kann über die Diagnose kein Zweifel mehr bestehen. In einzelnen Fällen aber ist auf dem Hintergrund der Mundhöhle nur eine Rötze und leichte Schwellung zu bemerken und doch sind alle subjectiven und die übrigen objectiven Symptome der Diphtherie zugegen. Wir haben es hier mit einem Belege der hinteren Fläche des Gaumensegels und der Nasenhöhle zu thun, was durch Aufheben des Gaumensegels mit einer Pinzette, freilich nur bei Erwachsenen leicht ausführbar, und durch einen profusen, röthlich gefärbten Schleimabfluss aus den Nasenlöchern nachgewiesen werden kann. Dass die vordere Fläche des Gaumensegels ganz frei, hingegen die hintere mit Membranen bedeckt sein kann, habe ich selbst schon öfter bei Sectionen beobachten können. Weitaus die gefährlichste und in manchen Epidemien früher auch

häufigste Erscheinung ist das Uebergreifen der Membranen auf den Kehlkopf, wovon weiter unten, Capitel Kroup, ausführlich gehandelt werden wird.

Die Diphtherie ist keine örtliche Krankheit, denn sonst könnten sich nicht zu gleicher Zeit auch die Vagina, Excretionen an verschiedenen Hautstellen, die Conjunctiva, zuweilen auch der Anus mit Membranen bedecken. —

Als die gewöhnlichsten Complicationen und Nachkrankheiten sind zu erwähnen die Albuminurie und Nephritis, Kroup, Bronchitis und Pneumonie, Darmcatarrhe, Myocarditis und endlich eine eigenthümliche Paralyse. Albuminurie soll in schweren Epidemien gleich zu Anfang der Krankheit häufig beobachtet werden, bei den gewöhnlichen Epidemien, wie ich eine solche in München im Jahr 1864 erlebte, ist der Urin Anfangs frei von Eiweiss, sehr arm an Uroleiden dunkel pigmentirt und wird spärlich ausgeschieden. Erst später nach vollständig abgelaufener Diphtherie stellt sich zuweilen eine wirkliche Nephritis ein, die sich bezüglich der Veränderungen im Urin von der nach Scharlach vorkommenden in keiner Weise unterscheidet. Der Urin wird blutroth, enthält grosse Mengen von Blutkörperchen, Epithel und Fibrinyländer und zeigt beim Kochen einen entsprechend grossen Eiweissniederschlag. Während aber bei Nephritis nach Scharlach mit Anasarca und Hölzerwassersucht schnell und in bedenklich hohem Grade eintreten, schwellen hier die Extremitäten in der Regel gar nicht an und die Wassersucht der grossen serösen Säcke wird nach selten beobachtet. Der gewöhnliche Ausgang dieser Nephritis ist Genesung, welche jedoch Monate lang auf sich warten lässt und erst nach einer Besserung erregenden allgemeinen Abmagerung unter allmählicher Abnahme des Eiweisses eintritt. Der Mangel des Hydrops wird sich wohl am einfachsten durch die Annahme erklären, dass im Scharlach fast immer beide Nieren erkranken, bei Diphtherie aber wahrscheinlich nur die eine ergriffen wird, während die andere in normalen Verhältnissen bleibt und hierdurch den Hydrops verhütet.

Bronchitis und Pneumonie als Complicationen der Diphtherie werden zweckmässiger beim Kroup besprochen werden.

Die Myocarditis, der mikroskopische Zerfall des Herzmuskels, ist bei plötzlich Verstorbenen ein ziemlich regelmässiger anatomischer Befund, der in jeder beträchtlicheren Epidemie ab und zu einmal vorkommt.

Die Darmcatarrhe während und nach der Diphtherie sind bei kleineren Kindern, welche noch in der Zahnung begriffen sind, oft von besonders langer Dauer und führen häufig unter zunehmender Anämie zum Tode.

Die diphtheritische Lähmung ist ganz eigenthümlicher Natur, ihr Zusammenhang mit der Diphtherie war schon Ghisl 1749 und Beronius 1826 bekannt. Was die Frequenz dieser Erscheinung betrifft, so ist dieselbe in den verschiedenen Epidemien eine sehr verschiedene. In einzelnen Epidemien sollen fast alle Reconvalescenten Lähmungssymptome zeigen, in andern, z. B. in den von mir beobachteten, wieder nur ein kleiner Theil derselben. Die Zeit des Auftretens fällt meist in die dritte oder vierte Woche nach Beginn der Krankheit, nicht leicht früher, zuweilen aber bedeutend später, — dass die Kinder 6 bis

8 Wochen lang anscheinend vollkommen wohl sein und doch noch plötzlich von der Lähmung befallen werden können. Sie beginnt fast ohne Ausnahme am Gaumensegel. Die Kinder bekommen mit einem Male eine undeutliche, stöchernde Sprache, wie sie bei Menschen mit angeborenem oder durch Syphilis erworbenem Defekt des Gaumensegels beobachtet wird, und namentlich wird die Aussprache der Gaumensegel beschränkt. Zu gleicher Zeit stellen sich Schlingbeschwerden ein, und ein Theil der genossenen Getränke fließt mit oder ohne Hustenreiz zur Nase wieder heraus. In den meisten Fällen bleibt die Lähmung auf diesen kleinen Raum beschränkt, das Allgemeinbefinden ist mit Ausnahme einer auffallenden Bluthere nicht getrübt, und der gewöhnliche Ausgang ist nach einigen Wochen eine plötzliche Genesung. Viel schlimmer gestaltet sich die Prognose, wenn auch die Extremitäten gelähmt werden, und bei der Lähmung der Muskeln des Rumpfes tritt in Folge der erschwerten, mühsamen Respiration gewöhnlich der Tod ein. Die Lähmung der Extremitäten betrifft häufiger die unteren als die oberen, ist meist doppelseitig und unterscheidet sich in nichts von der nach Typhus oder Scharlach eintretenden.

Eigenthümlich ist schließlich noch die diphtheritische Amaurose. Die Erblindung ist keine vollständige, sondern besteht nur in einer Schwäche, so dass kleinere Gegenstände nicht mehr genau erkannt werden. Ophthalmoskopisch lassen sich keine constanten Veränderungen nachweisen und die Spezialisten nehmen nach Donders' Vorgang eine Lähmung der *Mm. sphincter iridis* und des *tensor choroideae* an. Auch dieses Uebel verschwindet in der Regel in einigen Wochen vollständig. Recidive dieser sämtlichen Lähmungssymptome sind beobachtet worden, scheinen jedoch selten zu sein.

Pathologische Anatomie.

Der wesentlichste pathologisch anatomische Befund besteht immer im Nachweis der Membranen, welche sich am häufigsten an den hinteren Partien der Mundhöhle, im Rachen und Kehlkopf finden. Sie sind gewöhnlich gelblich weiss, werden aber in der Leiche, besonders bei geöffnetem Munde bald dunkelgelb, braun oder schwärzlich in Folge der Verstroechung. Sie lassen sich bald leicht, bald schwer von der unterliegenden Schleimhaut entfernen, und die letztere zeigt in der Regel keinen Substanzverlust, sondern bloss einen Verlust ihres natürlichen Glanzes. Die mikroskopische Untersuchung der Membranen liefert wenig Prägnantes. In der Hauptmasse bestehen dieselben aus Körnchen, Mikrocoecen, Kernen und Zellen, einzelnen Epithelien und Fibrinstreifen. Von den Veränderungen des Larynx und der Lungen weiter unten.

Therapie.

Ueber die Behandlung der Diphtherie herrschen die verschiedensten, geradezu sich widersprechenden Ansichten, wovon allein schon hervorgeht, dass alle bisher angewandten Mittel von zweifelhaftem Erfolge sind. Da man den Sitz der Krankheit mit den Augen und Händen bequem erreichen kann, so ist von jeher eine örtliche Behandlung angestrebt und empfohlen worden. Es gibt kein Aetzmittel, das dieogen noch nicht versucht worden wäre. Den größten Ruf unter denselben

hat sich der Höllenstein und die Salzsäure erworben. In neuester Zeit unterliessen einige bedeutende englische Aerzte diese Aetzungen ganz und fanden, dass sich ihre therapeutischen Resultate in keinem Falle verschlimmerten, ja sogar etwas günstiger gestalteten. Auf diese Beobachtung hin habe auch ich seit mehreren Jahren die Aetzungen der Rachenhöhle vollständig verbannt und mich in vielen 100 Fällen von der Richtigkeit jener Angaben überzeugt. Ich kann mit gutem Gewissen und zum Wohle der viel gequälten diphtheritischen Kinder erklären, dass die Aetzungen mit den bisher üblichen Mitteln keinen günstigen Einfluss auf den localen Verlauf haben. Bei grösseren, über fünf Jahre alten Kindern lasse ich mit dem jetzt so sehr vereinfachten Pulverisator reines Kalkwasser täglich 5—6 Mal mindestens fünf Minuten lang einathmen und habe bei dieser schonenden Behandlung, zu welcher man die Kinder in diesem Alter auch in Güte bringen kann, auffallend günstige Resultate gesehen. Weber in Darmstadt empfiehlt halbstündlich wiederholte Inhalationen von Milchsäure gutt. xx auf 15,0 Wasser. Einblasen von gewöhnlichen, nicht gereinigten Schwefelblumen mittels eines Federkiels in die Rachenhöhle leistet ebenfalls auffallend gute Dienste. Es hat diese Verfahren den Vortheil, dass es auch bei kleineren Kindern, welche noch nicht zu Inhalationen zu bringen sind, leicht ausführbar ist. Intern gebe ich seit Jahren nichts als chloresaurer Kali, bei Kindern unter einem Jahr 0,5—1,25, von 1—3 Jahren 2,0, von 3—5 Jahren 2,5, bei älteren Kindern 4,0 in 24 Stunden, gelöst in einigen Unzen Wasser. Wenn Durchfall oder grosse Unruhe vorhanden, wird zweckmässig eine entsprechende Dosis Opium oder Morphinum zugesetzt. Das von den Franzosen als specifisch gerühmte kohlensaure Natron zu 4,0 pro die hat sich bei uns keineswegs bewährt und steht in seiner Wirkung dem Kali chloricum jedenfalls weit nach. Bei beginnendem Verfall der Kräfte muss man durch Wein, China, Camphor, Castoreum etc. das Leben zu friden suchen. Ueber die Behandlung des diphtheritischen Kroups weiter unten bei den Kehlkopfkrankheiten.

9) Die Mundfäule, Stomatocoe.

Den ersten Anfang der Stomatocoe hatte ich noch nie Gelegenheit zu sehen, und kann also den Angaben der Autoren, nach welchen zuerst eine catarrhalische Stomatitis vorhanden sein soll, weder bestätigen noch entgegen treten. Die einmal entwickelte Stomatocoe — nur wegen dieser wird gewöhnlich Hilfe gesucht — hat folgende Symptome:

Der Rand des Zahnfleisches ist an einzelnen Stellen gelb, mit einer dünnen Schichte gelben Schleimes bedeckt und der scharfe Rand desselben ist nicht mehr vorhanden, so dass die Zähne etwas grösser erscheinen. Eine leichte Berührung solchen Zahnfleisches verursacht eine Blutung der geschwüpigen Partien. Trotz der geringen Ausdehnung der Geschwüre erkennt man sie schon bei einer Entfernung von mehreren Zollen durch den Geruchssinn. Die Stomatocoe entwickelt immer einen eigenthümlichen fötiden Geruch, und dieser Geruch ist es, der sie mit Bestimmtheit und Leichtigkeit von höheren Graden der catarrhalischen Stomatitis, wo es nach dem Platze

der Bläschen auch zu flachen gelben Geschwüren kommt, unterscheiden lässt.

Bei diesem, dem ersten Grade der Stomatocae ist die Mundschleimhaut nur wenig geschwollen, und ihre Secretion nicht bedeutend vermehrt.

Beim zweiten höheren Grade werden die dem Zahnfleisch anliegenden Theile durch Contact angesteckt und erleiden dieselben Veränderungen, wie dasselbe. Die Wangenschleimhaut schwillt bedeutend an, so dass man den Eindruck der einzelnen Zähne in ihr deutlich erkennen kann, ebenso die Schleimhaut der Zunge, welche an ihrer Oberfläche einen weissen Belag und an ihren Rändern ebenfalls die Zahneindrücke zeigt. Taf. III, Fig. 1 schematische Contour einer solchen Zunge. Uebrigens wird ihre ganze Peripherie in Folge der Schwellung und der Compression der oberen und unteren Zahnröhre scharfkantig. Es entstehen nun schnell an der Wange, den Lippen und der Zunge drosselnden gelben Geschwüre, wie sie ursprünglich nur am Zahnfleisch waren. Die Geschwulst nimmt rasch zu. In Folge derselben können die Kinder den Mund nicht mehr schliessen, sie öffnen nicht nur die Lippen, sondern auch die Kiefer, um jede Berührung und Reibung der höchst schmerzhaften Geschwüre zu vermeiden, und ein braunrother, faulig riechender Speichel fliesst ihnen in grosser Menge über die geschwollene Unterlippe herab. Fast ebenso regelmässig wie bei Diphtheritis oris schwellen auch hier die Halsdrüsen schmerzhaft an. Menstruationsbildung auf den Geschwüren konnte ich niemals bemerken. Ihre Neigung zur spontanen Heilung ist eine sehr geringe, die Geschwulst, die Geschwüre und der Gornel können unbehandelt Monate lang bestehen, die Zähne werden dabei locker und fallen aus und die Kinder atrophiren bedenklich. Endlich nach langer Zeit scheint spontane Heilung eintreten.

Das Schlingen, Kauen und Sprechen werden bei höherem Grade fast ganz unmöglich, die Kinder trinken lange Zeit nichts, bis der Durst quälend wird, worauf sie grosse Quantitäten kaltes Wasser oder kalte Milch unter heftigsten Schmerzäusserungen auf einmal zu sich nehmen. Bei grösseren Kindern tritt gewöhnlich kein Fieber ein, der Schmerz aber bei jeder Bewegung des Mundes und besonders auch beim Schlingen macht sie im höchsten Grade missmuthig.

Die Aetiologie ist eine mehrfache. Vor allem ist die Ansteckung häufig zu constatiren. Die Kinder einer Familie, oder die Nachbarn auf den Schnülpäken theilen sich die Stomatocae sehr leicht mit. Ein Incubationsstadium, wie bei den Exanthemen, scheint hier gar nicht oder nur kurze Zeit zu bestehen, wenigstens habe ich in Familien immer ein ziemlich gleichzeitiges Auftreten beobachtet. Ausserdem kann sie auch bei Kindern wie bei Erwachsenen spontan entstehen, wobei carieses Zahne ein prädisponirendes Moment sind, und endlich wird durch innerlichen und äusserlichen Gebrauch des Quecksilbers bei Kindern eine Mundkrankheit erzeugt, die von der eben beschriebenen Stomatocae in keiner Beziehung zu unterscheiden ist, es sei denn, dass der Mangel der Ansteckungsfähigkeit der sogenannten Stomatitis mercurialis als differentiales Merkmal geltend gemacht werden soll. Auf Quecksilber treten bei Kindern die Mundschleimhauterkrankungen viel später und öfter auf, als bei Erwachsenen. Auf

innere Application in Form der grauen Salbe, die ich seit vielen Jahren bei allen syphilitischen Kindern anwende, wenn anders die Beschaffenheit der Haut es zulässt, sah ich noch niemals Stomatocae eintreten. Salivation ist bei kleinen Kindern ein ausserordentlich seltenes Ereignis.

Behandlung.

Wir sind so glücklich, gegen die Stomatocae nur ein Mittel zu besitzen, womit schon genug zu dessen Empfehlung gesagt ist. Es ist dies das chloresaurc Kali, Kalichloricum, in der im vorigen Abschnitte angegebenen Dosirung von 0,5–4,0 pro die. Die verschiedenen Quantitäten werden jedesmal in 120,0 Wasser gelöst, mit einem Syrup versüßt, und im Verlaufe von 12–18 Stunden gerührt. Nach dieser Zeit ist in allen Fällen und bei jedem Grade von Stomatocae der Geruch vollständig verschwunden. Bei geringer Ausdehnung der Geschwüre tritt sofort Heilung ein, das Zahnfleisch wird wieder fest, der gelbe Rand stösst sich ab, man kann durch Berührung mit dem Finger keine Blutung mehr verursachen und die Kinder können wieder ohne Schmerzen sprechen und kauen. Bei höherem Grade genügt der eintägige Gebrauch des chloresaurcn Kali's wohl auch zur Tilgung des Geruches vollständig, wenn man dasselbe aber nicht 3–4 Tage lang fortsetzt, so kelet er wieder und die Krankheit macht neue Fortschritte. Länger als vier Tage habe ich dieses Mittel noch nie angewendet. Anderweitige Wirkungen, Diarrhöe, Appetitmangel, Leibschmerz, Störungen der Diuresis etc., konnte ich trotz mehr als hundertfachen Gebrauchs noch nie beobachten, und bin deshalb auch noch gar nicht dazu gekommen, diese Lösung statt schlucken zergergeln zu lassen, zumal die Kinder sich sehr ungeschickt zum Gurgeln stellen und auch die grössten nur mit Mühe dazu zu bringen sind. Die Cauterisation der nicht mehr riechenden und dann auch nicht mehr schmerzenden Geschwüre an den Wangen und der Zunge ist durchaus unnöthig, indem die Heilung ohnedies ausserordentlich rasch erfolgt. Früher glaubte man, die carösen Zähne, deren sich bei Kindern vor Beginn der zweiten Dentition oft eine bedeutende Zahl findet, müssten alle herausgenommen werden, damit Heilung eintreten könne. Es ist dies keineswegs nöthig und sogar direct schädlich, weil die gepackten Zahnfleischränder in der Nähe des extrahirten Zahnes rasch wieder von Stomatocae ergriffen und so der Schmerz und die eiternden Flächen nur vergrößert werden. Eine örtliche Behandlung ist bei dieser innerlichen Darreichung des Kali chloricum durchaus überflüssig.

10) Die scorbutische Entzündung der Mundschleimhaut.

Unter Scorbut versteht man eine ausgedehnte Erkrankung der Capillaren, welche an verschiedenen Stellen einreissen und je nach der Menge der Continuitätsstörungen grössere oder kleinere Mengen Blut in das nächstgelegene Gewebe austreten lassen. Ob hieran die chemische Beschaffenheit des Blutes Schuld ist, lässt sich nicht ermitteln, nur so viel weiss man, dass der Faserstoff des scorbutischen Blutes langsamer gerinnt, als der des normalen.

Diese Blutungen finden man noch in der Mundhöhle in so charak-

teristischer Weise statt, dass man aus ihrer Beschaffenheit allein schon auf die Gegenwart und den Grad des Scorbutus schliessen kann.

Ich kann aus Erfahrung nur von unserem Landscorbut referiren, wie sich die Kinder gegen den Seescorbut verhalten, liegt ausser meinem Bereiche. Ein gesundes wohl genährtes Kind in guter Wohnung bekommt niemals Scorbut. Bei der wohlhabenden Klasse kommt derselbe nur in Folge einer überstandener schwerer langwieriger Krankheiten, namentlich nach Abdominaltyphus vor, in der unbemittelten Klasse werden in feuchten Wohnungen und bei schlechter Kost ganze Familien scorbutisch.

Symptome.

Gewöhnlich geht schon längere Zeit Blässe, Abmagerung, Traurigkeit oder auch ein längerwährender Typhus dem Ausbruch des Scorbutus voraus. Hieraufängt das Zahnfleisch an beim Kauen zu schmerzen und ist zu kleinen Blutungen sehr geneigt. Der äussere Zahnfleischrand liegt nicht mehr fest an den Zähnen an, ist etwas geschwollen und von einer bläurothen Farbe, an einzelnen Stellen finden sich Defekte der Schleimhaut.

Die übrige Schleimhaut am harten Gaumen und an den Wangen ist nicht von catarrhalischer Stomatitis ergriffen, sondern vielmehr blass und anämisch. Der Geruch aus dem Munde ist auch hier ein sichtlich intensiver, lässt sich aber deutlich von dem der Stomatitis unterscheiden.

Bei länger bestehendem Processus bildet der Zahnfleischrand nur bläurothe Wülste mit kleinen Excrestzenzen bedeckt, und blutet bei der leisesten Berührung. Die Zähne sind mit einem gelben Schleim beschlagen, den ganzen Tag floss braunrother übelriechender Speichel aus dem Munde, und es erscheinen nun grössere und kleinere Echy-mosen auf der Schleimhaut der Zunge, der Wangen und Lippen, welche an einzelnen Stellen wieder resorbiert werden, an andern aber platzen und fungöse Geschwüre mit leicht blutendem Grunde darstellen. Unter günstigen Verhältnissen bilden sich alle diese Veränderungen, wenn auch meist nur sehr langsam, wieder zurück, das Zahnfleisch behält noch lange Zeit seine Neigung zu Blutungen, bestehen aber die ungünstigen ursächlichen Momente fort, so nehmen die scorbutischen Symptome mehr zu, die Zähne fallen aus, ganze Stücke Zahnfleisch stossen sich brandig ab, die echytmatischen unteren Extremitäten werden ödematös, es tritt allgemeiner Hydrops ein und die Kinder gehen anämisch zu Grunde.

Therapie.

Die Behandlung des idiopathischen nur durch elende Verhältnisse entstandenen Scorbutus ist sehr einfach, wenn man im Stande ist, diese Verhältnisse zu verbessern, wenn man die Kinder in eine trockene gut ventilirte Wohnung bringen und ihnen eine reiche Pflege und gute, zum Theil animalische Kost verschaffen kann. Im entgegengesetzten Falle hingegen lassen uns alle angepriesenen Mittel im Stiche. Es kommen hier wohl auch Genesungen vor, besonders wenn bei wärmerer Jahreszeit die Kinder wenigstens auf der Strasse frische Luft geniessen können. Als eines der besten Heilmittel wird der

Citronensaft oder eine Pflanzensäure überhaupt empfehlen. Die Mundaffection wird mit adstringirenden Gargelwässern, bestehend aus Alum, Eichenrinde, Ratanhia, Catechu etc., denen man sehr vortheilhaft einige Tropfen Hydrargentiur zugesetzt, bekämpft. Profusere Blutungen sucht man durch Liqueur ferri sesquichlorati, oder durch Cauterisation mit Höllenstein oder concentrirter Salzsäure zu stillen. Bei gangränöser Zerstörung muss man durch China, Wein, excitirende Mittel und gute Ernährung die Kräfte möglichst aufrecht zu erhalten suchen. Scorbut nach Typhus ist eine der übelsten Typhuscomplicationen. Bei der darniederliegenden Resorption schlagen in der Regel alle Ernährungsversuche fehl.

III Die Noma (*ἰσμή*, transzendes Geschwür).

Unter Noma, Wasserkrebs, Cancer aquaticus, Gangraena oris, Stomatocrosis versteht man einen Brand der Wange, der unter so eigenthümlichen und constanten Erscheinungen zu Stande kommt, dass er als eine specielle Art von Gangrän eine separate Beschreibung und Bezeichnung erfordert. Unseren alten Autoren scheint dieselbe nicht bekannt gewesen zu sein, die erste Arbeit darüber hat Battus, ein holländischer Arzt, zu Anfang des 17. Jahrhunderts geliefert.

Die Noma kommt fast nur bei Kindern von 2–12 Jahren vor. Säuglinge scheinen ganz von ihr verschont zu bleiben. Erwachsene werden auch nur ausserordentlich selten davon ergriffen, viele Aerzte haben sie bei diesen nie beobachtet. Immer geht eine längere, fehlerhafte Krankheit, Scharlach, Masern oder Typhus der Noma voraus, und es ist kein Beispiel bekannt, dass ein vorher ganz gesundes Kind daran erkrankt wäre. Epidemisch tritt sie nicht auf, in südlichen Ländern soll sie gar nicht vorkommen, am häufigsten scheint sie in Holland zu sein, Mädchen erkranken öfter daran als Knaben, und fast immer wird nur eine Gesichtshälfte ergriffen.

Symptome.

Der Sitz der Noma ist immer die Wange und zwar der dem Mundwinkel zunächst gelegene Theil derselben. Nur ein einziges Mal sah ich eine acute, rasch um sich greifende Gangrän in der Vertiefung unter dem Ohrfläppchen entstehen, welche wie die gewöhnliche Noma rasch in die Tiefe der Parotis und seitwärts auf die Wange, den Hals und das Ohrfläppchen übergreift und in wenigen Tagen zum letalen Ende führt. Man fühlt gewöhnlich bei einem in bester Reconvalescent begriffenen Kinde eine ziemlich genau umschriebene harte Stelle in der Wange nahe dem Mundwinkel, wobei das Kind keinen schmerzhaften Schmerz äussert. Beisichtigt man die Mundhöhle, so sieht man nur ganz ausnahmsweise eine der Härte entsprechende, jauchige Blase, gewöhnlich ist dieselbe schon geplatzt und es zeigt sich die Schleimhaut zu braunschwarzen Fetzen zerfallen.

Die Wange schwillt an und wird oedematös, das Oedem erstreckt sich über die ganze Gesichtshälfte, auch die nächst gelegenen Halsdrüsen werden infiltrirt. Die Haut ist dabei nicht geröthet, sondern blass, wochenlang glänzend. Der innern Zerstörung entsprechend wird die äussere Haut an der Stelle der ersten Härte blau, die Epidermis

Nist sich bei leiser Berührung ab und es zeigt sich, dass die Gangrän von innen nach aussen fortschreitend, an der Cutis angelangt ist. Das brandige Stück Wange, am Anfang kann von Grosse ngegrösse, contrahirt sich durch Vertractiong, es entsteht ein braunrother Graben zwischen der lebenden und mortificirten Haut, und dieser Graben dehnt sich peripherisch mehr und mehr aus, so dass von Stunde zu Stunde die brandigen Partheen an Umfang zunehmen. Der Brand erstreckt sich weiter und weiter, bis er in manchen Fällen die ganze Wange bis zum Angapfel, zum Ohre und zur Halsgegend ergriffen hat, und die Kinder das skellhafte Bild einer gräulichen Zerstörung bieten. Nicht nur nach aussen dehnt sich die Noma aus, sondern sie greift auch tief in die Kieferknochen. Der Ober- und zuweilen auch der Unterkiefer werden rasch necrotisch, die Zähne fallen aus und nach wenigen Tagen ist die Necrose so vollendet, dass man grosse Knochenstücke mit der Kortzange entfernen kann. Aus der wenig empfindlichen, unregelmässigen Geschwürsfläche ergiesst sich eine cadaverös stinkende, blutige Jauche. Die Ränder der gesunden Partheen sind hart und geröthet, zuweilen führen einige Linien vom Brande entfernt auf der scheinbar noch gesunden Wange Jauchehblasen auf, das unterliegende Gewebe mortificirt rasch und die Ränder des alten und neuen Brandgeschwürs nähern sich mehr und mehr, bis sie endlich eine um so grössere Brandfläche bilden. Untersucht man die brandigen Theile, so findet man viel freies Fett, Spuren von Muskeln, die Nerven sind weissgelb und die Gefässe mit Thromben erfüllt. Die Tarembase scheint sehr frühzeitig und in hohem Grade einzutreten, denn Blutungen kommen ausserordentlich selten vor. In 3—6 Tagen gehen alle diese grossartigen Zerstörungen vor sich.

Allgemeine Erscheinungen und Fieber sind zu Anfang unbedeutend und treten erst als Folge der örtlichen Zerstörung und der Jauchereception ein, bald aber stellen sich Diarrhöen colliquativer Art, Ohnmächten, Sopor oder Delirien ein und zuweilen schwellen zum Schluss auch die Füsse edematös an. In der Leiche findet man ausserdem häufig lobuläre Pneumonie, welche zu Lebzeiten bei dem tiefen Ergriffensein des ganzen Organismus nur wenige subjective und objective Symptome geboten hat. Die Diagnose der Noma ist leicht. Von allen anderen Arten von Stomatitides unterscheidet sie sich durch das schnelle Ergriffenwerden der äusseren Bedeckung und das rasche Umsichgreifen des Brandes. Die Prognose ist sehr äbel. Unter fünf Fällen, die ich zu beobachten hatte, ist nur einer genesen, und zwar mit einem schrecklichen Defect der Wange und Nase, der erst nach mehrfachen plastischen Operationen und nur mit grosser Verzerung der Nachtheile gedeckt werden konnte. Nach einer Zusammenstellung von Taurdes sind von 238 Fällen 63 genesen.

Behandlung.

Zur Verminderung des Geruches gibt man auch hier wieder das chlor-saure Kali in der bei der Stomatitis angegebenen Weise. Die Wirkung desselben ist aber keine eclatante, der Brand macht seine Fortschritte und der Geruch wird nur wenig gemindert. Zur möglichststen Verminderung desselben ist es notwendig, die Kinder täglich zu baden und mehrmals ihre Kleider zu wechseln, weil sie an dieselben

ihre mit Jauche beschmutzten Hände fortwährend abreiben. Durch Contamination der dem häufigen zunicht gelegenen gesunden Theile muss man den Fortschritt des Brandes aufhalten suchen. Als das passende Aetzmittel empfiehlt sich die concentrirte Salzsäure, womit täglich 2–3 Mal der ganze Rand der Noma anssen und innen bepinselt werden muss. Das Kind werde hierbei gut fixirt; denn der Schmerz ist sehr heftig und an der Schleimhautfläche der Noma muss mit kleinen Schwämmchen jedesmal die überflüssige Salzsäure abgepufft werden. Auf diese Weise gelingt es in einzelnen Fällen, dem Uebel Einhalt zu thun. Der Brand macht aber meistens unaufhaltsame Fortschritte und die Kinder sterben nach 2–14 Tagen unter den oben angegebenen Symptomen trotz aller Desinfection. Mit der roborenden Behandlung, Wein, Doct. Chinac. Eier etc. lässt sich bei diesen Kindern nicht viel ausrichten, indem sie gewöhnlich nichts dergleichen nehmen, am liebsten verstehen sie sich noch zu Milch oder Kaffee, wovon man ihnen möglichst oft und möglichst viel beizubringen sucht.

12) Der Soor.

Unter Soor, Mehlmaul, Schwämmchen, Mundstir, Muguet, Blaudat, Stomatitis pseudomembranacea, Stomatitis oromora, Aphthophyta, unter allen diesen vielen Bezeichnungen versteht man nur einen Process, nämlich die Bildung weisser Membranen in der Mundhöhle, welche mikroskopisch 1) aus einer Körnchenmasse, 2) aus Pilasorepithel und 3) aus Pilzen und ihren verschiedenen Entwicklungsstufen bestehen (Tafel III, Fig. 2). Robin hat diesen Pilz *Oidium albicans* genannt. Obwohl nun diese Krankheit ausserordentlich häufig vorkommt und sich jedem Arzte fast täglich zur Untersuchung aufträgt, obwohl die Mundhöhle allen Sinnen zugänglich ist, so findet man doch die Angaben der verschiedenen Autoren bis auf den heutigen Tag in vieler Beziehung differirend.

Der Soor befällt vorzugsweise kleine Kinder in den ersten Lebensmonaten, wird aber in einzelnen Fällen auch bei ein- und mehrjährigen Kindern und ausserdem auch bei kachektischen erwachsenen Individuen, namentlich Tuberculösen und Krebskranken, beobachtet.

Symptome.

Zuerst verändert sich die natürliche hellrothe Farbe der Mundhöhle: es tritt eine tief dunkelrothe an ihre Stelle, ungefähr so als wenn man eine dicke Schichte Himbeersyrup auf die Schleimhaut aufpinselt hätte. Diese Farbenveränderung findet sich nie in Form von Flecken oder Inseln, sondern ist gleichmässig über die ganze Mundhöhle ausgedehnt. Nur am harten Gaumen, wo die Schleimhaut fest mit dem Knochen verwachsen ist, und am Rande des Unterkiefers, wo die dem Durchbruche nahen Zähne eine bedeutende Ausdehnung und Spannung der darüberliegenden Schleimhaut verursachen, kann keine so beträchtliche Erweiterung der Capillaren stattfinden, und es ist deshalb die Rötthe hier weniger entwickelt; zuweilen sieht der ganze harte Gaumen ziemlich groß mit seiner gelbrothen Farbe von der übrigen dunkelrothen Schleimhaut ab. Die Zunge ist am dunkelsten gefärbt, und ihre Papillen, besonders die an den Rändern, ragen etwas

nale hervor. Die Temperatur der Mundhöhle ist hierbei dem Gefühle nach erhöht, exacte Thermometermessungen lassen sich in der Mundhöhle eines Kindes schwer anstellen. Zu gleicher Zeit wird die Berührung der Mundhöhle schmerzhaft, was die Kinder zu erkennen geben, indem sie, wenn man ihnen einen Finger in den Mund steckt, nicht wie gewöhnlich daran saugen, sondern unwillig durch Hin- und Herwenden des Kopfes den Finger zu entfernen suchen. Aus gleichem Grunde setzen sie beim Saugen häufig ab und rühen von dem durch die Schlüpfbewegungen hervorgerufenen Schmerz der entzündeten Schleimhaut einige Momente aus.

Ferner tritt eine Anomalie in den Secretionen der Mundhöhle auf. Die Schleimhaut verliert ihre Schlüpfbarkeit, fühlt sich klebrig an und saugt ein aufgelegtes Stückchen Filterpapier fest an, während ein solches auf einer normalen Schleimhaut nicht leicht haften bleibt. Höchst wichtig und aussehend für die Anschauung des ganzen Krankheitsprocesses ist die schon deutlich saure Reaction des Mundsecretes zu einer Zeit, wo noch keine anderen als die oben angeführten Veränderungen der Schleimhaut wahrgenommen werden können.

Wir haben in der Mundhöhle ein Gemisch von zweierlei Drüsensecreten, dem der Speicheldrüsen und dem der Schleimdrüsen. Reines Speicheldrüsensecret reagirt immer alkalisch und zwar am deutlichsten unmittelbar nach dem Essen, am undeutlichsten im nüchternen Zustande. Das Secret der Schleimdrüsen wird sehr bald sauer und diese saure Reaction zeigt sich beim Stehenlassen des frischen Schleimes immer deutlicher, indem sich in Folge dieser eintretenden Gährung rasch freie Säure bildet. Wir haben also in der Mundhöhle zwei entgegengesetzt reagirende Flüssigkeiten, und es wird nur auf deren quantitatives Verhältniss zu einander und ihren Concentrationsgrad ankommen, ob ihr Gemisch mehr die Eigenschaften des Speichels oder des Schleimes an sich trägt. Ist eine hinreichende Menge alkalischen Speichels vorhanden, so wird die im Schleim sich bildende freie Säure hiedurch neutralisirt, wo nicht, entsteht ein deutlich saurer reagirendes Mundsecret.

Die klebrige, hochrothe Schleimhaut beim Beginne des Sore reagirt immer sauer, wenn man sie auch mit Wasser abspült und eine Stunde lang durchaus mit keinem Nahrungsmittel mehr in Berührung gebracht hat. Schabt man eine so beschaffene Schleimhaut etwas ab, und untersucht das Abgeschabte mikroskopisch, so findet man neben den Epithelien schon eine beträchtliche Menge eiförmiger, scharf-contourirter, ausweilen schon zu zwei oder drei zusammenhängender Körper, welche sich deutlich als Pilzsporen zu erkennen geben. Man trifft wohl auch eine hochrothe sauer reagirende Schleimhaut, ohne irgendwo diese Sporen auf ihr entdecken zu können, niemals aber ist es mir gelungen, auf einer gesunden blasse-rothen Schleimhaut, welche eine Stunde vorher mit Wasser gut gereinigt und mit Nahrungsmitteln nicht mehr in Contact gebracht worden ist, dieselben zu beobachten. Daraus erhellt, dass wohl diese Erkrankung der Schleimhaut anfänglich ohne Pilzbildung, aber nicht eine Pilzbildung auf gesunder Schleimhaut entstehen kann. Diese Pilze verursachen nicht die saure Reaction und Röthung, sondern die im Munde sich sammelnden, chemisch veränderten Drüsensecrète reizen die Schleim-

haut, machen sie roth, wärmer und schmerzhaft und gestalten sie zu einem für die Pilzwucherung günstigen Boden um. Die Pilzbildung macht in der Mundhöhle gerade solche Fortschritte, wie auf irgend einer faulen Obstsorte, nur mit dem Unterschied, dass hier der Boden sich nicht mehr verändert, während er dort einem lebenden Organismus anheftet und deshalb keinen Augenblick aufhört, sich von unten zu regeneriren und an der Oberfläche abzustossen.

Bei der Besichtigung der Mundhöhle bekommt man nun, wenn diese Pilzwucherung nur wenige Stunden gedauert hat, weisse Punkte zu sehen, welche bald an einzelnen Stellen confluiren, grössere Flecke bilden und oft genug die ganze Schleimhaut mit einem dicken weissen Schorf, der an der Luft gählig vertrocknen und durch Blutbeimischung selbst braun gefärbt werden kann, bedecken. Ueber diese weissen Membranen konnte man sich bisher nicht recht einigen, besonders ist die Art ihrer Befestigung auf der Schleimhaut, ihr Verhalten zu den Epithelien und der Ort ihres ersten Auftretens Controverso.

Was zuerst ihren Zusammenhang mit der Schleimhaut selbst betrifft, so behaupten die Einen, es liessen sich diese Membranen ohne Blutung von der unterliegenden Schleimhaut trennen, die Andern verneinen dies, Beide aber haben Recht. Es kommt nur darauf an, wie lange nach dem Entstehen man sie zu trennen versucht. Kurz nach ihrem Auftritt ist der Zusammenhang wirklich ein sehr fester und kann auch von geübter Hand nicht ohne kleine Blutung getrennt werden, während nach einigen Tagen sich die Membranen von selbst lösen und die Mütter ohne alle Blutung oder Schmerzempfindung die grössten Stücke einfach mit dem Finger aus dem Munde wischen.

Zur Beantwortung der Frage von dem Epithelien muss ich zunächst auf die mikroskopische Beschaffenheit dieser Membranen überhaupt genauer eingehen. Man bemerkt bei jeder Soormembran: Sporen, Sporenträger, Thallusfäden und Pflasterepithel alles eingehüllt und umgeben von einer feinkörnigen weissen Masse, aus welcher man nur an den Rändern durch Querschnitte die genannten Gebilde hervortragen sieht. Gelingt es, ein grösseres Stück zu lösen, so dass man die Flächen unterscheiden und gesondert untersuchen kann, so findet man an der freien Fläche die meisten Sporen, weniger Thallusfäden und viel ausgebildetes Pflasterepithel, an der andern der Schleimhaut zugekehrten Fläche wenig oder gar kein Pflasterepithel, wenig Sporen, aber ein dichtes Gewebe von Thallusfäden, das die ganze Körnchenmasse durchsetzt. Legt man ein Stückchen Soormembran einen Tag lang in eine concentrirte Lösung von kohlensaurem Kali, so schwindet hier zuerst das Epithel, die weisse Körnchenmasse wird homogen, durchscheinender und ist nur mehr an einzelnen Stellen deutlich zu erkennen, die Thallusfäden aber, deren dichtes Gewebe man nun durch die ganze Dicke der Membran deutlich unterscheiden kann, haben keine Veränderung erlitten.

An einzelnen gelben Stellen der Membranen sieht man einen diffusen, die Körnchenmasse gelbfärbenden Farbstoff, der seinen Ursprung wohl kleinen Blutungen zu verdanken hat. Man kann zweierlei Arten von Thallusfäden unterscheiden.

1) Breitere mit vielen Querleisten, ganz nach der Form der Hef-

pilze und 2) schämlere mit fast gar keinen Querleisten. Diese letzteren haben weniger scharfe Contouren, sind meistens etwas granulirt und kommen überall und in allen Fällen vor, während die erste Art nur ausnahmsweise gefunden wird. Es gedeihen diese Pilze nicht bloss in der Mundhöhle, sondern wachsen auch auf andern feuchten gährenden Flächen, z. B. auf einer Apfeldecke, fort, wie durch meine Versuche (Hense und Pfeufer's Zeitschr. N. F. VIII. Bd. 2. Heft) dargethan worden ist. Auch werden Erosionen an den äusseren Theilen der Lippen und selbst am Anus damit bedeckt.

Nach all dem Gesagten hat man sich die Entstehung der weissen Membranen und das Verhalten der Pilze zu denselben auf folgende Weise vorzustellen: Die ersten Thallusfäden wachsen auf und zwischen den obersten Epithelschichten, suchen überall, wie die Wurzeln eines Baumes auf steinigem Erdreich nach günstigem Baun und Boden und schliessen endlich die ganze Epithelschichte in ein dicht verfilztes Gewebe ein. Auf der Oberfläche der Schleimhaut selbst, wo die Epithelien gebildet werden, angelangt, reizen sie dieselbe zu vermehrter Secretion oder vermehren wenigstens die durch die saure Reaction der Mundflüssigkeit bedingte Rötzung und es entsteht nun aus dem für die Epithelbildung geeigneten Hornstoff kein vollendetes Epithel mehr, sondern bloss eine dicke Schichte körnigen Exsudates. Die Pilze sind also weder auf dem Epithel noch unter demselben, sondern sie schliessen es ein; in den unter der Schleimhaut zugewandten Schichten kommt es aber nicht mehr zur Bildung fertigen Pflasterepithels, sondern die Thallusfäden benützen sich gleich der Körnchenmassen und durchsetzen sie nach allen Richtungen hin.

Was den Ort des ersten Auftretens betrifft, so geben viele Autoren an, dass die ersten weissen Punkte Schleimdrüsen entsprächen, und dass die Pilze aus diesen hervorstüchen. Es lässt sich diese Angabe weder beweisen noch widerlegen, indem man bekanntlich am lebenden Kinde die Mündungen dieser Drüsen nicht unterscheiden kann und an der Leiche das Auffinden von Thallusfäden in den Drüsen keinen Beweis abgibt, dass sie wirklich hier früher als auf der freien Schleimhäutfläche entstanden sind.

Bezüglich der Ausbreitung des Soors hat Reckhold zuerst gefunden, dass sich der Pilz an das Pflasterepithel hält und auf Flimmer- und Cylinderepithel nicht keimt, es gehören also zu seinem Gebiete die ganze Mundhöhle, der Rachen, der Oesophagus und der Kehlkopf bis zu den oberen Stimmbändern, wodurch die zuweilen sich einstellende Heiserkeit häufiglich erklärt ist. Die ziemlich verbreitete Ansicht vieler älterer Aerzte, dass der Soor sich in den Magen und Darmkanal fortsetzen könne, wurde noch niemals durch eine Section begründet. Wenn auch die Möglichkeit, dass verschluckte Soormembranen unverdaut durch den Anus wieder abgehen, durchaus nicht in Abrede gestellt werden darf, so resultirt hieraus noch lange nicht ihre Entstehung auf der Magen- und Darmschleimhaut.

Die Dauer des Soors ist in der Regel eine kurze und erstreckt sich bei kräftigen Kindern und zünftlicher Pflege fast nie über acht Tage hinaus. Bei atrophischen Kindern, besonders wenn ihre fortwährende Unruhe mit dem Schmelzer gestillt wird, besteht er mehrere Monate bis zum Tode.

Diese Erkrankung der Mundhöhle ist besonders in Fındel- und Gebärfhäusern ausserordentlich häufig mit Darmcatarrh complicirt, und zwar mit Darmcatarrh von höchst pürichäsem Charakter. Diese Complication ist so gewöhnlich, dass Valleix, Arzt am Pariser Fındelhause, die Darmaffection für einen integrirenden Theil der Erkrankung hielt und als solchen beschrieb, was jedoch durch Beobachtungen der Privatpraxis sich hinlänglich widerlegt.

Die Kinder bekommen Clotura ähnliche Symptome, collabiren rasch, die grosse Fontanelle sinkt ein, die Bulbi treten tief in die Augenhöhle zurück, die Haut verliert ihre Elasticität und Wärme, und die Fontanelster nehmen oft schon nach 12–24 Stunden merklich ab. Die grünen, dünnflüssigen, stark nach Fettsäuren riechenden Fäces reagiren scharf deutlich sauer und röthen und erodiren in der kürzesten Zeit den Anus, die Genitalien, die innere Schenkelfläche und die Fersen. Dass diese Diarrhöe oder vielmehr ihre Folgen die Kinder tödtet und nicht die Mundkrankheit, geht daraus hervor, dass zuweilen Kinder bei starkem Soor keinen Darmcatarrh bekommen und nach Abtossung der Membranen sogleich wieder vollkommen gesund sind.

Die Ursachen des Soors sind nun: 1) Die vorwiegend saure Reaction der Mundhöhle, welche auf einer mangelhaften Speichelsecretion bei Neugeborenen beruht. Es gewinnt die Quantität des sauren Schleimes das Uebergewicht über den alkalischen Speichel, und das Gerüsch reagirt dann sauer. 2) Die Uebertragung von einem Kinde auf das andere, besonders durch ein- und dasselbe Amme in den Fındelhäusern. 3) Der fast durchgängig gährende Substanzen enthaltende Schnüßel, welcher zudem an allen schmutzigen Tischen und Winkeln herumgewischt und dann den Kindern in den Mund geschoben wird.

Therapie.

Aus einer grossen Reihe von Versuchen, die ich in dieser Richtung angestellt, geht hervor, dass eine Soormembran im Zuckerwasser, Brunnenwasser und in nicht alkalisch reagirenden Salzlösungen bei einer Temperatur von circa 35° R. nach zwei Tagen Anstau einer neuen Strachwerkkes von Fäden ausstellt, während dies in alkalischen oder in Metallsalzen nicht zu beobachten ist. Wirklich gelöst werden die Soormembranen nur in concentrirten kausischen Alkalilösungen, die zu therapeutischen Zwecken natürlich nicht benutzt werden können. Wir haben also kein brauchbares Mittel, die einmal vorhandenen Membranen in der Mundhöhle chemisch zu zerstören, wohl aber können wir ihre Weiterverbreitung aufhalten durch örtliche Anwendung schwach alkalisch reagirender Salzlösungen. Die ganze Therapie beruht darauf, die saure Reaction der Mundhöhle zu beseitigen und es entspricht in der That eine Lösung des schon längst in Gebrauch gezogenen Borax diesem Zwecke vollständig. Es genügt, wenn man jede Stunde einmal eine Boraxlösung von 1,0:25,0 auf die Schleimhaut pinseln lässt. Die günstige Wirkung dieses Mittels wird aber zum größten Theil durch die allgemein übliche Beimischung von Honig oder Syrup wieder paralytirt, indem zuckerhaltige Substanzen die Fäulbildung entschieden befördern. Durch diese Boraxlösung wird keine Diarrhöe erzeugt, noch eine schon vorhandene vermehrt. Es ist hierbei aber unbedingt zöth-

wendig, die Schnuller wegzulassen, selbst Milchkost schadet durch ihren Gehalt an Zucker und Casein. Am besten reicht man, so lange die Membranen bestehen, als Nahrung dünne Bouillon oder Schleimuppe und zum Getränk Infus. Verhase. mit wenig oder gar keinem Zucker.

Inhalt.

a) Die Bedeutung des Zungenbeleges bei Kindern.

Vor allem ist zu bemerken, dass bei den meisten Säuglingen in den ersten Lebenswochen die Zunge einen weissen Beleg zeigt, wobei die Kinder nicht die geringste Verdauungsstörung erkennen lassen.

Ausserdem wird bei den meisten Magen- und Darmaffectionen kleiner Kinder die Zunge weiss belegt, und wahrscheinlich erst in Folge dieses Belegseins nimmt der Appetit ab. Dicke Belege kommen bei Kindern selten vor, in der Regel haben wir nur einen leichten weissen Anflug, der aber noch lange Zeit fortbestehen kann, nachdem der Appetit schon wiedergekehrt ist, und ebenso durch örtliche Krankheiten der Mundhöhle, Sore, Stomatitis catarrhalis, Diphtheritis, Traumen, chemische Reize und Verbrennungen, als durch eine Erkrankung des Magens oder Darmes erzeugt wird. Es kommen auch löthende oder wenigstens einige Monate bestehende partielle Belege der Zunge vor, welche ohne allen Einfluss auf den Fortbestand der Gesundheit sind. Man hat hierfür sogar einen eigenen Namen, *Pityriasis linguae*, erfunden. Sie bestehen in weissen Inseln oder weissen Kreisen und Halbkreisen auf der übrigen normalen, rosenrothen Zunge, und verdanken ihren Ursprung lediglich einer Anhäufung von Epithelien. Bei atrophischen Kindern kommen zerstreut auf einer ganz glatten rothen Zunge quere Einrisse vor, welche auf dem Riss einen gelben Grund durchblicken lassen, den Cantharisationen hartnäckig widerstehen und bis zum Tode nicht mehr verschwinden. Bei älteren Kindern hat der Zungenbeleg im Scharlach, den Masern, dem Typhus etc. dieselben Eigenschaften wie bei Erwachsenen, und wird bei jeder einzelnen Krankheit speciell beschrieben werden.

Die diagnostische und praktische Verwerthung des Zungenbeleges der älteren Kinder ist übrigens auch keine besonders grosse. Bei einem gleichmässigen, wenn auch nur ganz dünnen Belege ist es rathlich, die Diät der Kinder fortwährend zu überwachen und durch Reguliren derselben eine bessere Verdauung, und alsbald eine Reinigung der Zunge zu erzielen.

b) Dentitionsschmerzen. *Dentitis difficilis*.

Nachdem die physiologischen Verhältnisse des Zahndurchbruches schon im allgemeinen Theil ausführlich abgehandelt sind, erübrigt nur mehr auf die pathologischen Zustände, die während desselben entstehen und entschieden davon abhängen, aufmerksam zu machen.

Rötung, Schwellung, Schmerz und vermehrte Secretion, oder kurz die catarrhalische Stomatitis, findet sich in allen Fällen. Die häufige Bildung von schmerzhaften Geschwüren ist als eine Steigerung derselben anzusehen und nach den pag. 82 angegebenen Vorschriften zu behandeln. Das Bedürfniss der Kinder, auf etwas zu beißen, be-

riedigt man durch ein Stück Kitbschwurzel oder durch einen fest an den Finger gesteckten silbernen Fingerhut.

Als allgemeine oder sympathische Zufälle beim Zahndurchbruch machen sich geltend:

1) Fieber, bestehend in Schlaflosigkeit und erhöhter Hauttemperatur, besonders an der Stirn und den Wangen, welche häufig auch einseitig roth werden. Da an den Kindern durchaus keine andere Ursache des Fiebers entdeckt werden kann und dasselbe doch sehr häufig beim Zahndurchbruch sich einstellt, so ist anzunehmen, dass es durch letzteren bedingt ist.

2) Convulsionen, die sogenannten Fraisen. Die hier auftretenden Convulsionen haben durchaus nichts Charakteristisches, sondern verhalten sich wie überhaupt alle symptomatischen Krämpfe. Die häufigsten Muskelcontractionen kommen an den Augenmuskeln vor; die zahnenden Kinder schlafen oft mit halbgeöffneten Augen, die Bulbi nach oben gerichtet, und man sieht durch die ziemlich weit offene Lidpalpe nichts als die weisse Sklera, ein Anblick, der für unerfahrene Eltern etwas so Erschreckendes hat, dass gewöhnlich ärztliche Hülfe gesucht wird. Zuckungen der Gesichtsmuskeln, ein eigenthümliches Lächeln im Schlafe und leise Zuckungen der Extremitäten kommen bei vielen zahnenden Kindern vor, es sind das überhaupt reizbare Kinder, welche auch bei anderen krankhaften Zuständen, ja schon bei Gemüthsbewegungen Reflexerscheinungen bekommen. Da sie bei vielen Kindern jedesmal, so oft ein Zahn durchbricht, sich einstellen, so ist nicht einzusehen, warum sie nicht direkt mit der Zahnung in Verbindung gebracht werden sollen. Es kommen übrigens mit und ohne Zahndurchbruch bei einzelnen Kindern epileptische Anfälle vor, welchen sie in wenigen Minuten erliegen können, und welche in der Section durchaus keine materielle Veränderung der Nervencentren nachweisen.

Behandlung.

Da diese Convulsionen vornehmlich bei Kindern mit trager Verdauung und hartem Stuhlgange auftreten und mit eintretender Diarrhoe schwinden, so liegt in der Vermehrung des Darmsecretes und in der Beschleunigung der peristaltischen Bewegung die erste Indication. Man gibt ihnen ein oder mehrere Klystiere mit kaltem Wasser, wenn dies nicht genügt, etwas Manna oder einige Kaffeeöl-Tinct. Rhei aquosa. Ist aber die Haut dabei sehr heiss, so kann man Stuhl und Abnahme der Hauttemperatur zugleich durch einige Calomelpulver 0,01—0,015 erzielen. Gegen die Schlaflosigkeit zahnender Kinder ist Bromkalium, p. des. 0,05, stündlich ein Pulver bis zur Wirkung, ein vorzügliches Mittel, welches vor den Opiaten den Vorzug hat, dass es auch die Darmsecretion etwas anregt. In England und Frankreich hat man mit der Scarification des Zahnfleisches viel Lärm gemacht. Die einen empfehlen einen Kreuzzchnitt, die andern die ovale Abtragung der ganzen Kappcheta, das die Zahnspitze noch bedeckt. Vorsichtiger Weise wird aber bei allen diesen Berichten und Anpreisungen hinzugesetzt, dass der Zahn am Durchbruche sein müsse, sonst helfen die Scarificationen nichts. Ich habe dieselben auch öfter gemacht, habe aber immer gefunden, dass die scarificirten Wunden einer entzündeten Schleimhaut sehr schlecht heilen und längere Zeit ulceriren, dass aber

die Nervensymptome beobachteten, bis sich künstlich oder spontan Diarrhöe einstellte.

Wenn man freilich so lange warten muss, bis der Zahn „sehr nahe“ am Durchbrechen ist, so ist man überhaupt am Ende des ganzen Symptomencomplexes, und dann hilft eine jede beliebige unschädliche Behandlung gerade so viel als diese mit ziemlichlichen Schmerzen verbundene, stündlich oder zweistündlich eine kalte Waschung oder Begiessung des ganzen Kopfes vorzunehmen, ist ein zwar nicht sanftes und bei den Angehörigen nicht beliebtes aber sehr entschieden nützliches Heilverfahren gegen alle Convulsionen der Kinder und somit auch gegen die während der Dentition.

3) Hauteruptionen. Kinder mit feiner, glatter Haut, oder von Eltern stammend, die mit chronischen Hautkrankheiten behaftet sind, bekommen in jeder der fünf Zahnperioden eine oder die andere Ausschlagsform, die in den späteren Zahnperioden ziemlich dieselben anatomischen Merkmale zeigt, welche bei ihrem ersten Auftreten sich einstellten. Die Hauptformen sind nun:

a) Urticaria. Ausbruch von Quaddeln (Pomphi). Man versteht hierunter stark juckende Anschwellungen der Haut vom Umfange mehrerer Linien und von unregelmässig runder, zuweilen auch länglicher Gestalt, die nicht stark prominiren und eine abgeplattete Oberfläche haben. Sie haben meist normale Hautfarbe, während die sie zunächst umgebenden Hautpartieen geröthet erscheinen. Zuweilen sind die Quaddeln wohl auch blässer als die übrige Haut. Eine Lostrennung der Epidermis von der Cutis findet nirgends statt. Durch Brennessen (daher der Name), bei einzelnen Individuen auch durch Flohstiche entstehen Quaddeln, welche in keiner Beziehung von denen zu unterscheiden sind, die durch innere Ursachen, z. B. die Dentition veranlasst werden. Sie verschwinden nach einer oder mehreren Stunden fast spurlos, der rothe Hof ist noch eine kurze Zeit zu erkennen, erblasst aber auch wieder sehr rasch, und dann ist von der ganzen bedeutenden Eruption nichts mehr zu entdecken. Von diesen Quaddeln schiessen bis zu 15 und 20 bei den Kindern mit- oder nacheinander auf, verschwinden wieder und werden an andern Stellen durch neue ersetzt. Gewöhnlich sistirt diese Hautaffection erst nach Beendigung einer Zahnperiode und bricht bei Beginn einer neuen wieder neu hervor. Die Behandlung muss sich darauf beschränken, durch Kleinfäder und Fetteinreibungen das höchst lästige und die Kinder heimgreifende Jucken möglichst zu mindern.

b) Löken und Prurigo. Man versteht hierunter zwei papulöse Exantheme, von denen das erstere, auch Löken *straphilus* genannt, die harten Papeln meist in Haufen beisammen, das zweite seine flacheren, niedrigen Papeln vereinzelt stehen hat. Die Knötchen sind in beiden Exanthenen zu Anfang blässer als die übrige gesunde Haut, werden aber bald durch Kratzen ihres Gipfels beraubt und zeigen nun statt dessen eine kleine braune Kruste von der Grösse eines Nadelkopfes. Sticht man eine Lichenpapeln mit einer feinen Nadel ganz oberflächlich an, so dringt ein Tropfen Blut hervor, bei einer Prurigopapeln aber kommt kein Blut, sondern ein Tröpfchen seröser Flüssigkeit zum Vorschein, durch anhaltendes Kratzen aber bluten schliesslich auch die Prurigopapeln. Wenn diese vorkratzten Papeln nahe bei einander

standen, so vereinigen sich die Krusten und stellen dann grössere Geschwürsflächen dar, deren ursprüngliche Entstehungsweise nicht mehr zu erkennen ist.

c) *Eczem und Impetigo.* Unter Eczem versteht man eine Hautentzündung, bei welcher durch Anhäufung von flüssigem Exsudat unter der Epidermis sich kleine gewöhnlich nahe bei einander stehende Bläschen bilden, und unterscheidet ein Eczema simplex und rubrum. Bei Eczema simplex ist die Haut nur wenig geröthet und nicht geschwellen. Nach dem Eintrocknen oder Bersten der Bläschen bilden sich dann gelbe Schuppen und Krusten, nach deren Abfall auch eine neue Oberhaut entsteht. Das Eczema rubrum entwickelt sich meist aus dem ersteren und unterscheidet sich von demselben dadurch, dass neben der Bläschenbildung eine viel stärkere Röthe und Anschwellung der Haut besteht, und dass dann der Verlauf ein viel chronischerer wird. Nach Abfall der Krusten bleibt noch lange die Neigung zu neuer Bläschenbildung und eine infiltrirte, rothe schuppige Haut zurück. Einen noch heftigeren Entzündungsgrad, als er beim Eczema rubrum beobachtet wird, bedingt der Impetigo. Statt der Bläschen entstehen beim Impetigo grössere mit Eiter gefüllte Pusteln, gewöhnlich nahe aneinander, so dass nach ihrem Platzen dicke, käsige, grüngelbe oder braune Kruste sich bilden, nach deren Abfallen das geröthete Corium blossliegt, stark nässt und bald wieder von neuen Krusten bedeckt wird. Nach der Heilung bleibt die erkrankte Hautstelle noch längere Zeit infiltrirt und braunroth.

Die unter b und c aufgeführten Ausschlagsformen heilen nach Durchbruch eines Zahnes natürlich nicht mit einem Male, bessern sich aber ganz entschieden, während sie vor demselben sich verschlimmern. Auch soll durchaus nicht gesagt sein, dass sie immer mit dem Zahne zusammenhängen, da es ja bekanntlich viele Kinder gibt, die nach vollendeter erster Dentition erst diese Ausschläge acquiriren. Das aber ist Thatsache, dass sehr viele Kinder mit dem Durchbruch des ersten Zahnes eines dieser Exantheme, am häufigsten den Lichen, bekommen und gewöhnlich längere Zeit durch behalten, dann wieder verlieren, um bei neuer Dentitionsbeschwerden von Neuem davon befallen zu werden.

Die Behandlung dieser Hautkrankheiten ist ausserordentlich einfach. Die Haare müssen sorgfältig entfernt werden, wenn unter ihnen sich Ausschlag findet. Dicke Krusten werden mit Oel erweicht, und dann die Haare mit einer guten Scheere unter der Kruste an der Wurzel abgeschnitten. Gegen grosse Verbreitung und heftiges Jucken habe ich eine Einreibung von Ung. Zinc, täglich zwei Mal, sehr vorthheilhafte gefunden. So lange die Kinder kein Fieber haben, müssen sie täglich $\frac{1}{4}$ Stunde lang in ein nicht zu warmes Weizenkleinbad gesetzt werden. Interne Mittel sind hierbei nicht streng indicirt, die aber, welche die Verdauung stören, sind contraindicirt. Bei Eczema rubrum, das oft lang dauert, kann Liquor arsenicalis Fowleri, täglich 2–5 Tropfen nothwendig werden, wofür bei den Hautkrankheiten das Specillare berichtet werden wird. In allen Fällen ist es nöthig, den hantkranken Kindern die Nägel recht kurz zu schneiden, um das Kratzen möglichst unschädlich zu machen.

4) *Darmercatarrh.* Wenn ein Kind mit starker Rötung des Mundes und vermehrter Speichelsekretion zähnt, so bekünnt es b

Folge des verschluckten Speichels immer dünne Ausseerungen, indem der Salzgehalt des Speichels gleich einem leichten salinischen Abführmittel wirkt. Eine nicht zu profunde Diarrhöe von 5—6 Stühlen in 24 Stunden ist für die zahnenden Kinder sehr wohlthätig, weil die Gehirnerscheinungen hiedurch am sichersten vermieden werden. Dasselbe tritt auch in der That ebenso häufig auf, als die Stomatitis catarrhalis, man könnte beide Prozesse füglich zu den physiologischen Vorgängen rechnen, wenn ihre Steigerungen, die doch oft genug zur Beobachtung kommen, sich nicht entschieden als Krankheiten und zwar ersten Charakters zu erkennen gäben. Es kommt nämlich der Uebergang von diesem einfachen Darmcatarrh zu einer Infiltration des Follikelapparates der Schleimhaut, verbunden mit profussem Durchfall und Ueberschuss rascher Abnahme des Fettes und der Kräfte, sehr häufig vor und endet in den meisten Fällen mit äusserstem Collapsus und dem Tode des Kindes.

Die Behandlung fällt mit der der Darmcatarrhe, aus anderen Ursachen entstanden, zusammen und wird bei den Erkrankungen des Darmtractes ausführlicher erklärt werden.

5) Bronchialcatarrh. Es gibt Kinder, welche beim Durchbruch eines jeden Zahnes eine heftige Bronchitis, die nach dem Durchbruch alsbald wieder verschwindet, bekommen. Diese Bronchitis scheint eine äussere Veranlassung zu haben. Der massenhaft secretirte Speichel bei der Stomatitis catarrhalis durchlässt nämlich fortwährend die die Brust umhüllenden Kleider und bringt eine Temperaturerniedrigung der Brust zu Stande, als deren nächste Folge sich Schwellung und vermehrte Secretion der Bronchialschleimhaut einstellt. Werden die Kleider nicht mehr durchlässt oder wird die Brust wenigstens durch wasserdichtes Gewebe sorgfältig geschützt, so entsteht diese Bronchitis beim Durchbruch späterer Zähne nicht mehr. Mir sind schon so elegante und oft sich repetirende Beispiele dieser Dentitionsbronchitis vorgekommen, dass ich nicht anstehen, einen Theil der Bronchialcatarrhe zur Dentitis difficilis zu rechnen.

Behandlung.

Man lässt recht grosse gut ausgeschnittene Geisselbälgen anfertigen und sie auf der Rückseite mit der jetzt überall und zu billigen Preisen käuflichen gewalzten Guttapercha füttern, und wird fast ohne Ausnahme bemerkt, dass dann kein Husten sich entwickelt.

6) Schliesslich muss noch eine hlenorrhoidische Erkrankung der *Conjunctiva palpebrarum*, eine allerdings seltene Complication beim Durchbruch der oberen Backen- und Eckzähne erwähnt werden. Es schwellen hierbei pöthlich beide Augenlider, vorzüglich aber das obere an und sind so infiltrirt, dass man nur mit der grössten Mühe und kaum ohne Blutung der gespreizten Augenlider den Bulbus zu sehen bekommt. Letzterer ist übrigens mit Ausnahme einer Injection und leichten Schwellung seiner *Conjunctiva normal*, die *Cornua* sah ich noch nie ergriffen. Das Secret ist nicht so gelb und eiterig dickflüssig wie bei Ophthalmoblepharitis neonatorum, sondern mehr schleimig, fadenziehend, dem Nasenschleim nach überstandnem Catarrh der Nasenschleimhaut sehr ähnlich; von einer Ansteckungsfähigkeit desselben auf das andere Auge oder auf andere Individuen konnte ich nie

etwas erfahren. Die Umgebung der Lider findet sich gewöhnlich erodirt. Untersucht man nun bei einem mit dieser Form von Augenentzündung befallenen Kinde die Mundhöhle, so findet man eine schmerzhafte Rötze und Geschwulst des correspondirenden Oberkiefers und einen oder zwei Böcker, dem durchbrechenden ersten Backenzahne oder dem Eckzahne, der seine populäre Benennung „Augenzahn“ also nicht ohne Grund hat, entsprechend.

Es hat übrigens diese Augenentzündung gar nichts Wunderbares, wenn man bedenkt, dass der Boden der Highmor's-Höhle oft kaum von Papierdicke ist und also eine Fortsetzung der Congestion oder Entzündung auf die Schleimhaut dieser Höhle leicht sich ereignen kann. Die Schleimhaut des Antrum Highmori steht aber durch die Nasenhöhle und den Thalamussack direct mit der Conjunctiva in Verbindung und wir haben hier eine einfach fortgepflanzte Schleimhautentzündung. Die Prognose dieses sehr gefährlich aussehenden Uebels ist günstig. Ich habe früher nach Vorschrift der grössten Ophthalmologen diese Kinder viel mit Hollensteincauterisationen gequält und war entsetzt von meinen günstigen Erfolgen. Seit mehreren Jahren habe ich aber wenigstens ein Dutzend Kinder nur mit trockener Wärme ohne Cauterisation behandelt und eine noch schnellere und schmerzlosere Heilung erzielt. Ich lege auf das Auge einen grossen Leinwandfleck mit einfachem Cerat oder Ung. Zinci bestrichen und hinde über den Fleck gewärmte lockere Kleinsäckchen. Alle zwei Stunden lasse ich den Ceratfleck entfernen, das Auge mit einem spitzen Stückchen Schwamm in warmes Wasser getaucht, sanft reinigen und dann mit den warmen Säckchen sogleich fortfahren. Nach einem, längstens zwei Tagen ist das Oedem schon so weit eingesunken, dass die Kinder das Auge wieder ziemlich gut öffnen können, worauf sie die Kleinsäckchen gewöhnlich nicht mehr dulden, und wieder nach einigen Tagen ist an dem erkrankten Auge nichts mehr als einige Rötzung und Reizbarkeit der Lider zu entdecken. Untersucht man nun die Mundhöhle, so findet man die Stomatitis geringer oder ganz verschwunden und eine vorher nicht füllbare Zahnschuppe durchgehrochen. Leicht adstringirende Augenwässer, Zinc. sulfur. oder Cupr. sulfur. 2:1000, können während und nach Abnahme der Geschwulst der Lider mit einigen Vortheil eingebracht werden.

Dies sind die hauptsächlichsten und häufigsten Complicationen des Zahndurchbruchs, deren wirkliche Abhängigkeit von demselben allen Averten längst bekannt ist. Eine etwas ausführlichere Besprechung des Zahneizes erschien mir um so nöthiger, als bezüglich der Bedeutung dieser Symptome nach beiden Seiten hin Uebertreibungen vorkommen. Während viele Hausärzte, die keine eingehenderen pädiatrischen Studien gemacht haben, so ziemlich alle pathologischen Vorkommnisse, welche einem Kinde vom 2. bis 30. Lebensmonate zustossen, einfach mit *Dentitis difficilis* bezeichnen, gibt es auf der anderen Seite wieder vollkommenere Skeptiker, welche diese sämtlichen Symptome als bloss zufällig mit dem Zahndurchbruche zusammenstehend ansehen. Dass diese letztere Anschauung nicht richtig ist, lässt sich übrigens auch statistisch nachweisen.

Nach Jersel in Amsterdam, welcher die Kindersterblichkeit dieser Stadt für einen Zeitraum von 30 Jahren zusammengestellt hat, tritt

das erste und grösste Maximum selbstverständlich auf den ersten Lebensmonat. Von nun an sinkt die Sterblichkeit bedeutend und erreicht ihr zweites Maximum zwischen dem 3. und 4. Lebensmonat. Im 5. und 6. fällt sie wieder auf $\frac{1}{2}$ der vorigen Monate herab, um endlich im siebenten und achten ihr drittes Maximum zu erreichen. Die Sterblichkeit ist in diesen letzten Monaten 3–4 Mal so gross als in den vorhergehenden. Im 9. und 10. nimmt sie wieder ab und sinkt im 11. und 12. auf das entschiedenste Minimum des ersten Lebensjahres herab. Da nun gerade im 7. und 8. Lebensmonate der Zahndurchbruch in vollem Gange ist, so liegt es doch sehr nahe, die constant grössere Sterblichkeit mit diesem Vorgange in Zusammenhang zu bringen.

B. Parotitis.

1) Entzündung der Ohr-Speicheldrüse. Parotitis.

Es gibt drei Arten von Parotitis: a) die idiopathische, b) die secundäre und c) die metastatische Parotitis.

a) Die idiopathische Parotitis tritt fast nur epidemisch auf und hat wegen ihrer allgemeinen Verbreitung und dem fast komischen Aussehen, das sie den Kranken verleiht, eine Menge zum Theil scherzlicher Namen, als Ziegenpeter, Bauernwetzol, Mumps, Tölpelkrankheit etc., erhalten. Sie hat viel Analogieen mit den neuen Exanthemen, sie befällt den Menschen nur einmal, trifft vornehmlich das jugendliche Alter und hat einen ziemlich cyclischen Verlauf, ist aber zum Unterschied von jenen nicht contagios. Kinder unter einem Jahre werden kaum davon ergriffen. Am häufigsten erscheint sie im Frühjahr, zuweilen auch im Herbst: an den feuchten Küstengegenden von Holland, England und Frankreich soll sie endemisch sein.

Symptome.

Gewöhnlich gehen dem Mumps einzelne Vorläufer voraus. Die Kinder sind einen oder einige Tage matt, theilgelahmt, fiebern, verlieren den Appetit, legen sich freiwillig zu Bett, reizbare Kinder bekommen wohl auch Gehirnsymptome, Kopfschmerz, Delirien, Convulsionen, gefräßige Kinder erbrechen ihre letzte ohne Appetit hinuntergewürgte Mahlzeit. Nach einem, längstens 2–3 Tagen bekommen sie unter einem Ohr Schmerz, der sich durch Kauen, Öffnen des Mundes oder Druck von aussen bedeutend steigert. Zu gleicher Zeit bemerkt man eine Anschwellung der Parotisgegend, die Grube zwischen Unterkiefer und Zitzenfortsatz ebnet sich vorerst, statt ihrer erhebt sich aber bald an dieser Stelle eine Geschwulst, welche das Ohrflüppchen nach aussen schiebt und sich weit über die Contouren der Drüse hinaus erstreckt. Das Unterhautzellgewebe der entsprechenden Wange bis zum unteren Augenlid, und des Halses wird serös infiltrirt, so dass die Bewegungen des Unterkiefers und alle mimischen Bewegungen der Gesichtsmuskeln auf der erkrankten Seite unmöglich werden. Die Härte ist an der Stelle, wo die Drüse selbst liegt, am bedeutendsten und nimmt peripherisch ab. Die äussere Geschwulst ist ziemlich weich, teigig, der Fingerdruck hinterlässt eine Delle. Die die Geschwulst deckende Haut

ist gewöhnlich etwas geröthet. Oft schwillt nur die eine Ohrspeicheldrüse an; wenn beide anschwellen, so geschieht diess gewöhnlich nicht gleichzeitig, sondern die eine erkrankt ein paar Tage später als die andere, auch ist es nicht notwendig, dass die Geschwulst auf beiden Seiten gleich gross wird. Auf der Höhe der Krankheit können die Kranken den Mund fast gar nicht öffnen und sprechen nur sehr undeutlich: die Speichelsecretion ist selten vermindert, eher vermehrt, zuweilen kommen auch profuse Speichelflüsse vor, die aber wegen Abwesenheit aller Geschwüre der Mundschleimhaut nicht den ekellastischen Geruch, wie die mürbe Salivation, verbreiten. Angina tonsillaris und Laryngitis ist eine sehr seltene Complication. Suffocative Anfälle kommen fast gar nicht vor, weil die Geschwulst nach aussen, nicht nach innen sich ausdehnt. Die Allgemeinerkrankung ist bei den meisten Kindern nur von kurzer Dauer und geringer Bedeutung. So lange die Geschwulst ausgedehnt, hart und schmerzhaft ist, sichern sie meistens, am 3.—5. Tage aber sind nur locale Beschwerden mehr vorhanden. Die bei Erwachsenen von Hippokrates schon beobachtete consensuelle Anschwellung eines Hodens, häufig des der nämlichen Seite, kommt überhaupt ausserordentlich selten vor, z. B. bei der im Jahre 1857 in München aufgetretenen Epidemie, wo gewiss auch mehrere hundert Männer erkrankt sind, meines Wissens nur ein einziges Mal; bei Kindern aber wird sie nie getroffen.

Auch die andern Metastasen auf die Gehirnhäute, auf seröse Säcke, auf die Bronchial- und Darmschleimhaut habe ich noch nie gesehen, wage aber nicht, sie gerade ganz zu leugnen, indem es ja bekannt ist, dass in einzelnen Epidemien derselben Krankheit zu verschiedenen Zeiten grosse Verschärfungen sich einstellen können. Wenn unsere Nachkommen einmal eine Parotitisepidemie erleben, auf welche die Beschreibung unserer gegenwärtigen nicht mehr passt, so werden sie hoffentlich auch so viel Einsicht haben, unsere jetzigen Schilderungen nicht für erlogen zu halten.

Verlauf und Ausgänge

Der Verlauf der idiopathischen epidemischen Parotitis ist fast ausnahmslos ein günstiger. Nachdem die Krankheit 2—3 Tage zugenommen, nimmt das Fieber und bald darauf die Geschwulst ab, so dass nach 10—14 Tagen alle allgemeinen und örtlichen Symptome vollständig geschwunden sind. Fast immer tritt complete Zerstückerung der Geschwulst ein, bei einzelnen scrophulösen Kindern lässt dieselbe länger auf sich warten, die Speicheldrüse und die sie umlagernden Lymphdrüsen bleiben noch lange Zeit vergrössert und indurirt. Abscedirung der Drense scheint in früheren Epidemien nicht so selten gewesen zu sein, wie jetzt, wo sie fast gar nicht vorkommt. Der Abscess öffnet sich entweder direct nach aussen oder in den äussern Gehörgang, so dass lange Zeit Ohrenfluss und Schwerhörigkeit, bei Perforation des Trommelfells selbst lebenslängliche Taubheit zurückbleiben kann. Drückt die chronisch indurirte Drense auf den N. facialis oder kam derselbe in den Bereich der Eitorung, so kann vorübergehende oder bleibende motorische Gesichtslähmung eintreten. Die Prognose ist all dem Gesagten nach ausserordentlich günstig. Bei Beginn einer Epidemie bekommt man viele Kinder zu sehen, nach einigen Wochen aber bei

sich das Publikum so unangenehm von der Gefährlichkeit des Uebels überzeugt, dass die meisten Eltern keine ärztliche Hilfe mehr requiriren.

Pathologische Anatomie.

Die pathologische Anatomie dieser Krankheit ist wegen der seltenen Sterbfälle ziemlich dürftig. Ich selbst habe noch nie die Section einer Parotitis epidemica gemacht. Rumböcker berichtet folgendermassen hierüber: Die ganze Drüse erscheint vergrössert, geröthet und ihr Gewebe geschwollen und gelockert, indem ein in verschiedenen Graden faserstoffiges Exsudat zuerst in das interstitielle, die Drüsenarini mit einander verbindende und die ganze Drüse umgebende Zellgewebe abgelagert wird. In den höheren Graden geht die Entzündung auch auf die Drüsensubstanz selbst über, diese ist geröthet und injicirt und die ganze Drüse erscheint zu einer gleichmässigen, fleischartig derben Geschwulst vergrössert. Das Exsudat kann nun entweder resorbirt werden, worauf die Drüse wieder zu ihren normalen Grosse- und Consistenzverhältnissen zurückkehrt oder das in das Zellgewebe abgelagerte Exsudat verdichtet und organisiert sich und führt entweder zu einer bleibenden Volumszunahme oder zu Schwund und Obliteration der Drüse, wenn in Folge von Compression die eigentliche Drüsensubstanz allmählig verdrängt und zu Grunde geht.

Therapie.

Die Behandlung der Parotitis ist die der Drüsenentzündungen überhaupt. So lange allgemeine, fieberhafte Symptome zugegen, ist Ruhe, strenge Diät und ein säuerliches Getränk indicirt. Am bequemsten wird die Geschwulst selbst mit Oeleneinreibungen behandelt. Die Kälte befördert die Zertheilung nicht im geringsten. Die Cataplasmen und Kleiensiebkuchen sind unständlich, machen Kopfschmerzen und werden besonders von kleinen Kindern nur mit Widerwillen getragen. Bei grossen Schmerzen und sehr ausgedehnter, gespannter Geschwulst sind einige Blutegeln von Nutzen. Grosse Unruhe wird ohne Schaden durch eine Morphiumlösung 0,005 : 30,0 stündlich ein Kaffeeöffel bis zum Eintritt der Wirkung beseitigt. Zurückbleibende Indurationen müssen mit grauer Salbe eingerieben werden. Da die damit behafteten Kinder gewöhnlich scrofulös sind, so ist ein mehrmaliger Gebrauch des Leberthrans sehr ersprießlich.

b) Die secundäre Parotitis ist eine sehr seltene Krankheit und entsteht bei länger bestehenden, tiefen Erkrankungen der Mundhöhle. Die hauptsächlichste Veranlassung zur secundären Parotitis ist der Mercurialspeichelfluss, die Diphtheritis oder eine vernachlässigte Stomatitis. Sie erreicht nie die Grösse, Ausdehnung und Härte der epidemischen Parotitis, das Gesicht ist nie in so hohem Grade entsetzt, das Ohrklappen steht niemals weit nach aufwärts. Die Symptome beschränken sich auf locale Geschwulst und auf Schmerz bei Druck von aussen oder beim Kauen. Die um und über der Parotis liegenden Lymphdrüsen, welche bei Mundkrankheiten viel früher und häufiger anschwellen als jene, erschweren die Diagnose bedeutend. Der beste diagnostische Anhaltspunkt bleibt immer der Stand des Ohrklappens und der Verlauf. Die geschwellte Speicheldrüse vertheilt sich nämlich schneller und regelmässiger als die häufig indurirenden oder in Eiterung

übergehenden Halslymphdrüsen. In seltenen Fällen kommt es auch zur Eiterbildung, wobei heftige allgemeine Erscheinungen, langwierige Zunahme und endlich Fluctuation und Zuspitzung sich einstellt. Nach einer sehr profusen und erschöpfenden Eiterung endet dieser Process mit vollständiger Atrophie der verletzenden Drüse. Da die secundäre Parotitis gewöhnlich nur einseitig und die Mundhöhle dabei sehr intensiv erkrankt ist, so lässt sich über das Verhalten der Speichelsecretion in der erkrankten Drüse nichts Bestimmtes angeben.

Die Behandlung hat hauptsächlich ihr Augenmerk auf die Mundhöhlenkrankung zu richten, wobei das Kali chloratum wieder als erstes Mittel erwähnt werden muss. Das weitere der Behandlung der Mundhöhlenaffection findet sich in den entsprechenden Abschnitten bereits angegeben.

c) Die metastatische Parotitis tritt auf im Verlaufe eines Typhus oder von Scharlach, von Variola, von Masern und zwar schon in den ersten Tagen, auf der Höhe der Krankheit, wo dann fast regelmässig der Tod erfolgt, oder mit eintretender Reconvalescenz, in welchem Falle die Prognose bei weitem günstiger gestellt werden kann. Der ätiologische Zusammenhang der Parotitis mit diesen Exanthemen ist sehr unklar; unter anderen Ursachen muss jedenfalls, besonders für den Typhus, eine mechanische Verstopfung des Ductus Stenonae in Folge der Trockenheit der Mundhöhle geltend gemacht werden. In der Leiche findet man die Parotitis und ihre Umgebung geschwollen und die Drüse von einer Menge kleiner Abscesse durchsetzt, deren Inhalt entweder gelber, dickflüssiger Eiter oder braune blättrige Jauche ist. In sehr putriden Fiebern tritt rasch eine allgemeine brandige Verjauchung ein, wobei die ganze Drüse und ihre Umgebung in eine jauchige, braungüne, stinkende Masse zerfällt.

Die Symptome sind je nach dem Grade der Allgemeinerkrankung verschieden. Ist der Typhus oder das acute Exanthem zu einer beträchtlichen Höhe gediehen, so bemerken die Kranken selbst gar nichts von der sich einstellenden Parotitis, tritt dieselbe hingegen in der Reconvalescenz auf, so geben sie dieselben subjectiven Erscheinungen an wie bei der idiopathischen, epidemischen Form. Im Allgemeinen kann bemerkt werden, dass die metastatische Parotitis langsamer verläuft und viel häufiger in Eiterung übergeht als die secundäre oder gar die idiopathische. Der Uebergang in Eiterung findet hier sehr gewöhnlich statt. Die objectiven Zeichen, Grösse, Ausdehnung und Härte der Geschwulst verhalten sich hier gerade wie bei der epidemischen Parotitis. Wenn bei den andern Formen immer noch die Frage offen bleiben muss, ob wirklich das Drüsenparenchym und nicht bloss die zwischen den Acinis befindliche und das die ganze Drüse umgebende Bindegewebe erkrankt sei, so ist bei dieser metastatischen Parotitis wegen der Häufigkeit und Vielfältigkeit der Abscesse doch mit Bestimmtheit eine Parenchymerkrankung anzunehmen.

Die Behandlung spielt bei der Schwere der Complication gewöhnlich eine untergeordnete Rolle. Warme Kleinstückechen scheinen, wenn die Kinder sie dulden, einen günstigen Einfluss auf die Rückbildung des Geschwulst zu haben und die Schmerzen zu mildern. Einstiche können mit Vortheil nur gemacht werden, wenn deutliche Fluctuation gefühlt wird. Wird durch tiefe Einstiche kein Eiter ent-

leert und also keiner der Abscesse geöffnet, so tritt durchaus keine Erleichterung, vielmehr durch die zugefügte traumatische Parotitis nur grössere Schwellung und Beschwerden ein. Ist der Process in der Reconvalescenz aufgetreten, so wird dieselbe ungemein in die Länge gezogen und man hat durch möglichst roborende Behandlung, Wein, Eier, Infus. carnis, Fleisch, China etc., die Kräfte aufrecht zu erhalten.

2) Hypertrophie der Parotis.

Es gibt a) eine gut- und b) eine bösartige Hypertrophie.

a) Die gutartige kann spontan und langsam entstehen, ist aber viel häufiger die Folge der vorgenannten entzündlichen Zustände. Zuweilen entwickeln sich auch gutartige Geschwülste, Fibroide, Fett- oder Balggeschwülste in der Drüse. Die Haut ist über der gutartigen Hypertrophie verschiebbar. Ihre Entwicklung ist immer nur einseitig, der Schmerz bei Druck auf die Drüse sehr gering, der Unterkiefer deshalb auch bei ziemlich grossen Geschwülsten noch hinlänglich beweglich. Von scrophelöser Anschwellung der Halsdrüsen lässt sie sich dadurch unterscheiden, dass das Ohrfläppchen bei diesen nicht atrophirt, dass sie beweglicher sind und meist in grösserer Zahl gefunden werden.

Behandlung.

Einfache Hypertrophieen können durch längere fortgesetzte Einpinselung von Jodtinctur, wöchentlich 1—2 Mal, bedeutend verkleinert und selbst zum vollkommenen Schwund gebracht werden, die gutartigen Lipome und anderen Geschwülste im Parenchym der Drüsen verkleinern sich auf Jodtinctur natürlich nicht, sondern müssen durch das Messer entfernt werden, wenn anders sie oberflächlich genug sind, dass man erwarten darf, sie ohne zu grosse Gefäss- und Nervenverletzung heranzuschälen.

b) Die bösartige Hypertrophie der Parotis besteht in der Wucherung eines Medullar- oder Faserkrebses im Parenchym der Drüse. Dieselbe kommt aber nie primär und isolirt in der Parotis vor, sondern erscheint meistens mit gleichzeitigen Krebsablagerungen in andern Organen, und ist bei Kindern, wie überhaupt alle Krebse, ausserordentlich selten. Bei bedeutenderem Wachsthum des Carcinoms nach innen kann Druck auf Pharynx und Larynx und auf die grösseren Gefässe und Nerven des Halses entstehen. Zuweilen wächst die Geschwulst auch nach vorne über den aufsteigenden Ast des Unterkiefers herauf, wodurch dessen Contouren nicht mehr ermittelt werden können, sie ist immer vollständig unbeweglich, je nach der Beschaffenheit der Neubildung hart (beim Faserkrebs) oder weich, selbst fluctuirend (beim Medullarkrebs).

Bei der ersteren Art ist die bedeckende Haut unbeweglich mit der harten Geschwulst verwachsen. Tuberculose etablirt sich fast nie in der Speicheldrüse.

Die Behandlung ist wie bei der Krebskranken überhaupt lediglich eine Leben fristende. Ob durch Exstirpation der carcinomatösen Parotis, eine der schwierigsten und lebensgefährlichsten Operationen der ganzen Chirurgie, schon ein Kind gerettet worden, ist mir unbekannt.

C. Pharynx und Oesophagus.

- 1) Angina tonsillaris. Cynanche (wörtlich das Hundehalsband von *κύων* der Hund, und *αγκύρε* aussehnen).

Die Mandeln sind Aggregate von Schleimbrüsen, welche im gesunden Zustand kaum über die Gaumenbogen, zwischen denen sie liegen, hervorragten dürfen. An der dem Isthmus faucium zugekehrten Fläche finden sich 10–20 Ausführungsgänge der Schleimkrypten, die der Mandeloberfläche ein durchlöcheretes Aussehen verleihen und den Vergleich mit den Mandelschalen veranlassen haben. Diese 10–20 Krypten auf der Mandel sind nun Verschwörungen ausgesetzt, bei denen gleich den Furunkeln der Cutis jedesmal der Inhalt einer oder einiger Krypten eine Eiterung der Umgebung hervorruft und endlich durch Öffnung des Abscesses aus der Mandel ausgeschleudert wird. Bei diesem Process schwillt das ganze Parenchym der Mandel an und hat große Neigung, eine chronische Induration einzugehen, welche sogar auch ohne Verschwörung der Krypten spontan und dann beiderseitig entstehen kann. Nach jeder Verschwörung bleibt auf der Mandel eine tiefe Vertiefung zurück, so dass, wenn sich das Leiden öfter repetirt hat, die Mandeln ganz verklebt und zerrissen aussehen, wodurch aber sich merklich verkleinern. Je öfter Angina tonsillaris aufgetreten, um so wahrscheinlicher wird es, dass alle Krypten zerstört sind und damit die Gelegenheit zu ferneren Anginen entzogen ist, ein seltenes Beispiel einer radicalen Naturheilheilung.

Symptome.

Die Krankheit beginnt mit Schlundbeschwerden, Schmerz, Hitze und Trockenheit des Halses. Die erkrankte Mandel vergrößert sich allseitig und ist auch von aussen unter dem Unterkiefer als harte Geschwulst zu fühlen. Schwellen, was sehr häufig vorkommt, beide zugleich an, so berühren sie sich und steigen nun alle Symptome beträchtlich, bis endlich selbst Suffocation eintritt. Die Stimme ist hohl, innere Stimm; die Schmerzen strahlen nach dem Ohre aus, es kann durch Hinandrängen des hinteren Gaumenbogens der Zugang zur Rachenöffnung der Eustachischen Trompete mechanisch verlagert und auf diese Weise Ohrenausen und Schwerhörigkeit bedingt werden. Die Schlundbeschwerden sind bei Flüssigkeiten gelinder als bei compacten Massen, z. B. von Brod oder Fleisch, weil die letzteren durch ihre Festigkeit sich selbst den Weg bahnen, während die Getränke nur durch gleichmäßige Compression der ganzen Mandelhöhle gegen die geschwollenen Mandeln durchgedrückt werden können.

Untersucht man nun die Mandelhöhle, so muss man mit einiger Schonung zu Werke gehen, die Kinder einem hellen Fenster gegenüber placiren und so zuerst nur einfach den Mund öffnen lassen, wobei man häufig schon den ganzen Process übersehen kann, besonders wenn die Kinder auch die Zunge dabei herausstrecken und tief inspiriren. Gelingt es auf diese Weise nicht, die Mandeln vollständig zu sehen, so muss man die Zunge niederdrücken, was nach meinen Erfahrungen sich die Kinder viel lieber mit dem Finger als mit dem Spatel oder einem Löffelstiel gefallen lassen. Uebrigens kann man mit dem Finger

die Zunge viel tiefer herunter drücken und zu gleicher Zeit den Kopf besser fixiren als mit einem Löffelstiel. Man sieht nun das Gaumensegel geröthet und die hochrothen Mandeln mit dickem, zähem Schleim bedeckt. Sie füllen den grössten Theil des Isthmus faucium aus. Wenn die Angina ein paar Tage bestanden hat, so kommen einige gelbe Punkte an den Mandeln zum Vorschein, aus welchen sich beim Anstechen eine ziemlich Menge übelriechenden Eiters entleert, worauf eine rasche Besserung und wieder nach einigen Tagen vollkommene Heilung eintritt, wenigstens was die subjectiven Symptome betrifft; denn trotz des Substanzverlustes bleibt eine solche Mandel noch lange Jahre vergrössert. Eine acute Angina tonsillaris mit Schmerz, Schlundbeschwerden und Fieber dauert bei Kindern niemals länger als fünf bis sechs Tage, dann geht der Abscess entweder auf, oder es kommt gar nicht zur Eiterbildung, sondern der Process geht über in die chronische, schmerzlose Induration.

Was die Aetiology betrifft, so tritt sie zuweilen epidemisch auf, meist aber sind die Fälle nur sporadisch und treffen die besonders disponirten Individuen. Ausserdem ist die Mandelentzündung eine constante Begleiterin des Scharlachs, geht aber hiezu gewöhnlich nicht in Eiterung über, und kommt zuweilen auch bei secundärer Syphilis vor, die sich bei Kindern jedoch seltener als bei Erwachsenen am Gaumensegel und den Tonsillen entwickelt.

Therapie.

Die Behandlung ist verschieden nach dem Alter des Kindes. Kleine Kinder unter 3–4 Jahren, die der Krankheit viel weniger unterworfen sind als die Kinder nach dem Durchbruch der bleibenden Zähne, können bekanntlich nicht gurgeln und behalten niemals Wasser im Mund, sondern schlucken es immer gleich hinunter. Es fällt bei diesen also ein Haupterleichterungsmittel, das Gargarisma, weg. Die so beliebten Eibischgargarismen mildern den Schmerz weniger und können den Schleim, der fortwährend die Mandeln und die hintere Pharynxwand dick bedeckt, nicht so gut entfernen, als frisches, kaltes Wasser, das man die Kinder so lange richtig im Mund behalten, nicht aber gurgeln lässt, bis es ihnen durch seine Wärme unangenehm wird. Es wird dann durch frisches ersetzt. Die dicken Cataplasmen und Kleiensäcke, mit denen man den Kindern den halben Kopf zu verbinden pflegt, sollen die Eiterung befördern, machen aber jedenfalls den Kopf laus und eingenommen. Ich bin von dieser ihrer letzten Wirkung viel gewisser überzeugt als von der ersteren und gebrauche sie deshalb nicht. Odeurreibungen des Halses wirken schmerzstillend und erhitzen nicht. Bei Erwachsenen kann man heftige anginöse Beschwerden durch einige Blutegel sehr rasch mindern, bei Kindern ist aber der Blutverlust und dann die durch die Application der Blutegel hervorgerufene Angst und Aufregung mehr zu berücksichtigen. Die Incisionen in die hochgeschwollenen Mandeln, durch welche man bei Erwachsenen grosse Erleichterung und Abkürzung der Schmerzen bewirken kann, erfordern vor Allem die Einstimmung des zu Operirenden, auf welche man bei Kindern vergebens hoffen wird. Bei grosser Athemnoth und Suffocation müssen sie aber gemacht werden und können durch den mannigfach gebräuchtem Breithweinstein nicht ersetzt werden.

Es gelingt nur selten durch Brechbewegungen die Abscesse zum Platzen zu bringen. Der Eiter muss dabei jedenfalls sehr oberflächlich sein und hätte sich wahrscheinlich in den nächsten Stunden spontan entleert.

Man kann sich also bei acuter Angina tonsillaris auf Gargarien mit kaltem Wasser und auf Oedeinreibungen beschränken. Bei Suffocation müssen Einschnitte in die Mandeln gemacht werden, und wenn diese wegen zu grosser Unruhe des Kindes und mangelnder Assistenten nicht sicher ausgeführt werden kann, kann man ein Brechmittel versuchen. Die gewöhnlich bestehende Obstipation wird sehr passend durch ein leichtes Abführmittel, Det. tamarind. oder ein Infus. Rhei oder einige Kaffeebitter Tinct. Rhei aquosa beseitigt.

2) Hypertrophia tonsillarum.

Es gibt eine erbliche Hypertrophie beider Tonsillen, welche sich schon sehr früh, oft schon im zweiten Lebensjahre entwickelt und nicht die Folge von Anginen ist. Beide Mandeln sind hier gleichmässig angeschwollen, drängen das Gaumensegel nach vorne, schliessen das Zäpfchen zwischen sich ein, vergrössern sich nach oben gegen die Nasenhöhle und bedingen dadurch eine nasale Stimme. Durch die Verlagerung der Eustachischen Trompete tritt Otitis media und Schwerhörigkeit ein. Rötung, Schmerz und subjective Symptome sind hierbei nicht zugegen, die Schwerhörigkeit, die nasale Stimme, der Tag und Nacht offene Mund, ein fortwährendes Schnarchen im Schlaf sind die Hauptmomente, welche uns zu einer Untersuchung der Mandeln, die man bei bestandener Vergrösserung auch von aussen fühlt, auffordern müssen.

Die von Dupuytren zuerst als Folge der hypertrophischen Mandeln angegebene Atrophie der Respirationsmuskeln und das Pectus carinatum (Hühnerbrust) konnte ich nicht finden oder wenigstens kein so häufiges Zusammentreffen dieser Zustände beobachten, dass ich hieraus ein strictes Abhängigkeitsverhältnis entnehmen liess. Es gibt eine Menge ganz gut entwickelter Kinder, welche keine Spur von Hühnerbrust oder überhaupt irgend einer Erkrankung der Brust und der Brusteingeweide zeigen und doch an hypertrophischen Mandeln leiden und eine noch grössere Menge von Kindern leidet trotz ganz normaler Mandeln an hochgradiger Hühnerbrust und mangelhafter Entwicklung der Brustmuskeln.

Schon vor Beginn der Pubertät tritt ein Stillstand im Wachsthum der hypertrophischen Mandeln ein, und der freie Raum zwischen denselben vergrössert sich wieder bei den Erwachsenen. Zu neuen Anginen sind die damit befallenen Kinder häufig disponirt, und sehr gewöhnlich begleiten scrofulöse Erkrankungen der Haut, der Augen und der Knochen dieses Uebel.

Behandlung.

Die niedrigen Grade erfordern gar keine Behandlung. Bei mehrere Monate anhaltendem Gebrauche des Lebertheils, der wegen anderer scrofulöser Affectionen gegeben wurde, sah ich mehrmals eine auffallende Verkleinerung der hypertrophischen Mandeln, in den höchsten

Graden des Uebels aber liess mich derselbe im Stiche. Durch lange Zeit fortgesetzte Höllensteincantherisationen, die wöchentlich zweimal vorgenommen werden können und, gewandt applicirt, den Kindern gar keine Schmerzen und Beschwerden machen, erreicht man eine ziemlich beträchtliche Verkleinerung der Tonsillen, so dass man in vielen Fällen den Kindern oder eigentlich deren Angehörigen die Operation ersparen kann. Wenn aber das Uebel hochgradig ist, so ist die Exstirpation der Mandeln dringend indicirt, weil sonst die Kinder suffocatorisch zu Grunde gehen könnten. Die Operation wird am besten mit dem neuen Mathies'schen Tonsillotom, wo man mit einem Ruck die Mandeln anspiesset und mit dem zweiten das hervorragende Stück guillotiniert, zur Ausführung gebracht. Wenn man die Kinder übermüdet und sie von der Operation nichts ahnen, so lassen sie sich gewillig das in einem stumpfen Stahlring endende Instrument, in welchem die Klinge verborgen ist, um die Mandel legen, in demselben Moment ist sie schon ausgespiesset und im nächsten abgeschnitten, so dass sie kaum zum Bewusstsein des Geschehenen gelangen können. Die Abtragung einer Mandel genügt, den Isthmus faucium zu öffnen; zuweilen kann man die zweite unmittelbar darauf noch wegnehmen, gewöhnlich sträuben sich die Kinder aber sehr heftig gegen und das Chloroformiren ist wegen des hinabfliessenden Blutes nicht rathsam.

Man lässt die Wundfläche heilen und schneidet später, sollten die Symptome sich nicht gehörig mindern, auch die andere ab. Die Amputation mit der Muxsex'schen Zange und dem Messer ist sehr mühsam und wegen der Nähe der Carotis interna, die nach aussen und hinten an die Mandel grenzt und bei unruhigen Kindern leicht verletzt werden kann, auch gefährlich.

3) Retropharyngealabscess.

Die Abscesse der hinteren Pharynxwand lassen sich nach Bokai bezüglich ihrer Entstehungsweise in drei Arten theilen: a) in solche, die sich idiopathisch aus einer Entzündung des Pharynx und des denselben umgebenden Zellgewebes entwickeln; b) in solche, die sich secundär in Folge einer Vereiterung von entzündeten Halsdrüsen bilden und c) in solche, die mit Halswirbelcaries complicirt sind.

Bei allen drei Arten ist immer das erste Symptom ein langsam sich steigender Schmerz beim Schlucken, wobei bald eine gewisse Steifheit des Halses bei Bewegungen des Kopfes ohne äusserlich wahrnehmbare krankhafte Erscheinungen dieser Theile sich einstellt. Die Stimme wird rasselnd und bei der Untersuchung der Mundhöhle findet man den Pharynxraum verkleinert, die hintere Pharynxwand nicht auf beiden Seiten gleichmässig weit vom Gaumensegel entfernt, geröthet. Bei vorgeschrittenerem Stadium der Krankheit wird die Steifheit des Halses immer auffallender, die Kinder beugen den Kopf constant nach rückwärts und bekommen Athemnoth, so bald man das Kinn dem Sternum nähert. Der Hals wird in der Gegend der Unterkieferwinkel etwas dicker. Fieber und Unruhe stellt sich ein und nimmt mit Vergrösserung des Abscesses von Tag zu Tag zu. In den höchsten Graden des Uebels vermögen die Kinder nicht mehr zu schlucken, athmen nur sehr mühsam mit schmerzhaft verzerrten Gesichtszügen, das Athmen

es hat schmerzhaft, jedoch nicht pfeifend wie beim Kroup, wußt man im ersten Augenblicke die Krankheit halten könnte, zumal auch hier die Sprache unverändert, die Stimme klanglos wird. Die Mundhöhle ist während mit Schleim erfüllt und die hintere Pharynxwand flakirt endlich bei Berührung ziemlich deutlich. Der Abscess kann so gross werden, dass er bis zum Gaumensegel, das auf ihm aufliegt, vordringt. Reicht er tief hinab, so ist selbst das Zungenbein und der Larynx nach vorne oder zur Seite gedrängt, und wird er endlich geöffnet, so stürzt eine grosse Menge Eiter hervor, worauf sämtliche Erscheinungen angeblich nachlassen; wenn der spontane Ausbruch im Schlafe stattfindet, so sollen schon Kinder durch den Eiter, der ihnen in den Larynx floss, erstickt sein.

Bei der zweiten auf Halbdrüsenvereiterung folgenden Art findet man ausserdem noch vergrösserte oder vorereitende Lymphdrüsen im Hals und bei der dritten, der häufigsten Art, die Erscheinungen eines Monate lang vorangehenden Halswirbelsleidens, schmerzhafte Halswirbel, schmerzhafte, erschwerete Bewegung, Rückwärtsbeugung des Kopfes, Aufwärtsziehung der Schultern und Aufreißung oder Formveränderung der ergriffenen Wirbel. Obwohl Halbdrüsenvereiterung zu den alltäglichen Leiden des kindlichen Alters gehört, so kommt doch Retropharyngealabscess in Folge von Drüsenvereiterung ausserordentlich selten vor. Mir u. B. ist noch nie dieser Ausgang eines Lymphdrüsenabscesses begegnet. Die Prognose ist bei Retropharyngealabscessen immer zweifelhaft, bei Wirbelsaries mit Durchbruch des Eiters in den Rachen fast tödtlich zu stellen.

Behandlung.

Da die Diagnose erst mit Bestimmtheit gestellt werden kann, wenn der Abscess sich schon gebildet hat, so lässt sich von der Antiphlogose, von Blutegeln, Escharotischen und Laxantien so wenig wie von den zertheilenden Mitteln, der grauen Salbe, Jodsalben, Jodlinnen oder Cataplasmen, etwas erwarten.

Grösseren Kindern gewährt in den Mund genommene Eistückchen durch ihre abstringierende und schmerzstillende Eigenschaft die grösste Erleichterung. Hat man sich aber einmal wirklich von der Gegenwart eines Abscesses überzeugt, so ist schleunige Eröffnung das einzige Mittel, die quälenden Symptome zu heben. Nur bei gleichzeitigen Leiden des Wirbels, das übrigens nicht immer leicht zu diagnosticiren ist, rath Bamberger mit Recht, mit der Eröffnung so lange zu zögern, bis wirkliche Gefahr droht; denn der Zutritt der atmosphärischen Luft beschleunigt stets das Fortschreiten der eitrigen Wirbelsvereiterung. Wenn bei Halswirbelsaries überhaupt etwas erwartet werden darf, so ist eine ruhige Rückenlage, mehrere Monate lang fortgesetzt, unentbehrlich. Hierbei müssen natürlich die Kräfte möglichst aufrecht erhalten werden und durch ein später zu setzendes Haarschneisen den lange fortgesetzten Gebrauch des Jodeisens muss man versuchen die verdrickten Wirbelkörper zur Resorption zu beugen.

4) Entzündung des Oesophagus. Oesophagitis.

Fast alle Schleimhautkrankungen der Mundhöhle können sich auf die Schleimhaut des Oesophagus bis zur Cardia fortsetzen. E

gibt eine catarrhalische, mercurielle und diphtheritische Entzündung desselben, auch kann sich der Sopor bis zum Magen erstrecken. Die gewöhnlichste Art der Erkrankung der Speiseröhre aber ist die durch ätzende Substanzen und die durch mechanisch wirkende fremde Körper. Sie kommen fast nie bei Kindern unter einem Jahre vor, weil diese noch zu einfach genährt werden und zu ungeschickt sind, um selbst nach schädlichen Stoffen zu greifen und sie zu verschlucken.

Die Symptome der Oesophagitis sind folgende:

Brennender oder stechender Schmerz an irgend einer Stelle des Oesophagus, am Halse, am Rücken zwischen den Schulterblättern oder in der Herzgrube, das Schlucken ist immer mit Schmerz verbunden, selbst die mindeste Flüssigkeit, der eigene Speichel gleitet nicht ohne Schmerz hinunter. Je nach der Heftigkeit des Schmerzes tritt bloß Würghewegung oder wirkliches Erbrochen ein, besonders in der Rückenlage ist das Schlucken erschwert, weil bei zurückgelegtem Kopfe die vordere Wand der Wirbelsäule eine in die Rachenhöhle hineinragende Convexität bildet, weshalb man ja auch allen Kranken den Kopf emporzuheben pflegt, wenn man ihnen Medicin reichen will. Der Durst ist bei Oesophagitis sehr quälend und die Kinder verweigern aus Furcht vor dem Schmerze beim Schlucken Tage lang alles Getränke. Da die gewöhnlichsten Veranlassungen zur Oesophagitis Verbrennung mit heissem Wasser, Lauge oder concentrirten Säuren sind, so ist immer die Hauptveränderung im Munde, und es lässt sich von dieser ein Schluss auf die Veränderung der Oesophagusschleimhaut machen. Ist es einmal zur Geschwürsbildung gekommen, so heilen dieselben, weil die Schleimhaut der Speiseröhre bei jedem Schlucke eine bedeutende Ausdehnung erfährt, nur sehr langsam und fast immer mit Verengung des Lumens, welche Monate lang zunimmt und erst spät einen höheren Grad erreicht. Ausser diesen Verbrennungen, die hauptsächlich wegen der Ungeschicklichkeit der Kinder und ihrem Mangel an Geistesgegenwart entstehen, indem sie die in den Mund genommene ätzende Substanz nicht gleich wieder ausspucken, sondern verschlucken, gibt es noch eine Oesophagitis traumatischen Ursprungs. Sie entsteht durch Verschlucken und Steckenbleiben von Fischgräten, Knochenfragmenten, Nadeln und spitzen Körpern aller Art und hauptsächlich auch durch ungeschickte und rohe Versuche, dieselben zu entfernen. Endlich hat man auch Geschwürsbildung im Oesophagus auf grosse Dosen Tartarus stibiatum im Pulverform gereicht, entstehen sehen.

Behandlung.

Der Erfolg der Extractionsversuche fremder Körper hängt häufig bloss vom Zufall ab, da man den Fixationsort nicht genau wissen und oft auch nicht erfahren kann, um welche Art fremden Körpers es sich handelt. Sie sind auch nicht immer nothwendig, denn es gibt eine Menge von Stoffen, z. B. Brodkrusten, hartes Zuckerwerk aller Art, selbst Stöckchen Holz, welche bei längerem Liegenbleiben erweichen und durch Nachtrinken hinuntergespült werden können. Je länger der fremde Körper festsass, um so schwieriger wird seine Entfernung, da die Entzündung der Speiseröhre ihr Lumen noch mehr verengert. Der Versuch, spitze Körper in den Magen zu stoßen, kann sehr schlimm ausfallen, da man ihn ebenso leicht durch die Oesophaguswand durch-

als in den Magen hinabdrücken kann. Führt er die Höhle der Speiseröhre nicht vollkommen aus, was bei spitzen Körpern wohl niemals der Fall sein wird, so wird er durch ein über ihm hingehbrachtes Instrument, dessen Ende ein paar stumpfe Haken hat, oder nach Art eines Regenschirms entfaltet werden kann, zuweilen herausgezogen.

Gegen die chemischen Verbrennungen muss man, wenn sie erst ganz kurz geschehen sind, die Antidota, gegen Säuren die Alkalien und umgekehrt, in passender Verdünnung anwenden. Später reicht man Emulsionen und lässt zur Stillung des Durstes Eisstückchen im Munde zergehen, wenn die Kinder sich hartnäckig weigern zu schlucken. Es wird kaum notwendig sein, den Genuss fester Nahrungsmittel noch speciell zu verhieten, da beim ersten Versuche sich der Schmerz schon gewaltig steigert. Bei grossen Schmerzen legt man eine warme feuchte Cravatte um den Hals und gibt Opium dem Alter entsprechend, einem zweijährigen Kinde einen Tropfen Opiumtinctur, einem dreijährigen zwei Tropfen und so mit jedem Lebensjahre einen Tropfen mehr. Ein schlimmer, aber sehr häufiger Ausgang der Oesophagusgeschwüre, wie sie eben auf chemische oder mechanische Reize folgen, ist die Stricture. Die Bildung der Stricturen muss durch Bougiecuren, die man ganz in der Weise ordnen kann, wie bei den Stricturen der Harnröhre, verhütet werden. Wo sie schon entstanden, ist das Bougie und seine consequente Anwendung die einzige Rettung vor dem Hungertode.

5) Angeborene Halsfistel. *Fistula colli congenita.*

Eine sehr seltene, wenig beschriebene Krankheit, die erst vor wenigen Aerzten beobachtet worden ist. Ich selbst hatte nur einmal Gelegenheit sie zu sehen. Nach Bednar verläuft sie ihren Ursprung dem Offenbleiben der zweiten und dritten Kiemenpalte. Nach demselben Autor befindet sich ihre äussere Mündung, in deren Umgebung die äussere Haut an dem unterliegenden Zellgewebe festhängend in Grübchen bildet, an der Seitengegend des Halses, $\frac{1}{2}$ Zoll vom Schlüsselbein und seiner Vereinigung mit dem Brustbein entfernt. Ihre innere Öffnung mündet entweder in dem Schlundkopf neben dem Kehldeckel oder sie endet blind in der Nähe desselben. Das Secret dieser Fistel besteht in zähem Schleime und kommt hauptsächlich beim Kauen und Schlucken zum Vorschein, in die Fistel eingespritztes Wasser ruft eine Schlingbewegung hervor.

Die Heilversuche mittelst Cauterisation blieben bis jetzt ohne Erfolg.

6) Sklerose des *Musculus sternocleidomastoideus.*

In den ersten Lebenswochen kommt zuweilen eine eigenthümliche strangartige Verdickung eines Kopfmuskels vor, deren Deutung noch keineswegs klar ist. Der harte Strang sitzt offenbar im Muskel, nicht über oder neben demselben, tritt stets einseitig auf, hat eine cylindrische, Bleistift ähnliche Form und ist $\frac{1}{2}$ —1 Zoll lang. Die Geschwulst ist meist ziemlich beweglich, tritt bei der Bauchpresse deutlich hervor und theiligt sich bei allen Bewegungen des Kopfmuskels. Paget gibt an, dass das Gesicht nicht nach der erkrankten Seite hin gedreht werden

könnte, in den drei Fällen, die mir bisher vorgekommen, war von einer Funktionsstörung des Muskels nichts zu bemerken. Die Aetiologie der französischen Autoren, welche die Geschwulst einfach durch eine schwere Geburt, Zangensoperation etc., entstehen lassen, paßt für meine Fälle nicht, da bei allen dreien die Entbindung ohne Kunsthilfe von Statten ging und die Geschwulst erst einige Tage nach der Geburt bemerkt wurde. Gegen die Annahme einer geschwellenen Lymphdrüse spricht die offenbar walzenförmige Gestalt und das Fehlen anderweitiger Drüsenanschwellungen.

Behandlung.

Sämmtliche Autoren, Labalbay, Melchior, Dolbeau, Paget, Wilks etc., stimmen darin überein, dass die Geschwulst nach einigen Wochen auf innerlichen Jodgebrauch spurlos verschwinde, was ich durch meine eigene Erfahrung, einfache Einpinselungen mit Jodtinctur, vollkommen bestätigen kann.

B. Magen- und Darmkanal.

1) Die wichtigsten Symptome der Magen- und Darmkrankheiten.

Es repetiren sich bei den verschiedenen Magen- und Darmkrankungen so viele Symptome, dass es praktischer erscheint, sich über dieselben von vornherein zu verständigen, bevor wir zur Beschreibung der einzelnen Krankheiten, die dann mehr pathologisch anatomisch aufgefasst werden können, übergehen.

a) Dyspepsie (q. dyspepsia, Verdauungsstörung).

Unter Dyspepsie versteht man eine vollkommene Aufhebung oder blosser Verminderung des Appetits; in dem letzteren Falle werden die gewöhnlichen Nahrungsmittel verschmäht und es besteht bloss ein Verlangen nach den Lieblingsgerichten, von denen aber auch verhältnissmässig nur sehr wenig genossen wird. Der Appetit ist der zuverlässigste Wegweiser bei Beurtheilung einer Allgemeinerkrankung, und das hieüber anzustellende Examen macht den wichtigsten und schwierigsten Theil des ganzen Krankenexamens aus. Man darf sich niemals mit allgemein gehaltenen, vagen Antworten abfertigen lassen, sondern muss ganz genau die Menge und Qualität der genossenen Nahrungsmittel erforschen, muss sich das Gefäss zeigen lassen, aus welchem die Kinder zu essen bekommen, wie weit es voll war, wie viel übrig geblieben ist etc., nur dann bekommt man eine richtige Ansicht von der wirklichen oder eingebildeten Abnahme des Appetites eines Kindes.

Bamberger führt in seinem Lehrbuch der Krankheiten des chylopoetischen Systems folgende vier Arten von Dyspepsien an.

1) Dyspepsie durch anatomische Veränderungen der Verdauungsorgane.

2) Dyspepsie durch quantitative und qualitative Anomalieen der Verdauungssecrete.

3) Dyspepsie durch veränderten Nerveneinfluss, wohn auch die secundäre bei verschiedenen Krankheiten vorkommenden Verdauungsstörungen gehören und

4) Dyspepsie durch abnormen Reiz der Nahrungsmittel.

Alle diese Arten von Dyspepsien kommen, wie bei Erwachsenen, auch bei Kindern vor. Die seltenste ist die erste, die zweite ist sehr häufig und begleitet hauptsächlich die vermehrte Ausscheidung des Darmsecretes, die Diarrhöe. Die dritte findet sich bei allen acuten fieberhaften Erkrankungen und gibt den besten Anhaltspunkt für die Beurtheilung der Schwere und Dauer eines Fiebers, und die vierte ist die überhäufigste Erkrankung in der ganzen Pädiatrik, an der die Mehrzahl aller künstlich aufgefütterten Kinder das ganze erste Lebensjahr hindurch laborirt. Dass diese einzelnen Arten nicht immer streng von einander geschieden werden können, braucht kaum besonders erwähnt zu werden, indem ja einzelne sich gegenseitig direkt bedingen und in innigstem Zusammenhange stehen.

Bei jeder Dyspepsie ist der Verdauungsakt nicht nur verzögert, sondern auch von den mannigfachsten localen und allgemeinen Beschwerden begleitet. Die längere Zeit im Magen unverdaut liegenden Nahrungsmittel entwickeln stets Gase, welche einen denselben verwandten, wenn auch nur unbedeutenden Geruch haben, und von denen die geruchlosen Gase, die bloss durch Sehlärfen mit in den Magen gerathen sind und aus atmosphärischer Luft bestehen, wohl unterschieden werden müssen. Der grössere Theil der riechenden Gase entwickelt sich erst im Darmrohr und dehnt dasselbe aus, wodurch bei Berührung des Abdomens oder durch Bewegung des Körpers Schmerzen entstehen, die gewöhnlich mit dem Entweichen einer grossen Quantität von Gas endigen. Grössere Kinder klagen auch bei gestörter Verdauung über ein Gefühl von Druck, Völle und Schmerz in der Herzgrube und fast regelmässig gesellt sich hierzu ein consensueller Stirn- oder Scheitelschmerz, der nicht eher weicht, als bis der Appetit wiedergekehrt ist. Das gewöhnliche und bald eintretende Ende jeder Dyspepsie, besonders aber der durch abnormen Reiz der Nahrungsmittel bedingten ist Erbrechen, worauf, wenn bloss unverdaute Nahrungsmittel die Schuld trugen, der Appetit schnell wiedergekehrt und die übrigen consensuellen Symptome verschwinden.

Therapie.

Die Behandlung der Dyspepsie erfordert ein gründliches Eingehen in ihre Ursachen und ist je nach diesen bald eine radicale, bald eine symptomatische, bald eine rein expectative. Die Verhältnisse sind häufig so complicirt, die Ursachen so schwer zu ermitteln, dass es zu den schwierigsten Aufgaben gehört, allgemeine rationelle Regeln für diese Behandlung aufzustellen. Die Basis der ganzen Behandlung beruht auf strenger Diät, auf Entziehung der Nahrungsmittel, wie ja überhaupt Ruhe im Allgemeinen, Ruhe des erkrankten Organs insbesondere der erste Grundsatz der ganzen Therapie ist. Mag die Ursache der Dyspepsie sein, welche sie will, ihr Effect ist immer derselbe — verminderte oder aufgehobene Verdauungsfähigkeit — und die Zufuhr neuer, der Verdauung bedürftiger, lebiger oder gar fester Nahrung ist also unter allen Umständen schädlich. Bei anatomischen Verände-

rungen der Verdauungsorgane kann natürlich auf den Appetitmangel nicht eingewirkt werden, da er nur eine Folge der Schleimhaut-erkrankung ist und so lange bestehen wird, als diese sich nicht zur Heilung anschickt. Dyspepsien, veranlasst durch Anomalien der Verdauungssecrete, lassen sich durch richtig gewählte Medicamente oft schnell beseitigen. Bei künstlich aufgefütterten Kindern ist es nämlich sehr gewöhnlich, dass in Folge der vielen Nahrungsmittel, die für den jugendlichen Magen noch nicht geeignet sind, ein viel saurerer Magensaft als bei Brustkindern secretirt wird, und dass, wenn auch die Diät schon längere Zeit dem kindlichen Alter entsprechend regulirt ist, diese Secretion noch in reichlicher Menge fort dauert und Dyspepsie und Erbrechen bedingt. Man musste diese Zustände schon in den ältesten Zeiten und gab dagegen die *Oculi cancrorum*, die jetzt vom kohlensauren Kalk, von der kohlensauren Magnesia oder vom doppelt kohlensauren Natron mit Recht verdrängt worden sind. Welches dieser drei Mittel man geben will, ist ziemlich gleichgültig, sie neutralisiren alle auf gleiche Weise den überschüssigen, zu sauren Magensaft und wenn ein Kind ein paar Tage lang 0,1—0,2 dieser Mittel genommen hat, bekommt es regelmässig guten Appetit und gute Verdauung, vorausgesetzt, dass die Präsumtion der Ursache richtig war.

Ältere Kinder bekommen ziemlich häufig Icterus und wenigstens in den ersten Tagen vollkommene Appetitlosigkeit. Dasselbe sah ich in mehreren Fällen auf Argent. nitric., das man vom fünften Jahre an ganz passend in Pillen geben kann, deren jede 0,01 Höllenstein enthält, mit einem Male weichen. Nach 3—4 Pillen kehrte der Appetit wieder, obwohl der Icterus noch Wochen lang bestand.

Die Dyspepsie, welche fieberhafte Krankheiten begleitet, erfordert keine speciell Behandlung. Der Instinkt ist bei den Kindern noch viel lebhafter und richtiger als bei Erwachsenen. Kinder mit wirklich heisser trockener Haut und beschleunigtem Pulse rühren niemals vorgesetzte Speisen an und trinken auch nicht gerne stickstoffhaltige Getränke, wie Milch oder Suppe, sondern verlangen immer nach kaltem Wasser, das sie allen süßen und säuerlichen Getränken vorziehen. Es gibt kein Mittel, diese Dyspepsie zu heben und wenn es auch eines gäbe, so wäre es jedenfalls während der Dauer des Fiebers contraindicirt. Hingegen kommt es häufig vor, dass man durch gar zu eilige Darreichung von Mitteln, z. B. des so sehr beliebten *Tartarus emeticus* in refr., des, der *Ipecacuanha*, der Mittelsalze, der Säuren etc. die Verdauung der Kinder länger, als das Fieber währt, beeinträchtigt und hierdurch die *Reconvalescentia* verlangsamt.

Bei der durch abnormen Reiz der Nahrungsmittel bedingten Dyspepsie muss einige Tage strenge Diät, bestehend in dünner Schleimsuppe oder mit Chamillenthee gemischter Milch, gehalten werden, dann können die pag. 38 ff. angegebenen Ernährungsweisen versucht werden. Eine entschieden günstige Wirkung üssert auf eine so gereizte Schleimhaut das Calomel zu 0,01 täglich 2—3 Mal gegeben. Es erfolgen einige grüne Stühle, der meteoristisch aufgetriebene Leib wird kleiner, es tritt Ruhe und Schlaf ein und die Kinder fangen wieder an zu verdauen.

b) *Bulimia* (v. *bulire*, der Heißhunger). *Polyphagia* (v. *polycopia*, die Genußgier). *Fames canina*.

Eine krankhafte Vermehrung des Appetites kann zwar auch durch üble Gewohnheit und verkehrte Erziehung erworben werden, ist aber viel häufiger ein Symptom verschiedener krankhafter Zustände, bei Kindern vor allem der Eingeweidewürmer, dann der Hypertrophie der Mesenterialdrüsen und der chronischen Gehirnleiden. Der nach acuten Krankheiten, besonders nach Typhus, sich einstellende Heißhunger gehört nicht hierher, sondern findet seine physiologische Erklärung in dem raschen Ersatz der verloren gegangenen Fettpolster. Auch in jener *Bulimia*, welche bei allgemeinem Wohlbefinden und ohne alle Organerkrankungen entsteht, muss eine besondere Disposition angenommen werden, denn es werden sehr viele Kinder von ihren unvernünftigen Angehörigen fortwährend zum Essen angehalten und durch Abwechslung in den Leckerbissen dazu gereizt und nur wenige können sich diesem sehr seltenen Zustand erwerben. In diesen Fällen gehören die Gegenstände, womit die Kinder sich ihren Heißhunger zu stillen suchen, immer in die Klasse der wohlchmeckenden Nahrungsmittel, bei der auf krankhaften Organveränderungen beruhenden Gefräßigkeit aber kommen Gelüste, ähnlich wie bei schwangeren Frauen, vor. Solche Kinder essen dann rohe und seltsame Nahrungsmittel, Rüben, Kräuter, Wurzeln aller Art und verweigern zu keiner Tageszeit, noch nicht unmittelbar nach dem Mittagessen das schwarze Roggenbrot, von dem sie genießen so viel sie überhaupt bekommen können. Kann diesen Zustand nicht frühzeitig abgeholfen werden, so wird er chronisch, also dass die Kinder dabei an Körpergewicht und Grösse rascher zunehmen als andere mässige Kinder. Im Gegentheil, sie sehen in der Regel bleich und anämisch aus, entleeren copiose, nachhaft riechende Stühle und Mehen im Wachsthum zurück. Bei der Section findet man einen ausserordentlich grossen Magen mit verdickten Wandungen und, wie Eingangs bemerkt, gewöhnlich noch andere Veränderungen in verschiedenen Organen.

Therapie.

Die Behandlung ist glücklich und rasch, wenn Eingeweidewürmer, die man mit den verschiedenen Warmmitteln abtreiben kann, die Ursache der *Polyphagia* sind, unglücklich und erfolglos aber, wenn wie bei den atrophischen Kindern, die Mesenterialdrüsen sämtlich vergrössert und infiltrirt sind, oder wenn ein *Hydrocephalus chronicus* der Grund der Gefräßigkeit ist. Man muss sich hier darauf beschränken, wenigstens nur blande, leicht verdauliche Nahrungsmittel zu gestatten, die Quantität derselben lässt sich kaum verringern.

c) Erbrechen. *Vomitus*.

Das Erbrechen hat bei Kindern oft eine andere Bedeutung als bei Erwachsenen. Es gibt nämlich eine grosse Anzahl von Säuglingen, welche, so oft sie getrunken haben, ohne alle Würghewegungen, ohne Verzerrung des Gesichts und ohne alle Folgen die Milch zum Theil wieder herabbrechen, was am sichersten geschieht, wenn man sie nach dem Trinken hin- und herbewegt oder schaukelt. Sehr begünstigt wird dieses Erbrechen durch das fast vollständige Fehlen

des Blindsackes, des Fundus ventriculi bei Kindern, wodurch bei peristaltischen Bewegungen des Magens dessen Inhalt nicht wie bei Erwachsenen in den Fundus, sondern direkt gegen die Cardia gedrängt und bei mangelhaftem Verschluss derselben sogleich nach oben befördert wird. Hat man Gelegenheit, entkleidete Kinder Milch brechen zu sehen, so kann man sich leicht überzeugen, dass hierbei durchaus keine Bauchpresse stattfindet, sondern dass mit einem Male, während die Kinder ganz ruhig respiriren und die Zeichen allgemeinen Wohlbefindens an sich tragen, die Milch ruhig zum Munde herandrillt. Sie brechen übrigens nie sehr viel Milch heraus und gedeihen bei diesem Zustand vortreflich, so dass das alte Sprichwort der Kinderfrauen „Speikinder, Geleikinder“ als wahr anerkannt werden muss.

Es findet dies Erbrechen nur bei Brustkindern statt, die künstlich aufgezogenen erbrechen zwar auch oft genug, es geht aber hier dem Brechakt Unbehaglichkeit, Schlaflosigkeit und Hitze voraus, das Erbrechen selbst ist mit Würgen und Contractionen der Bauchmuskeln verbunden und seine Folgen sind Abmagerung und Verdauungsstörungen aller Art. Das Erbrochene besteht nicht rein aus den unverdauten, genossenen Speisen, der Kuhmilch, dem Brei oder der Suppe, sondern es ist ihm schon eine grössere Menge sauren Schleimes beigeengt und die Kuhmilch ist zu grösseren Klumpen geronnen. Wer zum ersten Male ein grösseres Kind bis zu fünf Jahren mit Ueblichkeiten beobachtet, hält es für sehr schwer erkrankt, dem Tode nahe. Solche Kinder entfärben sich vollständig, die Stimme ist mit kaltem Schweisse bedeckt, das Auge matt, die Respiration sublim, unregelmässig, der Puls so klein, dass er kaum zu fühlen ist. Die Kinder legen sich hin und stöhnen leise, stecken zuweilen die Hand in den Mund und haben im Gesichte den Ausdruck der höchsten Angst. Dieser Zustand kann mehrere Stunden lang dauern. Plötzlich tritt heftiges Erbrechen ein, eine grosse Menge von Speichbrei strömt in hohem Bogen aus dem Munde, es folgen noch einige Würgbewegungen unter lautem Schreien der erschreckten Kinder nach, und das ganze Krankheitsbild ist mit einem Male verschwunden. In der Regel tritt bald hierauf ein tiefer langer Schlaf ein, aus welchem die Kinder, wenn bloss eine Ueberladung des Magens mit schweren unverdaulichen Speisen die Schuld der Erkrankung war, vollkommen gesund erwachen, oder höchstens noch einige Zeit verminderten Appetit und belegte Zunge zeigen.

Werden Kinder von acuten Exanthemen, von Typhus oder Pneumonie befallen, so findet in der Regel am ersten Tage der Krankheit Erbrechen der letztgenannten Malizeit statt; wenn dasselbe nicht spontan entsteht, so beschränke ich mich darauf, durch mechanische Mittel Brechreiz zu veranlassen, Ipecacuanha aber und Tartarus emeticus sollen niemals gereicht werden, weil sie immer sogleich auf den Stuhl wirken und Diarrhöen die genannten Krankheiten nur erschweren.

Kommt ein Spulwurm in den Magen, was bei Kindern unter einem Jahre nur sehr selten, bei grösseren dagegen ziemlich häufig vorkommt, so scheint ihm dessen saurer Inhalt schlecht zu belagen, er bewegt sich rasch und veranlasst antiperistaltische Bewegungen und Erbrechen, womit er zum grössten Schrecken unerfahrener Angehöriger entleert wird. Uebble Folgen sind hievon nicht zu beobachten, gewöhnlich aber

leiden solche Kinder immer an einer grossen Zahl von *Ascaris lumbricoides* und man thut gut, ihnen einige Tage nach dem Brechen warmtreibende Mittel zu reichen.

Ganz eigenthümlich ist das Erbrechen bei acuten Gehirnkrankheiten, bei *Commissio cerebri* und besonders bei *Hydrocephalus acutus*. Wenn man die hieran Leidenden auf die andere Seite legt oder aufrichtet, so kommt plötzlich, ohne dass die Kinder dadurch unangenehm afficirt würden, wenn anders sie bei Bewusstsein sind, ein Guss schleimigen, weissen oder gelbgrünen Wassers zum Munde heraus, worauf sie ohne alles Würgen und ohne Zeichen von Ueblichkeit wieder zu trinken begehren oder fortschlafen. Man hat also in allen Fällen zu examiniren und wohl zu beachten, ob dem Erbrechen Ueblichkeit und Würgen vorausgeht oder nicht. Gehen diese Symptome nicht voraus, so hat man es mit sehr erstem cerebralen Erbrechen zu thun, wovon das zuerst besprochene Erbrechen der gesunden Säuglinge, das auch ohne Würgen sich einstellt, die einzige Ausnahme macht.

Behandlung.

Gegen das Erbrechen der Säuglinge hat man nicht einzuschreiten, so lange die Ernährung nicht darunter leidet und nicht grosse Quantitäten Milch entleert werden. Ist aber dies der Fall, so muss das Stillen in anderer Weise vorgenommen werden, die Kinder dürfen nicht trinken, bis sie von selbst die Brust loslassen, sondern man muss sie nach halb so langer Zeit abnehmen und möglichst ruhig liegen. Das dadurch entstehende Geschree gibt sich bald. Durch diese Procedur allein schon gelingt es gewöhnlich, das allzuhäufige und massenhafte Erbrechen zu verhüten. Reicht dies nicht aus, so gibt man einige Kaffeelöffel eines gemickerten, starken Chamillenthees, bevor man die Kinder an die Brust legt.

Das Erbrechen künstlich ernährter Kinder ist immer ein Symptom von geschwächter Verdauung und muss unter jeder Bedingung bekämpft werden. Es passt hier die Behandlung mit kohlensaurem Kalk oder mit kohlensaurer Magnesia vortreflich und führt, wenn die Därme ausserdem glücklich regulirt ist, bald zum Ziele. Ist der Darm erkrankt, ist Diarrhöe zugegen, so muss erst diese gestillt werden, bevor man ein Aufhören des Erbrechens erwarten darf. Auch hier steht das Calomel zu 0,01 2–3 Mal im Tage gewöhnlich, unter allen bekannten Mitteln oben an.

Glaubt man, dass die Kinder Brechreiz haben und nur in Folge dessen unruhig und von Angst ergriffen sind, so genügen gewöhnlich mechanische Mittel, den Brechakt selbst hervorzurufen. Das sicherste ist die direkte Compression des Magens, die ich in der Weise ausführe, dass ich mit den Fingerspitzen oberhalb des Nabels gegen die Herzgrube hin einen allmählig zunehmenden Druck mit rotirender Handbewegung ausübe, wodurch gewöhnlich heftige, seltener fühlbare Contractionen des Magens bedingt werden. Kommt es auf diese Weise nicht zum Erbrechen, so führe ich den Finger in den Mund, drücke die Zunge nieder und kitzele das Gaumengewölbe. Erfolgt auch nach dieser Manipulation kein Erbrechen, so kann man mit Bestimmtheit annehmen, dass die Kinder keinen Brechreiz haben, und dass ein gereichtes Emeticum kaum eine günstige Veränderung in dem Zustand

hervorbringen wird. Glaubt man ganz deutliche Zeichen von Ueblichkeiten bei einem Kinde, dem auf diese Weise keine Brechbewegungen gemacht werden konnten, bemerkt zu haben, so streut man ihnen am praktischsten 0,25–0,5 Ipecacuanhapulver auf die Zungenwurzel, indem man mit dem Zeigefinger der linken Hand die Kiefer möglichst weit auseinander hält, und gibt ihnen darauf einige Kaffeeöffel Wasser zu trinken. Reicht auch diese Quantität Ipecacuanha nicht hin, so darf man sich versichert halten, dass der Magen keinen ihn belästigenden Inhalt hat und dass durch stärkere Brechmittel nur grosser Schaden angerichtet wird.

Das Erbrechen bei Gehirnkrankungen ist nur ein symptomatisches, und lässt sich meines Wissens auf keine Weise stillen oder nur mindern; kommt in ganz seltenen Fällen der Hydrocephalus acutus noch einmal zum Stillstand, so hört es spontan wieder auf.

Das auf *Comotio cerebri* durch einen Sturz oder Schlag entstandene dauert, wenn keine Knochenverletzungen noch Gehirnbloodungen zugegen sind, nur einen oder wenige Tage, um dann einer vollständigen Genesung Platz zu machen.

3) Flatulentia und Colik.

Wenn die im Magen und Darmkanal physiologisch immer sich befindende Luft beträchtlich an Menge zunimmt und hierbei die peristaltische Bewegung dennoch nicht in der Weise beschleunigt ist, dass die abnorme Gasanhäufung durch den Anus sich entleert, so entsteht eine Ausdehnung des Magens und Darmrohrs und in Folge dessen eine vermehrte Spannung der Bauchdecken, die man, wenn sie acut ist, Meteorismus, wenn sie chronisch geworden, Flatulenz oder Tympanites nennt. Diese Vermehrung von Gas verdankt der Darm grössten Theils einer Vermehrung seines eigenen Secretes; denn nirgends ist dieselbe constanter, als vor und während der Diarrhöen. Verstopfung führt wohl auch Flatulenz herbei, dieselbe ist jedoch nie so häufig und beträchtlich, als die die Diarrhöen begleitende. Zu den höheren Graden von Meteorismus gehört immer auch eine Verminderung des Tonus der Magen- und Darmmuskulatur, ohne welche die entstehenden Gase immer gleich wieder zum Anus gelangen und auch ausser strömen müssen; diese findet sich hauptsächlich im Typhus, streifen auch in acuten Exanthemen. Die Nahrungsmittel, welche Kindern unter einem Jahre gereicht werden, Milch, Brod, Suppe und Amylacea, machen, so lange sie vertragen werden, niemals Flatulenz, tritt aber Diarrhöe ein, so lässt sich nicht mehr entscheiden, ob die darauf entstehende Darmausdehnung eine Folge der Nahrungsmittel oder des vermehrten Darmsecretes ist.

Mechanische Hindernisse, Carcinome des Magens oder Darmrohrs, eingeklemmte Hernien, bandartige Peritonäalexsudate, einschneidende Geschwürsnarben, die bei Erwachsenen so gefährliche meist tödtliche Gasauftreibungen bedingen, kommen bei Kindern fast nie, bei Säuglingen absolut nie vor.

Symptome.

Unter Flatulenz versteht man eine Vergrösserung des Unterleibes, welche entweder die ganze Bauchhöhle oder nur einzelne Theile der-

selben treffen kann, je nachdem der Magen und das ganze Darmrohr oder nur einzelne Abschnitte des letzteren besonders ausgefüllt sind.

Gewöhnlich nimmt man an, dass bei einem mehr zugespitzten Unterleib der Dünnarm, bei einem breiten faustförmig aufgetriebenen der Dickarm ausgefüllt sei, wobei aber jedenfalls ein completter Abschluss zwischen Dick- und Dünnarm bestehen müsste, da in mit einander communicirenden Räumen die Luft gleiche Spannung und zur gleichmässigen Ausdehnung ihrer Schranken bewirken kann. Dass ein so completter Abschluss jemals an der Cöcalklappe vorkomme, ist nicht denkbar, wohl aber ist ein ungleicher Tonus der Dick- und Dünnarm-muscularis möglich.

Bei acuten Krankheiten, besonders im Abdominaltyphus, wird der Zustand durch Meteorismus wesentlich verschlimmert, indem die Lungen und das Herz hiedurch comprimirt und so Athemnoth und Circulationsstörungen begünstigt werden.

Die Colik (*ἡ κολὴ νόσος*, Leibescoliken) ist ein in den Darmwänden entstehender Schmerz, welcher meist anfallsweise wiederkehrt und exacerbiert. Derselbe ist natürlich nur Symptom und zwar der verschiedenartigsten Unterleiberkrankungen, seine häufigste Veranlassung aber ist die Flatulenz. Die Colik ist deren stets Begleiterin. Ausserdem kommen bei Kindern mit jeder Diarrhöe, die in Folge anomalen Reizes der Nahrungsmittel entstanden ist, Colikschmerzen vor und dieselben fehlen nie, wenn einmal materielle Veränderungen auf der Darmschleimhaut, wenn Enteritis folliculosa oder Dysenterie selbst nur in ihren blähtesten Graden sich entwickelt haben.

Grössere Mengen von Spulwürmern können heftige Colikschmerzen veranlassen, einzelne Spulwürmer gehen häufig von Kindern ab, da durchaus keine Colik und überhaupt keine Symptome derselben gezeigt haben, wie bei dem Abschnitt von den Entozoen noch ausführlicher erörtert werden wird. Auch gibt es Kinder, welche nach jeder Verkältung, besonders bei nassem Füssen, plötzlich von Colik befallen werden, ohne dass die Verdauung vor oder während derselben merklich gestört wurde. Solche Kinder vertragen gewöhnlich das Baden und selbst die Waschungen mit kaltem Wasser nicht, sondern müssen oft Jahre lang mit warmem Wasser und nur sehr vorsichtig gewaschen werden.

Die Symptome sind gewöhnlich folgende: Plötzlich schmerzhafte Verzerrung der Mundwinkel und der Gesichtszüge überhaupt, plötzliches lautes, anhaltendes Geschrei, unruhige Bewegungen der Arme, Stampfen mit den Füßen, Aufwärtsziehen derselben an den Leib, Schmerzhafteigheit des Leibes, die bei Berührung zunimmt, Meteorismus, bei Krabben ist das Scrotum im Zustande ansehnlicher Contraction. Gewöhnlich tritt aber bald Entleerung von Gasen oder flüssigen Fäces, häufig auch Erbrechen ein. Bei sehr reizbaren Kindern und hohem Grade von Colik kann es sogar zu Convulsionen kommen. Die Diagnose hat ihren Haupthaltspunkt an den vollständigen Intermissionen der Schmerzen und an den vorausgehenden Verdauungsbeschwerden.

Man darf sich übrigens nie auf die Aussagen der Angehörigen verlassen, welche sehr geneigt sind, jede Unruhe der Kinder auf Colikschmerzen zu schieben, sondern muss immer die Kinder vollständig

entkleiden lassen, und sie 10—20 Minuten lang unausgesetzt beobachten und untersuchen. Ein anderer Theil der Mütter hält das Colikgeschrei immer für Hunger und besetzt sich mit Milch oder gar mit Brod den Mund zu stopfen, was merkwürdiger Weise oft gelingt, indem die Kinder nach einigen Schlucken wirklich sich beruhigen, aber nur, um nach kurzer Zeit in Folge des Reizes der neu eingebrachten Nahrungsmittel ein um so lautes und längeres Geschrei zu erheben.

Therapie.

Die Behandlung der Flatulenz hat das Ziel, das Gas aus dem Darne zu entleeren, was am besten momentan durch Clystiere erreicht wird. Meistens genügt schon ein gewöhnliches Clystier mit warmem Wasser, dem ein Kaffeelöffel Oel beigelegt worden; wenn hierauf keine copöse Entleerung von Faeces und Gasen erfolgt, so gibt man Clystiere entweder von ganz kaltem Wasser ohne Oel, oder von einem starken, warmen Chamilleninfusum: die ersteren haben eine pötllich vermehrte peristaltische Bewegung des ganzen Darmkanals zur Folge, die häufig von lebhaften Schmerzausschüßungen begleitet wird und deshalb bei vorherrschenden Coliksymptomen nicht wünschenswerth ist, die letzteren hingegen sind hauptsächlich gegen die Colikschmerzen gerichtet und wirken mehr kramptstillend als Gas entleerend. Die bei Erwachsenen so beliebten Eisblasen oder kalten Umschläge auf den Leib wirken bei kleinen Kindern sehr ungünstig und vermehren die Schmerzen ohne folgende Erleichterung. Es kann mit dieser Behandlungsweise bloss ein momentaner Nutzen gebracht werden, gegen die Ursachen der Flatulenz aber kann man nur einschreiten, wenn man die ganze Ernährung des Kindes prüft und genau die Wirkung der einzelnen Nahrungsmittel beobachtet. Es stellt sich bei diesen Untersuchungen, wie schon gesagt, heraus, dass hauptsächlich das diarrhoische Darmsecret, bevor es ausgeschieden wird, grosse Mengen Gas entwickelt, und dass also alle Nahrungsmittel, welche den Kindern leicht diarrhoische Stühle verursachen, mittelbar auch die Flatulenz bedingen; als die bekanntesten sind das Mehlmas und überhaupt alle mit Kuhmilch und Amylaceen bereiteten Speisen anzuführen, die Brustkinder leiden fast niemals an Flatulenz. Es ergibt sich hieraus, dass man künstlich aufziehende Kinder, die Neigung dazu haben, bald an Fleischsuppe gewöhnen muss, die man ihnen Anfangs mit etwas Zucker und nur einmal im Tage, später zweimal und ungezuckert reichen kann. Sich auf einzelne Fleischsorten, Kalbfleisch, Hühnerfleisch zu capriciren, halte ich für Luxus, die Hauptsache ist, dass die Suppe nicht zu concentrirt, nicht stark gesalzen und von Fettsäuren möglichst befreit sei. Das beste Material, der Suppe eine bröulige Consistenz zu geben, ist geriebenes Weissbrod; Reis-, Gries- und Schleimsuppen werden nicht lange genommen und widerstehen bald.

Die Colik erfordert während der Anfälle eine symptomatische, nachher aber eine causale Behandlung. Die symptomatische Behandlung besteht entweder in vorsichtiger Anwendung der Narcotica, besonders der Opiumpräparate, der Blausäure, und Nux vomica, oder in ätherischen, aromatischen Mitteln, Chamillen-, Pfefferminz- oder Melissenthee, per os et anum applicirt. Wärme ist vor allen Dingen nothwendig und muss durch Wärmlaschen, warme Tücher, warme Ge-

tränke und durch warme Säckchen, die man mit Chamillenblumen gefüllt den Kindern auf den Leib legt, hergestellt werden.

Die causale Behandlung hat die verschiedenen Ursachen zu beseitigen.

1) Colik durch Anomalie des Magen- und Darminhaltes. Hier ist so möglich der Magen durch mechanische Mittel, oder wenn dies nicht gelingt, durch 0,25—0,5 Ipecacuanhapulver zu entleeren. Sind schwer- oder unverdauliche Nahrungsmittel einmal über den Pylorus hinaus, so verursachen sie schon durch ihren eigenen Reiz Diarrhöe und man hat kaum jemals Veranlassung, dieselbe medicamentös zu bewirken, vielmehr trifft es sich häufig, dass die Diarrhöe, weil sie zu profus geworden, durch stopfende Mittel gestillt werden muss. Die Wurmcoliken müssen Anfangs mit Opium zur Beruhigung der Colik, dann aber mit grossen Portionen wurmtreibender Mittel, deren Besprechung weiter unten folgen wird, behandelt werden. Einem mit Diarrhöe und Colik behafteten Kinde soll man nie Vermifuga reichen.

2) Durch stagnirende Kockmassen bedingte Coliken kommen bei Kindern wegen ihrer überhaugt rascheren Verdauung und Resorption fast nie vor. Nur die Obstkerne, besonders die der Trauben und Kirschen, bleiben, wenn der Stuhl trotz der genossenen Früchte hart bleibt und grosse Mengen derselben verschluckt worden sind, zu grossen Klumpen zusammen, die heftige Colikschmerzen und selbst Symptome von Darmstenose bedingen können. Da diese Obstkerne Klumpen meist schon im Dünndarm liegen bleiben, so genügen Clysmata zu ihrer Entfernung gewöhnlich nicht, sondern es handelt sich darum, sie durch eine grössere Menge Darmsecret zu erweichen und zu verflüssigen, wozu einige Dosen Calomel von je 0,25 vollständig genügen.

3) Die auf Texturkrankheiten des Darmtraktes selbst beruhenden Coliken verlangen nur eine symptomatische Behandlung, wie sie schon oben gelehrt worden, die Behandlung der Texturkrankungen wird bei der Besprechung derselben ausführlicher gegeben werden.

Bilecoliken, Arsenicoliken und überhaupt alle toxischen Coliken müssen, wie bei Erwachsenen, durch die entsprechenden Antidota, welche die Toxicologie lehrt, behandelt werden.

a) Diarrhöe. (Zu häufiges Durchflossenz.)

Unter Diarrhöe versteht man eine qualitative und quantitative Veränderung der Excremente. Die Qualität der Excremente ist, abgesehen von den später zu erörternden chemischen und mikroskopischen Eigenschaften, in so fern verändert, dass ihre Form nicht mehr die betriege ist, dass vielmehr wasserdünnre Flüssigkeit allein oder wasserdünnre Flüssigkeit, in der noch Faecalmassen oder Speisereste suspendirt sind, zur Ausscheidung kommt. Die Quantität ist bei Diarrhöe immer vermehrt, genauere Zahlenangaben lassen sich nicht geben, weil gerade im kindlichen Alter sich die Stühle nie gehörig sammeln lassen und die Wägungen deshalb nur ein höchst approximatives Resultat lieferten; das Augenmass genügt aber vollständig zur Rechtfertigung des Ausspruches, dass in der Diarrhöe eine grössere Menge Faeces entleert wird, als im Normalzustand. Dass zur Entfernung einer grösseren Menge von Faeces der Mastdarm sich häufiger öffnen muss als gewöhn-

lich, bedarf keiner weiteren Erklärung. Wegen des abnormen Reizes, den der flüssige zahlreichere Darminhalt auf die Sphincteren ausübt, findet die Defaecation noch viel häufiger statt, als gemäss der Totalmenge des Ausgeschiedenen unumgänglich nöthig wäre.

Man kann je nach Form, Farbe und Geruch, ferner nach den chemischen und mikroskopischen Eigenschaften verschiedene Arten von Stühlen unterscheiden.

Die normale Form der kindlichen Faeces im ersten Lebensjahre — in späteren Jahren unterscheiden sie sich nicht mehr von denen Erwachsener — ist die breiige, die Farbe ist gelb, wie die eines Eitotters, der Geruch ist schwach säuerlich, niemals sauerhaft und nur bei Kindern, welche schon Fleischkost bekommen, so widerlich penetrant, wie bei Erwachsenen.

Die Diarrhöen können nun einfach in weichen, dünnflüssigeren, aber gelb gefärbten und noch fäculenten Materialien bestehen, *Diarrhoea simplex, stercolaris sive fasa*, oder es gehen mit es beschaffenen Stühlen unverdaute Nahrungsmittel ab, was man *Diarrhoea lieburica, Lienterie (Ailer)* glatt und *atrasca* Eingeweide, *laevitas intestinalium*) genannt hat. Bei künstlich aufgefütterten Kindern finden sich dieselben ausserordentlich häufig, indem die sorglosen Eltern von Zeit zu Zeit Versuche machen, ob man nicht endlich einmal aufhören dürfe, für das Kind apart zu kochen, und anfangen könne, es aus der grossen Schüssel mitessen zu lassen. Sie geben den Kindern Fleisch, Gemüse und Obst, Feingeschnittenes Fleisch wird zuweilen verdaut, in der Regel aber schlucken die Kinder wegen des Mangels der Zähne zu grosse Stücke hinunter, die der Magensaft nicht auflösen vermag, und die nun als fremde Körper, überdies in Zersetzung begriffen, das ganze Darmrohr passieren. Gemüse und rohes Obst gehen gewöhnlich unverändert wieder ab und machen oft eine sehr profuse, gefährliche, oft wieder gar keine Diarrhöe.

Ferner gibt es Diarrhöen, wo die hellgelben Ausdecrungen so dünn sind, dass sie wie aus einer Spritze aus dem Mastdarm hervorspritzen, wie Wasser zugleich die Wäsche durchdringen und an der Oberfläche des Tragkissens zum Vorschein kommen. Sie treten hauptsächlich in der *Cholera nostras und asiatica*, und bei Kindern, die eben von der Brust abgewöhnt werden sollen, *Diarrhoea albacolorum*, auf, sind entweder ganz geruchlos, oder haben einen molaffen, niemals aber den physiologischen säuerlichen Geruch und reagiren sie sauer, wie die normalen Stühle der Brustkinder, sondern neutral, zuweilen selbst alkalisch bei Gegenwart von grösseren Mengen kohlensaurer Alkalien. Hat man Gelegenheit, sie in einem reinen Gefässe aufzufangen und bringt man sie dann in Reagenzgläsern, so scheiden sie sich nach Art der Typhnustühle in zwei Schichten, in eine obere kellere, fast ganz durchsichtige, und in eine untere flockige mit kleinen braunen Kothbrockchen vermischte; diese untere Schicht ist oft sehr niedrig und wird von der oberen um das zehnfache an Volumen übertroffen. Die mikroskopische Untersuchung zeigt ausser den unverdauten Speiseresten, als Pflanzenzellen, Amylonkörnern, Milchäugelehen, *Cascinocagula* etc., nichts, als intensiv gelb oder hellbraun gefärbte Schollen, Fragmente von Epithelien — ganze Cylinderepithelien finden sich ausserst selten — und eine Menge brauner Kugeln von verschiedener

Größe und ohne Hülle, was man durch einfache Compression leicht nachweisen kann. In alkalischen Stühlen finden sich auch Tripelphosphate. Eiweißhaltig sind diese dünnflüssigen Stühle gewöhnlich nicht; nur wenn sie rosenrothe oder rothbraune Färbung haben, was gewöhnlich von der Beimischung kleiner Quantitäten von Blut herrührt, lässt sich leicht Eiweiß durch Salpetersäure nachweisen. —

Die grünen Stühle der Kinder heißen gewöhnlich „gallige“, jedoch ohne triftigen Grund; denn es hat noch Niemand bewiesen, dass in denselben mehr Gallenbestandtheile enthalten sind als in den gelben oder braunen. Der Gallenfarbstoff ist ursprünglich braun und es sind deshalb die normalen Fäces braun oder, wenn die Kinder zur Milch bekommen, goldgelb. Der braune normale Gallenfarbstoff (das Biliphaein) kann aber sehr leicht durch eine Menge chemischer Agentien, selbst schon durch einfache Berührung mit atmosphärischer Luft in der grünen (das Biliverdin) umgewandelt werden, und diese geschieht medicinell in der Pädiatrik sehr häufig durch Calomel. Die Annahme, dass die grünen Stühle nach kleinen Dosen Calomel von einer mechanischen Beimischung des mit einem schwarzen Ueberzuge von Schwefelquecksilber bedeckten Mittels herrühren, ist eine irrige: denn 1) dauern diese grün gefärbten Stühle oft mehrere Tage und in grosser Menge fort, ohne dass man, nach dem zweiten Tage, Quecksilber in denselben nachweisen kann, und 2) kann man denselben mit Wasser verdünnen und das Wasser abfiltriren, wobei es ganz grün durch das Filtrum läuft, so dass von einer mechanischen Färbung durchaus keine Sprache sein kann.

Während der Dentition und fast nach jedem Intestinalcatarrh durch indigeste Nahrungsmittel kommen bei kleinen Kindern die grünen Stühle vor, und es scheint das vermehrte Darmsecret schon hinreichend, das Biliphaein in Biliverdin umzuwandeln. Eine sehr häufige Erscheinung ist auch die Entleerung vollkommen gelber Fäces, welche sich aber an der Luft nach wenigen Stunden grün färben. Diese Farbenspiel beginnt an der Peripherie und den dünneren Schichten der Fäcalmasse zuerst, und ergreift erst nach längerer Zeit die dicke Hauptmasse, bis endlich das Ganze gleichmässig grün gefärbt erscheint. Gewöhnlich leiden die Kinder mit solchen Entleerungen an leichten Verdauungsbeschwerden. —

Bei einer anderen Art von Diarrhöe kommen Beimischungen von grossen Quantitäten Schleimes vor, welche in grösseren oder kleineren Klumpen und Fäden zwischen dem meist dünnflüssigen Darmsecret sich finden und die grösste Aehnlichkeit mit dem glasigen Nasenschleim haben. Sie lassen sich durch Schütteln mit Wasser vom Farbstoff ziemlich gut befreien, verlieren aber dabei an Durchsichtigkeit und zeigen unter dem Mikroskope Schleimkörperchen, Fragmente von Epithelien und körnige Massen. Die Entleerung derselben ist schmerzhaft. —

Bei künstlich aufgefütterten, langsam sich entwickelnden Kindern findet man zuweilen thonartige, fettige, graue oder hellgelb gefärbte Stühle, welche sich zwischen den Windeln wie feuchte Thonerde verschmieren lassen, und meist nur unter bedeutender Anstrengung des Anus passiren. Diese Entfärbung rührt von Mangel an Galle oder wenigstens an Gallenfarbstoff her, und hat meines Wissens kei-

schlimmen Folgen auf die Verdauung und Entwicklung überhaupt. Durch Tinet. Rhei aquosa oder Off. Rheimpulver kann man wohl eine vermehrte Gallensecretion erzielen, man läuft aber hierbei immer Gefahr, einen Darmcatarrh, dessen Ende nicht abzusehen ist, hervorzurufen, und kann deshalb mehr Schaden als Nutzen dadurch stiften.

Sehr wichtig für die Beurtheilung der Schleimhautrekrankung und besonders für die Prognose ist der Geruch der diarrhoischen Faeces. Bei ganz gleichem Aussehen und gleicher Dünndüffigkeit gibt es Stühle, die fast gar nicht, andere, die einfach fical, und wieder andere, welche faulig nasshaft riechen. Diese letzteren sind immer Symptome einer schweren Erkrankung, einer Enteritis folliculosa, die in den meisten Fällen mit dem Tode endet. Der Geruch lässt sich schwer beschreiben und ähnelt am meisten dem verfaulten Eier; er ist oft so heftig, dass die Pflege dieser Kinder nur mit der grössten Aufopferung bewerkstelligt werden kann, und dass die übrigen Bewohner des Zimmers, in welchem sich ein solches befindet, dasselbe verlassen müssen. Die Entleerung dieser Faeces ist ebenfalls schmerzhaft und röthet den Anus und seine Umgebung. Sie kommen am häufigsten in Begleitung des Stors vor, wobei dann Anus, Genitalien, innere Schenkelfläche und die Fersen intensiv geröthet und theilweise auch erodirt erscheinen. Mikroskopisch und chemisch konnte ich an diesen Stühlen keine besonderen Merkmale entdecken, und weiss ausser dem Geruch nichts Charakteristisches anzugeben.

Eiter in den Stühlen kommt bei kleinen Kindern wohl nie vor, bei grösseren nach überstandenen Dysenterien. Tuberculöse Darmgeschwüre sitzen meist im Dünndarme und ihre Secretion ist nicht so copios, dass ganze Streifen von Eiter, denn nur diese sind gemeint, in den Stühlen sich finden.

ii Obstipation. Obstructio alvi. Verstopfung.

Wenn ein sonst gesundes Kind unter einem Jahre nicht täglich zwei, und von 1.—3. Jahre nicht wenigstens eine Ausleerung hat, so wird die Consistenz der Faeces zu hart und es tritt der Zustand ein, den man Obstructio alvi nennt. Unter den kleinen Kindern sind hauptsächlich die künstlich aufgefütterten derselben unterworfen, doch kommt sie auch bei Brustkindern vor, zamentlich bei solchen, deren Ammen an diesem Uebel leiden. Die chemische Untersuchung solcher Ammenmilch führt zu negativen Resultaten.

Die Ursachen der Verstopfung finden sich in folgenden Momenten:

1) Mangellafter oder zu zäher Darmschleim. Hierin ist der Grund der Verstopfung in den meisten febrhaften Krankheiten oder bei verwehelter Schweiss- und Urinsecretion zu suchen, ohne dass die Beschaffenheit der Nahrungsmittel dabei theilhaftig ist.

2) Die Nahrungsmittel, besonders die Amylum haltigen Breie aus Mehl, Reis, Sago etc. Bei älteren Kindern die Speisen aus Erbsen, Bohnen, Linsen, Kastanien. Ferner alle adstringirenden Nährstoffe und Medicamente, rother Wein, die Bleipräparate, Alaun, Eisen, Wismuth, Kalk, Silberaztpeter und die gerbstoffhaltigen, vegetabilischen Mittel, bei deren Anwendung gegen Diarrhoe ihre stopfende Wirkung lange Zeit nachhält.

3) Zu geringe peristaltische Bewegungen des Darmtraks, die bei nie primär sondern meistens secundär als Folge der Erkrankung anderer Organe beobachtet wird. Hierher gehört die hartnäckige Obstipation bei Hydrocephalus acutus, bei welcher trotz ihres langen Bestehens der Leib immer mufdenförmig eingezogen bleibt; ferner die durch Opiumnarcose bewirkte. Bei atrophischen Kindern in ultimo stadio stellt sich ausser der Verminderung des Darmsecretes auch Atrophie der Darmmucularis ein, hiemit aus doppeltem Grunde Verstopfung ein, und endlich kommen noch periphere, lähmungsartige Zustände des Darmes vorzüglich bei mechanischer oder perforativer Peritonitis etc.

4) Mechanische Hindernisse, incarcerirte Hernien, Intussusceptionen, Achsendrehungen, vollständige Verstopfung des Darmlumens durch harte Kotmassen etc. kommen bei Kindern ausserordentlich selten vor. In neuester Zeit warhte A. Jacolé in New-York auf ein anatomisches Verhältniss aufmerksam, von dessen Richtigkeit ich mich seither bei einigen Sectionen Neugeborener überzeugen konnte. Der Darmkanal ist nämlich bei Neugeborenen relativ länger als bei Erwachsenen, der Dickdarm z. B. bei einem achtmonatlichen Fetus ist $2\frac{1}{2}$ Mal so lang als sein Körper, beim Erwachsenen nur 2 Mal so lang. Diese Verlängerung beruht auf einer stärkeren Entwicklung des Colon descendens, während Colon ascendens und transversum eher verkürzt als im richtigen Verhältniss gebildet erscheinen. Die übrige Kleinheit des Bauchraumes und die grosse Leber bedingen nun stärkere Krümmungen des Colon descendens, das anstatt einer Curvatur (*C. sigmoidea*) deren mehrere beschreibt. Die eigentliche *Flexura sigmoidea* findet sich deshalb entweder mehr in der Mittellinie oder eher entschieden rechts. Dass in Folge dieser vermehrten und verstärkten Krümmungen des Darmes die Fortbewegung seines Inhaltes erschwert werden müsse, ist klar. Bei Neugeborenen muss endlich auf Imperforatio auf, deren Beschreibung weiter unten folgen wird, Bedacht genommen werden.

Die Beschreibung der Symptome ist durch die Bezeichnung des Uebels fast schon erschöpft. Der Leib ist aufgetrieben, aber bei tiefer Verstopfung nicht schmerzhaft bei Berührung. Die spärlichen Fäces liegen trocken wie die der Ziegen oder Schafe in den Wücheln. Bei längerer Dauer und höheren Graden nimmt der Meteorismus zu einer Weise zu, dass die Leber nach oben gedrängt, die Milz nicht mehr zu percutiren und das ganze Abdomen trugmoelartig anzufüllen ist, wobei natürlich ein Druck auf dasselbe schmerzhaft wird. Die Kinder essen dann nicht mehr, sind sehr unruhig, bekommen Aufstossen und endlich Erbrechen, es gehen mit einiger vorübergehender Erleichterung stinkende Darmgase ab, und sämtliche Symptome verschwinden mit einem Male, wenn eine oder einige copulöse Ausleerungen erfolgt sind.

Bei längerer Dauer wird der Meteorismus chronisch. Unter den fortbestehenden Appetitmangel kommen die Kinder sehr herunter und es entwickeln sich in Folge der anhaltenden Compression der Abdominalorgane unter der Bauchhaut betrüfliche collaterale Ventrivestigungen.

Bei jeder bedeutenderen Obstipation ist es rathsam, den Arm und den Mastdarm mit dem Finger zu untersuchen, weil hiedurch eine

interne Behandlung zuweilen überflüssig wird. Die Folgen derselben sind häufig Hernien und, bei kleinen Kindern, Convulsionen. Die Prognose ist, wenn keine mechanischen, unüberwindlichen Hindernisse, wie sub 4) angegeben, vorhanden sind, günstig zu stellen.

Therapie.

Die Behandlung muss die Ursachen aufzuheben, wobei vor Allem die Diät genau geprüft und regulirt werden muss. Oft genügt schon eine kleine Modification der Ernährung, z. B. wenn man statt drei Mal nur zwei Mal Brod geben lässt und dafür mehr Milch reicht, oder wenn man statt der sehr stopfenden Schleimsuppen dünne Fleischbrühe mit etwas Weisbrod oder Gries als tägliche Nahrung und etwas concentrirtes Zuckerwasser als Getränk einführt. Bei etwas älteren Kindern kann man durch gekochtes oder auch rohes reifes Obst, Trauben, Äpfel, Birnen etc., dann durch reichliches Trinken kalten Wassers den Stuhl leicht vermehren, und überhaupt ist es in allen Fällen rathsam, die Verstopfung durch geänderte Diät und nicht durch Abführmittel, was immer für Namen sie haben mögen, zu heben. Gelingt es auf diese einfache Weise nicht, das Uebel zu bekämpfen, so ist die Tinct. Rhei aquosa zu 1–2 Kaffeeöffel gegeben, das beste und unschädlichste Mittel. Zur Beförderung des Stuhles ohne weitere Nebenzwecke soll man nicht immer gleich Calomel reichen, weil vom Quecksilber eben doch der Verdacht nicht weggewälzt werden kann, dass es in vielen Fällen die Entwicklung in der Folge retardirt und die Zahncaries befördert. Auf einfache Weise lässt sich oft durch ein Seifenröhrchen von der Länge eines Fingergliedes und der Dicke eines Foderkiess Verstopfung heilen. Clymata mit kaltem oder Seifenwasser haben den doppelten Nutzen, die harten Fäcalmassen im Rectum zu erweichen und durch consernsuellen Reiz den ganzen Darm zu vermehrter peristaltischer Bewegung und vermehrter Secretion anzuregen. Wenn übrigens die Kothmassen sehr compact sind, so gelingt es nicht, ein Clyma zu geben, sondern das Wasser fließt regelmäßig schon während des Einspritzens wieder ab, wo dann nichts übrig bleibt, als auf mechanische Weise mittelst Haarmadel oder Ohröffel dieselben zu entfernen. Die in Begleitung fieberhafter Krankheiten, dann die in Folge von Hydrocephalus ventris oder von Peritonitis entstehende Verstopfung wird nur selten Gegenstand specieller Behandlung und wird in den entsprechenden Abschnitten abgehandelt werden.

2) Catarrh der Magenschleimhaut. Catarrhus ventriculi.

Der Catarrh der Magenschleimhaut oder die Gastritis catarrhalis findet sich in den Leichen vieler Kinder, die bei Lebzeiten durchaus keine Zeichen von gestörter Verdauung erkennen liessen. Wenn man bedenkt, dass bei Neugeborenen eine lebhaft e Röthe der Magenschleimhaut ein physiologischer Zustand ist, so wird man auf die so oft beschriebenen Injectionen und selbst Echyminen derselben kein grosses Gewicht mehr legen können, zumal wir gar keine Anhaltspunkte haben, ob und welche Symptome hierdurch erzeugt werden. Nur wenn eine Blamorrhöe der Magenschleimhaut sich entwickelt hat und der profus secretirte Schleim mehrmals täglich ausgebrochen wird, hat man vom

klinischen Standpunkte aus das Recht, von Magencatarrh zu sprechen. Die Veranlassungen hien sind so mannigfach wie die, welche in den vorübergehenden Abschnitten für Dyspepsie, Erbrechen, Flatulenz etc. aufgeführt worden sind.

Symptome.

Die Symptome einer solchen Magenblennorrhoe sind nun meist sauer, schaltender Magenschmerz, der mit Druck zunimmt, permanentes Aufreißung der Magenregion, fühlbar erhöhte Temperatur derselben und Anhäufung von Gas im Magen. Aufnahme von warmen oder festen Speisen und von warmen Getränken vermehrt den Schmerz, kalte Getränke, besonders kalte Milch beruhigt die Kinder merklich. Sie erbrechen zwar häufig auch die eingenommene Nahrung, hierauf allein aber läßt die Diagnose des Magencatarrhs sich nicht gründen, sondern es muß schon viel Würgen vor oder einige Stunden nach der Mahlzeit Erbrechen von reinem, glasigem, trübem oder grünlichem Schleim erfolgen. Die Ernährung leidet hierbei Anfangs nicht besonders, weil, wie schon bemerkt, die Nahrungsmittel nicht regelmäßig erbrochen werden und die Darmschleimhaut resorptionsfähig geblieben ist. Mit der Zeit aber tritt natürlich Abmagerung ein, und man findet dann in der Leiche die Magenschleimhaut verflacht, mit einer dicken Schleimmasse belegt und ihre Oberfläche uneben warzig, was die *Frynosa* (mit *mucronata* genannt haben. Hierbei ist zu bemerken, dass wenn man eine Schleimhaut als mangelkrank bezeichnen darf, man vorher die contractile Muscularis des Magens ausgehöhlet haben muss, indem bei stark contractilem Magen ohne jede, auch die gesündeste Schleimhaut ein warziges Aussehen bekommt. Die übrigen in den Lehrbüchern angegebenen Symptome, wie den Puls, das Allgemeinbefinden, die Stühle, den Urin etc. betreffen, sind nicht charakteristisch genug, dass sie hier aufgeführt werden müssten.

Therapie.

Die Behandlung hat hauptsächlich die Diät ins Auge zu fassen, wobei mehrere Tage lang nichts als kalte Milch gestattet werden soll. Gegen die profuse Schleimsecretion hat sich der Höllenstein als vorzügliches Mittel herausgestellt. Bei kleinen Kindern unter einem bis zu zwei Jahren gebe ich ihn in Lösung zu 0,05 auf 100,0 destillirten Wassers ohne allen Syrup oder schleimigen Zusatz. Bei mehrjährigen Kindern, die schon geschloßt genug sind, gebe kleine Pillen von 0,05 zu schlucken, wirken Pillen, von denen jede 0,01 Argent. nitric. enthält, besser als die Lösung und sind leichter beizubringen. Ein einziges Mal erinnere ich mich bei einem nebjährigen Knaben mit dieser Behandlung zu keinem Resultate gekommen zu sein. Derselbe nahm 10 Tage hindurch täglich 4—6 Höllensteinpillen ohne allen Erfolg, worauf ich ihn in 150,0 schleimigen Vehäkel fünf Tropfen Kreosot ordnete und zu meinem Erstaunen das Erbrechen der Schleimmasse plötzlich zu Stillstand gebracht sah. Wegen des ühlen Geruches und überaus schlechten Geschmacks des Kreosotes ist der Höllenstein *castorei paribus* immer vorzuziehen. Uebl. im Behandlung des Erbrechens, pag. 120.

3) Die toxische Entzündung des Magens.

Alle Kinder raschen gerne, und so geschieht es nicht gar selten, dass Kinder von 1—5 Jahren — die grösseren sind meist schon zu vorsichtig — besonders in Werkstätten, wo viel starke Säuren oder caust. Alkalien gebraucht werden, grössere Mengen Schwefelsäure, Salpetersäure, Aetzkali, Aetzkalk, gewöhnliche Lauge oder kohlensaures Natron hastig verschlucken und schon ziemlich grosse Mengen in den Magen bekommen, bevor sie ihren folgeschweren Irrthum inne werden. Die allgemeinen Wirkungen der caustischen Gifte zu erörtern, gehört vor das Forum der Toxicologie, wir wollen uns hier darauf beschränken, die örtlichen Veränderungen am Magen und den Eingeweiden zu betrachten.

Symptome und anatomische Charaktere.

Die Mundhöhle ist der sicherste Wegweiser für die Zerstörungen im Magen. Ihre Schleimhaut findet sich bei allen concentrirten Causticis zu einer weissgrauen Masse verwandelt, nach deren Entfernung das submucöse Gewebe dunkelroth zu Tage liegt und zuweilen bedeutende Blutungen erleidet. Nur bei der Salpetersäure ist die Schleimhaut gelb gefärbt und weniger erweicht als geschwüpft. Bei sehr concentrirten und in grosser Menge in den Mund gebrachten Causticis ergreift die Zerstörung auch das submucöse Gewebe und man glauht bei der ersten Besichtigung eine ausgedehnte Gangrän wie z. B. bei Noma vor sich zu haben. Einen ähnlichen Befund trifft man auch im Magen. Die leichtere Cauterisation mit schwächeren Causticis oder so kleinen Portionen, dass sie durch Verdünnung des Mageninhaltes kaum mehr caustisch wirken, kommen kaum jemals zur anatomischen Untersuchung, da das letale Ende erst viel später oder in den meisten Fällen gar nicht erfolgt. In den schnell tödtlichen Fällen findet man die Schleimhaut zu schwarzen Fetzen zerstört, die Muscular und Serosa ebenfalls aufgedockert und gewöhnlich durchlöcheret, so dass der Mageninhalt in die Peritonealhöhle ausgetreten ist. Der Zwölfingerdarm kann auch noch von dem Causticum erreicht werden, die Erscheinungen des Darmes sind aber im Verhältnisse zu denen des Magens in allen Fällen sehr gering. Tritt nicht sofort der Tod durch Perforation des Magens ein, was bei wachsenden Kindern sich viel seltener ereignet als bei Selbstmördern, die mit Vorsatz eine grosse Menge ätzender Flüssigkeit verschlucken, so entstehen doch häufig Magen- und besonders Oesophagusgeschwüre (cf. Oesophagitis, pag. 113), die nur sehr langsam mit Stricturen und harten Narben heilen.

Die ein solches Misgeschick begleitenden Symptome sind verschieden, je nach der Menge und Stärke des Causticums, je nach der Tiefe, bis auf welche sie im Oesophagus vorgedrungen, je nach der Zeit, die sie im Magen unverändert geblieben, und je nach der Menge von Speisebrei oder Flüssigkeit, die sie im Magen vorgefundnen haben. Gewöhnlich tritt unmittelbar nach der Einführung in den Mund Brechbewegung und krampfartige Verschlussung des Oesophagus ein, in Folge deren die ätzende Flüssigkeit gar nicht in den Magen gelangt, sondern wieder zum Munde herausbefördert wird.

Viel schlimmer ist der Fall, wenn wirklich auch der Magen geätzt worden ist. Die Kinder liegen dann in der größten Angst da, bewegen sich nur wenig, weil die enormen Magenschmerzen hiedurch noch vermehrt würden und fortwährend fließt ihnen blutiger Speichel, dem zuweilen sich etwas erbrochene schwarze Masse hinzugesellt, aus dem Munde. Die Sprache ist vollkommen klanglos, jede Seldingbewegung ruft neue heftige Schmerzen, selbst Ohnmachten oder Convulsionen hervor, und kalter Angstschweiß bedeckt das Gesicht, die Augen suchen ängstlich umher, liegen tief in der Orbita und sind mit einem breiten, blauen Hof umgeben. Der Puls ist klein, kaum zu fühlen, die Prominenz des Körpers sind cyanotisch. Ist der Darmkanal auch noch mit dem Aetzmittel in Berührung gekommen, so sollen auch blutige Stühle eintreten. Haben die Erscheinungen den eben beschriebenen hohen Grad erreicht, so tritt in der Regel bald der Tod durch Perforation des Magens oder auch ohne diese, wie es scheint, in Folge einer Paralyse der N. vagi ein. Erfolgt der Tod nicht in den ersten Tagen, so tritt gewöhnlich nach Monate langen Schmerzen und unter gewaltiger Abmagerung Heilung ein. Die abnormen Anhöhen, Formveränderungen, Divertikelbildungen oder Strikturen können jedoch lebenslängliche Nachteile hinterlassen.

Therapie.

Die Behandlung wird bei Vergiftung mit caustischen oder kohlensauren Alkalien durch möglichst rasche Neutralisation mittel verdünnter Pflanzensäuren, Essig, Citronensaft oder Weinsäure eingeleitet, oder man versüßt sie mit fetten Oelen, Mandel- oder Olivenöl, das die Kinder löffelweise nehmen müssen. Eines dieser Mittel findet sich in jedem Hause und man hat deshalb nicht nöthig, es erst schmerzige Mittel, deren einhüllende Wirkung durchaus nicht klar ist, zu geben, noch viel weniger sind Brechmittel indicirt, weil dadurch immer spontanes Erbrechen erfolgt und durch noch kräftigere Magencontractionen die Gelegenheit zu endlicher Perforation nur vermehrt wird.

Die ätzenden Säuren verlangen ebenfalls möglichst rasche Neutralisation und hierzu wäre am besten die Magnesia usta geeignet, die sich aber in keinem Hause vorfindet und immer erst aus der Apotheke geholt werden muss, wodurch eine Zeitversäumniss, die dem Kinde leicht das Leben kosten kann, entsteht. Man greift deshalb besser zum Seifenwasser oder zu geschabter Kreide, wodurch sich aber sehr viel Kohlensäure entwickelt, die, bevor sie durch Aufstossen entfernt wird, eine gefährliche Ausdehnung des Magens bedingen kann. Asche und gewöhnliche Lauge dürfen nur mit Vorsicht und bei gehöriger Verdünnung gereicht werden, weil sie selbst neue Ätzung bedingen können. Hat man in dieser Weise nach mehrstündiger Behandlung die drohendsten Symptome gemildert, so ist Opium das beste und rationellste Mittel zur Milderung des Schmerzes und zur Aufhebung der antiperistaltischen Magenbewegungen. Man gibt einem Kinde Opiumtinctur, immer einen Tropfen weniger als es Jahre zählt, welche Dosis von zwei zu zwei Stunden wiederholt wird, bis Ruhe und leichte Excretions Symptome eintreten. Als bestes Nahrungsmittel, wobei auch ältere Kinder viele Wochen gut bestehen können, hat sich die Kal-

nisch erwiesen, welche Anfangs kalt, später lauwarm nach Belieben gereicht werden kann.

4) Das perforirende Magengeschwür. *Ulcus ventriculi rotundum sive perforans.*

Das perforirende Magengeschwür kommt bei Kindern unter zehn Jahren nur äusserst selten vor, hingegen ereignet es sich häufig bei chlorotischen Mädchen vor Eintritt der Pubertät. Wir haben es also hier mit keiner Kinderkrankheit im engeren Sinne zu thun, sondern führen dasselbe nur an, um es bei zweifelhafter Diagnose einer Magenkrankheit eines Kindes unter zehn Jahren ausschliessen zu können. Erkrankten aber ältere Kinder, besonders Mädchen daran, so unterscheiden sich die Symptome, die pathologische Anatomie, die Ausgänge und die Behandlung in nichts von denen, die bei Erwachsenen beobachtet werden. Wir verweisen deshalb auf die classischen Arbeiten von Rokitsansky, Cruveilhier und Bamberger, in dessen Krankheiten des chylopoëtischen Systems man eine erschöpfende Besprechung dieses Zustandes findet.

5) Die hämorrhagischen Erosionen der Magenschleimhaut.

Man sieht bei sehr vielen Sectionen von Kindern, die an den verschiedensten Krankheiten gestorben sind, auf der Magenschleimhaut eine grössere oder geringere Menge von kleinen Blutextravasaten. Es sind runde Stößen von kaum Hirsekorn- bis höchstens Erbsengrösse, oder längere, schmale, den äussersten Prominenzien der gewulsteten Magenschleimhaut entsprechende Streifen, an denen die Schleimhaut dunkel geröthet, blutend erscheint, oder bei längerem Bestehen eine sichte Depression in Folge von Substanzverlust darbietet. Gewöhnlich flottiren über solchen Stellen braunrothe Fibrinflocken, nach deren Entfernung man die beschriebenen Verhältnisse erst deutlicher wahrnimmt. Ein Weitergreifen in das submucöse Gewebe und die Muscularis konnte ich niemals bemerken.

In der Gegend des Pylorus sind diese Erosionen am häufigsten und zahlreichsten. Ob sie ihren Ursprung im drüsigen Apparat der Magenschleimhaut haben, weshalb Cruveilhier diesen Zustand Gastritis folliculosa genannt wissen will, ist in der Leiche, wo sich die Ecchymosen nicht auf einzelne Schleimfollikel beschränken, sondern über grössere Flächen in runder oder länglicher Form sich ausdehnen, nicht mehr zu entscheiden.

Die Symptome sind gemäss der schon Eingangs erwähnten Thatsache, dass man diese Erosionen in den Leichen der an den verschiedensten Krankheiten gestorbenen Kinder finden kann, sehr unbestimmt und mangelhaft. Am häufigsten kommen sie bei tuberculösen und atrophischen Kindern vor. Ausserdem findet man sie oft bei Kindern, die mit Tartarus stibius, mit andern Brechmitteln, mit Drastica behandelt worden sind, oder welche im Verlaufe ihrer letzten Krankheit an spontanem Erbrechen gelitten haben. Uebrigens kann man sich nicht verhehlen, dass sie auch zuweilen bei Kindern gefunden werden, bei denen keiner dieser Umstände vorhanden war, und die an

ganz anderen Krankheiten, an lobulärer oder lobärer Pneumonie, an Pyämie etc. zu Grunde gegangen sind, so dass es problematisch erscheint, für diesen Leichenbefund überhaupt Symptome bei Lebzeiten anzugeben und dass dieser Zustand also fast nur pathologisch anatomisches Interesse hat.

Anhang.

Die Magenerweichung. *Gastromalacia*.

Die Magenerweichung ist keine Krankheit, sondern ein Leichenphänomen; da aber noch eine grosse Anzahl von Autoren und beschäftigten Aerzten zweifelt an ihrer cadaverischen Natur, so sollen im Folgenden die Gründe hierfür etwas ausführlicher, als es die Einfachheit der ganzen Sache eigentlich erheischt, entwickelt werden.

Vor dem Erscheinen der Jäger'schen Artikel hielt Jedermann die Magenerweichung für eine Leichenerscheinung, eine nach dem Tode eintretende Selbstverdauung des Magens, in welchem Sinne schon Morgagni und Hunter, später Armstrong, Treviranus, Carcwell u. a. m. schrieben. Da trat 1811 Jäger mit seiner Entdeckung einer neuen Krankheit, der Magenerweichung, auf, die er in mehreren Journalartikeln im Hufeland'schen Journal für praktischen Heilkunde publicirte. Die Symptome der neuen Krankheit seien, wie später von Krenner ganz richtig bemerkt wurde, mit der gewöhnlichen Brechruhr ganz zusammen. So gibt sich bei ihrem Beginn durch Fieber, unregelmässiges Atmen, schmerzhaften Unterleib, grossen Durst, Appetitlosigkeit, Brechen und Durchfall zu erkennen, worauf in kürzester Zeit eine ausserordentliche Abmagerung, fortwährende Unruhe und Schlaflosigkeit, Kältewerden des Gesichts und der Extremitäten und fast regelmässig der Tod erfolgt.

Es dauerte aber nicht lange, so fand man, dass dieser Symptomencomplex nicht bei allen in der Leiche gefundenen *Gastromalacien* paßte, und man nahm deshalb seine Zuflucht zur Entdeckung von zwei Formen, einer acuten und einer chronischen. Für die acute blieben die oben beschriebenen Symptome aufrecht erhalten, der Tod sollte am 7.—8. Tage, der Uebergang in die chronische Form schon am 4. Tage erfolgen. Diese letztere Form kann sich aber ausserdem aus Anfangs milden und wenig in die Augen fallenden Symptomen entwickeln und die Kinder geben unter dem Bilde der Atrophie zu Grunde. Da fast ein jedes Kind im Verlaufe des ersten Lebensjahres das eine oder andere Mal Brechen und Diarrhöe gehabt hat, so lies sich nun, so oft man bei einer Section Magenerweichung fand, in sehr bequemer Weise diese chronische Form construiren. Dass bei der grossen Anzahl von Kindern, die wirklich an acuter Brechruhr, an der sogenannten Cholera nostras, zu Grunde gegangen waren, keine Spur von Magenerweichung zu finden war, wurde lange Zeit ignorirt, was denn eben zu gehen pflegt, wenn man von einer Idee einmal erfasst ist. Mit der Zeit wackelten sich aber die Zweifel über den Zusammenhang des Leichenbefundes mit dem künstlich construirten Symptomencomplex in einer Weise, dass die Stimme der Ungläubigen endlich gehört werden musste. Zu diesen gehören vor Allen Virchow und

seine Schüler, dann Engel, Bednár, Oppolzer, Bamberger, W. King und Trousseau. Ihnen stand und steht zum Theil noch ein ganzes Heer von deutschen und französischen Aerzten entgegen, die sich nach Bamberger in verschiedene Gruppen bringen lassen. Louis, Lallemand, Billard, Richter, Nagel betrachten die Erweichung als Produkt einer Entzündung. Andral, Cruveilhier, Berndt, Winter glauben sie durch veränderte Saftbeschaffenheit, zum Theil durch Reizung und Congestion bedingt. Jäger, Camerer, Autenrieth, Schönlein, Naumann, Most, Teniffel und andere sehen als ihren Grund eine veränderte Beschaffenheit des Nervensystems, eine Neuroplogose oder Neuroparalyse an. Auch Rokitanaky hält, wenigstens in der älteren Auflage seiner pathologischen Anatomie, diese Ursache für wahrscheinlich und nimmt ausserdem für eine andere Reihe von Fällen eine Degeneration dyskrasischer Process an. Canstatt sucht die Ursache in einer Veränderung des Magensecretes und Eisenmann wittert gar ein eigenthümliches Miasm.

Endlich gibt es auch noch eine grosse Menge von Aerzten, die es mit beiden Parteien halten wollen, indem sie Magenverweichung wohl im Leben begangen, aber erst nach dem Tode zu den höheren Graden und zur Perforation des Magens kommen lassen. Hierher gehören Chauxier, Mackel, zum Theil auch Andral.

Das meiste Licht in diesen verwickelten Streit brachte Elsässer durch seine 1846 erschienene Monographie, in welcher er nachwies, warum und unter welchen Bedingungen die Erweichung in einer Leiche eintritt, in einer andern nicht gefunden wird. Bevor wir genauer auf die Gründe für die cadaverische Natur der Magenverweichung eingehen, müssen vorerst die pathologisch-anatomischen Befunde demonstriert werden.

Man begreift unter Gastromalacie eine Veränderung des Magens, bei welcher seine Häute ohne alle Zeichen von Entzündung, Geschwürs- oder Pseudophloemenbildung in grosserer Ausdehnung erweicht und selbst vollkommen zerstört sind. Der Sitz dieses Processes ist in der grossen Mehrzahl der Fälle der Blinddarm, und vorzugsweise dessen hintere Wand. Dass gerade diese Partithen am häufigsten ergriffen werden, ergibt sich aus der Rückenlage, in welche man die Kinderleichen zu bringen pflegt. Das zuerst ergriffene Gewebe ist immer die Schleimhaut, erst wenn diese zerstört ist, greift der Process auf die Muscularis und nach dieser endlich auf die Serosa über. An den Uebergangsstellen der erweichten Magenpartithen zu den unverändert gebliebenen lassen sich diese Verhältnisse leicht und klar demonstrieren.

Man hat auch eine gallertige und eine schwarze Erweichung unterschieden. Bei der gallertigen sind die betreffenden Stellen zu einer gelbgrünen, salzigen, bei der schwarzen in eine dunkelbraune oder schwärzliche Masse zerfallen. Ob die Farbe eine dunklere oder hellere ist, hängt lediglich von dem mehr oder minder grossen Blutgehalt des Magens zur Zeit des eintretenden Todes ab. Je blutreicher die Magenhäute, um so dunkler werden die erweichten Stellen sich ausnehmen. Zuweilen beschränkt sich die Erweichung so präcis auf die Schleimhaut und das submucöse Gewebe, dass die Muscularis wie präpariert daliegt, ist aber auch diese zerstört, so bekommt die allein noch übrig bleibende Serosa ein förmliches Aussehen und zerfällt bei der leisesten

Berührung, die man zur Herausnahme des Magens vornehmen muss. In anderen Fällen ist der Magen schon vor Eröffnung des Abdomens geplatzt und sein Inhalt in den Peritonealsack ausgetreten. Dabei ist aber wohl zu beachten, dass man noch niemals bei einem so durchbohrten Magen eine Reaction des Peritoneums, frische Röthung oder eitrigen Erguss wahrgenommen hat.

Scharfe Begrenzung der erweichten Stellen findet sich fast niemals, die Erweichung wird allmählig weicher und verliert sich ohne alle entzündliche oder nur congestionelle Demarkation in die gesunde Schleimhaut. Was den Mageninhalt betrifft, so war Elsässer der Erste, der darauf aufmerksam machte, dass ein erweichter Magen niemals leer d. h. nur mit Schleim erfüllt ist und dass der vorhandene Speisebrei immer stark sauer reagirt. In der grossen Mehrzahl der Magenweichungen besteht der Inhalt in geronnener Milch. Oefters wird auch die Umgebung des Magens von der Erweichung ergriffen, ohne dass deshalb eine Perforation hätte stattfinden müssen. Es wird die Milz, die linke Hälfte des Zwerchfells und der Ösophagus in die Erweichung hineingezogen, so dass nach Platzen des letzteren, was häufig durch unsanfte Behandlung der Leichen geschehen mag, die Speisebrei in den linken Pleurasack austreten kann. Auch hier hat man natürlich noch niemals Spuren von Reaction gefunden. Es ist sogar eine Erweichung des Lungengewebes und schon Speisebrei in den Bronchien beobachtet worden, was wohl so gedeutet werden muss, dass durch Abwärtsrutschen der Kindesleiche auf dem Transport oder zum Behufe der Reinigung sich Mageninhalt in den Pharynx entleert und nun durch die klapfende Stimmritze in die Lungen sich ergossen hat, wo die die Erweichung bedingenden Stoffe ebenso zu wirken begannen, als wären sie im Magen geblieben. In den übrigen Organen findet man überdies meistens Veränderungen mannigfacher Art, aus welchen sich der Tod häufiglich erklären lässt. Folgende Gründe am lassen sich anführen für die cadaveröse Natur der Magenweichung und für die Nichtbestehen während des Lebens.

1) Die Magenweichung findet sich immer in dem am leichtesten geliegenden Theile des Magens, in welchem sich nach dem Gesetze der Schwere der Inhalt ansammelt, also unter den gewöhnlichen Umständen bei der Rückenlage der Leichen, im Blindsacke und zwar vorzugsweise auf dessen hinterer Fläche. Dass die Erweichung immer nur die Stellen der Schleimhaut trifft, welche mit dem Speisebrei längere Zeit in Berührung waren, kann man bei Thieren, die man bald nach einer Fütterung mit gährungsfähigen Substanzen getödtet hat, leicht dadurch nachweisen, dass man verschiedenen Thierleichen verschiedene Lagerungen gibt, indem man sie auf den Rücken, auf den Bauch, auf die Seite legt oder sie aufhängt. Elsässer hat auch an einer Kinderleiche diesen Nachweis geliefert, indem er dieselbe unmittelbar nach dem Tode 22 Stunden lang auf die rechte Seite legte und nun den Blindsack ganz unverletzt, die rechte Hälfte des Magens aber gegen den Pylorus so erweicht fand. Die Schleimhaut war an diesen Partien vollkommen, die Muscularis zum Theil in eine schleimigartige Masse verwandelt, der Mageninhalt bestand in einer grauen, milkgriechenden sauer reagirenden, mit geronnenen Milchklumpchen vermischten Brühe. Diese Versuche zeigen evident, dass die Magenweichung im Augen-

blicke des Todes noch nicht vorhanden ist und erst dann entsteht, wenn ein geeigneter Mageninhalt in der Leiche mit der Wandung längere Zeit in Berührung bleibt. Sie zeigen ferner, dass die Flächen- ausdehnung der erweichten Stellen im Verhältniss steht zu den Berührungsflächen des Magens und der Contesta. Bei einer Leiche, die bis zur Section ruhig gelegen ist, geht die Magenerweichung niemals über den Raum, den der Speisebrei einnahm, hinaus.

2) Direkte Versuche, vorzugsweise von Elsässer angeregt und nach ihm von Vielen wiederholt und bestätigt, haben dargethan, dass der aus der Leiche herausgenommene gesunde Magen nicht nur durch alle Säuren, sondern auch durch alle Stoffe, die der sauren Gährung fähig sind, besonders Milch und Zucker, unter Erhaltung jener Temperatur, die auch in der Leiche noch lange Zeit zurückbleibt, ebenso erweicht wird, als diess bei den Sectionen gefunden wird.

3) Direkte Versuche an Hunden und Kaninchen haben ergeben, dass ganz gesunde Thiere, wenn man sie mit Milch oder pflanzen- säurehaltigen Vegetabilien füttert, während der Verdauung tödtet und 14 Stunden an einem nicht zu kalten Orte liegen lässt, die höchsten Grade von Magenerweichung, Perforation des Magens — bei Kaninchen fast vollständiges Verschwinden des ganzen Magens, der zummehr als loser Schleim den grossen Klumpen der gegessenen Pflanzen anklößt, — zur Folge hat. Dasselbe findet man häufig bei der Section der Selbstmörder und Hingerichteten und vieler plötzlich Verstorbenen.

Die Magenerweichung lässt sich auch künstlich ausserhalb des Körpers und durch ein höchst einfaches Verfahren in jeder Thierleiche hervorrufen.

4) Die von Brechruhr befallenen Kinder, welche also nach der oben besprochenen Identität der Symptome der Brechruhr mit jenen der Magenerweichung auch an der letzteren leiden, genesen häufig und können dann bald darauf an einer andern Krankheit sterben. Man hat aber noch niemals die Spuren einer geheilten Magenerweichung in einer Kinderleiche gefunden, und doch müsste eine solche Zerstörung, wie sie schon bei den schwächsten Graden der Magenerweichung vorkommt, beträchtliche Narben und Contractionen der ergriffenen Theile bedingen. Man fand auch, wie schon erwähnt, noch niemals in einem erweichten Magen eine Spur von Reaction oder Abgrenzung, wie sie sonst bei allen vitalen Processen sich einstellt.

5) Die Symptome, welche die Erweichung bei Lebzeiten charakterisiren sollen, sind von den Autoren sehr verschiednen angegeben. Die meisten beschreiben allerdings die Symptome des Brechdurchfalles, der Cholera nostras, andere aber beschreiben Hirnzox oder Hirndruck und wieder andere nur die gewöhnliche Atrophie, aus welcher dann die chronische Magenerweichung construiert wurde. Uebrigens harnisiren auch die Symptome des Brechdurchfalles mit den anatomischen Veränderungen der Magenerweichung nicht. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass ein in Erweichung begriffener Magen fortwährend zu so kräftigen Contractionen disponirt ist, wie sie zu den Brechbewegungen nöthig sind. Wenn aber Kinder bei Lebzeiten Magenerweichung hätten und sich erbrechen, so müsste offenbar Blut erschossen werden, weil die Arterien der erweichten Stellen nicht obliterirt sind, wie allen mit Injectionen vertrauten Anatomen bekannt ist.

6) Das geduldige Nervensystem wurde von den Vitalisten, w nannte man kurz diejenigen Aerzte, welche die Magenverweichung bei Lebewesen entstehen lassen, mannigfaltig zu Hilfe gezogen. Namentlich erschien eine Halbblähung des Vagus sehr geeignet, alle Symptome zu erklären und besonders wurde durch sie der Mangel des Schitzerns und der Krampfhaftigkeit und ferner das häufige Auftreten der Magenverweichung bei Gehirn- und Lungenkrankheiten zu erklären gesucht. Elsässer bemerkt hingegen treffend, dass, wie die Magenverweichung, so auch anatomische Veränderungen in der Schädelhöhle bei Kindern überhaupt sehr häufig vorkommen und dass sich ihr Zusammentreffen so lange der Zufälligkeit verdächtig macht, bis einmal ausgeführte statistische Zusammenstellungen ergeben haben, wie oft bei Kindern überhaupt Gehirnleiden, wie oft Magenverweichung für sich allein und wie oft beide zusammen gefunden werden. Nach der bisher gesammelten Statistik stellt Elsässer eine genetische Beziehung zwischen Hirnkrankheiten und Magenverweichung in Abrede. Die von Camerer zum Belege dieser Vagualähmung angestellten Versuche haben durchaus keine Beweiskraft. Derselbe fand nämlich, dass gesunde Kaninchen, denen man den Inhalt von erweichten Kindermägen in den Magen bringt, dadurch keinen Nachtheil erfahren, dass aber bei Kaninchen, denen man den N. vagus und sympathicus beider Seiten durchschnitten und hierauf von jenem Mageninhalt eingegeben hatte, der Tod nach ungefähr 16 Stunden erfolgte und dass hierauf bei Einem 16½ Stunde nach dem Tode der Magen in allen Hanten merklich erweicht, bei einem andern, das erst 11 Stunden nach dem Tode geöffnet wurde, der Fundus des Magens grösstentheils aufgebläht war. Er hat unglücklicherweise vergessen, den Gegenversuch mit einem gesunden Kaninchen anzustellen. Auch die gesunden Kaninchen zeigen Magenverweichung, nur muss man die Thiere ziemlich bald, nachdem man ihnen den Inhalt erweichter Kindermägen oder irgend eine andere säuerliche Nahrung beigebracht hat, tödten, weil sonst durch die Bewegungen des verlaufenden Magens der schädliche Inhalt in den Darm gefördert und hier zu sehr vertheilt wird. Dass die Mägen der so operirten Kaninchen noch in Erweichung übergingen, obwohl sie 16 Stunden lang nach Einbringung des säuerlichen Mageninhaltes am Leben geblieben waren, lässt sich einfach aus der hierauf entstandenen Lähmung der Magenmuskulatur erklären. Es blieb in diesem Falle der Mageninhalt bis zum Tode unverändert in dem gelähmten Magen liegen. Zu gleicher Zeit aber paralytische Magenerven und ein „übersäuerter“ Magencontent anzunehmen, wie dies auch bei manchen Autoren vorkommt, ist physiologisch unrichtig, weil schon Tiedemann und nach ihm viele Physiologen nachgewiesen haben, dass nach Durchschneidung des N. vagi der Magensaft neutral oder wenigstens weniger sauer als im Normalzustand gefunden wird.

So wären nun meines Erachtens genug triftige Gründe aufgeführt, von denen jeder allein schon genügt, die Magenverweichung als Krankheit zu negiren, und es wäre manchen andern, Angst und Unruhe als wahr anerkannten Thatsachen nur zu wünschen, dass sie auch so bestimmt und exakt als das, wofür man sie ansieht, bewiesen werden könnten, wie dies bei der Magenverweichung als Lebeweicheit gelungen ist.

6) Die catarrhalische Darmentzündung. *Catarrhus intestinalis*.

Nachdem in dem Abschnitte von der Diarrhöe die Stühle des Darmcatarrhs schon besprochen, erübrigt hier nur mehr, die pathologische Anatomie, die Aetiologie, die Symptome, die Ausgänge und die Behandlung zu erörtern.

Stirbt ein Kind, das in den letzten Lebenstagen einen acuten Darmcatarrh acquirirte, so findet man die Schleimhaut des Dünn- und Dickdarms im Allgemeinen turgescent, an einzelnen Stellen entweder dendritisch inficirt oder von einer diffusen dunkleren Röthe durchzogen, welche Stellen häufig den Knickungen der einzelnen Darmschlingen entsprechen. Die solitären Drüsen erscheinen besonders im Dickdarm deutlich geschwellt und ragen als kleine weissliche Prominenzen von der Grösse eines Stecknadelkopfes über die geröthete Schleimhaut empor. Sie enthalten dieselben Zellen, die man auch im Normalzustand in ihnen findet, nur in viel grösserer Menge. Hat der Darmcatarrh erst kurze Zeit bestanden, so findet man diese Leukocyllofollikel und die Peyer'schen Drüsen, die ja nur als gruppenweise auftretende Leukocyllofollikel zu betrachten sind, niemals oder sehr selten geplatzt, während sie bei chronischen Darmcatarrhen gewöhnlich geplatzt und stellenweise schwarz pigmentirt erscheinen. Auf grossen Strecken der Schleimhaut nehmen die neugebildeten Epithelzellen nach rascher erfolgter Abstossung des normalen Cylinderepithels, worin eben das Wesen des Darmcatarrhs zu suchen ist, nicht wieder den Charakter der ursprünglichen Cylinderepithelien an, sondern behalten die rundliche Form der Schleimkörperchen. Die ganze Schleimhaut wird durch die vermehrte Blutzufuhr und die seröse Exudation geschwellt, schwerer. Das submucöse Zellgewebe bleibt beim einfachen Catarrh intakt, beim chronischen nimmt es an Dicke zu, ebenso auch die Muscularis. Die schwarze Pigmentirung der einzelnen Darmzotten, die der ganzen Schleimhaut eine grauschwarze Färbung verleiht und beim chronischen Darmcatarrh der Exsclaveten fast regelmässig beobachtet wird, kommt bei Säuglingen niemals, bei grösseren Kindern nur in sehr geringem Grade vor, obwohl im Kindesalter chronische Diarrhöen ausserordentlich lange anzuhalten pflegen. Die Mesenterialdrüsen sind zum Unterschiede von der Enteritis folliculosa zuweilen geröthet, aber niemals infiltrirt und vergrössert. —

Aetiologie.

Der primäre, idiopathische Darmcatarrh kommt bei Säuglingen viel seltener vor als bei künstlich aufgefütterten Kindern. Bei jenen wird er fast nie durch die Nahrung, die Muttermilch, veranlasst, nur wenn die Stillende erkrankt ist, künstlich erzeugte oder spontan entstandene Diarrhöe hat oder einer Gemüthsbewegung ausgesetzt war, stellt sich beim Säugling Uebel, Colikschmerz und ein ganz leichter, nur kurze Zeit bestehender Darmcatarrh ein, durch welchen die Entwicklung des Kindes kaum merklich gehemmt wird. Am häufigsten entsteht bei Säuglingen der Darmcatarrh durch Erkältung, beim Durchbruch der Schneidezähne in Folge des Verschluckens des massenhaft secretirten Speichels und Schleims, und beim Abgewöhnen (Diarrhöa

alactatrum). — Bei aufgefütterten Kindern ist die Nahrung so-
 kaum zu ergründende Quelle der verschiedensten Erkrankungen, vor
 allem aber der Diarrhöe. Es wurde schon im allgemeinen Theile bei
 der „Ernährung“ bemerkt, dass das Casein der Kuhmilch im Kinder-
 magen zu grossen Klumpen gerinnt, während das der Frauenmilch nur
 lose Flocken bildet, wodurch allein schon der grosse Unterschied
 zwischen der frischesten, besten Kuhmilch und der Milch einer Amme
 sich erklärt. Nun aber ist es in grösseren Städten, und gerade hier
 kommt das Aufsfüttern am häufigsten vor, wirklich unmöglich, sich meh-
 rere Male des Tages frische Milch zu verschaffen, der mannigfachen Ver-
 fälschungen nicht zu gedenken. Es gibt kaum ein künstlich aufge-
 füttertes Kind, das nicht wenigstens einmal, dann aber längere Zeit
 an Darmcatarrh gelitten und hierdurch um viele Monate in seiner Ent-
 wicklung aufgehalten worden wäre.

Bei grösseren, über 1 Jahr alten Kindern ist der Nahrungsprocess die
 häufigste Veranlassung. Derselbe ist bekanntlich schon bei physiologischem
 Vorgange von einer mässigen Diarrhöe begleitet, welche aber sehr leicht
 ausartet und zum profusen, cholerähnlichen Durchfall wird, der binnen
 24 Stunden tödlich oder einen unauffhaltsamen Marasmus herbeiführen kann.

Häufiger sind bei Kindern, die das erste Lebensjahr schon über-
 standen haben, die Diarrhöen in Folge abnormen Reizes der Nahrungs-
 mittel seltener, indem der Magen schon viel schwerer verdauliche
 Nahrung zu bewältigen im Stande ist. Im Sommer, bevor die ver-
 schiedenen Obstsorten ihre gehörige Reife erlangt haben, kommt der
 Darmcatarrh bei ihnen epidemisch vor, es ist aber dann gewöhnlich
 kein einfacher Catarrh, sondern der Process nähert sich mehr dem
 eitrigen, indem die Kinder dabei noch heftige Colikschmerzen,
 hartnäckigen Tenismus und zuweilen auch blutige Stühle bekommen.

Symptome.

Schon vor Eintritt des Hauptsymptomes der Diarrhöe sind an
 kleinen Kindern mannigfache Veränderungen zu bemerken. Sie werden
 unruhig, schreien fast fortwährend, ziehen die Schenkel an den Leib,
 nehmen die Brust und Saugflasche nicht mehr, kurz haben die ver-
 schiedenen Zeichen der Colik und Flatulenz. Mit dem ersten dünn-
 flüssigen Stuhle treten, wenn er nur einigermaßen copios war, fast
 alle Symptome von Colik zurück und können auch fortwähren ausbleiben,
 wenn die den Durchfall bedingende Ursache eine vorübergehende war,
 z. B. eine einmal gereichte kleine Quantität säuerlicher Milch. Es ist
 dies aber der seltenere Fall, der sich fast nur bei Brustkindern er-
 eignet, gewöhnlich genügt eine einmalige Darreichung nicht frischer
 Milch, einen Wochen lang dauernden, heftigen Darmcatarrh hervor-
 zuufen. Je grösser die Ausdehnung der catarrhalisch ergriffenen Stellen
 ist, um so profuser wird die Diarrhöe, um so länger dauert sie und
 um so merklicher leidet die Ernährung darunter. Catarrhe des Dun-
 darmes verursachen fast gar keine Colik und wenig Diarrhöe, indem
 hier das ausgeschüttete Secret im Dickdarme grösstentheils wieder
 resorbirt werden kann. Catarrhe des Dickdarms hingegen und be-
 sonders des Rectums sind mit heftigen Schmerzen, mit Tenismus und
 fortwährend profuser Diarrhöe verbunden. Die Farbe der diarrhöischen
 Fäces ist anfangs normal, nimmt aber mit jeder Ausleerung ab, so dass

schließlich eine ganz hellgelbe, selbst graue, reisswasserähnliche Flüssigkeit ohne allen Geruch entleert wird. Die Wiederkehr der dunkleren Farbe und riechender Faeces ist als das günstigste Zeichen baldigen Stillstandes der Secretion zu betrachten. Der Unterleib ist etwas aufgetrieben, um den Nabel herum gewöhnlich schmerzhaft, oft hört man gurrende Geräusche (Borborygmi) in ihm; die Percussion ist, wenn gerade viel Flüssigkeit im Darmrohr sich befindet, stellenweise gedämpft tympanitisch. Die Harnsecretion ist sehr vermindert, der Harn ist verhältnissmässig sehr pigmentreich und lässt nach mehrstündigem Stehen an einem Orte mit niedriger Temperatur (mindestens unter 10° R.) ein Sediment von doppeltkohlensaurem Natrium, den sog. Ziegelmehlniederschlag, herausfallen. Der Durst ist sehr vermehrt; es erregt sich hier zuweilen der eigenthümliche Fall, dass die Brustkinder während eines starken Durchfalles die Brust nicht nehmen, wohl aber Zuckerwasser und noch lieber kaltes Wasser begierig trinken; sobald die Diarrhöe steht, rühren sie das Wasser nicht mehr an und trinken wieder mit dem früheren Eifer an der Amme. Die künstlich aufgefütterten Kinder nehmen wohl einige Löffel Brei, werauf sie sich kurze Zeit beruhigen, werden aber alsbald durch den neuen Reiz der eingeführten Nahrung nur um so aufgeregter, und lassen sich Stunden lang nicht mehr zur Ruhe bringen. Wenn ein Kind das Unglück hat, von Personen gepflegt zu werden, die der Ansicht sind, dass man die Unruhe des Kindes durch Füttern stillen könne, und die deshalb mehrmals in der Nacht aufstehen, um ein Mus zu kochen, wovon das Kind natürlich immer nur wenige Löffel nimmt, so kann man es, falls diese Personen sich über ihre verkehrte Anschauung nicht belehren lassen, als eine sichere Beute des Todes betrachten. Mir wenigstens ist es noch niemals gelungen, bei solchen Angehörigen ein Kind durchzubringen.

Am Anfang eines einfachen Darmcatarrhes haben die Kinder kein Fieber, keine Trockenheit und erhöhte Temperatur der Haut, sie werden im Gegentheil bei profuser farbloser Diarrhöe leicht kühl, die Nasenspitze wird weiss und kalt, der Athem hat nicht mehr die normale Wärme, die Lippen werden blass und bleich, ebenso die Fingerspitzen, und das Fest der Orbita schwindet sehr rasch, wodurch die Bulbi etwas tiefer zurücksinken und der eigenthümliche Gesichtsausdruck dieser Kranken entsteht. Nachdem aber die Diarrhöe zum Stillstand gebracht, tritt in Folge des vermehrten Stoffumsatzes gewöhnlich Fieber ein, das meist lange währt, die Genesung aufhält und oft zur Enteritis folliculosa und Atrophie führt. Ist dieses Reactionsfieber von kurzer Dauer, so stellt sich nach seinem Verschwinden rasche Besserung ein. Die Stühle behalten einige Zeit noch eine abnorme Beschaffenheit, indem sie entweder sehr hart werden oder schleimig bleiben und dann einen ziemlich unangenehmen Geruch annehmen. Der Appetit kehrt wieder und die Kinder bleiben nach ihren Mahlzeiten ruhig, das sicherste Zeichen, dass die Verdauung wieder ohne Beschwerden von Statten geht.

Als häufigste Complication ist der Magencatarrh zu erwähnen, das Erbrechen hört aber in der Regel früher auf als die Diarrhöe. Bronchitis ist ebenfalls oft mit Darmcatarrh complicirt. Am schlimmsten ist der Uebergang in Enteritis folliculosa, die bei so unzählig vielen künstlich aufgefütterten Kindern sich einzustellen pflegt.

Behandlung.

Bei Brustkindern genügt gewöhnlich schon eine diätetische Behandlung der Anme. Hat dieselbe Dyspepsie ohne Fieber und Darmcatarrh, wie das besonders nach Gemüthsbewegungen vorkommt, so hält man sie einige Tage diät und nährt sie einfach mit Milchsuppe, etwas Kaffee, Fleischsuppe und gekochtem Obst, zum Getränk giebt man ihr Mandelmilch, Wasser mit Wein, oder pures Wasser. Die Milch bleibt bei dieser Kost, so lange kein anhaltendes Fieber zugegen, normal aus und wird höchstens in etwas geringerer Menge secretirt, was aber dem an Diarrhöe erkrankten Säugling gerade zuträglich ist.

Hat sich eine Anme durch einen Dittföcher Erbrechen und Durchfall angezogen, so tritt ein noch strengeres Regime ein, sie bekommt nichts als Schleimsuppe, weisses Brod und schleimige Getränke, Reisswasser, Gummiwasser, Salepwasser oder Mandelmilch, und steht auf diese Behandlung ihre Diarrhöe nach 2—3 Tagen nicht, so giebt man ihr 10—15 Tropfen Opiumtinctur unmittelbar nachdem sie das Kind gestillt hat, worauf sie es mindestens vier Stunden nicht mehr anlegen darf. Wird aber die Diarrhöe dennoch chronisch und hat die Opiumtinctur nicht gleich in dieser ersten Gabe einen günstigen Erfolg, so wehe ich bei Fortsetzung des strengen diätetischen Verfahrens von Opium ab und gebe Adstringentien, Alaun, Tannin, Colombo, Argent. nitrosum etc. Mit einer internen medicamentösen Behandlung der Brustkinder kommt man selten weit, indem die meisten ungenügsamen Löffel schlucken und die eingeschüttete Medicin wieder ausspucken. Am heissensten ist die Kimpfenehung des Mundes mit Opiumtinctur. Ich bediene mich hierzu eines kleinen Pinsels von der Dicke einer schwachen Röhrenfeder, tauche denselben in T. Opii croc., rühre mit einer schwellenden Fingerbewegung den ersten Tropfen der Tinctur aus dem Pinsel und stecke ihn nun mit dem Rest derselben in den Mund; dann drücke ich das Kinn etwas nach aufwärts und ziehe den Pinsel zwischen den zusammengeklebten Lippen heraus. Es kommt hierdurch circa die Hälfte eines Tropfens in den Mund, und wenn man nun 2—3 Tropfen Wasser auf die Zunge nachträufeln liest, so verschlucken die Kinder ohne Anstand die ganze Flüssigkeit ihrer Mundhöhle. Gewöhnlich tritt hierauf ein mehrstündiger Schlaf und Stillstand der Diarrhöe ein; die schlimmen Folgen, Geläutereiz und Geläuterection, die man auf Opium, wahrscheinlich auf grossere Gaben als länger fortgesetzten Gebrauch gesehen haben will, konnte ich niemals bei dieser Application bemerken.

Mit grossem Vortheile gibt man den Brustkindern kleine Clystere eines schleimigen Doctores, z. B. eines dünnen Amylonbreies mit 1—2 Tropfen Opiumtinctur. Zur Einführung von Medicamenten in das Maeldarm, welche also mehrere Stunden zum Behufe einer Resorption dazwischen verbleiben sollen, sind die gewöhnlichen Kinderclystierpipetten viel zu gross, ich bediene mich deshalb seit längerer Zeit kleiner Spritzen von Zinn, nach Art der Wund- oder Tripperspritzen und applicire sie eigenhändig, nachdem sie gut eingeölt und gehörig erweicht worden sind. So kleine Quantitäten von 4,0—8,0 Meiss fast immer bei den Kindern und nach $\frac{1}{2}$ —1 Stunde beginnt die Wirkung des Opiums.

Die künstlich aufgezogenen Kinder leiden an ganz andern Darmcatarrhen als die Brustkinder, indem die krankmachende Ursache, die ungeeigneten Nahrungsmittel, hier keine vorübergehende ist, sondern lange Zeit noch während der Erkrankung fortgesetzt wird. Im Allgemeinen ist der Grundsatz festzuhalten, dass kein Kind mit Darmcatarrh die Kuhmilch, sei sie nun pur oder mit Thee vermischt, oder mit Mehl oder Brod zu einem Brei verkocht, verträgt, und dass die Diarrhöe nur ausnahmsweise bei Milchkest zum Stillstand gebracht werden kann. Die erste Bedingung ist deshalb eine vollkommene Abstinenz der Kuhmilch. Sobald dünne Stühle sich einstellen, gibt man den Kindern bloss schleimige Getränke, wovon das beste und stopfendste ein Decoct. Salep ist, das man täglich zwei Mal frisch bereiten lässt, indem eine grosse Messerspitze Saleppulver mit 300,0 Wasser gekocht wird. Mit Zucker versüsst und etwas erwärmt, trinken alle Kinder eine solche Salepalkochung gerne, und seine stopfende Wirkung ist so merklich, dass oft die Ordination eines weiteren Medicamentes unnötig ist. Als Mahlzeit gibt man den Kindern statt des Milchbreies 2—3mal täglich eine Schleimsuppe aus dünner, fettarmer, ungegähreter Fleischbrühe und Reis, Hafer oder Roggenste bereitet und mit etwas Zucker versüsst. Diese Diät wird beibehalten, bis die Stühle schon länger als 24 Stunden wieder ihre normale Consistenz angenommen haben; wenn deutlicher Appetit sich einstellt, so können zu jeder Mahlzeit 2—3 Kaffeeöffel geriebenen Weizenbrodes mit der Schleimsuppe verkocht werden. Wie verwehnen übrigens auf das Capitel der künstlichen Ernährung pag. 38. Nachdem die Stühle seit mindestens zwei Tagen normal geworden sind, versucht man täglich einen Milchbrei, dann zwei und endlich drei, wobei das Salepwasser immer noch fortgebraucht wird, um schliesslich auch durch gewöhnliches Brunnenwasser wieder ersetzt zu werden.

Die Einpassung der Mundhöhle mit etwas Opiumtinctur und die kleinen Opiumclystiere stehen unter den therapeutischen Mitteln oben an. Nur bei den profusen Sommerdiarrhöen entspricht das Opium zuweilen nicht, hier wirken kleine Dosen Calomel 0,01, 3—4 Dosen täglich, oder eine Hellensteinlösung (0,03 auf 90,0 mit Zusatz von einem Tropfen Opiumtinctur, ohne allen Syrup) entschieden. In Frankreich gibt man mit Vorliebe in diesen Fällen Magisterium Bisnuthi 0,02—0,06 pro dos, wovon auch ich ansehnliche überraschende Erfolge gesehen habe. Die gerbstoffhaltigen Vegetabilien, Colombo, Ratanhia etc., die reinen Tanninlösungen und die Adstringentia überhaupt sind den kleinen Kindern nur schwer, und dann nur mit grossen Quantitäten Syrup beizubringen, weshalb ich selten von ihrem Gebrauch mache und sie mehr bei chronischen Darmcatarrhen der älteren Kinder benutze. In einzelnen Fällen sah ich auf eine Alundlösung (0,4 : 100) Diarrhöen eintreten, welche durch keines der oben genannten Mittel gestillt werden konnten. Die Hauptsache bleibt immer eine gehörige Prophylaxis. Man gebe den Kindern immer nur schwach alkalische Milch, indem man zu jeder Mahlzeit einen Kaffeeöffel der oben besprochenen Lösung von kohlens. Natrium (4,0 : 200) zusetzt, und wird dann bald die Erfahrung machen, dass die Darmcatarrhe sich bedeutend mindern. Hätte ich die Wahl, bloss durch die Kost oder bloss durch Medicamente einen Darmcatarrh stillen zu müssen, so würde ich vor-

ziehen, durch diätetische Behandlung allein es zu versuchen; denn von der Wirkungslosigkeit aller Arzneimittel ohne sorgfältige Regulirung der Diät habe ich mich schon zu oft und zu evident überzeugt.

7) Enteritis folliculosa und Tabes mesenterica.

Es ist praktisch wichtig, vom einfachen Darmcatarrh die *Enteritis folliculosa* streng zu scheiden, obwohl die pathologisch-anatomische Unterschiede nicht sehr frappant, und mannigfache Uebergänge zwischen sie dieser ungemein häufig sind.

Pathologische Anatomie.

Man findet hierbei das submucöse Gewebe beträchtlich infiltrirt, so dass der Darm an Gewicht fühlbar zugenommen hat, und auf der ganzen Schleimhaut des Dick- und einer grossen Strecke des Dünndarmes die Zeichen des acuten Darmcatarrhes, d. h. statt der normalen Cylinderepithelien nichts als Schleimkörperchen. Die solitären Follikel und Peyer'schen Plaques sind zum Theil stark geschwollen und sehen auf den ersten Blick als weisse Knöpfchen und Inseln über das Niveau der Schleimhaut hervorragend, zum Theil aber sind sie geplatzt und stellen dann leere, kraterförmige Vertiefungen auf dem durch die ursprüngliche Follikelschwellung erzeugten Erhabenheiten dar. Das Mesenterium ist turgescirend, die Chylusgefässe strahlen meist und sind von rosenrother Färbung, die Mesenterialdrüsen sind, soweit der Darmcatarrh geht, um das 2—4fache ihres Volums vergrössert, auf den Durchschnitt in recenten Fällen rosenroth, nach längerem Bestehen aber gelblichweiss. Die mikroskopischen Elemente sind dieselben wie in den normalen Mesenterialdrüsen, nur wenn die Farbe gelblich ist und die Drüse an Härte zugenommen hat, findet man das Bindegewebe etwas vorherrschender. Auch hier, wie beim einfachen Darmcatarrh, findet man trotz der lange bestehenden Diarrhöen nur auffallend wenig Pigmentirungen der Schleimhaut. Der wesentliche pathologisch-anatomische Unterschied zwischen Darmcatarrh und *Enteritis folliculosa* liegt in der Betheiligung der Mesenterialdrüsen in dem letzteren Falle. Es lässt sich leider weder durch Injectionen noch auf irgend eine andere Art experimentell nachweisen, dass die Resorption des Chylus durch diese vergrösserten Mesenterialdrüsen gehindert wird und damit die Ernährung und Weiterentwicklung des Kindes nicht mehr stattfinden kann. Wenn man aber in einem atrophischen Kinde, dessen Atrophie durch *Enteritis folliculosa* ursprünglich bedingt war, ausser jenen vergrösserten und härter gewordenen Mesenterialdrüsen nichts findet, so wird die Annahme doch sehr wahrscheinlich, dass hier mechanisch die Passage des Chylus in denselben unterbrochen wurde und so die Kinder, obwohl sie in ihren letzten Lebenswochen und selbst Monaten viel gegessen und keine Diarrhöe mehr hatten, doch aus Mangel an einer hinreichenden Zufuhr von Chylus gewissermassen verschmachtet sind. Die *Tabes mesenterica* der alten Aerzte ist also durchaus nicht so motivirt und absolet, wie sie von einigen Neueren dargestellt werden möchte, nur darin irren sich die Aelteren, dass sie glaubten, die vergrösserten Drüsen fühlen zu können; denn gerade bei ihrer Hypertrophie ist der Darm immer meteoristisch aufgetrieben, und

ist dann gar nicht möglich, unter oder zwischen den gespannten Därmen diese kleinen Geschwülste zu tasten, die kaum jemals die Grösse einer kleinen Haselnuss erreichen und jedenfalls gegen die Wirbelsäule gedrückt werden müssen, wenn man sie fühlen wollte.

In seltenen Fällen von entwickelter Mesenterialdrüsentuberkulose, wie sie bei mehrjährigen Kindern zuweilen vorkommt, fühlt man allerdings einzelne härtere Stellen durch die Bauchwand hindurch. Es sind diese aber grössere, unter einander zu Paketen verschlossene Drüsen, welche mit käsiger Tuberkelmasse durchsetzt sind. So geringe Veränderungen, wie sie bei Enteritis folliculosa beobachtet werden, können bei Lebzeiten niemals durch den Tastsinn entdeckt werden.

Symptome.

Die Enteritis folliculosa beginnt immer mit Darmcatarrh, und wir verweisen deshalb auf die im vorhergehenden Abschnitte angeführten Kennzeichen. Statt dass aber, wie beim einfachen Darmcatarrh, nach einigen Tagen die Stühle wieder breiig werden und die Ernährung sich wieder regulirt, bleiben die Ausleerungen ganz dünn und nehmen einen aashaften, faulen Geruch an, erodiren den Anus und seine Umgebung, die innere Schenkelfläche und die bei den angezogenen Oberschenkeln gerade den Anus berührenden Fersen. Es tritt ein starkes, anhaltendes Fieber mit bedeutender Temperaturerhöhung ein, die Kinder haben fortwährend grossen Durst, die Zunge ist roth und glatt oder mit einem dünnen weissen Belege bedeckt, in späteren Stadien fast immer mit Soor befallen. Erbrechen ist häufig, jedoch nicht in allen Fällen und nicht sehr reichhaltig zu beobachten. Charakteristisch ist die rasch eintretende Abmagerung. An der inneren Schenkelfläche werden bei vorher ganz wohlgenährten Kindern mit harten Fettpolstern zuerst kleine Faltchen bemerklich, die früher kernig anzufühlenden Fettpolster werden weich und welk. Rasch schwindet nun unter Fortbestand der Diarrhöe mit ihrem aashaften Geruche das Fett an allen Körpertheilen, so dass in wenigen Tagen die Knochen an den Händen und Füssen deutlich zu unterscheiden sind und die Schenkelhaut weit herabhängende Falten bildet. In der Schenkelbeuge lässt sich dann beiderseits ein Convolut von Inguinaldrüsen erkennen, welche auch um das 2–3fache ihres normalen Volums anschwellen. Die Augen liegen tief, vom inneren Augenwinkel zum Jochbogen bildet sich in Folge dessen eine starke Falte, die Wangen werden blass und welk und lassen die Contur der Masseteren durchschimmern, das Kinn wird spitz, der Hals wird faltig, die Mm. sternocleidomastoidei und der Larynx treten hervor, die Rippen lassen sich ohne Betastung zählen, die Wirbelsäule und die Beckenknochen sind nur mehr von einer atrophischen Haut bedeckt.

Am Hinterhaupt bemerkt man hierbei eine ganz eigenthümliche Erscheinung. Es schiebt sich nämlich das Hinterhauptsbein unter die Scheitelbeine hinein, so dass sich hier eine Treppe bildet, deren obere Stufe die Seitenwandbeine, deren untere das Occiput bildet. Nur sehr ausnahmsweise schiebt sich das Occiput über die Seitenwandbeine. Eine ähnliche, aber weniger eclatante Verschiebung findet an den Stirnbeinen statt, welche sich ebenfalls unter die Scheitelbeine begeben.

Diese Verkleinerung der Schädelhöhle wird bedingt durch eine Verkleinerung des Gehirns, indem dasselbe bei der allgemeinen Atrophie sich theilhaftig, und da es zum grossen Theil aus Fett besteht, jedenfalls auch einen beträchtlichen Verlust an diesem Material erleidet. Es sind mir keine quantitativen chemischen Analysen des Gehirns atrophischer Kinder bekannt, man weiss nur, dass das Gehirn kleiner Kinder überhaupt ärmer an Fett ist als das Erwachsener, und es wäre sehr eine derartige Untersuchung ein Postulat, das die Pädiatrik an die pathologische Chemie zu stellen hat. Wenn einmal die Kopfknochen übereinander geschlossen sind und die Atrophie des Gehirns sich eingestellt hat, so ist nur sehr selten noch eine Besserung zu erwarten. So Kinder atrophiren mehr und mehr und gehen regelmässig zu Grunde, obwohl sie in den letzten Lebenswochen keine Diarrhöe gehabt, aber immer aashaft riechende Stühle behalten haben und sogar mit grossem Appetit zu essen pflegen. Es resultirt aus dieser Gehirnatrophie eine Reihe von Gehirnsymptomen, welche wir später unter dem Namen Hydrocephaloid kennen lernen werden. Einen der besten Anhaltspunkte für die Beurtheilung des Grades, zu welchem die Atrophie schon vorgeschritten ist, haben wir an der Bauchhaut. Wenn man dieselbe mit zwei Fingern zu einer Falte erhebt, und wenn diese Falte nach Zurückziehen der Finger längere Zeit noch bestehen bleibt, so ist die Prognose fast immer und unter allen Umständen lethal zu stellen, die Prognose bessert sich mehr und mehr, je schneller die so erzeugten Hautfalten wieder verschwinden.

Bei atrophischen Kindern mit nervenlosig aufgetriebenem Leibe, wie er eben bei Atrophie in Folge von Enteritis folliculosa gewöhnlich gefunden wird, sieht man auf der Bauchhaut einzelne kleine Knötchen von der Grösse eines Stecknadelkopfes, welche durch ganz dünne Stränge, gewöhnlich nur dem Gefühl erkennbar, mit einander verbunden sind. Gefüllte Venen sind diese Stränge nicht, weil Venen bei atrophischer Haut und so oberflächlicher Lage bläulich durchschimmern müssten; es können bloss obliterirte Venen, oder, was noch wahrscheinlicher ist, Lymphgefässe mit ihren Klappen sein, wodurch dann auch zugleich die Knötchen erklärt werden.

Behandlung.

Es gilt hier alles, was bei dem Catarrhus intestinalis, als dessen Folgen offenbar die Infiltration der Mesenterialdrüsen und die Tabes zu betrachten sind, erwähnt wurde. In der Regel führen alle Behandlungsmethoden zu demselben Resultate, zum Tode, nur ein Mittel gibt es, von dem ich frappante Erfolge gesehen habe, nämlich die Mutterbrust. Atrophische Kinder von vier, selbst noch von sechs Monaten, welche am Rande des Grabes waren, an aashaften Diarrhöen und dispersen Stoeinseln litten und mit ihren langen, mageren Fingern als in fortwährender Unruhe vor Schmerz das Gesicht verkratzten, werden in die Brust einer Amme gelegt, plötzlich wie umgewandelt, sie trüben Anfangs nur wenige Minuten, um dann ihrer gewöhnlichen Unruhe sich wieder hinzugeben, nach ein paar Tagen aber saugen sie schon wie ganz gesunde Kinder, schlafen mehrere Stunden auch zusammen, bekommen gelbe, normal scharflich riechende Excremente und schreien so schnell wieder zu, dass man sie nach wenigen Wochen gewöhnlich

nicht mehr erkennt. Wo die Verhältnisse die Anschaffung einer Arznei nicht erlauben, ist, wie schon gesagt, die Prognosis fore lethalis. Einige Mal ist es mir in solchen Fällen gelungen, durch Chinapulver 0,05, täglich zwei Dosen, die Erhöhung der Hauttemperatur zu beseitigen, worauf die Atrophie auch abnahm und bei höchst vorsichtiger, mühseliger Ernährung endlich die Kinder wieder zu gedeihen anfangen, wobei als Nachkur lange Zeit Tinct. mart. pomat. drei Mal täglich 10 Tropfen gereicht wurde. Gewöhnlich aber schlägt diese Behandlung auch nicht an, die Hauttemperatur verändert sich nur auf sehr kurze Zeit und die Kinder verfallen mehr und mehr, bis sie endlich oft erst nach vielen Wochen durch den Tod erlöst werden.

8) Dysenterie, die Ruhr.

In grossen Ruhr-Epidemien, wie sie hauptsächlich in Sumpfigegen den und in den Tropen so verheerend auftreten, bleiben die Kinder unter einem Jahr fast vollständig verschont. Nur wenige Beispiele sind erzählt, wo ruhrkranke Frauen Kinder zur Welt brachten, die bald nach der Geburt unter den Zeichen der Ruhr wieder zu Grunde gegangen sind. Ältere Kinder, vom zweiten Jahre an, werden von derselben wie die Erwachsenen ergriffen.

Die sporadische Ruhr hingegen kommt bei kleinen Kindern häufig vor, wird aber wegen ihres milden, meist gefahrlosen Verlaufes gewöhnlich nicht besonders beobachtet.

Symptome.

Es können die Symptome der sporadischen und epidemischen Ruhr füglich mit einander abgehandelt werden, nur muss die Bemerkung vorausgeschickt werden, dass sie bei der sporadischen niemals die Heftigkeit und Gefährlichkeit der epidemischen erreichen.

Zu Anfang bestehen einfache Diarrhöen, welche mehrere Tage lang ohne weitere charakteristische Merkmale fortdauern, bis sich unter Zunahme von Kolik und Tenesmen die spezifischen Ruhrstühle einstellen.

Eine genaue Besichtigung und Zertheilung der Stühle gibt immer den besten Anhaltspunkt für die Beurtheilung der Darmschleimhaut. Jeder Stuhl, in welchem glasartiger, zu Klümpchen geformter Schleim sich findet, zeigt eine Veränderung der Dickdarmschleimhaut oder wenigstens ihres Follikelapparates an. Zu diesem glasartigen, den gekochten Sagokörnern ähnlichen Schleim gesellen sich bald einige Blutstreifen, oder es wird der ganze Stuhl gleichmässig roth gefärbt, je nachdem eben die Blutung näher oder entfernter vom Mastdarme stattgefunden und das Blut sich kürzere oder längere Zeit mit dem Faeces vereinigt hat. Mit der Zunahme dieses Schleimes wird die eigentliche Faecalmasse immer weniger und es werden schliesslich Schleimmassen ohne alle Beimischung von Faeces entleert. Die Erkennung des beigemischten Blutes ist niemals schwierig, finden sich Blutstreifen und Blutklümpchen, so genügt die einfache Besichtigung; ist das Blut aber schon länger mit dem Schleim in Berührung, so macht es sich inniger mit ihm und verleiht der ganzen Ausleerung eine rosenrothe oder wirklich rothe Farbe. Diese Färbung reicht eigentlich schon hin, um über die Gegenwart des Blutes zu belehren, weil ausser dem Blut-

farbstoff überhaupt kein anderer rother Farbstoff in den Fäces vorkommt; es kann übrigens auch durch das Mikroskop das Blut mit Leichtigkeit nachgewiesen werden.

Ist es einmal zur Geschwürsbildung gekommen, so nehmen die Ausleerungen eine schmutziggraue oder graurothliche Farbe und einen unangenehmen Geruch an, indem man die abgestossenen Schleimhautparthien und vorzüglich der von den Geschwüren massenhaft gelieferte Eiter sich hinzugesellen. Die Abtossung grösserer Schleimhautstücken, die in den tropischen Dysenterieen häufig beobachtet werden soll, habe ich bei uns im Lande noch niemals gesehen. Zuweilen gehen, obwohl die übrigen Symptome durchaus keinen Stillstand der Krankheit erkennen lassen, in Mütigen oder eiterigen Schleim gehüllt, festere Kothklumpen ab, die wahrscheinlich aus einer von der Ruhr nicht ergriffenen Parthie des Darmes stammen und die Prognose deshalb keineswegs verbessern. Nach Abgang dieser auf Besserung deutenden Fäces stellt sich sogleich die frühere dysenterische Beschaffenheit wieder ein.

Man hat, je nachdem Blut beigemischt ist oder nicht, von einer rothen und weissen Ruhr gesprochen, eine Einteilung, die natürlich jeder wissenschaftlichen Basis entbehrt, indem es recht wohl möglich ist, dass ein Kind am ersten Tage die weisse, am zweiten die rothe und am dritten oder vierten wieder die weisse Ruhr haben kann. Tritt wirkliche Besserung ein, so nehmen die Fäces ihren fäcalen Geruch, später auch die Consistenz wieder an und es schwindet allmählig die eiterige und schleimige Beschaffenheit. Sind Spalverwunden vorhanden gewesen, so gehen dieselben regelässig mit ab. Der Geruch des Stuhls ist zu Anfang der Krankheit fäcal und wird es wieder bei Eintritt der Genesung, auf der Höhe derselben ist er entweder gänzlich verschwunden oder wird süsslich fade. Wenn bei der epidemischen Ruhr Eiter und abgestossene Schleimhautstücke mit den Fäces abgehen, so wird er höchst penetrant und häufig und erinnert an den der faulen Eier. Die mikroskopische Untersuchung zeigt Schleimkörperchen, Epithelien, Blutkörperchen, grössere Aggregate von Fettkügelchen, strotzender Speisereste, Vibrionen, Tripelphosphate, alles eingebettet in eine moleculare, feinkörnige Masse; die chemische Reaction ist gewöhnlich alkalisch. Erweise lässt sich durch Ahrhören oder Schütteln des Stuhls mit destillirtem Wasser, Filtrirung und Ansäuerung dieses Filtrates mit Salpetersäure nachweisen. Die Zahl der Stühle ist sehr verschieden. In den leichteren Fällen erfolgen 4—8, in den schwereren 20—30 Ausleerungen binnen 24 Stunden, was sich nicht so fast nach der Quantität des zu Entleerenen, die oft sehr gering ist, als nach dem Grade des Tenismus richtet.

Unterleibschmerzen und Tenismus fehlen niemals: der Schmerz ist meist intermittirend, anfallsweise, nur auf der Höhe der epidemischen Ruhr jammern und stöhnen die Kinder unaufhörlich. Gewöhnlich ist die Berührung des ganzen Leibes, sowohl um den Nabel herum als nach dem Verlaufe des Colon schmerzhaft. Der Tenismus ist sehr quälend, man sieht häufig die untersten Falten des Anus hervortreten und trotz des heftigen Pressens wird kaum ein Kaffeebehl des oben geschilderten Schleimes entleert. Mastdarmpfropf ist oft die Folge dieses Pressens. Die Application der Clysmata, die in der Ruhr die allereinstündigste Wirkung hätten, wird durch den

Tenesmus sehr erschwert und oft unmöglich gemacht. Sensible Kinder bekommen bei der Einführung der Clystierspritze in Folge des gesteigerten Schmerzes Convulsionen. Der Tenesmus tritt gewöhnlich schon mit den ersten schleimigen Auslassungen ein und besteht bis zum Eintritt der Besserung fort. Bei zunehmender Verschlimmerung kann Paralyse des Mastdarmes und somit Auflösen des Tenesmus erfolgen, wobei die Prognose äusserst ungünstig wird.

Erbrechen kommt zuweilen bei epidemischer Ruhr vor und ist, wenn es anhält, ein Zeichen beginnender Peritonitis, bei sporadischer Ruhr wird es nur sehr ausnahmsweise beobachtet.

Fieber ist gewöhnlich anfangs nicht zugegen, sondern tritt erst im Verlaufe der Darmsveränderung hinzu. Der Puls gibt durchaus keinen Massstab für die Schwere und Ausdehnung der Erkrankung. Die Temperatur ist selten sehr erhöht, gewöhnlich normal, in schweren Fällen sogar vermindert. Delirien und Convulsionen stellen sich bei reizbaren Kindern ziemlich häufig, auch in sporadischer Ruhr, ein.

Als sekundäre Erscheinungen sind bei sporadischer Ruhr nur die lobuläre Pneumonie und eine häufig folgende *Tuberc. mesenterica* mit Infiltration der Mesenterialdrüsen zu erwähnen. Bei epidemischer Ruhr kommen Anämie, Pyämie, Marasmus, Darmperforation und Peritonitis, Darmstricturen, Icterus und Leberabscess in Betracht.

Die Genesung kann bei der sporadischen Ruhr in 4–6, bei der epidemischen in 10–14 Tagen eintreten. Die hierauf folgende Abmagerung ist immer sehr bedeutend und viele Kinder erliegen noch trotz begonnener Besserung den Nachkrankheiten. Der Tod tritt entweder in den ersten Tagen der Krankheit oder im chronischen Stadium ein.

Die epidemische Dysenterie complicirt sich bekanntlich mit allen möglichen acuten und chronischen Krankheiten. Die sporadische befallt hauptsächlich die Kinder in der ersten Dentition und die grösseren Kinder im heissen Sommer zur Zeit des unreifen Ostites.

Pathologische Anatomie.

Das dysenterische Exsudat findet sich nur im Dick- und Mastdarm und vorzugsweise auf der Höhe der Falten, an den Flexuren, an den Umbiegungsstellen des Darmrohres und erscheint als ein schmutzig-weisses, graugelbes, grauröthliches oder dunkelgefärbtes Stratum, das oft die Dicke einer Linie erreicht und sich leicht abstreifen lässt. Die darunter zum Vorschein kommende Schleimhaut ist geröthet, erweicht und geschwollen, so dass die Innenfläche des Darmes ein löcheriges Ansehen bekommt. Im Darm findet sich der bei den Stühlen näher beschriebene dysenterische Schleim etc. Nach wenigen Tagen stösst sich nun diese Membran in kleineren oder selbst in grösseren Partien ab, und je nach der Tiefe, in welcher die Schleimhaut ergriffen werden, entstehen nun weichere oder tiefere Geschwüre mit lang gestreckten Ecken und Zacken. Die solitären Fokkel sind immer geschwollen und sogar exulcerirt. In den übrigen Organen die Zeichen der Anämie, nur das Peritonäum ist an verschiedenen, besonders den Schleimhautveränderungen entsprechenden Stellen injicirt. Bei der sporadischen Ruhr ist eine ausgedehnte oder irgend tiefer gehende Geschwürsbildung sehr selten.

Behandlung.

Gleichmässige Wärme in einem gut ventilirten Zimmer und strenge Diät ist vor allem notwendig. Kalte Getränke vermehren die Schmerzen, weshalb Alles lauwarm gereicht werden muss. Am besten gibt man den Kindern blosse Schleimsuppen und schleimige Getränke, Brustkinder vertrugen die Ammenmilch sehr gut, künstlich aufgefüttert aber bekommen heftige Schmerzen auf Kuhmilch, die also zu vermeiden ist. In der epidemischen Ruhr gibt man so bald als möglich einige Dosen Ricinusöl, wodurch manchmal erstaunlich grosse Mengen von Fäces entleert werden und der Zustand sich rasch bessert. Das wirksamste Mittel bei der sporadischen Dysenterie ist das Opium, und die sicherste Application ist die in Clystieren, woran man leider häufig durch den Tenesmus gehindert ist. Es wird dann am besten die bei der Therapie des Darmcatarrhs besprochene Einspritzung der Mundhöhle ausgeführt. Ich lasse mich übrigens niemals mit der Versicherung der Pflegerinnen, dass es nicht möglich wäre, das Kind zu clysieren, abfertigen, sondern versuche immer selbst noch einmal 5—10 Cc einer mit Opiumtinktur versetzten schleimigen Flüssigkeit zu injizieren, was sehr häufig gelingt, obwohl die Umgebung das Gegentheil versichert hat. Sehr guten Erfolg sieht man auch von der Verbindung des Calomels mit Opium z. B. für ein einjähriges Kind:

Rp. Calomel 0,01
Op. pur. 0,003
Sacch. alb. 0,30
Dent. tal. des. N. viii
S. Zetündlich ein Pulver.

Die adstringirenden Vegetabilien, der Hollenstein und der Alaun finden erst ihre Anwendung nach Stillung des Schmerzes im chronischen Stadium.

9) Intussusception.

Unter Intussusception oder Invagination des Darmes (auch Volvulus genannt) versteht man die Einstülpung eines Darmstückes in ein anderes benachbartes nach Art der Handschuhfinger, die sich beim Abziehen eines engen Handschuhs durch Ubereinanderschieben verkürzen.

Pathologische Anatomie.

Bei weitem nicht alle Invaginationen, die man in dem Kinde finden findet, waren bei Lebzeiten bestehende Krankheiten, sondern die meisten sind erst in Agone entstanden, zeigen keine Spur von Reaction, lassen sich ohne alle Mühe entwickeln und sind an mehreren verschiedenen Stellen zugleich, immer aber nur am Dünndarm zu beobachten. Sie kommen auffallender Weise nur bei ganz gesundem Darms nicht bei Sectionen von Cholera, Ruhr, Typhus oder Peritonitis, wohl aber von Gehirnkrankheiten vor und scheinen das Ergebnis einer ungleichmässigen Innervation der Darmmucularis, die sich vorzüglich erst in Agone geltend macht, zu sein. Indess gibt es auch eine Reihe von Fällen, wo schon bei Kindern unter einem Jahre Invaginationen mit allen ihren Folgen: Darmstauung, Darmblutung, Kothbrechen, rasche

Collapse etc., auftrat und in der Regel zum Tode führte. Die anatomische Lagerveränderung ist bei beiden Invaginationen dieselbe.

Eine Jede Einstülpung besteht aus drei aufeinander folgenden Schichten, von denen die äussere und mittlere einander ihre Schleimhautflächen, die mittlere und innerste ihre Peritonealflächen zukehren, wie aus einem schematischen Durchschnitt, Taf. III. Fig. 3 B., leicht zu sehen ist. Die äussere Schichte c. c. nennt Rokitsansky die Scheide oder das Intussuscepiens, die innerste a. a. das eintretende, die mittlere b. b. das austretende Rohr und beide zusammen das Intussusceptum. Zwischen dem eintretenden und austretenden Rohre befindet sich das miteingezerrte conisch zusammengefaltete Gekrösestück des Intussusceptum und übt einen besonderen Einfluss auf die Gestaltung der Invagination. Die Zerrung des Mesenteriums bewirkt nämlich, dass das eingestülpte Darmstück nie ganz parallel seiner Scheide verläuft, sondern immer eine Krümmung darbietet, und dass seine Mündung nicht in der Axe oder dem Centrum der Scheide, sondern excentrisch liegt, indem es dem Zuge des miteingestülpten Mesenteriums folgt, weshalb auch die Mündung des Intussusceptum (d) niemals rund, sondern zu einer Spalte verzogen ist.

Die Vergrösserung der Invagination kommt so zu Stande, dass die Mündung des Volvulus (c) den festen Punkt bildet, während die Scheide sich bei c. c. immer weiter umstülpt.

Die Ursache der Entstehung eines Volvulus lässt sich schwer erklären, wahrscheinlich ist das eindringende Darmstück stärker contractirt und hat eine kräftigere peristaltische Bewegung als das weitere, es aufnehmende Darmstück. Hiefür spricht der Umstand, dass ihrer Bildung meist langwierige Durchfälle vorausgehen, wobei das aufnehmende Darmstück wahrscheinlich catarrhalisch erschlafft ist, während das eindringende eine normale Schleimhaut und normale Bewegung hat.

Die unabweichlichen Folgen einer Invagination sind Circulationsstörungen im invaginierten Mesenterium, Oedem und Hyperämie des invaginierten Darmes, und Entzündung und plastisches Exsudat am Peritonealüberzug des ein- und austretenden Rohres (a. und b. b.). Das Oedem und die Schwellung des invaginierten Darmstückes kann eintreten so hohen Grad erreichen, dass das Lumen des anfangs noch offenen, eintretenden Rohres aufgehoben wird, worauf gar keine Kothmassen, sondern bloss mehr blutiger Schleim per anum abgeht und fäcales Erbrechen sich einstellt.

Gewöhnlich geschieht die Einschließung von oben nach abwärts, häufig kommt sie im Dickdarm vor, wobei man dann möglicher Weise das eingestülpte Stück per anum fühlen kann.

Die Intussusception tödtet entweder durch die von den serösen Oberflächen sich nach aufwärts über den Darmkanal verbreitende Peritonitis oder durch Brand des invaginierten Stückes.

Symptome.

So lange das Darmlumen noch nicht ganz verschlossen ist, sind die Symptome nicht besonders charakteristisch, ist aber einmal vollständige Stenose eingetreten, so treten die bekannten Zeichen, wie bei eingeklemmten Hernien hervor. Die Einstülpung des Darmes erzeugt für sich, ohne vollkommene Abschnürung, immer heftige Colikeckmerzen,

wobei der Leib bald meteoristisch aufgetrieben wird. In einzelnen Fällen fühlt man einen länglichen Tumor, der von einigen Autoren für das invaginierte Darmstück gehalten wird, viel wahrscheinlicher aber aus Kotmassen besteht, die über der Invagination stagnieren. Die Kinder sind dabei meist verstopft, es kommen jedoch auch Diarrhöen vor, und den Stühlen mischen sich in allen Fällen grössere oder kleinere Quantitäten Blut bei, was als das constante und charakteristischste Symptom des ganzen Zustandes zu betrachten ist. Fast ebenso constant ist das Erbrechen aller Genossen, wobei sich schliesslich auch ein gelber oder grüner Magenschleim entleert. Die Kinder collabiren rascher und haben im Anruch viel Aehnlichkeit mit den Cholera-kranken, der Puls wird kleiner, endlich kaum mehr zu fühlen, es treten Ohnmachten und am 3.—4. Tage in der Regel der Tod ein.

Der günstigste, jedoch ziemlich seltene Ausgang ist allseitige Anlösung des invaginierten Darmes und hierauf brandige Abtossung desselben; bisweilen sollen sich die Symptome auch ohne Abgang und Brandigwerden des Darmstückes mildern, das Lumen sich wieder erweitern und es kann so die Invagination fixirt bleiben, wobei aber der Kanal immer stark verengt und zur Ableitung der Darmconcreta nicht gehörig sufficient bleibt. Es besteht hierbei ein chronischer, häufig recidivirender Zustand von entzündlicher Schwellung, der leicht in Darmentzündung ausartet und neue Intussusceptionen veranlasst.

Behandlung.

Die theoretischen Vorschläge Rokitan'sky's, vor eingetretener Fixirung des Volvulus durch Exsulas Injectionen von Luft oder Aspiration mittelst der Saugepitze zu versuchen, werden wohl immer theoretisch bleiben. Alle Mittel, welche vermehrte peristaltische Bewegung bewirken, können ebenso gut schaden als nützen, indem der Volvulus möglicher Weise zwar wieder gelöst wird, allein bei umgekehrter Bewegung sich auch vergrössern und eine heftigere glückliche Verlösung zerrissen werden kann. Man gibt deshalb weder milde, noch drastische Abführmittel und noch viel weniger Brechmittel. Die berülmte Anwendung des Mercurius vivus ist jedenfalls nachtheilig und häufig nützlich, weil hierdurch das zum Verschwinden verengerte Lumen des idematischen, invaginierten Darmstückes mechanisch wieder etwas wegsämer wird.

Das rationellste scheint die von Pfeufer vorgeschlagene und schon mit Glück durchgeführte Behandlung zu sein, welche in absoluter Diät und Ruhe, und in Erzeugung einer Opiumnarkose besteht und eine Sistirung der peristaltischen Bewegung beabsichtigt während welcher sich allseitige Verlöthung bilden kann. Der Reizeschnitt ist trotz seiner grossen Gefahr schon mehrfach glücklich ausgeführt worden.

10) Der Leistenbruch. *Hernia inguinalis.*

Nachdem der Nabelbruch schon pag. 58 bei den Krankheiten des Nabels abgehandelt worden ist, Cruralhernien bei Kindern aber so gut wie gar nicht vorkommen, so bleibt nunmehr der Leistenbruch zu besprechen.

Die Inguinalhernien der Kinder sind in der äbergrossen Mehrzahl äussere und zwar angeborene, jedoch nicht angeboren im strengen Sinne des Wortes, sondern nur in den ersten Lebenswochen durch beginnende Wirkung der Bauchpresse erworben, wobei dann durch den noch offenen Processus vaginalis peritonaei eine oder einige Darmschlingen in den Hodensack oder bei Mädchen in die grosse Schamlippe dringen. Die vorgefallenen Eingeweide stehen bei Knaben mit der freien Fläche des Hodens in Contact, was bei keiner erworbenen Hernie möglich ist.

Man findet eine länglich runde, nicht eng abgegrenzte, vom äusseren Leistenringe bis in's Scrotum reichende, weiche compressible Geschwulst, die sich durch gleichmässigen, etwas rotirenden Druck ohne Schwierigkeit wegdrücken lässt. Man findet den Hoden nicht ganz leicht, bei genauerer Untersuchung kommt er nach hinten und oben liegend zum Vorschein, Blähungen, Stuhldrang, Schreien, Husten, erzeugen den repositierten Bruch sogleich wieder. Bei Mädchen, wo der Bruch „äusserer Schamlippenbruch“ genannt wird, zeigt die eine oder andere grosse Schamlippe eine weiche längliche Geschwulst, welche ähnliche Merkmale wie der angeborene Inguinalbruch des männlichen Geschlechtes darbietet, übrigens niemals so gross wird und viel seltener beobachtet wird, als jener. Der Bruch entsteht hier in der Art, dass durch den beim weiblichen Fötus zur Aufnahme des runden Mutterbandes bestimmten Inguinalkanal (Canalis ligamenti rotundi), der in seinem Anfange offen ist, sich aber gewöhnlich schon vor der Geburt durchaus schliesst, eine Darmpartie oder, in ganz seltenen Fällen, das Ovarium sich hineindrängt. Nur ausnahmsweise geschieht es nach v. Ammon, dass sich in den Scheidenkanal bei Entstehung des Bruches eine eigene neue Falte des Bauchfelles als Hülle des Bruchsackes vor-drängt und so ein wirklicher besonderer Bruchsack entsteht.

Der Inhalt des angeborenen Inguinalbruches besteht fast immer aus einer oder einigen Darmschlingen, sehr selten aus Netz. Der Bruch ist Anfangs klein wie eine Erbse, vergrössert sich aber bald und dringt in den Hodensack, wobei der Canalis vaginalis weiter, kürzer und gerader wird. Zuweilen wird eine seröse Flüssigkeit abgesondert, wodurch sich dann zur Hernia inguinalis noch Hydrocele gesellt. Durch Quetschungen, rohe Repositionsversuche, vielleicht auch ohne diese, durch eine Art inflammatorischer Disposition entstehen zuweilen selbst plastische Abscheidungen, welche filamentöse Adhäsionen zwischen dem vorgefallenen Darm und dem Hoden bewirken und eine Reposition der Hernie unmöglich machen. Einklemmungen sind ausserordentlich selten, und wenn auch momentan ein solcher Bruch hart, schmerzhaft und irreponibel wird, so gelingt die Reposition doch regelmässig im warmen Bade und noch sicherer in der Chloroformnarkose.

Haben die Brüche einmal ein bedeutenderes Volum erreicht und hat sich der Canalis vaginalis beträchtlich ausgedehnt, so dringt er sogleich nach jeder Reposition wieder vor und bleibt nur in liegender Stellung bei schlafenden Kindern zurück. Es ist sehr schwierig, solche Kinder vor dem Frattwerden zu schützen oder schon vorhandene Epidermisdefekte zu heilen. Bei der Untersuchung eines kleinen Kindes auf Inguinalhernie muss man sich immer erst des Hodens versichern, weil ein verspäteter Descensus testiculi bei oben stattfindendem Austritt

des Hodens aus dem inneren Leistenringe die nämliche Geschwulst darstellt wie eine beginnende Hernie. Zum Unterschiede von Hydrocele haben wir hier die Reponirbarkeit, die ausserdem in den meisten Fällen mit einem gurrenden Geräusche verbunden ist, den Mangel der Durchsichtigkeit, der leicht durch ein Licht constatirt werden kann, und den Mangel einer Fluctuation zu berücksichtigen. Die Untersuchung wird in der Weise angestellt, dass man das Kind auf den Rücken legt, die Geschwulst sanft zu reponiren sucht und nach gelungener Reposition den kleinen Finger in den Hodensack einrückt. Man führt ihn dann nach aufwärts gegen den Leistenring, sucht die Bruchpforte auf und bestimmt hierauf mit Leichtigkeit deren Lage und Ausdehnung.

Resümiren wir noch einmal die wichtigsten Varietäten der angeborenen Inguinalhernie, so haben wir:

In Bezug auf die Zeit der Entstehung:

- 1) *Hernia canalis vaginalis congenita* (seltener Form).
- 2) *Hernia canalis vaginalis mox post partum acquisita* (häufige Form).

In Bezug auf Geschlechtsverschiedenheit:

Bei Knaben:

- 1) *Hernia canalis vaginalis testiculi congenita*.

Bei Mädchen:

- 2) *Hernia canalis ligamenti rotundi congenita*.

In Bezug auf die Complication:

- 1) *Hernia inguinalis congenita cum Hydrocele*
- 2) *Hernia inguinalis congenita cum adhaesione testicul ad intestina*.

Behandlung.

Die meisten Inguinalhernien heilen von selbst auch ohne Bandagen, und die beste und einfachste Compression des Canalis vaginalis wird durch die Zunahme der Fettpolster des Kindes bewirkt. Es genügt in der Regel eine gute Ernährung, eine Ueberschätzung der Anstrengungen und die Verhütung zu grosser und anhaltender Unruhe, zur Heilung. Wenn nur dafür Sorge getragen wird, dass während des Schlafes der Bruch reponirt ist, so hat es dann nichts zu sagen, wenn er einen grossen Theil des Tages herausgetreten bleibt. Es lässt sich die Reposition beim Einschlafen sehr leicht bewerkstelligen, indem man den Kinderfrauen lehrt, hierbei immer die eine Hand an der Hernie zu fixiren.

Von Bruchbändern habe ich nur bei Kindern, die über ein Jahr alt waren, entschiedene Vortheile gesehen. Bei Wickelkindern ist die Application der Bandagen ausserordentlich schwierig und in vielen Fällen schädlich. Erstlich muss man wenigstens deren drei haben, damit man bei jeder Durchfällung und Stuhlentleerung wechseln kann, geduldet dann das Kind wirklich, so werden die kaum angehefteten Bänder nach 8–10 Wochen zu klein und gänzlich unbrauchbar und müssen wieder durch drei neue ersetzt werden, so dass man oft ein Dutzend und mehr Bruchbänder fertigen lassen muss. Ferner gelingt es fast nie, die Kinder vor Wundwerden zu halten, die einzeln und

gewordenen Stellen brauchen mehrere Tage zur Heilung und die neue Epidermis geht gewöhnlich gleich wieder zu Grunde, sobald der Druck des Bruchbands von Neuem beginnt. Blei- und Zinksalben, sowie die häufigen Waschungen mit kaltem Wasser oder mit Wasser und Brauntwein scheinen zwar einen günstigen Einfluss auf die Verhütung der Erosionen zu haben, genügen aber doch nur selten, sie gänzlich abzuhalten. Bei mageren Kindern endlich ist die Anlegung eines Bruchbandes geradezu unmöglich, weil es nie gehörig befestigt werden kann. Wenn also ängstliche Eltern absolut die Anlegung einer Bandage wünschen, so muss man sie auf die daraus erwachsenden Kosten und die möglicher Weise entstehenden Nachtheile der langsameren Entwicklung des Kindes aufmerksam machen. Solaminis causa bedecke ich die Hernien gewöhnlich mit einem Stöckchen Heftpflaster oder lasse sie täglich mit irgend einer unschuldigen Salbe einreiben, Sorge übrigens für strenge Reinlichkeit, gute Pflege, passende Kost und regelmäßige Entleerungen und habe auf diese Weise schon sehr viele Hernien heilen sehen. Je schneller die Fettpolster eines Kindes zunehmen, um so sicherer bleibt die Hernie zurück und tritt ständiger Verschluss des *Canalis vaginalis* ein.

(1) *Fissura ani.*

Es kommen bei Säuglingen und Kindern jeden Alters zweifels am Anus heftige Schmerzen vor, die mit jeder Stuhlentleerung sich einstellen und ihren Grund in einem kleinen Einrisse des Anus haben. In vielen Fällen sind diese kleinen Schründen (Rhagaden) eine Theilerscheinung der Syphilis, auf welche also stets genau zu untersuchen ist, in andern aber sind sie rein idiopathisch, nur als locale Erkrankung aufzufassen. Die hämorrhoideten Kinder sind immer sehr obestipirt und der Riss ist wahrscheinlich durch das heftige Auspressen der harten Faeces entstanden. Die harten trocknen Stühle sind stellenweise blutig gefärbt, und es fliessen auch nach der Defaecation noch einige Tropfen Blut aus dem Risse ab, wobei die Kinder ein durchdringendes Schmerzensgeschrei anheben. Besonders erwähnt muss werden, dass diese kleinen Anusrisse bei oberflächlicher Besichtigung nicht zu sehen sind, sondern dass man zu ihrer Entdeckung die Nates gehörig auseinanderhalten und Falte für Falte des Anus genau untersuchen muss. Sie sind oft kaum 1—3 Millimeter lang und unterscheiden sich in der Farbe nur wenig von der übrigen gerötheten Schleimhaut. Der Schmerz tritt fast nur während und nach der Stuhlentleerung ein, scheint aber sehr heftig zu sein, indem die Kinder dabei entstellte Gesichtszüge und stöhnende Reflexbewegungen am ganzen Körper bekommen.

Behandlung.

Vor Allem ist nothwendig, dass die Obstipation geloben wird, was am besten durch $\frac{1}{2}$ bis 1 Kaffeelöffel der wässrigen Rhabarber-tinctur sich bewerkstelligen lässt. Die von Trausseau angegebene Methode, bestehend in Clystieren mit 1,20 Batschianextrakt habe ich nicht bewahrt gefunden, weil die Application des Clystieres selbst die heftigsten Schmerzen verursacht. Ich cauterisire diese Einrisse höchst mit Höllenstein, was zwar auch bedeutende Schmerzen hervorruf, aber

dar einmal zu geschehen braucht, während jene Clystiere oft wiederholt werden müssen, und halte darauf, dass die Anstreuung niemals hart wird. Diarrhöe darf hierbei nicht bestehen, denn das diarrhöische Secret hindert ebenfalls die Heilung des Risses.

12) Polypen des Mastdarms.

Diese Polypen kommen nur sehr selten vor, werden vielleicht auch manchmal übersehen. Alle daran leidenden Kinder, deren in der Literatur gedacht wird, haben das zweite Lebensjahr schon überschritten.

Das Hauptsymptom ist eine kleine oder zuweilen auch grössere Mastdarmlutung mit und unmittelbar nach der Defecation, welche bei Mädchen, die der Pubertät schon nahe sind, leicht als beginnende Menstruation gedeutet wird. An den Händen lassen sich die Menstruationsflecken von denen durch Mastdarmlutung verursachten easily dadurch annähernd unterscheiden, dass die ersteren vorzugsweise die Vorderseite des Handes einnehmen, während die letzteren sich fast ausschließlich auf dessen Rückseite finden.

Die Entleerung der Faeces hat immer Schwierigkeit und ist mit Schmerz verbunden, zuweilen erscheint hierbei der Polyp vor der Anöffnung, zieht sich aber nach Remission des Zwanges schnell wieder zurück. Bei der Exploration des Mastdarmes mit dem Finger, wodurch sehr heftige Schmerzen verursacht werden, fällt man den Polypen meist nahe am Anus aufsitzen. Der Verlauf des Uebels scheint in den meisten Fällen eine Spontanheilung zu sein, indem der Polyp sich mehr und mehr zurückzieht und endlich bei einer harten Defecation abreist. Die gewöhnliche Form ist die der Schleimpolypen.

Behandlung.

Die Entfernung des Polypen geschieht sehr leicht, wenn man unmittelbar nach dem Stuhlgang ihn vor dem Anus trifft, wo man ihn dann sogleich mit den Fingernägeln abknippen oder seinen Stiel mit einem Faden unterbinden kann. Um nicht zu lange auf eine Stuhlentleerung warten zu müssen, thut man gut, dem Kinde einige Stunden vor der zur Operation bestimmten Zeit ein Infus. Sennae oder ein andern Drasticum zu geben, indem bei dem hiedurch erzeugten Tenismus der Polyp am sichersten und längsten austritt.

13) Vorfall des Mastdarmes. Prolapsus ani.

Man bezeichnet mit dem Namen Mastdarmpvorfall zwei Zustände, die von einander ziemlich verschieden sind, nämlich 1) die einfache Umstülpung der untersten Schleimhautfalten und 2) eine Invagination der oberen Mastdarmpartie in den Anus, wobei dieselbe vor dem Anus zum Vorschein kommt.

Der Mastdarm lässt bekanntlich drei Portionen, eine obere, mittlere und untere unterscheiden, Taf. III, Fig. 4, a, b, c. Die obere schliesst sich in ihrer Structur an das S. romanum an, ist wie dasselbe vom Bauchfell überzogen, hat eine Cylinderform und verläuft von oben nach unten und etwas von links nach rechts. Diese Portion bildet

fast die Hälfte des ganzen Mastdarmes und erstreckt sich vom S. romanum bis zu jener Linie, wo die Peritonealhülle aufhört, Taf. III, Fig. 4, Nr. 3. Der Mastdarm verliert diesen Ueberzug an seiner hinteren Fläche höher oben als an der vorderen, wo er bis in die Gegend des dritten Kreuzbeinwirbels damit bekleidet ist. Die mittlere Portion (b) beginnt da, wo das Peritonium den Mastdarm verlässt und wo derselbe nur mehr durch lockeres Zellgewebe an das Kreuzbein und beim Manne an die Blase und Prostata, beim Weibe an die Vagina angeheftet ist. Es zeichnet sich diese Partie durch die Stärke ihrer Längsmuskeln aus, während die Quer- oder Ringfasern nur schwach entwickelt sind. Sie kann sich bei Obstipation baulich ausdehnen und grosse Mengen harter Faeces bergen. Die untere, dritte Portion (c) ist die kürzeste, sie geht von der Prostata nach abwärts bis zum After und besitzt eine dicke Schichte Kreismuskelfasern, die beiden Afterschliessmuskeln.

Es werden nun entweder die Schlüsselmuskeln, die unterste Portion des Mastdarmes, einfach nach aussen umgestülpt und kommen als hochrothe oder blauerthe Wülste mit einer centralen Oeffnung zum Vorschein, oder es wird die mittlere Mastdarmportion (b) in die untere invaginirt und hängt rosenroth, oder, wenn die Sphinkteren durch starke Contraction den venösen Rückfluss hemmen, blauerth als ein mehrere Zoll langer, wurstförmiger Vorfall zum Aussen heraus. Eine Umstülpung der Sphinkteren und eine Invagination der mittleren Portion scheint nicht gleichzeitig vorzukommen. Bei der ersten Art, der einfachen Umstülpung der Sphinkteren, kann der untersuchende Finger wohl in die centrale Oeffnung eindringen, wobei gewöhnlich sogleich eine Reposition des Vorfalles sich ergibt, bei der zweiten Art kann der Finger oder wenigstens eine Sonde auch noch neben den Vorfall ein bis zwei Zoll eindringen, bis er an die obere Umbiegung des Vorfalles anstösst.

Aetiology.

Die Umstülpung der Sphinkteren oder wenigstens ein partieller Prolapsus ihrer Schleimhaut kommen bei kleinen Kindern ausserordentlich häufig vor. Gewöhnlich ist längere Zeit Diarrhoe vorausgegangen, wodurch die besagte Schleimhaut sich wulstet, während die Sphinkteren erschlaffen. Aber auch anhaltende Verstopfung kann den Prolapsus bedingen, wo dann der Mastdarm durch die harten grossen Kothmassen mit herausgerissen wird. Es erfolgt hier häufiger Invagination der mittleren Portion als Umstülpung der unteren. Bei jungen Hunden, die an der sog. Sucht leiden, sind grosse Invaginationen des Mittelstückes sehr gewöhnlich zu beobachten.

Die Prognose ist bei beiden Arten günstig, wenn die Kinder nur sonst gut genährt und nicht atrophisch sind; eine radicale Heilung ist ohne Operation möglich.

Behandlung.

Was die allgemeine Behandlung betrifft, so versteht es sich von selbst, dass man bei Prolapsus in Folge von Diarrhoe stopfende Mittel, und bei dem in Folge von Obstipation gelind eröffnende Mittel geben muss. Zu den ersten gehören das Opium, die Mucilagines und die

vegetabilischen Adstringentien, sowie der Hallenstein und der Alaun; zu dem letzteren das Rheum und die Mittelsalze in kleinen Dosen. Ricinusöl ist den Kindern schwer beizubringen und wird gewöhnlich gleich wieder ausgespuckt oder erbrochen.

Bei der Reposition des Vorfalles selbst fragt es sich weniger darum, wie, sondern wann sie zu geschehen hat. Die Hauptsache ist, dass man den Angehörigen, wenn sie nicht von selbst geschickt genug sind ihn zu reponiren, gleich bei dem erstmaligen Vorfalle die Reposition lehrt, indem man sie nicht selbst macht, sondern die Kindsmagd dazu instruiert. Dieselbe hat ein auf beiden Seiten mit Cerat bestrichenen Leinwandlappchen auf den Vorfall zu legen und nun mit dem Finger die centrale Oeffnung zu suchen, worauf sie den Finger direkt in den Anus hineinschiebt. Nachdem am Vorfalle und Finger 1/2 ihm eingedrungen sind, hat sie den Finger durch langsam rotirende Bewegungen herauszuziehen, worauf das schlüpfrige Geratlappchen sich ganz leicht und ohne neuen Vorfalle zu erzeugen, entfernen lässt. Im Winter, oder wo Eis schnell zur Hand ist, ist es sehr nützlich, bester man die Reposition vornimmt, ein rundes Stückchen Eis in den Vorfalle zu schieben und dasselbe dann mit zu reponiren.

Bei atrophischen Kindern geht der Mastdarm immer wieder heraus, so oft man ihn auch zurückbringen, ätzen oder brechen mag, bei gut sich entwickelnden Kindern genügt meist schon die oben beschriebene interne und örtliche Behandlung, nur wenn die Neigung zum Vorfalle schon sehr lange besteht, können einige Längsstriche mit dem Hallensteinstifte oder mit der rauchenden Salpetersäure notwendig werden. In neuester Zeit wurden von Pouchet subcutane Strychninjectionen gegen veraltete Mastdarmporfälle empfohlen. Dieselben sind jedoch wegen der äusserst gefährlichen Wirkung dieses Mittels nur bei grösseren, mehrjährigen Kindern rationell. Man sticht die Pravaz'sche Spritze ein Paar Linien vom After entfernt in das den Mastdarm umgebende Zellgewebe und spritzt von einer schwefelwasser Strychninlösung 1:100 ungefähr 8—10 Tropfen ein. Diese Injectionen 3—4mal repetirt üben nach meiner eigenen Erfahrung eine sehr günstige Wirkung auf den Mastdarmporfalle. Wer aber wie ich auf sehr kleine vorsichtige Dosen Strychnin schon die furchterlichsten venenösen Krämpfe hat eintreten sehen, wird sich nur im äussersten Nothfalle zu diesem heimtückischen Mittel entschliessen können. Das Glühcien ist ich noch niemals genöthigt anzuwenden.

Um das Pressen aus Gewohnheit, das manche Kinder an sich haben, zu verhindern, ist es rationell, den Nachttopf der Kinder auf eine Fußbank zu stellen, so dass das Kind mit seinen Füßen bei Fußhoden nicht erreichen und hiermit keine so kräftige Händepressen anwenden kann. Erfahrene Wärterinnen verstohen es auch sehr gut, die Kinder während des Stuhlganges frei schwebend hinhaltend und zugleich die Anusaperte von unten und seitwärts zusammenzudrücken, wodurch der Wiederevfall häufig verhütet wird.

11) Bildungsfehler des Mastdarmes und des Afteres.

Wir haben am After zweilei Veränderungen, a) eine Verengung und b) eine Verschlössung desselben.

a) Verengerung des Mastdarms.

Ein geringerer Grad von Verengerung wird kaum so merkliche Symptome liefern, dass künstliche Abhilfe nothwendig erscheint, zumal im ersten Lebensjahre die Fäces im Normalzustand niemals fest, sondern immer breiig, formlos entfernt werden. Nur wenn Obstipation eintritt, kommt das Uebel an den Tag, die Kinder können etwas festere Fäces nicht mehr entleeren, bekommen Meteorismus und selbst die Symptome von Darmstenose. Durch öfter applicirte Clystiere werden die harten Kothmassen wieder erweicht, entleert und hienit alle Krankheitssymptome gehoben, durch Laxantien erreicht man diesen Zweck wohl auch, doch wird deren Wirkung in diesen Fällen immer von Colikschmerzen begleitet.

Es werden zuweilen aber auch Kinder mit so bedeutender Verengerung des Afters geboren, dass schon die Defecation des Meconiums sehr verspätet und mühsam erfolgt und dass man kaum mit einer gewöhnlichen Sonde in den Mastdarm gelangen kann. Hier ist natürlich ein kleiner chirurgischer Eingriff nothwendig, darin bestehend, dass man eine Hohlsonde einführt und auf derselben die verengerte Aftermündung mit dem Messer ein Centimeter weit dilatirt. Es müssen dann mehrere Wochen lang Conallpappen in die Wunde eingelegt werden, um frühzeitige Verwachsung zu verhüten. Die täglich mehrmals erfolgenden Erweiterungen des Afters durch die Fäces verhindern die Bildung einer contractirten Narbe.

b) Verschluss des Afters. Imperforatio ani.

Zum richtigen Verständnis dieses Zustandes müssen die Vorbemerkungen aus der Embryologie vorausgeschickt werden, dass in einer ganz frühen Zeit des Embryolebens eine Cloake, d. h. eine Verbindung zwischen Blase und Mastdarm besteht, und ferner, dass der Mastdarm ursprünglich blind endet, blind in das kleine Becken hinabwächst, hier auf eine ebenfalls blind endigende Einstülpung der äusseren Haut, auf die Anlage des Afters stösst und dass erst nach einer gegenseitigen Verwachsung dieser beiden blinden Endigungen und nach schliesslicher Atrophie der verschliessenden Quermembranen sich eine Communication zwischen Mastdarm und Anus herstellt.

Es können sich nun folgende Bildungselongationen, die auf Tafel III, Fig. 5, 6, 7, 8 und 9 schematisch veranschaulicht sind, ereignen.

1) Der Mastdarm ist vollkommen entwickelt, auf der äusseren Haut aber in der Nabelgegend, wo der Anus sich einstülpen sollte, ist diese Einstülpung nicht entwickelt, das blinde Ende des Mastdarmes wächst fort und fort nach abwärts, bis es die Cutis, die es nicht zur Atrophie bringen kann, erreicht. Dies ist die einfachste und glücklichste Art der Imperforatio oder Atresia ani. Das nach der Geburt sich sammelnde und den Mastdarm ausdehnende Meconium wölbt die Stelle, an der der Mastdarm sich unter der Haut befindet, mehr und mehr hervor und ein einfacher Kreuzechnitt auf dieser Hervorwölbung genügt, einen After für alle Zukunft zu bilden. (Fig. 5.)

2) Die äussere Anseinstülpung hat sich normal entwickelt, kann aber das blinde Ende des Mastdarmes nicht erreichen, weil dasselbe entweder in seinem Wachsthum zurückgeblieben ist (Fig. 6), oder in die Vagina (Fig. 7) oder in die Blase (Fig. 8) einmündet. Es bleibt

bei diesen Fällen die einseitige Bezeichnung des Anus rosulatus, indem derselbe gebildet ist, wie bei jedem gesunden Kinde. Erst nachdem in den ersten 24 Stunden kein Meconium entleert worden ist und wenn die Kinder unruhig werden, einen meteoristisch aufgetriebenen Leib bekommen und die Brust nicht nehmen, entdeckt die Hebammen, die durch ein Clystier abhelfen will, dass das Röhrchen ihrer Spritze entweder nicht weit genug hineingeht oder, wenn auch hierbei kein Anstand sich ergibt, dass das Clystema total zurückgespritzt. Untersucht man nun mit der Sonde oder mit einem silbernen Katheter, so findet man, dass die Anuscinstülpung 2—5 Centim. höher oben blind endet.

3) Es hat sich weder eine Anuscinstülpung entwickelt, noch ist das blinde Ende des Mastdarmes so weit herabgewachsen, dass es nach der Geburt durch eine Hervorwölbung der Cutis sich zu erkennen gäbe (Fig. 7). In diesen Fällen ist gewöhnlich in der Gegend der Leiste gar keine Andeutung von einer Aftervertiefung zu beobachten und man hat keine Anhaltspunkte für die Bestimmung des Mastdarmes, dessen blindes Ende oft 5—8 Centim. von der äußeren Haut entfernt im kleinen Becken sich findet. Zuweilen setzt sich ein compacter Strang vom Scrotum bis zur Cutis fort, der als ein rudimentärer Mastdarm zu betrachten ist und bei der Auffindung des blinden Darmendes wesentliche Dienste leistet.

4) Der Mastdarm mündet nicht nach aussen, sondern in die Vagina, die Blase oder einen Ureter, wobei eine Anuscinstülpung vorhanden sein oder auch fehlen kann (Fig. 8 und 9). Die Erscheinungen sind hier insofern andere, als das Meconium nicht vollständig zurückgehalten wird, sondern in dem einen Fall mit dem Urin, im anderen durch die Vagina abgeht. Die Diagnose ist leicht zu machen, wenn man mit einer silbernen Sonde oder einem kleinen Katheter die Blase untersucht und den Meconium haltigen Urin auffängt, und noch leichter, wenn man das Meconium in der Vagina und in derselben die Einmündung des Mastdarmes durch eine Sonde findet. Die Folgen dieser Missbildung sind verschiednen. Bei Communication des Mastdarmes mit einem Harnleiter oder der Blase wird der Urin immer alkalisch, reizt die Blasen Schleimhaut fortwährend und bedingt Cystitis, Atrophie und den Tod. Mündet der Mastdarm aber in der Vagina, so entsteht durch den continuirlichen Abfluss der Faeces, die durch keinen Sphinkter willkürlich zurückgehalten und entleert werden können, wohl ein eklatantes Gebrechen, indem die Kinder nach Faeces riechen und an den Schenkeln fortwährend beschmutzt sind, keiserwegs aber ist Lebensfähigkeit anzunehmen. Es gibt Beispiele, wo auf operativem Weg der Mastdarm hergestellt und dann die Verbindung zwischen Vagina und Mastdarm aufgehoben wurde.

5) Endlich gibt es noch Fälle, wo der Anus gar nicht oder nur rudimentär vorhanden ist. Es existirt nur eine Parthie des Dickdarms und diese mündet in der Nabelgegend, indem der embryonale Ductus omphalo-entericus offen geblieben ist, ein Zustand, den man Anus praeternaturalis oder Ectopia ani genannt hat.

Behandlung.

Die Behandlung kann natürlich nur eine operative sein. Bei den mit 1) besprochenen Fällen besteht dieselbe, wie schon angedeutet,

einfach in einem Kreuzschnitt auf der vorgewölbten Haut, worauf das Meconium sich entleert. Um zu schnelle Verwachsung der Schnittwunden zu verhüten, ist es rathsam, die ersten Wochen nach jeder Stuhlentleerung ein Ceestyläppchen einführen zu lassen.

Bei den sub 2 angeführten Fällen muss man durch einen oder einige vorsichtige Einstiche mit einem gewöhnlichen grossen Troikart, wie man sich dessen zur Punction des Ascites bedient, versuchen, das colimentäre Rectum zu finden, worüber uns das Hervorquellen von Meconium Gewissheit verschafft. Man führt dann durch die Troikart-canüle einen oben abgeschnittenen elastischen Katheter ein und spritzt zur Verflüssigung der Fäces 3—4mal täglich warmes Wasser in denselben. Nach einigen Tagen ersetzt man ihn durch einen von stärkerem Caliber und führt so mehrere Wochen fort, bis die Defecation auch ohne Katheter regelmässig von Statten geht. Die Sphinkteren des Anus functioniren gewöhnlich ziemlich gut, oft bleibt aber eine Neigung zur nachträglichen Verengung zurück, die durch Reagieuren beseitigt werden muss.

Bei der sub 3 angegebenen Art der Atresia ani muss zuerst an der Stelle, wo der Anus normal sich findet, ein Kreuzschnitt bis zur Tiefe von $2\frac{1}{2}$ Centim. angelegt werden, worauf man dann nochmals nach dem blinden Ende des Mastdarmes mit dem Finger sucht und mit dem Troikart ebenso verfährt, wie sub 2. Dass diese Operationen häufiger erfolglos sind und, selbst wenn der Mastdarm eröffnet ist, häufig noch lethal ausgehen, versteht sich bei der Lebensschwäche und Vulnerabilität eines neugeborenen Kindes von selbst.

Bei den Communicationen des Mastdarmes mit der Blase muss man ebenfalls so schnell als möglich suchen, den Fäces einen anderen Ausweg durch einen künstlichen After zu verschaffen, weil im Falle des Misslingens das lethale Ende gewiss ist. Bei der Ausmündung des Mastdarmes in die Vagina hingegen ist Eile weniger nöthig, weil dieser Zustand lange ertragen wird und es schon Kinder gegeben hat, die mit dieser Missbildung ohne alle chirurgischen Eingriffe gross geworden sind; mo möglich muss aber auch hier, wenn das Kind anfängt zu gedeihen, der Mastdarm von aussen aufgesucht werden, worauf sich die Verbindung mit der Vagina von selbst hebt oder durch eine spätere Operation gehoben werden muss.

Wenn sub 2 und 3 die Auffindung des Mastdarmes nicht gelungen ist, so soll nach den Gesetzen der Chirurgie der künstliche After in der linken Leistengegend oder in einer Inguinalgegend angelegt werden. Dass so operirte Kinder durchkommen können, ist mehrfach schon betrachtet worden, ob sie aber gedeihen und gross werden, ist mir nicht bekannt. Wenigstens habe ich noch nie einen Erwachsenen gesehen, dem in den ersten Lebenstagen wegen Verschlusses des Anus an diesen Stellen ein künstlicher After angelegt worden wäre.

1b) Infectionskrankheiten mit vorwiegender Localisation auf den Darmkanal.

a) Typhus abdominalis.

Der Abdominaltyphus ist bei Kindern viel häufiger als gewöhnlich angenommen wird, die Diagnose kann aber in vielen Fällen nicht mit

Bestimmtheit gestellt werden und hierin mag wohl der Grund liegen, dass viele Aerzte den Kindern eine grössere Resistenz gegen denselben zuschreiben. Die Ansteckungsfähigkeit ist, wenn überhaupt eine solche angenommen werden darf, eine ausserordentlich geringe und gar nicht zu vergleichen mit der der anderen ansteckenden Kinderkrankheiten, Masern, Scharlach, Variocellen und Keuchhusten. Es kommt wohl häufig vor, dass gleichzeitig in einem Hause die Kinder verschiedener Familien an Typhus, gewöhnlich in einer leichten Form erkranken, noch viel öfter aber sieht man nur ein Kind unter zahlreichen Geschwistern, die alle den Typhus noch nicht gekostet haben, typhus werden, während die übrigen mit ihm in derselben Stube lebender vollkommen gesund bleiben.

Vor Beendigung des ersten Lebensjahres befällt der Typhus die Kinder ausserordentlich selten, doch finden sich auch einzelne Fälle in der Literatur aufgezeichnet, in denen Säuglinge dem Typhus erliegen sind, wobei aber zu beachten ist, dass in den Sectionsbereichen niemals von typhösen Darngeschwüren, sondern immer nur von Irritation der Peyer'schen und Mesenterialdrüsen gesprochen wird. In zweitem, und auch beredigter Dentition im dritten Lebensjahre wird der Abdominaltyphus ausserordentlich häufig und mit ziemlich charakteristischen Symptomen beobachtet, von welcher Zeit an er in jedem Lebensalter und zu jeder Jahreszeit sich einstellen kann.

Da bei der ganzen Anlage dieses Lehrbuches gründliche Kenntnisse der speciellen Pathologie und Therapie vorausgesetzt wird und nur die durch das kindliche Alter bedingten Abweichungen genau berücksichtigt werden können, so liegt es nicht im Plane, die gegenwärtig herrschenden Ansichten über Infectiouskrankheiten und über den Zusammenhang der localen zur allgemeinen Erkrankung eine Kritik zu unterwerfen. Nur so viel sei hierüber bemerkt, 1) dass die Erscheinungen im Darmkanal nicht im geraden Verhältnisse zur Gesammterkrankung stehen und 2) dass noch niemals im Blute Typhus qualitative noch quantitative Veränderungen gefunden worden sind. Die Veränderungen im Blute Typhöser, welche schon seit mehreren Wochen erkrankt sind, sind Folgen der langwierigen Störungen im Stoffwechsel und Kreislaufe, und das sogenannte Typhusblut in den Leichen, worunter man ein dunkelviolett, dünnflüssiges Blut zu verstehen, losem Coagula versteht, findet sich nicht constant in den Typhusleichen, wohl aber in den Leichen der meisten Kranken, deren Krankheit mit Störung der Respiration und Assimilation verbunden war.

Leichenbefund.

Man kann im Allgemeinen an den Typhusleichen eine erste und zweite Periode unterscheiden.

Erfolgt der Tod in der ersten Periode, so finden sich die typhösen Veränderungen nur im Dünndarm, in allen Mesenterialdrüsen, in der Milz und auf der Bronchialschleimhaut. — Die Leichen sind noch nicht abgemagert, haben tiefblaue Todtenflecken und eine trockene dunkle Muskulatur. Das Gehirn ist fest und trocken. Die Bronchialschleimhaut ist geröthet, geschwellt und allenthalben mit einem weissgelben, süßem Schleim bedeckt, so dass an einzelnen Stellen die Bronchien dritter Ordnung davon schon ganz erfüllt sind. Die mannigfachen

Folge dieser Schleimüberfüllung ist in den Lungenpartien, hauptsächlich nach hinten und unten, Circulationsstörung, Hypostase und endlich Splenisation. Das Herz ist ausserordentlich schlaff, enthält sehr lose Coagula und der Muskel ist an einzelnen Stellen erschlafft. Unter dem Mikroskope zeigen diese blässeren Stellen beginnende fettige Degeneration. Die Milz ist vergrössert und die Vergrösserung trifft besonders ihren Längendurchmesser, die Kapsel ist prall gespannt, das Gewebe sehr dunkel und weich, oft bis zum Zerfließen breiig.

Der Darm ist meteoristisch aufgetrieben und enthält viel dünnflüssige, höchst penetrant riechende Flüssigkeit, fast die ganze Mucosa des Dünndarmes ist im Zustande des acuten Catarrhes und die Peyer'schen Drüsen sowie die solitären Follikel sind eigenthümlich infiltrirt. Die Vergrösserung der genannten Drüsen beruht auf einer grauweissen, markigen Masse, die hauptsächlich die Drüsenkapseln erfüllt und schwillt, aber auf das submucöse Gewebe und die Mucosa selbst übergreift. Die Veränderungen und der Verlauf dieser Infiltrationen sind bei Kindern etwas abweichend von denen, die bei Erwachsenen beobachtet werden. Während die übergrosse Mehrzahl erwachsener Typhusleichen Verschwärung der Plaques zeigt, kommt dieselbe bei Kindern nur sehr ausnahmsweise vor, indem sich in den meisten Fällen die Infiltration zurückbildet oder wenigstens nach einfachem Platzen der Kapseln eine Entleerung derselben ohne Verschörfung einzutreten scheint. Wenn in seltenen Fällen wirkliche Schorfe oder Geschwüre gefunden worden, so sind sie doch immer nur vereinzelt und haben nur einen oder wenige Plaques ergriffen; die Mehrzahl der Peyer'schen Drüsen bleibt immer auf der markigen Infiltration stehen, daher es wohl auch kommt, dass Darmblutungen und Perforationen bei Kindern so ausserordentlich selten sind. Je jünger die Kinder, um so seltener trifft man Geschwürbildung; ich habe sie noch nie bei Kindern unter vier Jahren gefunden, obwohl ich schon mehrere Kinder von 2—4 Jahren, die an exquisitem Typhus gestorben sind, sectirt habe.

Die Mesenterialdrüsen erkranken ganz in derselben Weise, wie die Peyer'schen Plaques, sie schwellen um das 3—4fache ihres Volumens an, sind auf dem Durchschnitt gelblichgrau und markig; je stärker jene infiltrirt sind, um so grösser werden diese, und da die meisten Peyer'schen Plaques sich gegen die Cöcalklappe zu finden, so sind auch die Mesenterialdrüsen gegen diese Klappe zu mehr und mehr vergrössert.

Sectirt man eine Kinderleiche, die in der zweiten Periode erliegen ist, so fällt vor allem schon die grosse Abmagerung auf, die Haut ist blass und welk, die Todtenflecken sind nicht mehr so violett, die Muskulatur ist blass und ödematös durchgeschwollen. Die Haut zeigt oft Decubitus, Eiterbläschen, Sudamina und Eczyemen; die unteren Extremitäten sind zerreissen etwas hydrophisch. Die Parotis kann geschwollen und mit Eiterherden durchsetzt sein. Im Larynx findet sich zuweilen Perichondritis und Necrose einzelner Knorpelpartien, die Lungen zeigen noch grössere Splenisationen als in der ersten Periode, die Bronchien sind mit Schleim erfüllt. Die Milz ist geschwollen, brüchig, ebenso die Mesenterialdrüsen, in welchen man hier und da centrale Abscesse findet. Die Peyer'schen Platten und die solitären Follikel sind etwas grau pigmentirt, die Kapseln sind meist geplatzt,

wedurch die ganze Drüsenfläche ein reticulirtes Aussehen bekommt, und wenn bei älteren Kindern einzelne Verschwürungen vorhanden waren, sind dieselben in der Vernarbung begriffen. Sind die Kinder an Pyämie zu Grunde gegangen, so findet man die bekannten eitrigen Ergüsse und Keilbildungen in den serösen Säcken und parenchymatösen Organen; sind sie der Anämie und dem Scurbut erlegen, so findet man beträchtlichere seröse Ergüsse in den Körperhöhlen und im subcutanen Gewebe, beim Scurbut ausserdem noch die Veränderungen am Zahnfleisch. Das Gehirn ist im Gegensatz zur ersten Periode ausserordentlich fest und weich und lässt sich nur sehr schwer ganz aus der Schädelhöhle herausziehen. Die Seltenheit der Verschwärung der Peyer'schen Plaques macht eine Verwechslung mit dem Leichenbefund der Enteritis folliculosa leicht möglich. Die Anschwellung der Milz und die Beschaffenheit der Lungen unterscheiden aber zur Genüge den Typhus von der folliculären Enteritis.

Symptome.

Wie schon aus der Beschreibung des Leichenbefundes hervorgeht, so sind die Veränderungen und Zerrörungen, die der Typhus im kindlichen Organismus anrichtet, nicht so beträchtlich, wie die bei Erwachsenen; dem entsprechend sind auch die Symptome gewöhnlich weniger stürmisch und bedrohlich und die Prognose im Allgemeinen eine sehr günstige. Selten sind die Symptome so heftig und charakteristisch, dass man schon beim ersten Anblick die Diagnose bestimmt auf Typhus stellen kann, wie ein geübter Beobachter dies wohl zu thun im Stande ist, wenn er an das Krankenbett eines erwachsenen, schweren Typhuskranken tritt. Namentlich schwankt die Diagnose oft zwischen Typhus und Hydrocephalus acutus, und auf dieser Schwierigkeit der Differentialdiagnose mag wohl auch so manche Heilung des vermeintlichen Hydrocephalus acutus beruhen. In den meisten Fällen aber haben die Kinder den Typhus so leicht, dass Verwechslungen mit Gastricismus oder Dentitionbeschwerden vorkommen und das wenig züngeliche Eltern ärztliche Hilfe gar nicht nachsuchen. Physikalisch ist an diesen Kindern mit leichter Febris typhoides auch nicht viel zu entdecken, die Milz vergrößert sich nicht bedeutend, der Leib ist nicht besonders von Gasen aufgetrieben, und der Bronchialcatarrh erreicht keine beunruhigende Höhe, die Diarrhöen sind mässig, die Kinder sind ruhig, klagen nicht über Schmerzen und schlafen viel. Die bedeutende, Wochen lang dauernde Mattigkeit, der anhaltende Appetitmangel und die langwierige Convalescenz, bei der immer die Haare ausfallen und die Nägel an den Fingern und Füssen mit weissen Querstreifen und Furchen versehen sind, sind oft noch die am meisten charakteristischen Merkmale einer schleichenden Febris typhoides, die in München allgemein Schleimfieber genannt wird.

Indessen lässt es sich nicht leugnen, dass einzelne Kinder, besonders nach vollendeter erster Dentition, auch ganz schwere complete Typhussymptome zeigen können und es ist deshalb nöthig, dieselben einer speziellen Analyse zu unterwerfen.

Was zuerst die Chronologie betrifft, so ist es bei keiner acuten Krankheit schwieriger als beim Typhus, die Anfangszeit zu bestimmen, doch ist dieselbe bei Kindern gewöhnlich leichter als bei Er-

wachsenen, insofern ihr zarter Organismus durch eine Infection und den Beginn ihrer Wirkung viel heftiger ergriffen wird und sie ausserdem weder durch Beruf noch Noth gezwungen werden, trotz begonnener Krankheit noch möglichst lange gegen dieselbe ankämpfen. Der Tag, an welchem das Kind seine Heiterkeit verliert, sich gerne hinlegt und zu einer ungewohnten Stunde einschlüft, ist, wenn später deutlichere Symptome nachfolgen, als der Anfang des Typhus zu betrachten. Oft essen sie noch an diesem Tage mit kaum verringertem Appetit, brechen aber gewöhnlich nach einigen Stunden die ganze Mahlzeit unverdaut wieder heraus, worauf sich dann die typhösen Symptome rascher und heftiger einzustellen pflegen, als wenn kein Erbrechen erfolgt ist. Deutliche Fröste habe ich nach nicht beobachten können und kann sie deshalb zur Bestimmung des ersten Tages gar nicht verwerthen. Wenn sich der Typhus während der Dentition entwickelt, ist es kaum möglich, seine Anfangszeit zu bestimmen, indem hier die fast physiologischen Diarrhöen und Kopfcongestionen ganz unmerklich in die typhösen Symptome übergehen. Der Typhus der Kinder kann bezüglich der Zeitdauer ebenso unregelmässig und verschieden verlaufen, als der der Erwachsenen, und es lässt sich von dem stürmischen Auftreten der ersten Symptome kein bestimmter Schluss auf dessen Verlauf und Dauer machen. Einzelne Kinder genesen von einem intensiven Typhus schneller als andere von einer ganz leichten schleichenden *Febri typhoides*. Im Allgemeinen aber ist als Norm anzunehmen, dass ein Kind, welches nach weniger als drei Wochen vollkommen genesen und nicht entschieden abgemagert ist, keinen Typhus und nicht einmal eine *Febri typhoides* gehabt habe, dass also die davon befallenen Kinder länger als drei Wochen in ihrer Ernährung und Entwicklung aufgehalten werden.

Die febrilen Erscheinungen lassen sich bei Kindern eben so leicht in Ziffern ausdrücken, wie dies in neuerer Zeit für die Temperatur, die Palaschläge und die Harnstoffausscheidung bei Erwachsenen gelungen ist. Zu bemerken ist hierbei, dass Temperaturen von 41,0 bis 41,5 bei Kindern noch nicht von so grosser Bedeutung sind.

Auch der Puls, auf dessen Beschaffenheit und Frequenz bei Erwachsenen mit Recht so grosser Werth gelegt wird, gibt minder sichere Anhaltspunkte bei Kindern. Er kann sich enorm beschleunigen, bis zu 160 und 170 Schlägen in der Minute, ohne dass deshalb die Gefahr eine sehr grosse und die Prognose besonders ungünstig würde. In der *Reconvalescenza* lässt er sich ausserordentlich leicht wegdrücken, in *Agone* wird er unzählbar und ist nicht mehr zu fühlen. Aussetzen des Pulses kommt bei Kindern selten vor, einen *ätheren* Puls kann ich mich nicht erinnern bei Kindern unter zehn Jahren jemals gefunden zu haben.

Von subjectiven Fiebersymptomen sind immer die Abgeschlagenheit, die Aufregung oder auch die Schlafsucht die wichtigsten. Deutliche Fröste haben die Kinder fast nie, der Kopf ist immer geröthet, das Auge matt oder, bei starker Aufregung, eigenthümlich glänzend, der Ausdruck des Gesichts ist entweder der der Apathie oder der Erregtheit, oder in heftigsten Fällen, der Verwirrtheit.

Die Ernährungsverhältnisse gestalten sich in der kürzesten Zeit sehr ungünstig, der Appetitmangel und die nicht zu stillenden

produsen Diarrhöen, einerseits und der an Harnstoff reiche Harn andererseits erklären hinlänglich die rasche Abmagerung typhöser Kinder. Ich habe noch oft bemerkt, meine Harnstoffbestimmungen, die ich bei Erwachsenen Jahre lang im grössten Maassstabe durchgeführt habe, auch auf die Kinder anzuwenden. Alle Bemühungen scheiterten aber an der Unmöglichkeit, von Kindern unter zehn Jahren den Harn zu 24 Stunden zu sammeln. Einzelne procentische Harnstoffuntersuchungen ergaben bei typhösen Kindern immer einen Harnstoffgehalt von 2,5—3,5 %, und, da sie dem Augenmaass nach eine ziemlich grosse Menge catieren, so lässt sich approximativ wohl angeben, dass auch die Kinder, wie die Erwachsenen, im Typhus eine grosse Quantität Harnstoff produciren. Eigenthümlich ist, dass die Abmagerung immer noch Fortschritte macht und erst ihren Höhepunkt erreicht, wenn der Appetit schon wiedergekehrt ist und die Kranken sich vollständig zu Recovalescenten befinden. Stellen sich Nachkrankheiten, z. B. Tuberculosis, Scrophul, Phlebitis an verschiedenen Hautvenen, oder grössere mehrfache Abscesse ein, so hungern die Kinder oft bis zum Tode ab, weshalb die Prognose jedoch nicht unbedingt letal zu stellen ist, indem solche Kinder zuweilen eine wunderbare Widerstandskraft zeigen und sich nach vielen Monaten endlich doch noch erholen. Nach jedem intensiveren Typhus verlieren die Kinder ihre Haare fast vollständig und bekommen anfangs sehr dünne, glanzlose wieder, schliesslich aber wachsen doch die stärkeren mit ihrem ursprünglichen Glanze zu neuen Fülle nach. Bei den so häufigen leichten Formen, bei denen die typhösen Symptome gewissermassen nur angehaucht sind, ist das Ausfallen der Haare weniger bemerklich.

Die wichtigsten Veränderungen finden immer im Gebiete der Digestion statt. Der Appetitmangel ist eines der constantesten Symptome, gewöhnlich ist er vollständig, zuweilen kommen aber auch eigenthümliche Gelüste, z. B. nach Schwarzbrot, nach Olat etc. vor, die man den Kindern ohne besonderen Schaden gewähren kann, wenn man die Vorsicht gebraucht, ihnen hiervon recht grosse Quantitäten zu einmal vorzusetzen. Sie spielen gewöhnlich mit den vorgesetzten Nahrungsmitteln, führen auch wohl etwas davon zum Munde, schlucken in den meisten Fällen aber nichts hinunter, sondern spucken Alles wieder aus, worauf dann die ganze Schmeichelei gestillt und kein weiteres Vorgehen mehr kund gegeben wird. So lange die Fiebersymptome währen dauert auch der Appetitmangel, 3—4 Wochen lang, und man hat dann oft die grösste Mühe, die Kinder zu einigermaassen zu nähren, was nur durch Getränke möglich ist. Nach und nach stellt sich der Appetit wieder ein und wird in wenigen Tagen zu einem Heisshunger, dessen unvernünftige Befriedigung oft heftige Rückfälle veranlasst.

Die Zunge wird bei Kindern selten so trocken als bei Erwachsenen, weil die Kinder meist mit geschlossenem Munde schlafen und hiemit die Hauptgelegenheit zur Entstehung der trockenen Zunge fehlt. Sie ist meistens ziemlich dick belegt und die Papillen sehen dunkelroth zwischen dem weissen Belege hervor, in schweren Fällen kommt aber allerdings auch die charakteristische, braune, trockene Zunge der Typhösen vor.

Die Lippen häuten sich öfter und bluten viel, besonders bei grösseren Kindern, die fast unaufhörlich an den gesprungenen Lippen

zupfen, worauf dann auch der sogenannte rissige Lippenbeleg in Folge kleiner Blutungen sich einstellt. Der Geruch aus dem Munde, der bei erwachsenen Typhösen so ausserordentlich widerlich ist, wird bei Kindern weniger intensiv bemerkt.

Die Parotis schwillt bei typhösen Kindern zuweilen an, was immer als ein höchst gefährliches Symptom zu betrachten ist. Es lässt sich nicht mit Bestimmtheit angeben, ob alle Parotiden metastatischer Natur sind, indem ja auch eine direkte Fortpflanzung des Mundhöhlen-catarthes auf den Stenosischen Gang und die Speicheldrüse selbst möglich ist. Die Gefährlichkeit des Uebels aber und der meistens sich ereignende letale Ausgang machen es wahrscheinlich, dass in der Mehrzahl der Fälle doch eine wirkliche Metastase und keine einfache Fortpflanzung des Catarthes die Ursache der Parotitis ist. Sie geht regelmässig in Eiterung über, wenn anders die wenigen Lebenstage, die die Kranken gewöhnlich nur noch vor sich haben, der Drüse Zeit lassen zum eitrigen Zerfall. In der Leiche findet man neben einzelnen grösseren Abscessen immer noch eine Menge kleiner, von der Grösse eines Stecknadelkopfes.

Mit Erbrechen wird sehr gewöhnlich der Krankheitsprocess eingeleitet, kleinere Kinder erbrechen oft während des ganzen Verlaufes mehrmals im Tage, wodurch, wenn nebenbei keine Diarrhöen bestehen, die Differentialdiagnose von Hydrocephalus acutus sehr erschwert wird. Dieses hartnäckige Erbrechen beruht auf einem profusen Magen-catarth, dem die Kinder brechen nicht nur die wenigen flüssigen Nahrungsmittel, sondern auch beträchtliche Quantitäten von Schleim heraus, wobei sie ungemein schnell atrophiren und gewöhnlich zu Grunde gehen. Das Erbrechen, welches bei Erwachsenen die perforative Peritonitis begleitet, ist bei Kindern sehr selten, weil eben auch das veranlassende Moment, die Perforation, fast nie beobachtet wird.

Leibschmerzen sind bei Kindern unter zwei Jahren wohl kaum mit Sicherheit zu eruiren, kommen bei grösseren aber nur ausnahmsweise und nicht in hohem Grade vor. Das gurrende Geräusch in der Coecalgegend, das früher als ein charakteristisches Typhussymptom bezeichnet wurde, ist als solches mit Recht in Mitleid gekommen, indem es sich bei jedem profusen Dünndarm-catarth ebenso gut findet.

Der Meteorismus ist, der geringeren Geschwülstbildung entsprechend, gewöhnlich nicht sehr bedeutend, und seine Folgen: erschwertes Athmen durch Heraufdrängung des Zwerchfelles, Lungenhypostase und Cyanose, kommen deshalb nur in geringerem Grade vor.

Die Darmausleerungen unterscheiden sich in nichts von denen der Erwachsenen. In den ersten Tagen haben die wenigsten Kranken Diarrhöe, bald aber treten fast regelmässig ohne Medicamente und trotz stopfender Getränke Diarrhöen ein, die oft in grosser Menge 20—30mal im Tage dejicirt werden. Von einem Sammelstuhle aller in 24 Stunden entleerten Stühle ist bei Kindern kaum die Rede, approximativ aber lässt sich angeben, dass dem Gewicht und Raume nach die typhösen Kinder 3—4mal mehr entleeren, als die gesunden. Die 24stündige Menge steht aber nicht immer im Verhältniss zur Anzahl der Entleerungen, manches Kind entleert auf zwei- oder dreimal eine

grössere Quantität typhöser Faeces als ein anderes auf 10 oder 12mal, was lediglich auf die Reichhaltigkeit des Sphincter ankommt.

Sind die Stühle ganz dünnflüssig, so werden sie hellbraun von Farbe und scheiden sich bei ruhigem Stehenlassen in zwei Schichten, eine obere durchscheinende und eine untere aus feinen weissen und gelben Flocken bestehende. Durch starke, mehrmals nach einander gereichte Drastica lassen sich allerdings Stühle erzeugen, die in Farbe und Schichtenbildung von jenen typhösen nicht mehr zu unterscheiden sind; da solche Drastica aber im Typhus kaum jemals gegeben werden, so hat man nichtsdestoweniger an der Schichtenbildung einen wichtigen Anhaltspunkt für die Diagnose. Die Abwesenheit stärkerer Diarrhöen beweist noch lange nicht die Abwesenheit des Typhus, indem es getrag typhöse Kinder gibt, besonders nach überstandener zweiter Dentition, die während der ganzen Krankheit hartnäckig obstipirt sind und durch Clysmata entleert werden müssen. Die mikroskopische Untersuchung der gelblichen Flocken, aus denen die untere Schichte besteht, ergibt vor Allem 1) eine völlig formlose, gegen Reagentien wenig empfindliche Körnchenmasse, 2) intensiv gelb gefärbte Schollen, Fragmente von Epithelien (ganze Cylinderepithelien finden sich nur ausserst selten), 3) braune, fein granulirte Kugeln von verschiedener Grösse und einer Hülle, was man durch vorsichtige Compression leicht ermitteln kann, 4) grosse braune, oft doppeltconturirte, runde, ovale, zuweilen deutlich rhombische, das Licht stark beechende Körper, 5) Tripelphosphate und 6) Infusorien, als ständige Begleiter einer jeden Verwesung. Letztere Gebilde, die sich auch in diarrhöischen Stühlen finden und für den Typhus somit nicht charakteristisch sind.

Ebenso wenig als durch das Mikroskop, können durch die chemische Untersuchung eigenthümliche Typhusstoffe nachgewiesen werden. Die typhösen Stühle entwickeln mehr Schwefelwasserstoffgas als die diarrhöischen, was durch feuchtes Bleizuckerpapier sich nachweisen lässt, und haben einen grösseren Ammoniakgehalt, weshalb sie geröthetes Lackmuspapier intensiver bläuen.

Im Salzgehalt, dann in den verschiedenen Destillaten, die ich bei Gelegenheit einer früheren Arbeit ausdrücklich angestellt habe, ergibt sich kein Unterschied zwischen einem typhösen und einem diarrhöischen Stuhl.

Gewöhnlich dauern die profusen Diarrhöen 8—14 Tage, wenn Obstipation erfolgt; länger dauernde Diarrhöen sind bei Kindern verhältnissmässig seltener, weil die Zerstörungen der Darm Schleimhaut weniger intensiv sind. So lange die Kinder fiebern, lassen sie mich sich gehen, wobei jedoch genau zu unterscheiden ist, ob sie bloss in Folge von Unaufmerksamkeit bei der Eingenommenheit des Sensoriums einige Male des Tages den Stuhl in das Bett gehen lassen, oder ob in Folge einer Lähmung der Sphincteren die flüssigen Faeces fortwährend zum Anus herausöckern und ihn unmittelbar nach vorgenommener Reinigung immer wieder beschmutzen. Die erstere Erscheinung ist sehr gewöhnlich, zeigt zwar einen ziemlich schweren Typhus an, gestattet aber dennoch eine günstige Prognose, die letztere hingegen ist ein Symptom höchster Schwäche und tiefster Depression des Nervensystems und ist als ein ungünstiges Zeichen zu betrachten.

Typhöse Darmblutungen und Darmperforationen sind bei

Kindern ausserordentlich selten, ihre Symptome und Consequenzen sind in nichts verschieden von jenen, die bei Erwachsenen vorkommen und als bekannt vorausgesetzt werden müssen.

In einzelnen bösartigen Epidemien gesellt sich in der dritten oder vierten Woche zum Typhus ein krupöser Process des Dickdarms, wobei die Kinder stuhlförmige Stühle entleeren, rasch collabiren und comatos oder unter Convulsionen zu Grunde gehen. Man findet dann bei der Section auf der Dickdarmschleimhaut ausgebreiteten Keup mit Geschwürsbildung der verschiedenen Stadien, wie sie bei der Ruhr ausführlicher beschrieben worden sind.

Die Milz schwillt auch bei Kindern regelmässig an; der physikalische Nachweis der Milzvergrößerung aber ist viel schwieriger als gewöhnlich angenommen wird und unterliegt unvermeidlichen und zugleich unberechenbaren Schwankungen. Bei einem gesunden Kinde von 1—2 Jahren lässt sich zwischen der neunten und zehnten Rippe eine kleine Dämpfung von kaum einem Zoll Länge und $\frac{1}{2}$ Zoll Breite nachweisen, eine senkrechte Linie, von der Mitte der Achselhöhle zum grossen Trochanter gezogen, schneidet diese durch geringere Resonanz kenntlich gewordene Stelle. Die normale, nicht vergrösserte Milz liegt mit ihrer Längsaxe der des Körpers parallel, nur das untere Ende ragt ein wenig mehr nach vorn; vergrössert sie sich aber, so wird ihre Lage mehr und mehr horizontal, doch bleibt das untere Ende immer etwas tiefer als das obere. Bei zunehmender Vergrößerung wächst also der untere Rand nach vorne und unten, erreicht den knorpeligen Rippenrand und schiebt sich an der Bauchwand nach vorne, während sich das obere hintere Ende der Milz nach dem Verlaufe der neunten Rippe gegen die Darmfortsätze nach rückwärts vergrössert, so dass man bei Percussion des Rückens zwischen Wirbelsäule und Milz nur mehr einen schmalen sonoren Streifen findet. Je grösser die Milz wird, um so mehr geht sie wieder aus der horizontalen in die ursprüngliche senkrechte Lage über. Im Typhus kann sich die Milz um das 3—4fache ihres normalen Volumens vergrössern, die Vergrößerung im Längendurchmesser ist unverhältnissmässig beträchtlicher als die im Quer- und Dickendurchmesser.

Der typhöse Milztumor ist immer leicht beweglich und wird bei jeder tiefen Inspiration weiter nach abwärts gedrückt, was sich leichter durch Percussion als durch Eindringen der Finger an den Rippenrand untersuchen lässt. Ueberhaupt ist es auffallend, wie schwer und undeutlich man eine stark vergrösserte Typhus-Milz, die weit über den Rippenrand hervorragt, palpiren kann, was wohl durch die enorme Weichheit und grössere Beweglichkeit zu erklären ist. Die Hauptanschwellung der Milz fällt in die erste und zweite Woche, mit der dritten Woche beginnt die Verkleinerung, die schon in der vierten gewöhnlich die normale Grösse wieder herstellt.

Der Metascismus des Darmrohrs, der natürlich bald grösser, bald geringer ist, je nachdem der Catarrh überhand nimmt und die peristaltischen Bewegungen verlangsamt werden, ist ein grosses Hinderniss bei Untersuchung der vergrösserten Milz. Die Raumvergrößerung des Darmes geht nicht bloss auf Kosten der Bauchwand, sondern auch aller übrigen Baucheingeweide vor sich. Die Leber hebt ihren scharfen Rand mehr und mehr nach oben und drängt das Zaphragma

nach aufwärts, die Milz aber wird nach hinten und oben geschoben und stülpt sich in den nachdrängenden Darm ein, so dass auch eine ganz bedeutend vergrösserte Milz kaum mehr zu percutiren ist. Man müsste die Diagnose häufig umstossen, wenn man den Nachweis des Milztumors als ein notwendiges Postulat des bestehenden Typhus betrachtet. Es geht hiernach keineswegs hervor, dass man die Percussion der Milz als unnötig unterlassen soll, nur das muss beherzigt werden, dass eine grössere Dämpfung in der Milzgegend nicht constant ist.

Keilförmige Milzentzündung entsteht nur bei Pyämie, welche bei typhösen Kindern, die nicht in einem Spitale liegen, fast niemals zur Beobachtung kommt.

Ebenso constant, wie die Veränderungen der Digestions-, sind die der Respirationsorgane. Alle typhösen Kinder haben Bronchialcatarrh und Husten, schacken aber bis zum fünften, sechsten Jahre den ausgehusteten Schleim regelmässig wieder hinunter. Je intensiver die Erkrankungen, um so unbedeutender und seltener ist der Husten, nicht als ob der Bronchialcatarrh hierbei geringer wäre, sondern weil die Reizbarkeit der Schleimhaut so abgestumpft ist, dass die secretirten Schleimtrassen nicht mehr expectorirt werden. Bei der Auscultation der Lungen hört man allenthalben grosse- und kleinhalsige Rasselgeräusche. Der liegen bleibende Schleim verursacht endlich Verstopfung kleinerer Bronchien und es kommt zu den bekannten hypostatischen Splenisationen. Desselben finden sich nur in den hinteren Partien der unteren Lungenlappen und veranlassen wohl einen verminderten Percussionsschall, aber keine so exquisite Dämpfung wie eine pneumonische Lunge, woselbst auch der feineren Nuancirung des Percussionsschalles der Umstand in den Weg tritt, dass hier meist in beiden Lungen Splenisation entsteht und somit der Vergleich des Percussionsschalles auf beiden Lungenflächen wegfällt. Zuweilen hört man an den splenisirten Stellen deutliches Bronchialathmen, niemals aber weder zu Anfang, wenn die Splenisation sich bildet, noch zu Ende, wenn sie sich in seltenen Fällen löst, kann man charakteristisches Knisterrasseln entdecken, wie dies in der Pneumonie so regelmässig gehört wird. Mit zunehmender Splenisation beschleunigen sich die Athembzüge und die Nasenflügel heben sich bei jeder Inspiration, ein Symptom, das man bei der Schwierigkeit der physikalischen Untersuchung und den unzureichenden Resultaten, die bei der Unruhe der Kinder nur zu häufig erzielt werden, nicht aufmerksam genug beachten kann. Zuletzt tritt blasses Cyanose ein, die Hämipnämie nehmen zu, die Pulsfrequenz steigt und die Kinder geben nach einer ziemlich langen Agone zu Grunde. Kleinere Splenisationen scheinen sich lösen zu können, grössere bedingen fast immer ein lethales Ende. Die Erconvalescenz dauert, wenn einmal Splenisation eingetreten war, immer sehr lange und der Husten verschwindet erst nach Monaten gänzlich.

Lebäre Pneumonieen finden sich häufig bei den Sectionen typhöser Kinder und kommen sowohl in splenisirten als in gesunden Stellen vor. Sie sind zu erkennen durch ihr starres Exsudat und das körnige Ansehen der Schnittfläche. Diagnostische Zeichen hierfür habe wir keine, denn die beschleunigte Respiration, das Heben der Nasenflügel und der ausserordentlich rasche Puls kommt ebenso der Splen-

sation und selbst schon einem ausgebreiteten typhösen Bronchialecatarrh ohne Splenisation als der lokalen Pneumonie zu. Durch Percussion und Auscultation lassen sich umschriebene Verdichtungen des Lungengewebes niemals entdecken.

Lungenödem wird häufig bei Sectionen bemerkt und scheint die Wirkung einer länger dauernden Agone zu sein. Lungenembolie kann sich bei Kindern mit hereditärer Tuberkelanlage nach überstandener Typhus rasch entwickeln, ist übrigens nach Typhus viel seltener als nach Mäscen, in deren Folge bei einer grossen Menge von Kindern dieselbe sich einstellt. Neu auftretendes Fieber, zunehmender Husten und Anwurf lassen sie vermuthen, die physikalische Untersuchung gibt nur selten hierüber direkten Aufschluss. Die Bronchialdrüsen sind häufig vergrössert und vermehren die Athemnoth, ihre Vergrösserung lässt sich aber nicht diagnostizieren.

Zu manchen Zeiten sollen im Larynx Geschwüre vorkommen, in den letzteren Jahren sind mir bei keiner Section einfache Geschwüre im Larynx, wohl aber Perichondritis und Knorpelnecrose mehrfach begegnet. Gewöhnlich tritt die Erkrankung des Larynx erst in der dritten bis vierten Woche eines schweren Typhus auf und gehört zu den secundären Symptomen. Die Kinder werden plötzlich leiser, dann gänzlich aphonisch, bekommen einen hellenden Krachstoss und Fieber, bald gesellt sich die heftigste Athemnoth dazu und die Kinder sterben einem furchtbaren Erstickungsod. Bei der Section findet man eine mehr oder minder grosse Necrose der Laryxknorpel, die necrotischen Knorpelstücke sind von Jauche umgibt und die Glottis ist edematös geschwollen. Fälle von spontaner Heilung mit lebenslänglicher Heiserkeit und selbst Aphonie sollen vorgekommen sein, von dem erfahrensten Aerzten aber wird die Kehlkopfneurose für tödtlich gehalten. Die Laryngotomie liefert bei Erwachsenen mit typhöser Larynxnecrose ziemlich günstige Resultate, ich selbst habe schon mehrere Individuen gesehen, an denen sie mit Glück verrichtet wurde, und werde keinen Augenblick anstehen, sie vorzunehmen, wenn ich wieder bei einem Kinde Larynxnecrose in Behandlung bekomme.

Wenn gleich auch im Typhus, wie in jeder anderen Krankheit, catarrhalische Laryngitis, die dann freilich auf jeden beliebigen Hautreiz und auch von selbst wieder in einigen Tagen verschwindet, sich einstellen kann, so muss doch Heiserkeit bei einem typhösen Kinde immer die grösste Besorgniss erregen, und es ist rathsam, sich auf die Tracheotomie vorzubereiten, damit sie im Momente zunehmender Athemnoth sogleich angestellt werden kann.

Die Haut zeigt mannigfache Veränderungen. Ungefähr 5–10 Tage nach Beginn des Abdominaltyphus treten auf Brust und Unterleib, — an den übrigen Stellen nur höchst selten und spärlich — nicht auf einmal, sondern im Verlaufe mehrerer Tage, stecknadelkopf bis linsengrosse, nicht scharf begrenzte, in der Mitte dunkler, nach der Peripherie zu heller rothe Flecken auf, welche auf Fingerdruck schwindend sich so gleichmässig wieder röthen, dass man nicht entscheiden kann, ob die Röthe vom Centrum nach der Peripherie oder umgekehrt wieder eintritt. Roscela typhosa, taches lenticulaires. Sie sind gewöhnlich im Niveau der Haut und erheben sich nur ausnahmsweise nach Art der Morbillen über dieselbe, mit den Haarfollikeln und

Schweißdrüsen stoßen sie in keinem Zusammenhang und werden von den Kindern nicht empfunden.

Der Unterschied zwischen *Roseola typhosa* und Floetischen ist nicht immer leicht zu bestimmen. Die Floetischen werden mit in die Krankheit gebracht und erlöszen täglich mehr, ohne durch neue ersetzt zu werden, weil die Flöhe alle Fieberkranken verlassen, während das typhöse Exanthem erst einige Tage, nachdem die Kinder schwer erkrankt sind, zum Vorschein kommt.

Der Ausbruch des typhösen Exanthems findet nicht auf einmal statt, der Verlauf ist durchaus nicht typisch, einzelne Flecken bleiben länger, andere kürzer stehen, während einzelne schon wieder erlöszen, treten an anderen Stellen wieder neue auf, und wir haben hier wesentliche Unterschiede von den acuten Exanthemen. Die typhöse *Roseola* steht immer mehrere Tage, in den Exacerbationen des Fiebers wird sie dunkler, in den Remissionen blässer, endlich erlöszt sie durch Braunroth und Gelbroth wieder zur normalen Hautfarbe. Fast alle schwer typhösen Kinder zeigen einzelne solcher *Roseolaflecken*, in den leichteren Formen des Abdominaltyphus wurden sie nicht beobachtet. In prognostischer Beziehung kommt es weniger auf die Zahl als auf die Farbe und Dauer der Flecken an. Je bläulicher sie sind, um so gefährlicher ist der Zustand.

Schweisse sind im Typhus selten kritisch. Einzelne Kinder schwitzen von Anfang an trotz Zunahme des typhösen Symptoms, andere gehen mit kaum feuchter Haut in eine vollkommene Reaction über.

Miliarien stellen sich bei den meisten typhösen Kindern in grösster Menge ein. Auch hier haben sie keine kritische und noch viel weniger eine ungünstige Bedeutung, und es ist geradezu merklich, wodurch unter den Laien aller Klassen eine so gewaltige Furcht vor diesen unschuldigen Schweißbläschen entstanden ist. Ihre Entstehungsweise ist eine höchst einfache. Durch die Störung der Schweißsecretion am Anfange des Typhus vertrocknen die den Ausführungsgang der Schweißdrüse auskleidenden Epithelien, werden nicht weggeschwemmt und bilden gegen den nun plötzlich nach längere Unterbrechung wieder reichlich secretirten Schweiß einen Damm, den er nicht durchbrechen kann, weshalb er die verschlossene Mündung und die sie umgebende, ebenfalls vertrocknete Epidermischicht in der Grösse eines Stecknadelkopfes und grösser emporhebt. Nach zwei, längstens drei Tagen platzt diese Epidermiskappe, und der Schweiß sickert nun ungehindert durch die wiedergeöffnete, gereinigte Passage. Die micro-chemische Untersuchung weist zur Evidenz nach, dass der Inhalt der Miliarien kein seröses Cutisaccretat, sondern reiner Schweiß ist, und bringt man die Kappe eines Miliarienbläschens unter das Mikroskop, so kann man sich leicht überzeugen, dass in ihrer Mitte sich die Mündung einer Schweißdrüse befindet, welche sich durch concentrische Lage der Epidermiszellen zu erkennen gibt und normal geöffnet, sondern durch grössere und kleinere Kerne verschlossen erscheint.

Am grössten und zahlreichsten entstellen die Miliarien an den Stellen, wo Hautreize, z. B. Senfteige oder Ung. cinereum, angewendet wurden. Sie erreichen dort oft die Grösse von Linsen, nach dem

Bersten derselben schält sich die Epidermis in grösseren Fetzen fast wie bei Scharlach, und die neue Cutischichte zeigt längere Zeit eine höhere Rötze als die Umgebung. Es ist diese Erscheinung auch sehr erklärlich, indem durch Salben die Schweissdrüsenausführungsgänge noch fester verstopft werden und durch Rubefacientien eine Congestion der Cutis entsteht, wobei die Drüsenkanäle jedenfalls comprimirt werden müssen. Kritisch kann man die Miliarien *per insensibilem* nennen, als sie eben anzeigen, dass die länger unterbrochene Schweisssecretion sich wieder eingestellt hat, was immer als ein erwünschtes, beruhigendes Symptom zu betrachten ist.

Ganz andere Bedeutung haben die Furunkel, die Zellgewebsabscesse und Decubitus. In der Convalescenz stellt sich zuweilen eine höchst schmerzhafteste Furunkulose hauptsächlich am Kopf und im Nacken ein, wodurch die Kinder viele Wochen geküht und in ihrer vollständigen Genesung aufgehalten werden, ein gleiches gilt von den mehrfachen subcutanen Abscessen, die oft sehr träge in Eiterung übergehen und lange auf die zum Einstich erwünschte Fluctuation warten lassen.

Reinlich gehaltene Kinder bekommen Decubitus viel später und in geringerer Ausdehnung als dies bei Erwachsenen beobachtet wird. Es sitzt sich gewöhnlich an einigen kleinen Stellen am Kreuzbein, den Nates oder den Trochanteren die Epidermis ab und bedingt oberflächliche Cutisgeschwüre, die gewöhnlich auf einfache Bestreichung mit adstringirenden Salben wieder heilen. Grössere Hantnecrosen, weithalergrosse Parthiesen der Haut über dem Kreuzbein plötzlich blau und brandig werden und sich in wenigen Tagen abtösen, entstehen zuweilen in schlecht ventilirten Spitälern, in der Privatpraxis sind sie mir bei Kindern noch nie vorgekommen.

Petechien an den unteren Extremitäten bemerkt man zuweilen bei typhösen Kindern, die in ganz feuchten, armseligen Localen liegen und scorbutisch erkranken, sie unterscheiden sich in nichts von jenen des gewöhnlichen Scorbutes. Erysipels des Gesichts, wie sie bei Erwachsenen zuweilen als Theilerscheinung einer pyämischen Entzündung der Oberkieferhöhle sich finden, habe ich bei Kindern noch nicht beobachtet.

Die Kopf- und Nervensymptome sind bei den typhösen Kindern nicht so sehr markirt, als man bei der allgemeinen Irritabilität annehmen sollte. Die meisten kühleren Fälle verlaufen nur mit geistiger Trägheit und allgemeiner gemüthlicher Verstimmlung, in schweren Fällen stellen sich zuerst Nachts, später auch am Tage Delirien des verschiedensten Inhaltes ein, worauf dann wieder Stunden des tiefsten Sopors folgen. Die Eintheilung der *fbris nervosa* in eine *versatilis* und *stetiva* lässt sich also, wie bei den Erwachsenen, auch bei den Kindern nicht aufrecht erhalten, und nur wenn der eine oder andere Zustand mehrere Tage lang ein continuirlicher geworden, kann möglicher Weise die therapeutische Indication darnach sich ändern. Die Delirien dauern zuweilen nur einen oder wenige Tage, gewöhnlich aber 2–3 Wochen, hören nicht mit einem Male, sondern nach und nach auf und lassen eine grosse Reizbarkeit und Gedächtnisschwäche zurück, die bei manchen Kindern eine Neibende, lebendingsche werden kann. Zuweilen tritt auf starkes Nasenbluten, auf eine Darmblutung

oder auf eine profusere Diarrhöe ein plötzliches Freiwerden des Sensoriums ein.

Die Muskelschwäche der typhösen Kinder ist eine außerordentlich grosse, sie liegen meist ganz ruhig auf dem Rücken und können sich kaum aufsetzen. Der fast nie fehlende Meteorismus ist zum Theil auch einer Parese der Darmmuskulatur zuzuschreiben, die Schwerhörigkeit lässt sich einfacher durch mechanische Störung der Schalleitung, die in Folge eines Catarrhes der Eustachischen Röhren eintritt, als durch die toxische Wirkung des typhösen Blutes erklären. Von der dem Typhus eigenthümlichen Muskelschwäche ist zu scheiden eine Parese der unteren Extremitäten, die sich unverhältnissmässig lange in der Convalescentia hinanzieht, endlich aber doch sich wieder spontan hebt, gleichviel ob die jetzt so hoch gepricebene Electricität in Anwendung gekommen ist oder nicht.

Ueber den Urin typhöser Kinder und das uropoetische System sowie über die Genitalien ist wegen der Unmöglichkeit, den Harn gehörig aufzufangen, und wegen der untergeordneten Bedeutung der kindlichen Genitalien überhaupt wenig zu berichten. Einmal sah ich bei einem ganz gut gepflegten zweijährigen Mädchen aus einer wohlhabenden Familie Diphtheritis der Vagina und sofortige Gangrän der kleinen und grossen Labien eintreten, wozu trotz der energischen, örtlichen Aetia und allgemein roborirenden Behandlung der Tod nach wenigen Tagen eintrat.

Metastasen im Sinne der älteren Schule kommen im Typhus nicht vor. Man hat hierzu die Phlebitis, die Furunkel, die Hautabscess, die eitrigen Entzündungen parenchymatöser Organe und die Gangris gerechnet. Seitdem man aber die Verschleppung der Gerinnel und die Bedingungen der Pfortbildug hauptsächlich durch Virchow's Bemerkungen genauer hat kennen lernen, und seitdem der pyämische Process und sein Auftreten in den verschiedenen Höhlen und Organen besser erforscht worden ist, haben diese Anschauungsweiseu sämtlich sich sehr verändert. Wenn auch noch nicht alle Verhältnisse vollkommen aufgeklärt sind, so ist doch schon so viel eruiert, dass sie zum grössten Theil auf mechanischen Circulationsstörungen beruhen, und dass wir somit nicht zöglig haben, unsere Zuflucht zu den mysteriösen Metastasen zu nehmen.

Wirkliche Recidive kommen bei Kindern nur selten vor, hingegen geht fast kein typhöses Kind ohne längere oder kürzere Unterbrechung einer stetigen Genesung entgegen, weil sie bei erwachendem Heilunger sich fast immer Nahrungsmittel zu verschaffen wissen und in Ermangelung derselben vollkommen unverdauliche Dinge, Papier etc. zu sich nehmen. Als häufigste Nachkrankheit stellt sich bei Kindern mit hereditärer Anlage die Tuberculose ein, an der sie erst nach vielen Monaten zu Grunde gehen, bei scrofulösen Individuen entstehen sind stark nässende Eczeme, Eczem und Impetigo und bösartige Ovarien, wobei gewöhnlich das Trommelfell perforirt und die Gehörknöchelchen ausgestossen werden. Das Ende dieses ebenso schmerzhaften als langwierigen und wegen des üblen Geruches auch für die Umgebung höchst lästigen Uebels ist natürlich complete Taubheit.

Eine dem Typhus der Kinder ausschliesslich zukommende Complication ist die Noma, welche sich zuweilen in der Convalescentia

einstellt und hauptsächlich Kinder in schlecht ventilirten feuchten Localen befällt. Das Nähere hierüber wurde schon pag. 90 besprochen.

Therapie.

Man kann einem typhösen Kinde durch Medicamente viel mehr schaden als nützen, und zwar wird ein wesentlicher Schaden zugefügt durch alle Brech- und Abführmittel drastischer Natur, obwohl die Anfangssymptome eines Typhus dazu oft ausserordentlich einladend sein können. Ich gestehe es offen, dass ich mich schon öfter habe hincissen lassen, einem stark congestionirten obstipirten Kinde mit weissbedeckter Zunge ein kleines Brechmittel aus Tartar. stibiat. 0,05, Ipecac. 1,20 zu reichen, und jedesmal bemerkte ich, dass der Typhus, der sich in der Folge entwickelte, zu den heftigsten Erscheinungen sich steigerte. Bei dem jebsamlichen Zusammentreffen eines heftigen Typhus mit dem Brechmittel kann von einem Zufall nicht mehr die Rede sein und es muss deshalb dringend ermahnt werden, den Tartarus emeticus bei Seite zu lassen, wo irgend ein kleines Symptom den beginnenden Typhus verrathen hat.

Die in den Lehrbüchern ausführlich besprochenen prophylaktischen Massregeln (Ventilation, gehörige Nahrung und Beschäftigung etc.) verdienen allerdings die grösste Bohernigung, lassen sich aber in den meisten Fällen viel leichter vorschreiben als durchführen. Hat man doch schon genug zu kämpfen, bis man die typhösen Kinder aus einer kleinen, von andern Kindern und Erwachsenen bevölkerten Hinterstube, dem Kinderzimmer, in das sog. schöne Zimmer transportiren kann, wo gewöhnlich der schönste, freieste Raum nur von einigen Luxusmöbeln ausgefüllt ist. In grösseren Wohnungen muss man darauf dringen, dass zwei neben einander liegende Zimmer für das kranke Kind disponibel sind, nur auf diese Weise gelingt es, die Luft gründlich zu erneuern. Wenn auch die Ansteckung eine höchst problematische ist, so ist es doch rathsam, schon zur Aufrechterhaltung der nöthigen Ruhe, dass kein anderes Kind und nur eine, höchstens zwei erwachsene Personen in demselben Zimmer sich aufhalten. Die Temperatur des Zimmers gehe niemals über 15° R. hinaus, Betten müssen immer leicht, die Unterlagen ziemlich hart, von Seegras, Stroh oder Rosshaaren sein. Wenn die typhösen Symptome einmal gehörig ausgesprochen sind, so ist es immer wünschenswerth, dass die Kopfhare kurz abgeschnitten werden, wodurch die grösste Abkühlung des congestionirten Kopfes erzielt wird. Die kalten Umschläge, die gewöhnlich von den Laien in der Weise applicirt werden, dass man ein Stück Leinwand in kaltes Wasser taucht und es dann durch ein anderes trockenes Tuch auf die Stirne bindet, wirken höchstens eine Minute kühlend, nehmen alsbald die Temperatur der Haut an und wirken dann mehr erhitzend als abkühlend, wie man sich durch den Anblick und die Berührung so behandelter Kinder leicht überzeugen kann. Ich glaube nicht, dass auf die Stirne gelegte kalte Compressen grosse Erleichterung verschaffen, indem sie zu bald warm werden und man doch nicht jede Minute wechseln kann, was überdies ein krankes Kind nur noch mehr aufregen würde. Wenn ein Kind noch zu unvernünftig ist, oder wenn es in Folge der Erkrankung in Delirien liegt, so muss man von dieser Art der Kaltapplication ganz abstecken und sich darauf

beschränken, den kurz geschorenen Kopf alle Stunden über eine Schüssel kaltes Wasser zu halten und eine tüchtige Waschung vorzunehmen, wobei man durch ein um den Hals gelegtes Tuch den steifen Körper und die Kleider leicht vor Durchnässung schützen kann.

Die interne Behandlung muss in den ersten Tagen des Typhus schon deshalb eine expectative sein, weil die Diagnose nicht bestimmt gestellt werden kann, und man, wie schon bemerkt, durch alle eingreifenden Mittel, wozu auch die zur Bekämpfung der Congestion an die Schläfe gesetzten Blatiegel gehören, nur schadet. Man beschränkt sich am besten darauf, bei Obstipation ein säuerliches Getränk, irgend eine wohlgeschmeckende Pflanzensäure oder auch einige Tropfen Acid. Hallen zu geben, während man bei schon eingetretener Diarrhöe passender die Mucilagines reicht. Vom Calomel ist zu rühmen, dass es, in Misdosen von 0,1–0,2 einige Male gereicht, sicher Stuhlansammlung bewirkt, ohne dass deshalb so profuse Diarrhöen wie auf Tartarn stülzt, oder Drastica folgten. Von einer euphorisirenden Wirkung ist natürlich keine Rede. So fñhrt man mit der äusserlichen oder schlmigen Behandlung 10–14 Tage fort, bis zu welcher Zeit sich gewöhnlich weder Besserung noch Verschlimmerung erkennen lässt, und fñgt dann an, die Kinder besser zu ernähren.

Die Diät der typhösen Kinder richtet sich nach ihrem Alter und der früheren Nahrungsweise. Die Beullen und die Schleimsuppe, bei den Erwachsenen mit Recht als das passendste Nahrungsmittel betrachtet, belohn viele Kinder, die in gesunden Tagen sich hauptsächlich von Milch und Mählspeisen genñhrt haben, gar nichts an, und es bleibt deshalb nichts übrig, als ihnen auch im Typhus kleinere Portionen Milch oder Milchkafee mehrmals des Tages zu reichen, obwohl sich nicht leugnen lässt, dass die Diarrhöen dadurch etwas zunehmen und dass zuweilen grössere Coagula unverdauter Milch sich in den Stühlen finden. Durch dickselbikönlige Getränke, ein dickes Selgelebkelt, Gummiwasser, Reisswasser etc. muss man trachten, den durch die Milchsäure der genossenen Milch unfehlbar entstehenden Reiz zu bekñmpfen. Schwertyphöse Kinder haben gar kein Bedürfniss, als kaltes Wasser, und verweigern Wochen lang alle Nahrung, selbst Milch und Suppe, ohne dass sie deshalb mehr abmagerten als andere, die täglich einige Male die Nahrungsmittel zu sich nehmen. Es fragt sich demnach sehr, ob die den typhösen Kindern beigebrachte Nahrung überhaupt assimiliert wird. Bei zunehmendem Collapsus, bei beginnender Splenisation und kleiner werdendem Pulse ist eine excitirende, roborende Diät dringend indicirt.

Wir haben in dem Kaffee ein bequemes, leicht zu schaffendes Erregungsmittel, das wegen seines Wohlgeschmacks allen andern excitirenden Medicamenten, Campher, Moschus, Castoreum, Ammoniak etc. bei weitem vorzuziehen ist. Auf eine Tasse gerackerten, starken Kaffees, der mit nicht zu viel Milch gemischt werden soll, haben sich oft plötzlich die Kräfte und die ausserordentlich geschwächte Circulation bekommt neuen Tonus. Ausserdem muss Fleischbrñhe mit Eigelb versucht werden, die auch per anum applicirt werden kann. Den Campher nehmen die Kinder sehr schwer und brechen gewöhnlich darauf, Mähk verhält es sich mit dem Moschus, der ausserdem die Luft des ganzen Hauses verpestet. Kalte Begiessungen in trockener Wanne stellen

gewöhnlich das Bewusstsein wieder her, kräftigen die Respirationsbewegungen und erzeugen eine zum Schwitzen geneigte, duftende Haut. Wenn die Kinder mehrmals im Tage unter sich gehen lassen, so sind zur Herstellung der Reinlichkeit lauwarme Bäder von 25 Grad R., in welchen die Kinder 5–10 Minuten lang zu verbleiben haben, dringend indicirt. Miliarien, Rosola typhosa und der nie fehlende Bronchialcatarrh dürfen nicht als Contraindication derselben angesehen werden.

Stellt sich nun in der 3.–4. Woche ein lebhafter Appetit ein, so ist die strengste Aufsicht nothwendig. Es muss mit Schleimsuppe, Fleischsuppe, Milch, Kaffee und Milchkreis so lange fortgefahren werden, bis vollkommene Verstopfung, Fieberlosigkeit und reine Zunge eintritt, worauf man etwas feingewiegtes Hühner- oder Kalbfleisch versuchen kann. Fette Speisen und Blättergemüse sind noch lange Zeit, am besten bis die Kinder schon ihren ersten Ausgang überstanden haben, zu vermeiden.

Mit dieser einfachen, expectativen Behandlung reicht man in der Mehrzahl der Fälle aus. Werden einzelne Symptome noch besonders gefährdend, so müssen sie natürlich speciell in Angriff genommen werden.

Gegen das Fieber und die Kopfcongestion ist die Kälte das beste Remedium. Kälte erzeugende Mittel sind: kühle Temperatur des Zimmers von 12–14 Grad R. und leichte Bedeckung, kurz geschorene Haare, Kopfkissen von Rosshaar mit einem Ueberzug von weichem Rohleder, eine mit Eisstückchen gefüllte Schweins- oder Cautschuck-Masse, nur bei älteren nicht delirirenden Kindern anwendbar, stündlich kalte Waschungen des Kopfes, kalte Begiessungen des ganzen Körpers in trockener Wärme, ein, höchstens zwei Mal im Tage, kühle Bäder. Von Senfteigen im Nacken oder auf den Waden habe ich noch wenig Erleichterung gesehen. Die mehrtägige Röthe und grössere Empfindlichkeit der Haut, die regelmässig darauf erfolgen, machen die Kinder nur noch unruhiger und aufgeregter. Niemals aber lasse man sich verleiten, typhösen Kindern Vesicantien zu setzen, weil diese nur sehr langsam heilen, sich häufig mit diphtheritischen Membranen bedecken und sogar gangränös werden können. Die antipyretische Wirkung des Chinins, der Salicylsäure und des Eucalyptus, womit gewöhnlich in den ersten Wochen des Typhus Versuche gemacht werden, ist keineswegs eine frappante. Zum Theil mögen wohl auch die viel zu kleinen Dosen, in welchen Chinin und Eucalyptus beigebracht zu werden pflegen, daran Schuld sein.

Gegen grosse Aufregung, Schlaflosigkeit und frühende Delirien haben wir in der Opiumtinctur das beste Mittel. Man gibt von derselben am sichersten immer einen Tropfen weniger als das Kind Jahre zählt, also einem dreijähr. Kinde gtt. ij, einem vierjähr. gtt. iij etc. und kann diese Dosis 2–3 Mal in 24 Stunden repetiren. Ich habe davon niemals die dem Opium nachgesagten Nachteile: Collapsus, tiefen Sopor, aussetzenden Puls, Cyanose etc. gesehen, sondern bemerkte nur, dass die Kinder einige Stunden Ruhe, für sie und die Umgebung gleich erquickend, fanden, ohne dass sich im Verlaufe des Typhus sonst etwas geändert hätte.

Gegen grosse Schwäche, kleinen Puls, kühle bläuliche Haut und die dabei regelmässig sich einstellende Spontaneisation der hinteren Lungen-

parthien ist eine excitirende roborirende Behandlung einzuschlagen, wobei ich starken Kaffee obenan stelle, beim Gebrauche des Weines, der im Typhus der Erwachsenen mit Recht eine so wichtige Rolle spielt, hingegen zur Vorsicht mahnen muss, weil die alkoholhaltigen Getränke auf manches Kinderkind einen rasch betäubenden Einfluss haben oder auch furiöse Delirien erzeugen können. Intern giebt man am besten Valeriana, Campher oder einige Tropfen Essigäther. Von der roborirenden Wirkung des Chinin in diesen Fällen ist nicht viel rühmliches zu erzählen. Trockene Schröpfköpfe, mehrmals täglich auf die vorderen und seitlichen Parthien des Thorax gesetzt, sind nicht nur theoretisch rational, sondern üben in der That einen ziemlich günstigen Einfluss auf die Splenisation aus.

Mässiges Nasaleuten bringt immer Erleichterung und Ruhe. Man muss den Wärterinnen einschärfen, dass sie das Blut in ein leeres, nicht in ein mit Wasser gefülltes Gefäss laufen lassen, weil man aus dem Blutverlust gewöhnlich viel zu hoch einschlägt und sich zu viel besorgt, die Blutung, die in den meisten Fällen von selbst wieder sich zu stillen. Erst wenn mehr als 60–80 CC. Blut verloren gegangen sind, ist die Tamponade indicirt, wobei es fast immer genügt, ein Stückchen Eis in das blutende Nasenloch zu schieben und durch ein Charpiepfropf die Mündung zu verstopfen. Die Tamponade von unten und hinten durch die Mundhöhle mittelst der Bellows'schen Röhre ist wohl niemals nöthig und würde die Kinder jedenfalls sehr belästigen und ängstigen. Um sich zu überzeugen, dass die Blutung wirklich steht, muss man nach der Tamponade die Kinder auf die Gesicht legen oder den Kopf nach vorwärts halten lassen, weil sonst die Blutung fortbestehen und das Blut nach hinten abfließen und verschluckt werden könnte.

Die typhöse Diarrhöe lässt sich durch kein Mittel gänzlich stopfen, nur das Opium vermindert sie etwas, die Adstringentia und Muscarosa sind gewöhnlich ganz ohne Wirkung. Im Allgemeinen aber ist die Diarrhöe bei Kindern überhaupt selten so profus und hartnäckig als bei Erwachsenen.

Vorstopfung ist im Verlaufe des Typhus zuweilen ein ungewöhnliches Symptom, das zu gewissen Zeiten fast epidemisch auftreten kann. Sie darf niemals durch Purgantien, sondern nur durch Clyster beseitigt werden. Gelingt es den Letzteren nicht, eine Oeffnung zu erzielen, so ist Calomel das einzige Mittel, das man intern geben darf, indem Tinct. Rhei aquosa und Ricinusöl den Kindern nur sehr schwer beizubringen sind. Schliesslich muss noch allen Ernates gedenkt werden, unter allen Umständen die Kräfte des Kindes zu schonen und sich niemals zu einem strengeren, antiphlogistischen Verfahren verleiten zu lassen.

b) Cholera asiatica.

Die Geschichte, das epidemische Verhalten, die Verbreitungsweg und die Aetiologie der epidemischen Brechruhr sind in den letzten Jahren so mannigfach ventilirt worden, dass wir sie füglich hier übergehen können; zumal für die Cholera asiatica der Kinder so keine Bemerkung abweichende Verhältnisse sich ergeben haben. Die Symptome aber, unter welchen bei kleinen Kindern die asiatische Cholera

austritt, unterscheiden sich vielfach von denen der Erwachsenen, und diese Unterschiede sind es, welche hier eine speciellere Betrachtung finden sollen.

Da die Diarrhöe bei kleinen Kindern überhaupt ausserordentlich häufig ist und durch den Reiz ungeeigneter Nahrungsmittel und die Dentition fortwährend neu veranlaßt wird, so ist es bei ihnen noch schwerer zu entscheiden als bei Erwachsenen, ob eine Diarrhöe, die während einer herrschenden Choleraepidemie entsteht, dem Choleragifte oder den oben bezeichneten gewöhnlichen Veranlassungen zugeschrieben werden muss. Thatsache ist, dass während einer Epidemie alle Kinder, auch die Säuglinge, viel mehr zu Diarrhöe geneigt sind und dass dieselbe schwieriger zu stillen ist, als diese zu einer anderen epidemiefreien Zeit beobachtet wird. Die so entstandenen Diarrhöen können entweder als solche fortbestehen und nach einigen Wochen wieder sistiren, ohne dass sich ernstere Symptome dazu gesellen, oder sie gehen alsbald in wirkliche Cholera über. In vielen Fällen geht aber überhaupt keine Diarrhöe voraus, sondern ganz gesunde Kinder bekommen plötzlich starke Diarrhöe und Erbrechen und zeigen in wenigen Stunden das Bild der entwickeltsten Cholera, profuse, hellgelbe, selten rosenrothliche Ausleerungen, seltener Erbrechen, dann Krämpfe, Collapsus, Schwinden des Pulses, Algor, Cyanose und Aufhören der Urinsecretion.

Man kann auch bei Kindern zwei Stadien unterscheiden: 1) das Stadium des Anfalles und 2) das Stadium der Reaction, bis zu welchem jedoch nur sehr wenig Kinder gelangen, indem sie meist schon während des Anfalles zu Grunde gehen. An die Reactionserscheinungen reihen sich dann noch die secundären Prozesse und die Erschöpfungsstadien an. Im Allgemeinen aber lassen sich drei Hauptreihen von Erscheinungen in der Cholera trennen: 1) die des Darmes, 2) die der Circulation und Respiration und 3) die der Nieren.

1) Die Störungen auf der Darmschleimhaut sind weitaus die wichtigsten, sie treten immer zuerst auf und sind wahrscheinlich die Veranlassungen zu den Veränderungen der Circulation, ganz gewiss aber zu denen der Nieren.

Eigenthümlich ist, dass bei Kindern die Stühle selten so weiss werden, wie bei Erwachsenen, sondern fast immer einen Stich in's Gelbliche behalten, im Uebrigen bieten sie weder chemisch noch mikroskopisch bemerkenswerthe Abweichungen dar. Selten sind sie sehr copios, und 5—6 dünne Ausleerungen genügen schon bei einem kleinen Kinde, den gefährlichsten Collaps zu erzeugen. Bei vorher marastischen Kindern tritt derselbe sogar schon mit dem ersten dünneren Stuhl ein, worauf noch einige Convulsionen und nach wenigen Stunden der Tod erfolgt. Werden die Stühle rosenroth, was von einer kleinen Beimischung von Blut herrührt, so ist die Prognose beifal zu stellen.

Länger als 48, höchstens 60 Stunden hält ein Kind unter einem Jahre profusen Choleradurchfall nicht aus, entweder sistirt derselbe oder es tritt der Tod in Folge des enormen Verlustes an Säften ein. Im ersteren Falle werden die Ausleerungen seltener, dann gelber gefärbt, weniger dünnflüssig und nehmen einen intensiven, aber nicht gerade芳igen Geruch an.

Mit dem Erbrechen verhält es sich bei Kindern anders als bei

Erwachsenen. Während an den letzteren in $\frac{1}{2}$ des Fälle dasselbe beobachtet wird, leidet die Mehrzahl der Cholera Kinder gar nicht oder nur höchstens ein- bis zweimal und das profuse Erbrechen alles Genossenen, kurz nachdem es in den Magen gelangt, kommt fast niemals vor, was um so auffällender ist, als die Kinder in gesunden Tagen bekanntlich viel häufiger und leichter erbrechen als die Erwachsenen. Der Akt des Erbrechens ist nur von ganz geringer Anstrengung begleitet, am Anfange kommen die zuletzt genossenen Nahrungsmittel wieder zum Vorschein, alsdann aber wirkliches Magenschleimhauttrauma, gemischt mit den zuletzt genossenen Getränken, die wegen des mangelnden Durstes fortwährend in grosser Menge eingeführt werden. Ueber die chemischen Eigenschaften des Erbrechens der Cholera Kinder ist meines Wissens wenig bekannt, weil es immer gleich in das Ben und die Kleidung geht, und die Chemiker zu einer genaueren Untersuchung sehr grosse Quantitäten des zu bestimmenden Materials verlangen.

Die Resorption der Magen- und Darmschleimhaut ist während des Anfalles sehr beschränkt und man kann desshalb den Kindern grossen Mengen toxischer Substanzen, z. B. Morphinum, Strychnin, Belladonna verabreichen, ohne dass Reaction hierauf einträte; zuweilen aber, wenn die Transsudation gerade schon in spontaner Abnahme begriffen war, tritt plötzlich gefährliche Resorption ein, worauf hier nur deshalb aufmerksam gemacht werden soll, weil die besagten Substanzen immer wieder von Neuem zum therapeutischen Versuche, als besonders einkaufend gewählt werden, und der Experimentator, durch die ersten erfolglosen Gaben zu grösseren Dosen verleitet, plötzlich eine Vergiftung veranlasst, zu deren Folgen das sonst genessende Kind zu Grunde gehen kann.

Der Unterleib fällt nach Beginn der Cholera schnell ein, wird weich schwappend, und lässt die Darmwindungen erkennen. Der Percussion zeigt, dass der Magen ziemlich viel Luft enthält, während die ganze Darmrohr mit Transsudat angefüllt ist und demnach einen vollkommen leeren Percussionsschall gibt. Wirkliche Colik scheinen die Kinder weniger zu haben als das Gefühl einer fortwährenden Ueblichkeit, das sie durch häufiges Öffnen des Mundes, eigenthümliche Hervorstrecken der spitzen Zunge und einen ängstlichen Blick zu erkennen geben.

Es ist auffallend, dass die profusesten Diarrhöen bei Cholera asiatica den Anus nicht röthen, während er bei Enteritis follicularis z. B. in Folge von Stoe nach wenigen Stühlen sich röthet und entzündet wird.

Die nächste Folge dieser Transsudation ist bei der vollkommensetzten Resorption natürlich eine beträchtliche Verminderung der ganzen Blutmenge und eine Aufsaugung des Wassers aus den pneumatischen Organen und serösen Säcken. Ob sich alle weiteren Symptome aus dieser Bluthere und Vertrocknung allein herleiten lassen, oder ob das Cholera Gift auch anderwärts als im Darmkanal eine gewirkung zeigt, ist noch immer Gegenstand der Controverse. Bei Kindern ist der Verlauf so ausserordentlich schnell, dass eine direct Wirkung des Cholera Giftes auch auf die Herzbewegung und den Puls hier ziemlich wahrscheinlich wird, denn schon mit dem ersten flüssigen Stühle schwindet zuweilen der Puls und der Diastolen.

2) Die Circulation soll in den ersten Stunden des Choleraanfalles zuweilen eine erhöhte Thätigkeit, heftige Heraspalpitationen und kräftiges Klopfen der Arterien zeigen, gewöhnlich aber wird Herzschlag und Radialpuls vom Beginne des Anfalles an stündlich schwächer und der letztere verschwindet bald ganz, während die Herztöne immer dumpfer und schwächer werden und der Diastolenton nur mehr schwach über den grossen Gefässen, an der Herzs Spitze selbst aber gar nicht mehr gehört wird.

Der Puls behält eine normale Frequenz, bei Kindern unter einem Jahre gewöhnlich circa 100 in der Minute, wird aber alsbald fadenförmig und verschwindet dann gänzlich. Die Beobachtung von J. Meyer, an Erwachsenen angestellt, dass bei der spontanen Reaction der Puls lange anhält, aber nachdem er einmal wiedergekehrt, nicht leicht mehr verschwindet, dass dagegen bei der künstlich durch Reizmittel hervorgerufenen Reaction es sich umgekehrt verhalte, findet auch ihre vollkommene Geltung in der Cholera der Kinder. Es gelingt sehr häufig, durch hohe Temperatur, ein Senfbad oder Campherpulver den verschwundenen Puls wieder fühlbar zu machen, sehr selten aber ist es möglich, ihn zu conserviren; gewöhnlich verschwindet er bald wieder, um niemals wiederzukehren. Uebrigens muss bemerkt werden, dass pullose Kinder, wenn diese Pulslosigkeit einmal einige Stunden gedauert hat, gewöhnlich verloren sind, während es genug Beispiele gibt, dass Erwachsene 12—24 Stunden und noch länger pullos waren und doch wieder vollkommen genesen. Im Cholera typhoide kommen verschiedene Pulsanomalien, Intermittiren und enorme Beschleunigung vor; bedeutende Verlangsamung bis auf 40—50, die sonst nur bei hydrocephalischen Kindern eintritt, ist hier kein ungünstiges Symptom, sondern lässt baldige Genesung voraussagen.

Die Venen sind mit dickflüssigem Blute überfüllt, indem theils die *vis a tergo*, theils auch die ausende Kraft des rechten Herzens geschwächt ist, und in Folge dieser venösen Stauung tritt auch eine Stase der Capillaren an den Lippen, den Fingern, den Augenlidern, die sich als Cyanose aussert, ein. Bloss gut genährte Kinder werden in der Cholera cyanotisch, abgemagerte, marastische bringen es an den genannten Stellen nur zu einer graugelben Färbung.

Die Respiration kann bei so gewaltigen und rasch eintretenden Störungen im Kreislauf natürlich nicht intact bleiben. Physikalisch ist zwar nichts Abnormes an den Lungen nachzuweisen, in der Function des Athmungsaktes bemerkt man aber bald Veränderungen. Die Kinder athmen unregelmässig, seufzen tief und oft und zeigen einen entschiedenen Luft Hunger. Am auffallendsten aber ist das Kühlwerden des Athems, das man durch die an den Mund gehaltene Hand, besonders an deren Dorsalfäche, deutlich unterscheiden kann. Prognostisch ist dieses Kühlwerden des Athems von grösster Wichtigkeit und offenbar das deutlichste Zeichen des unterbrochenen Stoffwechsels. Mit demselben steht immer im geraden Verhältnisse das Kühlwerden der Prominzenzen. Mit warmer Hand eine Betastung der Nase und Stirne, der Hände und Füsse, sowie eine Untersuchung der Temperatur der ausgeathmeten Luft genügt dem geübten Arzte, sich ein Urtheil zu bilden über die Schwere der Erkrankung und ihren wahrscheinlichen Ausgang.

3) Die Veränderungen in den Nieren sind bei den Kindern ebenso constant als bei Erwachsenen. Es finden sich in den Leichen alle Zeichen der Stase und eines acuten Moeb. Brightii, nur ist der klinische Nachweis derselben durch eine Untersuchung des Harns meistens unmöglich, weil die Kinder entweder gar keinen Urin entleeren oder nur wenige Tropfen in die Windeln laufen lassen. Wenn in Ausnahmefällen Kinder von einem schweren Choleraanfall genant, so finden sich in ihrem Urin Eiweiss und Cylinder. Wie lange die Urinsecretion unterbrochen bleiben und doch Genesung wieder eintreten kann, ist schwer zu entscheiden, indem die Windeln von den profusen Stühlen beständig durchnässt sind und man eine Urinbeimischung nicht wohl erkennen kann.

Durch die Aufhebung der Urinsecretion tritt natürlich eine gewaltige Unwährung im ganzen Stoffwechsel ein, als deren Hauptresultat die Zurückhaltung des Harnstoffs zu betrachten ist. Höchst wahrscheinlich sind hierauf auch die tonischen und chronischen Krämpfe zurückzuführen, von denen alle Cholera Kinder wenigstens an den Muskeln des Gesichtes befallen werden, während der grösste Schwäche, der rasche Collapsus und der Verlust der Stimme mehr dem raschen Serumverluste zuzuschreiben sind.

Überstehen die Kinder ausnahmsweise den Choleraanfall, so ist der erste Urin, der wieder gelassen wird, immer eiweisshaltig und von harnartigen Salzen getränkt, und es entwickelt sich ein Cholera typhoid, in welchem die Haut weiss und trocken, der Puls hart und ausserordentlich frequent, die Zunge zur Trockenheit geneigt ist und die Symptome der Gehirncongestion zum Vorschein kommen. In vielen Fällen tritt dann noch der Tod unter Convulsionen ein oder es entwickelt sich ein Marasmus, von dem nur sehr wenig Kinder sich mehr erholen können.

Fassen wir die Symptome der Cholera der Kinder zusammen, so ergeben sich folgende Verschiedenheiten von denen der Erwachsenen:

1) Die Stühle bleiben länger gelb gefärbt. 2) Der Collapsus ist ausserordentlich rasch, bei schwächlichen atrophischen Kindern tritt der Tod schon nach wenigen solchen Stühlen ein. 3) Das Erbrechen ist selten und fehlt in vielen Fällen gänzlich. 4) Das Mortalitätsverhältniss ist viel ungünstiger, indem von den wirklich kahl gewordenen pulslosen Kindern wenigstens 80 Proc. zu Grunde gehen.

Die pathologische Anatomie, die in der Cholera überhaupt bis jetzt von untergeordneter Bedeutung ist, lässt keine Unterschiede zwischen den Leichen der Kinder und der Erwachsenen entdecken. Man findet bei Kindern, die bald nach dem ersten Anfall gestorben sind, eine eigenthümliche Klebrigkeit der serösen Häute, Trockenheit aller parenchymatösen Organe, Cyanose der Haut, klebrige schwarze Blutklumpen in den Venen und im Herzen, den Dünndarm mit weissem Fluidum angefüllt, die Schleimhaut desselben rosenroth, das Epithel vollständig beraubt, die Nieren infiltrirt, in den Harnkanälen ausgefalteten desquamativen Catarrh, die Harnblase leer.

Sind hingegen die Kinder am Cholera typhoid gestorben, so ist die Cyanose der Haut weniger auffallend, die serösen Häute sind wieder schlüpfrig, das Gehirn ist ödematös, in den Lungen kommt häufig lobuläre Infarkte vor, im Dünndarme ist zäher, grüner Schleim

enthalten, seine Schleimhaut ist weniger infiltrirt und geröthet, die Schitdrüsen des Dickdarnes geschwollen oder excorirt. Die Harnblase enthält meistens wieder etwas trüben Urin, in welchem sich gewöhnlich noch Eiweis nachweisen lässt.

Behandlung.

Die Therapie der Cholera der Kinder ist, wie sich schon aus den Mortalitätsverhältnissen ergibt, eine höchst unglückliche, obwohl der wesentlichste Theil der Behandlung, die künstliche Hebung der gesunkenen Hauttemperatur, hier leichter zu effectuiren ist als bei Erwachsenen. Ueber die allgemeinen, öffentlichen Massregeln und über die individuelle Prophylaxis kann ich füglich hinweggehen, indem dieselben ausführlich in den neueren Handbüchern, z. B. Griesinger's Infektionskrankheiten beschrieben sind. Die Behandlung der Cholera-diarrhöe und des Choleraanfalles der Kinder unterscheidet sich wenig von der der Erwachsenen. Das Bestreben, den Durchfall zum Stillstand zu bringen, gelingt eben hier auch auf keine Weise, sobald einmal die Stühle ganz wässrig, hellgelb oder gar reisswasserartig geworden sind. Gegen einfache Diarrhöe, z. B. der zahnenden Kinder, die während einer herrschenden Epidemie natürlich auch die grösste Besorgnis erregen muss, ist Opiumtinctur das sicherste Mittel, gegen die wirkliche Cholera habe ich durchaus noch keinen Nutzen von ihr gesehen. Man kann das Opium in 4–5 Mal höherer Dosis geben als gewöhnlich, die Diarrhöe besteht unverändert fort, zuweilen aber, wenn sie vor der Application desselben schon 1–2 Tage gedauert hatte, steht sie plötzlich und es treten dann die heftigsten Opiumerscheinungen auf.

Gleich nutzlos sind die Adstringentia und überhaupt alle Mittel, denen man zur jemals stopfende Wirkung zugeschrieben hat.

Es ist hierbei zu berücksichtigen, dass bei der profusen exosmotischen Strömung, die auf der Schleimhaut des Magens und des ganzen Darmes stattfindet, höchst wahrscheinlich keine Resorption mehr zu Stande kommt. Ich werde deshalb bei der nächsten Epidemie mir andere Stellen wählen, die zur Resorption geeigneter erscheinen, z. B. die Harnblase, die Harnröhre, Vagina, das subcutane Zellgewebe und hier verschiedene Mittel namentlich aus der Classe der Narcotica versuchen. Die Injectionen in die Venen sind sehr unständig und dürften bei Kindern wegen Kleinheit der Venen und der Gefahr des Luft Eintritts kaum gelingen.

Was das diätetische Regime betrifft, so ist besonders hervorzuheben, dass die Entziehung des Getränkes, wodurch man den profusen Diarrhöen Einhalt thun möchte, entschieden nutzlos und grausamer ist, man lasse die Kinder nicht zu viel auf einmal trinken, gebe ihnen aber, so oft sie Durst haben. Auf grosse rasch verschluckte Quantitäten Flüssigkeit entsteht gewöhnlich alsbald Erbrechen. Am liebsten trinken die Kinder kaltes Wasser, Säuglinge ziehen, so lange es ihre Kräfte erlauben, geüßig an den Brüsten und verschlucken, wenn sie auch schwach geworden, die ausgepumpte Muttermilch noch sehr begierig. Von Darreichung anderer Nahrung, ausgenommen leere Seltsamkeit oder lauwarme Milch kann keine Rede sein, warmen Chamillen-, Wallblumen-, Münzeuthee etc. verschmähen viele Kinder gänzlich.

Die Hauptindication ist offenbar eine künstliche, anhaltende Erwärmung der kalt gewordenen Körperoberfläche, welche am besten dadurch gelingt, dass man die Kinder in ein heisses Bad von 30° E. setzt, worin ausserdem noch 30,0—60,0 Senfsehl suspendirt sind. Man trocknet die dadurch ziemlich geröthete Haut rasch ab, umgibt sie die Kinder in ihrem Bettchen ganz mit heissen Flaschen, Krügen und Steinen und wechselt die Windaeln nicht öfter als alle zwei Stunden. Unter Erhaltung einer hohen Temperatur wird der spärlich verschwendete Puls zuweilen wieder fühlbar, die Diarrhöen mindern sich, die Nasenspitze, die Ohren, der Hauch werden wieder warm und es stellt sich eine Reaction ein, die freilich oft genug noch in ein tödtlich endendes Typhoid übergeht.

Im Typhoid ist die häufige Darreichung von Getränken das wichtigste, um die gehemmte Passage in die Nieren so schnell als möglich wieder wegsam zu machen. Die Nerrina, Campher, Moschus, Kaffee etc., dann das so mannigfach gepriesene Chinin scheinen mir keinen günstigen Einfluss auf den Verlauf zu haben. In der Convalescent ist die grösste Vorsicht so lange nothwendig, als noch irgend Veränderungen an den Stühlen vorkommen. Brustkinder müssen wenigstens noch 6—8 Wochen nach einem Choleraanfälle die Amme behalten und dürfen nur ganz langsam abgewöhnt werden; bei künstlich aufgefütterten Kindern muss man noch lange Zeit Schleimsuppen reichen und kann sie erst nach und nach wieder an Mischkost gewöhnen.

So gross und beruhigend die Wirksamkeit des Arztes durch ein bestimmtes Auftreten sein kann, so problematisch ist der Nutzen, den er durch sein therapeutisches Verfahren einem cholera-kranken Kinde zu verschaffen mag.

10) Die Entozoen. Enthelminthen, Helminthiasis, Wurmkrankheit.

Bevor wir auf die Wirkung der einzelnen Helminthen einzulassen, erscheint es nothwendig, zuerst eine einfache zoologische Betrachtung derselben zu geben, wobei wir zum Theil Bamberger's vortrefflichen Aufsatz über die Entozoen in seinem Lehrbuch der Unterleibskrankheiten zu Grunde legen. Im Darmkanal der Kinder finden sich 1) die *Taenia solium*, 2) die *Taenia mediocanellata*, 3) der *Bothriocephalus latus*, 4) die *Ascaris lumbricoides*, 5) die *Oxyuris vermicularis* und 6) vielleicht auch der *Trichocephalus dispar*. Die in neuester Zeit so grossen Schrecken bereitenden Trichinen kommen bei grösseren Kindern natürlich eben so gut als bei Erwachsenen vor. Kleine Kinder blieben meines Wissens bisher von *Trichina spiralis* verschont aus dem einfachen Grunde, weil sie eben von dem die Trichinen bergenden Schweinefleisch, als einem für Kinder nicht geeigneten Nahrungsmittel nichts bekamen. Da die Trichinose der Kinder sich in keiner Weise von der der Erwachsenen unterscheidet, so kann deren Schilderung so sehr umgangen werden, als die vortrefflichen zahlreichen Monographien über diesen Gegenstand die ausgebreitetste Verbreitung gefunden haben.

1) *Taenia solium*, 2) *Taenia mediocanellata* und 3) *Bothriocephalus latus* (Cestoden).

1) Die *Taenia solium* (*T. cucurbitina*, *armata*, Kettenwurm) Tafel IV, Fig. 4, 5, 6 und 7 ist ein weißgelber, bandartiger, gegliederter Wurm, 15—30 Schuh lang, und 3—5 Linien breit. Sie hat, wie alle *Taenia*-arten, die männlichen und weiblichen Geschlechtsorgane in jedem ihrer entwickelten Glieder vereint und pflanzt sich durch Eier, die aber niemals im Darmkanale selbst zur Entwicklung kommen, fort. Der Kopf erscheint dem unbewaffneten Auge als ein weißes Pünktchen, an dem sich mit der Lupe vier, ausweißen schwärzlich pigmentierte Saugnapfe erkennen lassen. Zwischen denselben findet sich ein conischer, von einem doppelten Hakenkranz umgebener Rüssel, die einzelnen Haken sind aber so klein, dass man zu ihrer deutlichen Ansicht einer 200maligen Vergrößerung bedarf. Der Hals ist mehrere Zoll lang, ungegliedert, einem plattgedrückten Föfchen ähnlich und geht allmählig in den Körper über, der dann deutliche Gliederung zeigt. Die jungen Glieder sind breiter als lang, werden weiter nach hinten ganz und am Schlusse länglich viereckig mit stumpfen Ecken. An den letzteren sieht man die Genitalien deutlich, indem sich am Rande eine Hervorragung mit den Mündungen für die Scheide und den Penis findet und im Inneren die Fruchthälter durchschimmern. Diese Hervorragung sitzt meist abwechselnd am rechten und linken Rande der Glieder.

Am Kopf findet eine beständige Neubildung von jungen, am Ende eine Abstoßung von reifen Gliedern statt, die von Laien oft mit Kürbiskernen verglichen werden, und deshalb zur Bezeichnung *T. cucurbitina* Veranlassung gegeben haben.

2) Die *Taenia mediocanellata* ist der *Solium* sehr ähnlich und wurde erst von Küchenmeister als eine besondere Species von letzterer getrennt. Sie übertrifft nach Leuckart die *T. Solium* nicht bloss an Länge, sondern noch constanter auch an Breite und Dicke. Besonders auffallend erscheint die Breite der unreifen Glieder. Der ansehnliche Kopf ist ohne Hakenkranz und Rostellum und mit vier grossen, äusserst kräftigen Saugnapfen, die gewöhnlich von einem schwarzen Pigmentsaum umfasst worden, versehen. Der Uterus der reifen Glieder charakterisirt sich durch die bedeutende Menge seiner Seitenzweige, welche dicht nebeneinander hinhängen und statt dendritischer Verästelungen höchstens dichotomische Spaltungen erkennen lassen. Im Uebrigen verhält sie sich genau wie *T. Solium*.

Leuckart fütterte ein Kalb mit einer vier Fuss langen Gliederstrecke der *T. mediocanellata* und fand nach drei Wochen sämtliche Muskeln, das Herz, die Nierenkapseln, das Gehirn etc. mit unzähligen, kleinen Cysten durchsetzt, die sich sämtlich als junge *Cysticercus* zu erkennen gaben. Es kann demnach mit Bestimmtheit das Rind als die Wohnstätte dieser Finne bezeichnet werden.

3) Der *Bothriocephalus latius* Tafel IV, Fig. 1, 2, 3 (*Taenia lata* der breite Bandwurm, Grubenkopf) ist den vorigen sehr ähnlich; unterscheidet sich aber folgendermassen davon: Er hat eine mehr graue Farbe, der Kopf ist länglich, zeigt nur zwei längliche Vertiefungen ohne Rüssel und ohne Hakenkranz. Der Hals ist viel kürzer, die Glieder sind alle breiter als lang, liegen dachziegelförmig übereinander und, das charakteristischste, an jedem Gliede zu bemerkende Kennzeichen, die Geschlechtsöffnungen sind nicht am Rande, sondern in der Mitte der Glieder.

Die Eier haben eine bräunliche Färbung und schimmern als brenn- gelte Rosetten in der Mitte eines jeden Gliedes durch. Der *Bothriocephalus* hat ausserdem noch die Eigenthümlichkeit, dass er nicht hiebt einzelne reife Glieder, sondern immer ganze Gliederreihen ablässt, was die Diagnose, die nur auf Erzählung der Kranken gestellt werden soll, wesentlich erleichtert.

Diese drei Wurmartens zeigen ein merkwürdiges, gegenseitiges Ausschliessen. Der *Bothriocephalus* findet sich nur in Russland, Polen und Ostpreussen bis zur Weichsel, während die *Taenia solium* und *medicamentata* in sämtlichen andern Ländern Europa's vorkommt, nur in der Schweiz sollen nach Mayer-Ahrens alle drei beobachtet worden.

Diese Wurmartens kommen bei Kindern vor. Ausserordentlich selten bei Kindern unter einem Jahre, bei Säuglingen wahrscheinlich niemals. Nach Küchenmeister's Forschungen entsteht die *Taenia solium* aus dem *Cysticercus cellulosus* des Schweines, und könnte demnach nur bei Kindern vorkommen, die schon Schweinefleisch genossen haben.

4) *Ascaris lumbricoides* (Classe der Nematoden) Spulwurm

Der Spulwurm Taf. IV, Fig. 8 und 9 ist ein runder, dem Regenwurm ähnlicher, gelblicher oder röthlicher Wurm von 5—10 Zoll Länge und 1—3 Linien Durchmesser. Er wird nach vorne und hinten schmaler, hat einen Mund und einen Darmkanal mit After, der Kopf ist vom Körper abgeschnürt und aus drei Papillen zusammengefasst, die im Momente des Saugens sich in einen breiten Saugnapf ausbreiten können. Männchen und Weibchen sind leicht zu unterscheiden. Das Männchen ist kleiner als das Weibchen und hat ein gekrümmtes Schwanzende, zuweilen stehen kurz vor dem Schwanze ein Paar weisse, aus Häutchen hervor, die hervorgestülpten Penes. Drückt man nach Küchenmeister das Weibchen auf den Leib, so entsteht ein Prolapsus d. h. eine Schlanche (Ovarien) und ein Auslauf eines milchigten Gemenges (Eier) in der vorderen Hälfte des Thieres aus der Scheideöffnung. Drückt man ein Männchen, so fliesst ein Milchsaft (der Samen) in der Nähe des Afteres hervor, ohne dass eine Ruptur oder ein Prolapsus eintritt. Die äussere Haut besteht nach Czermak aus sechs Schichten und ist aus bandartigen Querringen gebildet, die nicht in sich zurückklappen, sondern sich manchmal dichotomisch spalten und meist an den Segmentlinien des Thieres plötzlich unterbrochen werden. Wenn man frisch entleerte Spulwürmer mehrmals mit Wasser schüttelt und sie nach gründlicher Abspülung auf einen reinen Teller bringt, so bemerkt man an demselben doch noch einen eigenthümlichen, Fettsäuren ähnlichen Geruch, der sich deutlich vom Geruche der sie bergenden Fäce unterscheiden lässt.

Die Spulwürmer bewohnen mit Vorliebe den Dünndarm, sind selten vereinzelt, sondern kommen meistens von 5—10, zuweilen aber auch zu 20—30 vor, und finden sich viel häufiger im Darmkanal der Kinder als in dem der Erwachsenen.

Bei Säuglingen kommen sie nicht vor, wohl aber, wenn auch sehr selten, bei ganz kleinen Kindern, die mit Mehl oder Semmelbrei künstlich aufgefüttert werden. Ihre Eier gelangen ohne Zweifel mit den Nahrungsmitteln in den Darmkanal, wenigstens bleibt nicht anders anzunehmen übrig, da nach v. Siebold die Ascaridenweibchen niemals

lebendige Junge gebären und ihre Brut auch niemals im menschlichen Darm aufzufinden ist. Sie scheinen sich vorzugsweise von Amylaceen zu nähren, womit jedoch nicht behauptet werden soll, dass alle Kinder, die gerne Brod essen, Ascariden heherbergen. In diesem Falle gäbe es wohl kein gesundes Kind, das nicht an solchen litten.

5) *Oxyuris vermicularis*. (*Ascaris vermicularis*, Springwurm, Pfriemenschwanz, Darmschabe, Madenwurm.) (Classe der Nematoden.) Tafel IV, Fig. 10, 11, 12 und 13.

Der Name *Oxyuris*, Spitzschwanz (von *ὄξυς* und *οὐρά*), passt nur auf das Weibchen, nicht auf das Männchen. Das Weibchen ist ein 2–5 Linien langer, dünner, weissgelber Wurm mit geradem, pfriemenförmig zugespitztem Schwanz. Das Männchen ist kaum eine Linie lang und hat ein stark gekrümmtes Schwanzende. Beide haben einen kolligen Kopf mit zwei seitlichen blasenartigen Membranen. Die Weibchen finden sich unendlich viel zahlreicher als die Männchen, die in den Stühlen selbst nie gefunden worden, indem sie fester an der Darmschleimhaut haften, von welcher sie nach Zenker in der Leiche leicht mit dem Darmschleim abgeschaht werden können. Es gelingt die Sammlung der Männchen besonders dann gut, wenn der Dickdarmkoth durch Diarrhöe weggespült worden ist.

Der gewöhnliche Aufenthalt der *Oxyuris* ist der Mastdarm, im Dickdarm kommt sie schon in viel geringerer Menge und im Dünndarm so gut wie gar nicht vor. Sie verlässt auch den Mastdarm, besonders wenn die Kinder in warmen Betten liegen, und wandert bei Mädchen in die Vagina. Küchenmeister sagt, es sei ein „Aberglaube“, sie nur und hauptsächlich dem Kindesalter zuzuschreiben und führt als Beleg an, dass er sie zweimal bei Erwachsenen gefunden habe. Jeder erfahrene Praktiker aber, der in einer Gegend wohnt, wo die *Oxyuris* überhaupt häufig vorkommt, wird seinen zwei Füssen von Erwachsenen Hunderte von Kindern entgegengesetzten können, so dass ich keinen Grund einsehe, von diesem „Aberglauben“ abzuweichen.

6) *Trichocephalus dispar*. (Nematoden.) Peitschenwurm. Taf. IV, Fig. 14 und 15.

Der *Trichocephalus*, ein weißer, 1–2 Zoll langer Wurm, ist am Kopfe so dünn wie ein Haar und geht nach hinten in ein dickeres Ende über, so dass er im ganzen eine Aehnlichkeit mit einer Peitsche bietet. An der Spitze des dünnen Theiles findet sich ein unbewaffneter Mund, in den der Oesophagus mündet. Der Hintertheil ist bei den Weibchen gerade und zeigt eine einfache Scheide, bei den Männchen aber spiralgewunden, am Ende mit einem kleinen Präputium und einem nicht unbeträchtlichen Penis versehen.

Es hält sich dieser Wurm fast ausschliesslich im Blinddarm und dem Colon ascendens auf und findet sich fast nie in den Fäces, weil er den Darm, wie es scheint, nur ungern verlässt. Ich fand einmal in der Leiche eines 15jährigen Mädchens, das am vierten Tage der Cholera verstorben war und die profussten Ansdorungen gehabt hatte, eine ganz beträchtliche Menge dieser Thiere, wenigstens 30–40 Exemplare, im Coecum, so dass alle der Section beivohnenden Aerzte ihre Verwunderung äusserten, wie sich die Thiere bei so flüssigem und reichlich angeschiedenem Darminhalt vier Tage hindurch halten konnten.

Er kommt bei Kindern ausserordentlich selten vor und wird eigentlich mehr der Vollständigkeit halber abgehandelt.

Symptome.

Ueber die Symptome, die durch Entozoen verursacht werden, hat man schon viel geschrieben und gestritten. Unsere Vorfahren legten den Eingeweidewürmern gewiss eine zu grosse Bedeutung bei und glaubten von vielen schweren Krankheiten, während welcher zufälliger Weise solche abgingen, dass sie hiedurch hervorgerufen und durch den Abgang der Würmer auch glücklich wieder beseitigt worden seien. Die so entstandenen Symptome wurden immer mannigfacher und die Verwirrung immer grösser, bis endlich die Sache klar sehenden Aerzten zu bunt wurde und man anfang, alle Wurmsymptome zu leugnen, was nach heut zu Tage von mehreren, besonders Wiener Aerzten bestritten wird. Was alles Neues, so fand auch diese Negirung vielfache Anhänger, und es gehörte einige Zeit zum guten Theil, von den Belästigten gar nichts zu wissen. Einzelne Symptome aber liessen sich nicht absegnen, und ich will, um sicher zu gehen, nur die anführen, die ich selbst zu wiederholten Malen beobachtet habe.

Sie lassen sich in örtliche und allgemeine, reflectirte, scheiden, von den eingebildeten Symptomen, welche bei Erwachsenen, besonders Bandwurmkranken so häufig auftreten, können wir in der Pädiatrik glücklicher Weise ganz absehen.

A. Oertliche Symptome.

Unter den Symptomen, welche durch direkte Reizung der Entozoen erklärt werden müssen, ist vor allen der Schmerz zu nennen. Derselbe wird sehr häufig beobachtet, ist bald knispend, stechend, nagend, bohrend etc. und intermittirt ohne Ausnahme. Verschiedene Nahrungsmittel, besonders die stark gesalzenen, aromatischen oder sauren, daher auch alle Obstsorten, vermehren denselben, während Milch, ölige und fette Nahrungsmittel ihn meistens mindern. Der Appetit ist bei Wurmkranken gewöhnlich normal, zuweilen aber vermindert, was einer Vermehrung desselben durch Würmer lässt sich bei Kindern zu schwer sprechen, weil bekanntlich zu verschiedenen Zeiten bei einem jeden Kinde abnorme Zunahme des Appetits vorkommt. Gewöhnlich ist der Grund des vermehrten Appetits in rascherer Entwicklung und stärkerer Bewegung oder körperlicher Anstrengung, nicht aber in der Gegenwart von Würmern zu suchen. Erbrechen kann sich eintreten entweder in Folge des Eindringens eines Wurmes in den Magen oder als Reflexerscheinung von der gereizten Darmmucosa ausgehend. *Ascaris lumbricoides* kommt häufig in den Magen, scheint dort durch seine Bewegungen Brechreiz zu veranlassen und wird dann nach im grossen Schrecken der Angehörigen zuweilen erbrochen. Das kleine Kind, das ich einen Spulwurm von drei Zoll Länge erbrechen sah, war $\frac{1}{2}$ Jahre alt und genoss erst seit $\frac{1}{4}$ Jahre neben der Muttermilch etwas Mehlbrei. Die Stühle sind hierbei meist unregelmässig, bald in Verstopfung, bald Diarrhöe vorhanden, mit letzterer geht in der Regel eine grosse Anzahl der Enthelminthen ab. Die grossen Schleimzotten (s. g. Wurmerster), welche bei Bandwurmkranken zuweilen abgehen, werden bei Kindern selten beobachtet.

Die Oxyuren gehen aus dem Mastdarm, in welchem sie ein fortwährendes Zucken veranlassen, bei Mädchen in die Vagina, rüthen deren Schleimhaut und bedingen Leukorrhöe. Der anhaltende, hierdurch erzeugte Kitzel gibt häufig den ersten Anstoß zu Onanie, von der die Kinder selten mehr abzubringen sind, wenn auch die Oxyuren längst verschwunden sind. Bei Knaben kriechen sie zuweilen unter das Präputium, worauf Balanitis, Erectionen und ebenfalls Neigung zur Onanie sich entwickeln kann.

Die Spulwürmer dehnen ihre Wanderung noch weiter aus, als die Oxyuren. Sie gelangen zuweilen ohne Erbrechen in den Oesophagus, die Mund- und Nasenhöhle und sollen sogar schon in den Larynx gekommen sein und Erstickungsanfälle bewirkt haben. Man hat auch bei Sectionen schon Leberabscesse gefunden, die einen und selbst mehrere Spulwürmer beherbergten. Dieselben sind jedenfalls durch den Ductus cholecysticus in die Gallengänge gelangt und verursachten dann Entzündung, Leberabscesse und den Tod; auch im Ductus pancreaticus und im Wundfortsatz hat man sie schon beobachtet, wo sie Reaction und Eiterung erzeugten. Die ausserordentlich seltenen Fälle, in denen encystirte Ascariden im Peritonealsack gefunden wurden (die sog. Wurmbabscesse), hat man in neuerer Zeit ganz bezweifeln wollen, weil sich an keinem Körperteile der Würmer Organe finden, die zur Durchbohrung des Darmes fähig erscheinen. Ich selbst habe keinen derartigen Fall gesehen und kann deshalb nicht entscheiden, v. Siebold aber, einer der ersten Helminthologen, und bekant durch seine gewissenhaften Beobachtungen, behauptet, dass die Ascariden mit ihrem härteren Kopfe die Schichten des Darmes auseinanderziehen und in die Bauchhöhle gelangen können, ohne dass nachträglich Spuren ihres Durchtrittes am Darm zu bemerken wären. Leuckart hält die Lippenränder der Spulwürmer für scharf genug, dass sie, wenn sie auch nicht geradezu als Bohraparate bezeichnet werden können, doch immerhin reizend und corrodirend auf die Darmmucosa einzuwirken im Stande sind.

B. Allgemeine und Reflexerscheinungen.

Ein sehr gewöhnliches Symptom ist das Jucken an der Nase, doch darf nicht außer Acht gelassen werden, dass fast alle Kinder gern mit den Fingern in den Nasenlöchern bohren, und dass dieses Symptom somit keinen besonders hohen Werth hat. Erweiterung der Pupillen sah ich öfter auf Abgang von Ascariden verschwinden und halte sie zwar für kein constantes, jedoch faktisch bestehendes Symptom. Krämpfe verschiedener Art, besonders die Chorea und Epilepsie, wurden mit Entozoen in Zusammenhang gebracht. Da diese Anschauung auch unter den Laien bekannt ist, so wurde ich schon in mehreren Fällen gebeten, die Würmer abzutreiben, in keinem aber sah ich trotz der energichsten Mittel einen Abgang von Würmern, noch überhaupt eine Veränderung der Krämpfe eintreten. Es scheint demnach das Vorkommen von Würmern bei Chorea-kranken und Epileptischen ein zufälliges zu sein.

Dass Würmer schwere, hydrocephalusähnliche Symptome bedingen können, bezweifelte ich so lang, bis ich mich persönlich davon überzeugte. Es wurde vor mehreren Jahren ein Kind, das erst vor ein

paar Tagen von Krämpfen befallen worden sein sollte, sterbend in das Münchener Kinderspital gebracht. Es bot alle Zeichen eines in Acute begriffenen Hydrocephalus acutus und starb nach wenigen Stunden.

Zu unserem grossen Erstaunen fanden wir bei der Section das Gehirn und seine Hülle vollkommen normal, ebenso Herz und Lungen, desgleichen Leber, Milz und Nieren, im Darmkanal aber über hundert Spulwürmer, welche in grossen und kleineren Knäueln zusammengeballt, an einzelnen Stellen das Darmlumen vollständig ausfüllten und die Schleimhaut desselben intensiv geröthet liessen. Leuckart erzählt diesen analogen Fall. Huber beobachtete, nachdem er sich eine Stunde lang mit Untersuchung von Spulwürmern beschäftigt hatte, an sich selbst Jucken der Hände, partiellen Ausbruch einer Urticaria und Conjunctivitis und leitete diese Symptome von dem eigenthümlich scharfen Geruch, den diese Thiere verbreiten, her. Es kann demnach auch ein Theil der Warmsymptome als die Folge einer chemischen, nicht bloss mechanischen Reizung angesehen werden.

Diagnose.

Aus diesen örtlichen und allgemeinen Symptomen lässt sich allerdings eine Wahrscheinlichkeitsdiagnose stellen, Gewissheit aber gibt nur das Abgeben von ganzen Helminthen oder wenigstens einzelnen Stücken (Bandwurm) oder endlich das Auffinden der verschiedenen Würmer in den Stühlen mittelst des Mikroskopes. Die genaue Anleitung zu dieser höchst zweckmässigen Untersuchung findet sich bei Frey, das Mikroskop. Da die gewöhnlichen Abtreibungsmittel bei sonst gesunden, nicht an Darmcatarrh leidenden Kindern durchaus keine üblen Folgen haben, so genügen schon die oben angeführten Symptome zum Verweife, die Würmer aus dem Darme zu entfernen.

Behandlung.

1) Der Bandwurm darf nur abgetrieben werden bei Kindern, die über ein Jahr alt sind, sich vollkommen wohl befinden und keine grosse Neigung zu Diarrhöen haben. Ganz kleine oder salmende Kinder vertragen selbst die mildesten Bandwurmmittel schlecht. Das einfachste und sicherste Mittel gegen *Taenia solium* ist die Cortex radic. *Punicae* granat. nur muss dafür Sorge getragen werden, dass sie frisch ist und lange macerirt wird. Für Kinder von 2—5 Jahren kann man sich folgende Formel bedienen: Rp. Cort. rad. *Punice*. Granat. rec. 30,0 Macer. c. Aq. fontan. 360,0 per horam 24 dein cog. per hor. 12 ad remanent. 180,0. Man lässt dieses Decoct. Morgens nüchtern in drei Portionen getheilt in $\frac{1}{2}$ stündigen Intervallen reichen, nachdem man Tags vorher durch gekochte, getrocknete Zwetschgen 1—3 weiche Stühle erzielt hat. Es ist rathlich das doppelte Quantum des Granatriebens decocti bereiten zu lassen, weil zuweilen die eine oder andere Portion erbrochen wird, worauf nach einer halben Stunde das Mittel wieder versucht werden muss. Nach 1—2 Stunden geht gewöhnlich der Wurm ab. Erfolgt der Abgang nicht oder findet sich kein Kopf des Bandwurms, so kann man unbeschadet der Gesundheit dieselbe Procedur in einigen Tagen repetiren. Anhaltende Diarrhöen oder länger dauernde Lebschmerzen entstehen gewöhnlich nicht auf dieses Mittel und können durch Emulsionen bald beseitigt werden.

Wo frische Granatwurzelrinde nicht zu haben ist oder wenn die Kinder nicht dazu gebracht werden können, sie zu nehmen, so können die übrigen Bandwurmmittel, vor allem das Extr. fibe. mar. sether. 0,60 gegen *Botrioccephalus latus* oder die Blüten der *Brayera anthelmintica*, von denen man 30,0 mit Honig zu einer Latwerge machen lässt, in Anwendung kommen. Starke Drastica, wie das Gummi gutti, die Colopintien und das Crotaöl, sind in allen Fällen zu meiden. Bei schwächlichen, kränklichen Kindern sind diese Kuren niemals indicirt, und es sind mir selbst Beispiele bekannt, dass sich dieselben trotz ihres Bandwurmes nach und nach erholten, der Bandwurm also die Entwicklung nicht aufgehalten hat.

2) Die *Ascaris lumbricoides* machen nur selten eigentliche Beschwerden und gehen häufig in grosser Menge bei ganz gesunden Kindern ab, bei denen weder subjective noch objective Symptome vorausgegangen sind. Die gewöhnliche Methode der Abtreibung besteht darin, dass man Pulv. Semin. Cinnae 4,0 und Pulv. rad. Jalap. 2,0 mit 4—5 Portionen vertheilt, in zwei Stunden nehmen lässt. In der Regel sind den Kindern mit Wasser vermischte Pulver leichter als Latwergen beizubringen. In neuerer Zeit hat man sich daran gewöhnt, in den Alasbiden, die aus einem Mittel dargestellt werden können, die Quintessenz der Wirkung desselben zu suchen und gibt deshalb statt 4,0 Cinnsamen einige Centigramme Santonin. Der Erfolg des Santonin ist aber durchaus nicht so brillant, als er von mancher Seite geschildert wird, im Gegentheile sehr problematisch und steht weit hinter dem des gewöhnlichen Cinapulvers zurück, das durch die jetzt so verbreiteten Santoninzüchteleien gewiss nicht verdrängt werden wird. Wenn auch die Furcht vor dem Calomel, in welcher einzelne Therapeuten befangen sind, durchaus keine begründete ist, so ist dessen Anwendung gegen Würmer doch eine sehr überflüssige, zumal die Kinder die Oblaten, in die man die Pulver hüllt, im Munde zu zerdrücken pflegen und dann gewöhnlich eine Stomatitis davantragen. In allen pädinrischen Lehrbüchern spielt das Ol. Ricini eine vielfache Rolle, und einzelne Autoren versäumen fast keine Gelegenheit, die Kinder mit ein Paar Kaffeelöffel Ricinusöl zu beglücken. Ich habe mich schon oft bemüht, dasselbe zu geben, habe es aber nur den wenigsten Kindern beigebracht, die meisten spuckten es sofort wieder heraus, so dass ich von dessen Anwendung jetzt vollkommen abgesehen bin.

3) Gegen die *Oxyuris vermicularis* nützen interne Mittel sehr wenig, hingegen kann man ihnen, da sie sich fast nur im Mastdarm aufhalten, leicht mit Clystieren beikommen. Man hat diesen Clystieren schon verschiedene wurttreibende Medicamente, als Abkochung von Knoblauch, Zwiebeln, Aca foetida, Valeriana, Tutaecum oder einige Tropfen Terpentintöl, Campher, Salzwasser, selbst eine schwache Sublimlösung beigegeben. Die Hauptsache bleibt aber immer, dass der Mastdarminhalt wenigstens einmal täglich verflüssigt und entleert wird, wozu das kalte Wasser dieselben Dienste zu leisten scheint. Täglich zwei Kaltwasserclystiere, vier Wochen lang fortgesetzt, beseitigen mit Bestimmtheit alle *Oxyuris*. Ist gleichzeitig Leucorrhoe der Vagina vorhanden, so sind auch hingegen die Injectionen mit kaltem Wasser von grösstem Nutzen. In den grossen breiigen Ansammlungen, die auf die ersten Kaltwasserclystiere erfolgen, findet sich zuweilen eine solche

Ummasse von Oxyuris, dass durch das Gewimmel der unzähligen Thiere der Kothhrei in fortwährender Bewegung ist.

4) Der *Trichocephalus dispar* macht niemals Symptome und wird auch fast niemals in den Ausleerungen entdeckt, sondern immer nur zufällig bei Sectionen gefunden, weshalb von einer Abtreibung desselben auch unmöglich die Rede sein kann.

E. Leber.

Die Leber ist bei einem Neugeborenen verhältnissmässig viel grösser als bei einem einjährigen Kinde. Die Angaben von Portal und Meckel aber, nach denen die Leber bei Neugeborenen um $\frac{1}{3}$ schwerer sein soll, als bei 8—10 monatlichen Kindern, kann Frerichs nicht bestätigen. Derselbe Autor fand, dass das Gewicht der Leber sich verhält zu dem des ganzen Körpers, wie 1 : 17 bei einem 7monatl. Fetus,

wie 1 : 28 bei einem Neugeborenen.

wie 1 : 24 „ „ „

wie 1 : 20 „ „ „

wie 1 : 33 bei einem 1½-jährigen Kinde.

Die Leber eines Neugeborenen wiegt durchschnittlich 100 Gramm, die eines 1½-jährigen Kindes aber 250 Gramm, so dass von einer wirklichen Gewichtsabnahme dieses Organes nicht die Rede sein kann.

Die physikalische Untersuchung der Leber wird bei Kindern ganz nach denselben Principien angestellt, wie bei Erwachsenen. Man percutirt zuerst in der Axillarlinie (eine senkrechte von der Achselhöhle nach abwärts), dann in der Mamillarlinie (eine senkrechte von der Brustwarze nach abwärts) und endlich in der Sternallinie (eine senkrechte vom Sternum ausgehend). Durch die ersten beiden Linien wird der Durchmesser des rechten, durch die letzte der des linken Leberlappens bestimmt.

Durch die Unruhe der kleinen Kinder wird diese Percussion sehr erschwert und unentwederlich muss man darauf verzichten, den so wichtigen Einfluss der Athembewegung auf die Stellung der Leber erforschen zu wollen. Ältere Kinder vom vierten Lebensjahre an kann man durch freundliches Zureden gewöhnlich dazu bringen, dass sie sich so gut untersuchen lassen, wie die Erwachsenen.

Die Leberkrankheiten sind bei kleinen Kindern ausserordentlich selten. Nachdem wir den Icterus neonatorum schon im Kapitel von den Krankheiten, die unmittelbar nach der Geburt entstehen, betrachtet haben, bleiben uns nur mehr die syphilitische Leber, die Fetide und die angeborenen Anomalien. Die anderen Leberkrankheiten, die Cirrhose, der Leberkrebs und die Echinococcus kommen bei Kindern fast niemals vor und unterscheiden sich, was ihre Symptome und der Verlauf betrifft, kaum in nichts von denen der Erwachsenen. Die acute Leberatrophie wurde meines Wissens noch niemals bei Kindern beobachtet.

1) Die syphilitische Leberentzündung.

Der Zusammenhang zwischen einer eigenthümlichen Veränderung der Leber und der sec. Syphilis wurde von Rayer und Ricord an-

gedenkt, von Dittrich aber durch eine Reihe genauer Untersuchungen zur Evidenz erwiesen. Im Allgemeinen ist die Erkrankung jedoch eine seltene. Ich habe schon viele Kinder mit hereditärer Syphilis (vielleicht 10—15) secirt und immer genau die Leber untersucht, habe aber erst einmal diese Veränderung gefunden.

Pathologische Anatomie.

Bei der Section von Kindern mit angeborener Syphilis, die bekanntlich fast alle zu Grunde gehen, findet man zuweilen in der Leber eine besondere Art von Entzündung, welche die Drüsenanlage selbst ergreift. Das Exsudat dieses entzündlichen Processes ist theils plastisch und verwandelt sich in späterer Zeit in eine schwielige Narbe, wozu es aber bei Kindern wegen des zu bald erfolgenden Todes nur sehr selten kommt, theils serös und demnach resorbirbar, theils endlich weder plastisch noch resorbirbar, und besteht in letzterem Falle aus einer grauen oder gelblichen Masse, die mikroskopisch Elementarkörnchen, Fetttropfchen und nur wenige Leberzellen erkennen lässt. Diese graugelbe Masse ist, wenn der Process lange genug gedauert hat, im Umfang eines Hanfkornes oder einer Erbse von dem plastischen, später schwielig gewordenen Theile eingeschlossen. Wenn diese Veränderungen an vielen Stellen der Leber vorkommen, so erhält dieselbe dadurch eine höckerige, unebene Form, und ihr Beschafftheitzug wird schwielig verdickt, wenn die Veränderung an ihrer Oberfläche vor sich geht. Die freien Stellen der Leber sind bei Kindern in der Regel normal, bei Erwachsenen können nebenbei Cirrhose, Krebs, Malignus-Fett-leber vorkommen.

Bei kleinen Kindern kommt es kaum jemals zu grösseren Formveränderungen der Leber, man findet gewöhnlich nichts als einige Stellen, welche sich beim Durchschnitt härter zeigen, eine blassere Farbe haben und aus den oben genannten mikroskopischen Elementen, Körnchen, Fetttropfchen und nur wenig Leberzellen, bestehen.

Symptome und Therapie.

Die speciell auf die Leber bezüglichen Symptome sind sehr geringfügig und kaum zu erkennen. Die gewöhnlich 2—3 Monate alten Kinder haben die Zeichen hereditärer Syphilis an sich, bestehend in condylomatösen Wucherungen am Anus und den Mundwinkeln, in Geschwüren um den Mund herum, in Ozaena und einem syphilitischen Exanthem. Die Ernährung ist eine sehr unvollkommene und die Fettpolster sind gänzlich geschwunden. Die Oberfläche der Leber findet man möglicher Weise höckerig, von ungleicher Härte, den scharfen Lebertrand an einzelnen Stellen etwas stumpfer.

Die kleineren Veränderungen der Leber sind natürlich gar nicht diagnosticirbar. Als Complication ist eine faserstoffige Degeneration der Nieren zu erwähnen, wodurch einige Tage vor dem Tode Anasarca sich einstellt. Das merkwürdigste bei dieser Leberkrankheit ist, dass niemals Icterus eintritt, sondern bloss bei herannahendem Ende eine graue, erdfahle Hautfarbe.

Eine specielle Behandlung dieses Zustandes ist nicht anzugeben. Die Kinder, die nicht an der Brust ihrer eigenen Mutter trinken können und also künstlich aufgefüttert werden müssen — weil sie ja gesunde

Annahmen ausbleiben würden — gehen fast ohne Ausnahme zu Grunde, gleichviel ob ihre Leber mit erkrankt ist oder nicht. Die Schminke bietet, wo der Zustand der Haut es erlaubt, noch die meiste Garantie für Genesung. Das Nähere findet sich bei der Therapie der Syphilis.

2) Die Fettleber. *Hepar adiposum.*

Wir verstehen unter Fettleber einen grösseren Fettgehalt in Leberzellen und zwar in so ausgedehntem Maasse, dass deutliche Farbenveränderungen des Parenchyms vorkommen. Es ist an dieser Farbenveränderung festzuhalten, weil im entgegengesetzten Falle das Auffinden einiger fetthaltiger Leberzellen schon zu dieser Diagnose genügt, und man dann bei einer jeden Section eine Fettleber finden würde. Die Fettleber ist im künstlichen Organismus eine ziemlich constante Begleiterin der Consumptionskrankheiten, namentlich der Lungen tuberculose und der länger bestehenden Darmcatarrhe.

Ihre Entstehung bei Tuberculose hat man schon mehrfach zu erklären versucht, und die meisten Autoren neigen sich der Ansicht zu, dass sie in diesem Falle bedingt werde durch die mangelhafte Resorption, in deren Folge die Oxydation der Kohlenhydrate und Fette nicht gehörig von Statten gehen könne. Frerichs hebt aber mit Recht hervor, dass mehrere beträchtliche Respirationstörungen, z. B. Lungenemphysem, keine Fettleber hervorrufen und dass andererseits die Fettleber auch bei anderen tuberculösen Processen, z. B. Knochentuberculose, wobei die Lungen vollkommen intact sein können, häufig gefunden wird.

Er glaubt deshalb hier die Ursache in der Blutveränderung suchen zu müssen, welche während des Abzehrungsprocesses sich entwickelt und darin besteht, dass das Blut mit dem Fett überladen wird, das bei fortschreitender Abmagerung zur Resorption kommt. Die Fettleber ist bei Lungentuberculose deshalb ausgesprochen, als bei andern Consumptionskrankheiten, weil bei unversehrten Lungen eine grössere Sauerstoffaufnahme und damit raschere Umsetzung des Fettäthers im Blute stattfindet.

Pathologische Anatomie.

Eine exquisite Fettleber ist nach der Fläche vergrössert, abgeplattet und hat keine scharfen, sondern mehr abgerundete Ränder. Ihre Oberfläche ist glatt, glänzend, durchsichtig und fühlt sich wie an, so dass ein Eindruck mit dem Finger eine bleibende Vertiefung hinterlässt. Die Farbe ist rötlich gelb oder blass gelb, und ein trockene, etwas erwärmte Messerklinge nimmt einen Fettbeschlag an, wenn sie durch fettig degeneriertes Leberparenchym gezogen wird. Die Menge des Fettes ergibt sich bei der chemischen Untersuchung als sehr beträchtlich. Frerichs fand in einem Falle 78% Fett in der wasserfreien Lebersubstanz; im frischen Zustand enthielt dieselbe Leber 45,84 Fett, 43,84 Wasser, 12,32 Gewebe, Zellen, Gefässe etc. Gleichzeitig vermindert sich der Wassergehalt des fettig degenerierten Parenchyms, der von 76% auf 50—43% sinken kann. Das Fett besteht aus Olein, Margarin und Spuren von Cholesterin.

In weniger exquisiten Fällen sind diese anatomischen Merkmale auch weniger deutlich. Da die Leberlappen immer in der Wei-

erkranken, dass zuerst die peripherisch gelegenen Zellen eines jeden Läppchens fettig degeneriren, während das Centrum des Lobulus, das Gebiet der Lebervenen, noch frei und von normaler Farbe bleibt, so entsteht ein reticulirtes Aussehen des Parenchymdurchschnittes, die sog. Muscatulusleber.

Es wechselt hier beträchtlichrothe und blasse gelbe Substanz in der Weise mit einander ab, dass die erstere kleine Inselchen bildet, welche von letzterer, als einem hellgelben Hofe umgeben werden. Die Form der braunen Inselchen hängt von der Richtung ab, in welcher die Läppchen durchschnitten worden sind; wo die Centralvenen quer durchschnitten werden, sind sie rund, wo der Schnitt den Centralvenen parallel fällt, stellen sie längliche, zuweilen blattähnliche Figuren dar.

Die Fettablagerung kommt nicht immer in allen Theilen der Leber gleichmässig vor, es entstehen dann grössere oder kleinere blassere Inseln, besonders an der Oberfläche der Leber, die in die normale Parenchymfarbe übergehen.

Der mikroskopische Befund ist sehr charakteristisch. Die Veränderung beschränkt sich bloss auf die Leberzellen und normal findet man freies Fett in den Interzellularräumen des Parenchyms. Die im Normalzustand nur wenig granulirten Leberzellen zeigen anfangs kleine Fetttropfchen in ihrem Innern, die bald an Zahl und Umfang zunehmen, coaguliren und dem ursprünglichen Zellkern unsichtbar machen. Zuletzt vereinigen sich alle Fetttropfchen einer Zelle zu einem einzigen. Die früheren Bestandtheile derselben sind ganz zur Seite gedrängt und werden erst wieder gehörig sichtbar, wenn man durch Zusatz von Terpentinöl das neu entstandene Fett entfernt hat. Die Form der fettig degenerirten Zellen wird meist eine rundliche, und ihre eckigen Contouren verlieren sich.

Was die übrigen physiologischen Verhältnisse der Fettleber betrifft, so sind dieselben auffallender Weise nur wenig alterirt. Der erst in neuerer Zeit entdeckte und gewöhnliche Zuckergehalt der Leber verändert sich hierbei nicht, und auch die von einer solchen Leber producirte Galle weicht weder qualitativ noch quantitativ von der Beschaffenheit der normalen ab.

Es ist sehr schwer, die Grenze zwischen der physiologischen und pathologischen Fettleber zu bestimmen, indem sie fast bei allen Säuglingen, an was immer für einer Krankheit sie zu Grunde gegangen sein mögen, gefunden wird. Auch junge, noch saugende Thiere zeigen dieselbe gewöhnlich.

Das Verschwinden der Fettleber bei zunehmendem Alter der Thiere ist ein sicherer Beweis, dass die fettinfiltrirten Zellen nicht zu Grunde gehen, sondern dass die Leber wieder vollkommen normal werden und dass also die Fettleber unter gewissen Verhältnissen auch heilbar sein kann. Unter den pathologischen Zuständen, zu denen sich Fettleber gesellt, ist der häufigste die Tuberculose, dann Rachitis, hereditäre Syphilis, endlich alle zur Atrophie führenden Krankheiten, als Enteritis folliculosa, Diphtheritis, acute Exantheme, Typhus.

Symptome und Behandlung.

Dass die Symptome dieses Zustandes sehr unbestimmt sind, erhellt schon aus dem bisher Gesagten zur Genüge. Der beste Anhalt-

punkt ist immer eine Vergrößerung der Dämpfung in der Lebergegend, obwohl das Fehlen dieses Symptomes durchaus keine exclusive Bedeutung hat; denn in vielen Fällen findet man vollkommenste Fettleber ohne irgend eine Volumszunahme. Allerdings aber vergrößert und verflacht sich die Fettleber häufig und hat eine Neigung, sich an der Bauchwand nach vorne zu senken, wo sie dann durch eine beträchtliche Dämpfung erkannt wird. Ausserdem findet man bei solchen Kindern die sog. Abdominalplethora, die sich durch stärkere Gasentwicklung, Flatulenz und Neigung zu Diarrhöe zu erkennen gibt. Am wahrscheinlichsten wird die Diagnose, wenn die oben bezeichneten Krankheiten, Tuberculose etc. bestanden haben oder noch bestehen.

Die Fettleber der Kinder wird kaum jemals der Gegenstand direkter Behandlung werden können. Wenn es möglich ist, die bedingenden Zustände zu heben, so wird sie von selbst vergehen, wenn nicht, so gibt es kein Mittel, direkt auf den Schwund des Leberlebens einzuwirken.

9) Angeborene Anomalien.

Die Bildungsfehler der Leber sind entweder ganz unbedeutend, die Form betreffende, oder gleich so enorm, dass sie Lebensunfähigkeit bedingen. Was die Abweichungen von der normalen Form betrifft, so haben wir eine viereckige, dreieckige, platte, breite oder runde Form, die Theilung in Lappen kann entweder ganz fehlen oder kaum merklich vorhanden sein. Betrefflich der grossen Anomalien ist vorerst das vollkommenste Fehlen der Leber bei Missgeburten, besonders Acephalen zu erwähnen. Bei doppelseitigen Missgeburten kommt auch Duplicität derselben vor. Achtliche Bildungsfehler wie an der Leber beobachtet man auch an der Gallenblase und dem Ductus cholecysticus, nämlich Duplicität, Fehlen und Anomalien der Form. Bei einer angeborenen Zwerchfellsapathie, die übrigens sehr selten auf der rechten Seite auftritt, kann die Leber in den rechten Pleurasack aufsteigen und bei angeborenem Nabelschnurbruch (vide pag. 58) durch die Bauchspalte bis zu Tage liegen.

Bei angeborener Transposition der Eingeweide liegt die Leber im linken Hypochondrium, und damit ist immer eine vollkommene oder theilweise Transposition der übrigen Bauch- und Brusteingeweide verbunden. Die Milz, in der Regel in kleinere Milzen zerfallen, liegt im rechten Hypochondrium, die Cardia auf der rechten, der Pylorus auf der linken Seite, das Herz im rechten Thorax.

Hyrtl hat diese Transposition der Leber und der übrigen Eingeweide erst vier Mal gesehen, mir ist sie noch niemals vorgekommen. Bei einigermaßen aufmerkamer Untersuchung kann die Diagnose unmöglich schwierig sein.

F. M I L Z.

Idiopathische, primäre Milzkrankungen kommen bei Kindern wohl niemals vor, bei einzelnen acuten Krankheiten aber ereignet sich eine secundäre Anschwellung dieses Organes, wie wir sie beim Typhus abdominalis schon ausführlicher beschrieben haben. Die Consistenz

einer vergrößerten Milz ist in der Kinderpraxis nicht so leicht wie bei Erwachsenen, weil sich die Kinder bis zum dritten Lebensjahr regelmässig gegen eine längere Untersuchung der Milzgegend sträuben. Man untersucht die Kinder in der Rücken- oder in der rechten Seitenlage. Eine normale Milz ist niemals durch Palpation zu entdecken, aber auch die bedeutend vergrößerten sind oft so beweglich oder, besonders bei Typhus, so weich, dass sie der Palpation häufig entgehen, nur der harte Milztumor bei hochgradiger Rheclitis und bei chronischer Intermittens ist leicht zu fühlen und bei abgemagerten und erschöpften Bauchdecken sogar zu sehen. Er begibt sich bei jeder Inspiration etwas nach ab-, und bei der Expiration wieder nach aufwärts.

Bei mässiger Vergrösserung behält die Milz ihre schräge Richtung von hinten und oben nach vorne und unten, bei chronischer bedeutender Schwellung aber lagert sie sich vertical, ihre Längsachse wird der des Körpers parallel, indem die das Lig. pleurocolicum, das die schiefe Richtung im Normalzustand bedingt, nach und nach sich ausheilt. Die Form der Milz ist, wo sie gefühlt werden kann, sehr charakteristisch, ein längliches Oval mit stumpfen Kanten und einer Einkerbung am inneren Rande ungefähr in der Mitte der Geschwulst.

Soll die Milz durch Percussion ermittelt werden, so ist eine sehr sanfte schwache Percussion, besonders bei tympanitisch aufgetriebenem Darms, dringend anzurathen, weil durch starkes Anklopfen der tympanitische Magen und Darm mitschallt; auch darf man nie vergessen, die Kranken immer in derselben Lage zu untersuchen, weil Verschiebenheit der Lagerung allein schon beträchtliche Veränderungen der Dämpfung verursacht. Im Allgemeinen sind bei Kindern unter einem Jahre alle jene Dämpfungen der Milzgegend als abnorme zu bezeichnen, die die Ausdehnung eines gewöhnlichen Pleasimeters überschreiten. Bei beträchtlichem Ascites und bei serösem Erguss im linken Pleurasack ist die Milzdämpfung nicht isolirt zu percutiren, bei bedeutendem Meteorismus verschwindet sie gänzlich, so dass auch bei Vergrösserung der Milz an der entsprechenden Stelle ein ganz sonder tympanitischer Percussionsschall gehört werden kann.

Ausser bei Typhus kommt Milztumor vorzugsweise bei Wechselstieber vor, und es lässt sich eine Beschreibung dieser Infectiouskrankheit hier ebenfalls anreihen, wie wir es im Kapitel von den Darmkrankheiten mit dem Abdominaltyphus und der Cholera unternommen haben.

Wechselstieber. Febris intermittens.

Bei kleinen Kindern kommt Wechselstieber ebenso häufig vor, als bei Erwachsenen. Es finden sich in der Literatur sogar Fälle beschrieben, wo Kinder, deren Mütter während der Schwangerschaft an Intermittens litten, mit Milztumor auf die Welt kamen und zu derselben Stunde, an der die Mutter ihren Fieberanfall bekam, ebenfalls davon befallen wurden. Mir ist dergleichen noch nicht begegnet; das jüngste Kind, das ich an Intermittens zu behandeln hatte, war acht Wochen alt. Die im folgenden zu beschreibenden Symptome beziehen sich nur auf Kinder unter zwei Jahren, bei älteren Kindern ist der ganze Verlauf so charakteristisch, dass jeder, der nur einmal bei einem

Erwachsenen einen Wechselieberanfall gesehen hat, ihn sogleich wieder-erkennt.

Die Aetiology der Kinderintermittens stimmt natürlich mit der allgemein bekannten überein. Die Intermittens ist an einzelne Gegenden gebunden und wird niemals bei einem Kinde beobachtet, das nicht in einer Fiebergegend lebt oder wenigstens einige Zeit in einer solchen sich aufgehalten hat. Die erschöpfendste Besprechung der Aetiology der Malaria-krankheit findet sich in Griesinger's Infectionskrankheiten (Virchow's Handbuch der spec. Pathologie), wo die Verhältnisse der Wassermenge des Bodens, der Temperatur, des Klima's etc. auf das ausführlichste erörtert werden.

Symptome.

Der quotidiana Typus ist bei Kindern der häufigste, doch kommt auch Tertiana und selbst Quartana vor. Die Stunde, in welcher der Anfall eintritt, ist nicht immer dieselbe, es bindet sich aber der Anfall an eine bestimmte Tageszeit, er tritt immer entweder in einer Morgenstunde oder Nachmittags oder Abends ein. Was den Anfall selbst betrifft, so ist er gewöhnlich nicht vollkommen ausgebildet, sondern zu dem einen oder anderen Stadium rudimentär. Es kommen wohl wirklich Prostrationsfälle vor, wobei die Kinder zittern, wimmern, collabiren, blaue Lippen und Nägel bekommen, worauf auch bedeutende Hitze, trockene heiße Haut, lebhafter Durst, Unruhe, und endlich ein allgemeiner Schwäche eintrifft, so dass der ganze Vorgang das Bild eines vollendeten Fieberparoxysmus bietet, in der Regel aber sind die Symptome nicht so prägnant und lassen oft nur durch ihr täglich zur selben Zeit wiederkehrendes Auftreten den Malaria-Process vermuthen. Die Schüttelfröste fehlen oft gänzlich und man bemerkt nur auffällige Blässe der Haut, bläuliche Nägel, Lippen und Augenumfänge, Kälte der Extremitäten, leises Wimmern oder lebhafte convulsische Zuckungen der Gesichtsmuskeln. Der Puls wird hierbei nicht besonders beschleunigt, aber sehr klein. Die Respirationsbewegungen behalten ihre normale Frequenz, der Athem wird nicht kühl, sowie auch die Temperatur der Mundhöhle überhaupt nicht sinkt. Während dieses das Froststadium darstellenden Symptomencomplexes lassen die Kinder fast niemals Urin, haben sie aber kurz vorher viel Milch genossen, so wird sie gewöhnlich wieder eintreten. Länger wie eine, höchstens 1½ Stunden dauert dieses Stadium niemals an. Die Kinder bieten während desselben ein höchst bedenkliches Aussehen, und man kann sich gewaltige Blässen bezüglich der Prognose geben, wenn man sogleich mit der ersten Besichtigung sein Urtheil fällen will. Mir selbst ist einmal am Anfange meiner medicinischen Laufbahn dieses prognostische Misgeschick begegnet.

Im zweiten Stadium werden die Kinder aufgeregter, das Gesicht röthet sich, der Puls wird hart und beschleunigter als im Frost, der Herzstoss wird stärker und ausgebreiteter. Die Kinder werden unruhig, schreien laut und viel und bekommen häufig Convulsionen, wobei die Pupillen sich auffallend erweitern. Urin und Stuhl sind abgehalten.

Dieser Zustand kann 2—4 Stunden dauern und wird von den Müttern viel leichter bemerkt und besser beschrieben als das Frost-

stadium. Oft ist er aber auch vorübergehend, dauert kaum $\frac{1}{4}$ Stunde und macht einem leichten Schweiße, dem dritten Stadium Platz.

Der Schweiß ist bei kleineren Kindern nicht bedeutend, die Haut fühlt sich wohl feucht an, selten aber steht der Schweiß in grösseren Tropfen auf ihr, was nur bei eintretendem Schlafe beobachtet wird. Die Hitze und Röthe des Gesichts nimmt hierbei ab, der Durst mindert sich, der Urin wird entleert und ist ziemlich dunkel pigmentirt, der Puls nimmt seine normale Beschaffenheit wieder an und die Kinder gehen überhaupt wieder die Zeichen allgemeinen Wohlbefindens zu erkennen. In der fieberfreien Zeit sind die Kinder aber selten vollkommen wohl, sie sind meist sehr ruhig, haben weniger Appetit und eine verlangsamte, unregelmässige Verdauung. Die Fieberanfälle sind häufig so wenig ausgesprochen, dass eine mehrtägige Beobachtung zur Constatirung der Diagnose nöthwendig ist.

Die Intermittenscachexie stellt sich bei kleinen Kindern sehr bald, schon nach 1–2 Wochen ein und ist durch folgende Symptome charakterisirt.

Sehr rasch entwickelt sich bei Kindern Anämie, die Hautfarbe wird ganz weiss oder schiebt selbst in das Graue über, die Lippen und Schleimhäute werden blass, die Abmagerung wird täglich bemerkbarer, an den unteren Augenlidern bilden sich kleine, oedematöse Anschwellungen aus, der Milztumor ist deutlich zu fühlen und bei zunehmender Abmagerung sogar zu sehen, auch die Leber schwillt an und verhärtet sich in ihrem Parenchym (Speckleber). Der Darm ist meteoristisch aufgetrieben, die Stühle sind meist diarrhoisch, in den letzten Tagen des Lebens zuweilen mit Blut vermischt. Die wichtige Entdeckung des körnigen, braunen oder schwarzen Pigmentes im Blute der Intermittenskranken ist eine Erwegenssache der pathologischen Mikroskopie, die wir Virchow und Meckel verdanken (Melanämie). Im Blute, das man durch einen Nadelstich aus einer comprimierten Fingerspitze entleeren kann, findet man bei Kindern dieses Pigment nur sehr selten, weil hierzu schon ein hoher Grad von Cachexie gehört, welchen die Kinder gewöhnlich nicht erleben. Auch ist die Erkennung der Intermittens jetzt so allgemein und die Therapie hingegen von so gutem, raschem Erfolge, dass, wo Aerzte consultirt werden, es selten mehr zur entwickelten Cachexie kommen wird.

Pathologische Anatomie.

Bei uns zu Lande stirbt nicht leicht ein Kind während des Anfalles, in Gegenden aber, wo bösartige, perniciöse Fieber herrschen, kann auch bei Kindern der Tod schon auf den ersten Anfall folgen. Der pathologisch anatomische Befund ist dann ein rein negativer und eine geringe Schwellung der Milz mit Blutüberfüllung des ganzen venösen Gefässsystems das einzige Abnorme. Bei Kinderleichen aber, die an Wechselstiebercachexie zu Grunde gegangen sind, kommen mannigfache Veränderungen vor.

Es findet sich Anasarca und Erguss in den serösen Säcken, Speckleber, grosse Speckmilz und braunes oder schwarzes Pigment am reichlichsten angehäuft in der Milz, ausserdem aber auch in der Leber, im Gehirn, auf der Darmschleimhaut, und in den Nieren, welche ausserdem häufig brightisch erkrankt sind. Der in der Blase sich findende

Urin ist in solchen Fällen immer eiweißhaltig und in seinem Bodensatz lassen sich Cylinder mikroskopisch nachweisen.

Behandlung.

Der Anfall selbst erfordert bei unseren mildereren Formen von Wechselstößen keine direkt eingreifende, sondern nur eine expectative Behandlung. Hohe Temperatur und leichte Hautrötze, wie Reibungen mit wollenen Lappen, mit Campherspiritus oder anderen Exsiccantien genügen für das Froststadium, kühle Bedeckungen, kalte Waschungen des Kopfes, Darreichung von vielem, kaltem Wasser und bei Convulsionen 1—2 Tropfen Opiumtinctur für das Hitzestadium. Der hierauf folgende Schwäche ist möglichst zu befördern. Während der Apnoe müssen die Kinder sehr diät und in gleicher Temperatur gehalten werden. Die Wiederkehr der Anfälle aber zu verhindern haben wir in schwefelsauren Chinin ein ganz exakt wirkendes Mittel. Bei Kindern unter einem Jahre genügt gewöhnlich schon 0,05 Chinin auf einmal gereicht zur vollkommenen Sistirung der Anfälle. Größeren Kindern gibt man 0,1—0,2. Da das schwefelsaure Chinin ziemlich voluminös ist, so ist es durchaus unpraktisch, eine solche Dosis noch durch Zuckerpulver zu vergrößern, zumal der Geschmack dadurch keineswegs verbessert wird. Bei kleinen Kindern gelingt es sehr leicht, diese Mittel beizubringen. Größere mehrjährige Kinder aber, die doch noch zu ungeschickt sind, das Pulver in Ollate eingehüllt zu verschlucken, bringen es in vielen Fällen mit dem besten Willen nicht hinüber und weigern sich entschieden gegen jeden ferneren Versuch. Für diese Fälle eignet sich die Application in Form eines Clysters vorzüglich.

Es besuchte einmal ein Bauer aus einem Dorfswen seinen fünfjährigen Jungen zu mir und gab an, dass er schon seit sechs Wochen täglich das Fieber habe, welches ihm der dortige Landarzt nicht vertreiben könne, da dem Kinde durchaus kein Chinin beizubringen sei. Der Knabe war ganz anämisch, hatte eine sehr grosse Milz, einen harten Lebertrand, deutlichen Ascites, Spuren von Kiweiss im Urin und leichte Oedem an den unteren Augenlidern. Ich verordnete ihm nun eine Chininlösung (0,6 auf 40,0) und liess diese vor meinen Augen als Clyster reichen, was sich das Kind ganz gerne gefallen liess. Der Mann nahm es wieder mit nach Hause in sein Moor und obwohl es also der Malariafist noch ferner ausgesetzt blieb, so trat kein Anfall mehr ein und das Kind erholte sich unter robocirender Behandlung mit Tinctura, pomat., Fleischkost und Beer vollständig.

Wenn eine Dosis Chinin nicht genügt, so wiederholt man dieselbe in der nächsten fieberfreien Zeit. Die Bestimmung der Stunde der Darreichung, auf welche von manchen Aerzten viel Gewicht gelegt wird, scheint weniger relevant zu sein. Die Hauptsache ist immer, dass das Chinin gut und vollständig resorbirt wird, und es ist deshalb rathsam, es nicht unmittelbar vor oder nach der Mahlzeit zu geben und jedenfalls nicht kurz vor Eintritt des Frostes, weil während desselben die Verdauung unterbrochen ist.

Mir hat das Chinin noch niemals bei unseren Wechselstößen den Dienst versagt und ich habe deshalb auch niemals Arsenik dagegen versucht, würde aber in einem solchen Falle keinen Augenblick zögern, letzteres Mittel in Anwendung zu bringen, da die Fowler'sche

Arseniklösung von Kindern vortrefflich vertragen wird. Ist schon Cachexie eingetreten, so ist eine Nachbehandlung notwendig. Die beste Nachbehandlung ist die Entfernung des Kindes aus der Fiebergegend nach einem höher gelegenen trockenen Wohnort. Wo dies nicht thöulich, muss man sich auf Eisen, Fleischkaut und bei älteren Kindern auf kleine Gaben Beer beschränken.

G. Barchfeld.

1) Peritonitis acuta und chronica.

Die Peritonitis mit serösfaserstoffigem Exsudat kommt bei Neugeborenen und selbst schon im Fötus nicht selten vor, bei älteren Kindern hingegen findet man ausser der traumatischen und tuberculösen Form dieselbe fast niemals, weil eben bei diesen die hauptsächlichsten Veranlassungen der Peritonitis Erwachsener, die Darmperforationen und die Erkrankungen der weiblichen Genitalien, so gut wie gar nicht vorkommen.

Aetiologie.

Sämmtliche drei Arten von Peritonitis, die man in der speziellen Pathologie anzunehmen pflegt, werden auch beim Neugeborenen beobachtet. Die idiopathische ist die seltenste Form und kommt fast nur im Fötus vor, die secundäre ist die häufigste, die metastatische tritt in Gebärlämmern auf, in denen das Puerperalieber herrscht. Die beiden letzteren Formen lassen sich nicht immer streng scheidern, in beiden geht eben der Process von den jaucheführenden Nabelgefässen aus; ob sich nun aber die Entzündung einfach auf das zunächstgelegene Bauchfell fortpflanzt oder ob dasselbe, wie andere seröse Häute, von dem pyämischen Processo ergriffen wird, ist oft nicht mehr zu unterscheiden. Diese Art von Peritonitis, abhängig vom jauchigen Nabel, kommt nur so lange vor, als der letztere bestehen kann, sechs, längstens acht Wochen nach der Geburt. Von dieser Zeit an findet sich bloss noch die traumatische, wozu auch die in Folge von Verbrennungen und Perforationen des Darmes oder Magens, dann in Folge von Einklemmung einer Hernie oder von Intussusception zu rechnen ist, und die tuberculöse Form.

Symptome.

Bei der Peritonitis der Neugeborenen ist ein Druck auf das Abdomen immer schmerzhaft, und zwar in einem so hohen Grade, dass die Kinder bei leisester Berührung laute aber abgebrochene Schreie ausstossen. Anhaltend zu schreien sind sie nicht im Stande, weil der hierzu notwendige Gebrauch der Bauchpresse neue Schmerzen verursacht. Sie sind am ruhigsten, wenn man sie ganz abdeckt, so dass der Unterleib von allen Seiten frei bleibt, die Beine sind gewöhnlich gestreckt und die Oberschenkel nicht so, wie dies regelmässig bei Colik der Fall ist, an den Leib gezogen, weil auch durch die Berührung der eigenen Oberschenkel der Schmerz vermehrt zu werden scheint. Wenn ältere Kinder an Peritonitis leiden, so halten sie constant die Rückenlage ein und sind nicht zu bewegen, sich auf die eine

oder andere Seite zu legen. In allen Fällen besteht ein peritonäaler Zustand der Bauchmuskulatur und in Folge dessen bedeutender Meteorismus. Fluctuation ist bei Neugeborenen wohl niemals zu fühlen, weil 1) das Exsudat ein plastisches, membranöses ist und 2) der meteoristisch aufgetriebene Darm gegen die Bauchdecken dermaßen angedrängt, dass allenfalls verflüssigtes flüssiges Exsudat nach hinten zu unten zu liegen käme.

Erbrechen wird bei Peritonitis der Kinder viel weniger regelmäßig beobachtet, als bei Erwachsenen. Auch ist häufiger Diarrhöe vorhanden als Verstopfung. Der Appetit ist natürlich ganz verschwinden, der Durst aber gross. Wenn die Peritonitis sich auf den Peritonäalsack der Blase erstreckt, so tritt Urinverhaltung ein oder es entleert sich unter deutlichen Schmerzäußerungen nur wenige Tropfen Urin zu einmal. Die Zeichen des Fiebers sind immer sehr deutlich ausgesprochen, die Haut ist trocken, heiss, der Puls frequent und klein, die Athemzüge sind häufig und oberflächlich. Die Respirationsbewegungen unterscheiden sich dadurch von jenen im physiologischen Zustand, dass das Zwerchfell sich gar nicht oder nur wenig bewegt, während die Brustmuskeln eine möglichst Erweiterung des Thorax zu erzielen trachten. Da jedoch durch diese Art der Respirationsbewegung nie die gehörige Ausdehnung der Lungen zu Stande kommt, so sind die Kinder genöthigt nach 10—15 solchen oberflächlichen Inspirationen immer eine tiefe Zwerchfellinspiration folgen zu lassen, die von einer schmerzhaften Verzerrung der Gesichtszüge und häufig von einem schmerzhaften Schrei begleitet ist. Die Gesichtsfarbe ist öfter blaß als geröthet; Convulsionen kommen hier seltener vor, als z. B. bei Pneumonie.

Die Peritonitis der Säuglinge führt in der Regel schon nach 1—3 Tagen zum Tode. Die tuberculöse Bauchfellentzündung über Kinder verläuft langsamer und kann sogar mehrere Monate dauern. Abweichend von der tuberculösen Peritonitis Erwachsener kommt es hier zuweilen zu einem Durchbruch des Eiters nach aussen und zwar durch den Nabel, wo sich zunächst eine schmerzhaft rothe Geschwulst bildet, die nach einigen Wochen aufricht und bis zum endlichen Tode des Kindes täglich grosse Mengen ansteigend riechenden Eiters entleert. Der letzhale Ausgang ist bei dieser Form fast unvermeidlich. Nur ein einziges Mal sah ich auch Durchbruch einer eitrigen Peritonitis nach aussen durch den Nabel Genesung eintreten. Doch war es nicht zu entscheiden, ob in diesem Falle nicht einfache idiopathische Peritonitis vorlag. Der Eiter entleerte sich bei diesem vierjährigen Kinde mehrere Wochen hindurch massenhaft. Erst nach mehreren Monaten schloß sich die Nabelfistel und seit dieser Zeit befindet sich das Kind als mehrere Jahre lang vollkommen wohl.

Pathologische Anatomie.

Das Bauchfell zeigt an verschiedenen Stellen, zamentlich an der Berührungsfäche zweier Darmschlingen, capilläre Injection und plastische Anschwellung, wodurch mannigfache Verwachsungen bedingt sind. Bei der Peritonitis der Neugeborenen, die fast regelmässig ihren Ursprung in Phlebitis umbilicalis hat, finden sich die Hauptveränderungen an Nabelfistel und der concaven Fläche der Leber, die durch plastisches Exsudat mit den benachbarten Organen, Magen, Dünn- und Dickdarm

verklebt ist. Im kleinen Becken zeigt sich gewöhnlich noch eine eitrige, jauchige oder blättrige Flüssigkeit in einer Menge von 30,0 bis 180,0. Bei den zwei von Billard beschriebenen Fällen von fötaler Peritonitis waren in den Leichen der todtgeborenen Kinder zahlreiche straffe Bänder und ältere Verwachsungen zugegen. — Als Complication findet man häufig lobuläre Pneumonie.

Die Behandlung der Peritonitis ist, wie aus dem bisher Gesagten schon hervorgeht, eine höchst missliche. Die der Neugeborenen in Folge von Phlebitis umbilicalis scheint fast immer tödtlich zu sein, und es ist daher nur eine symptomatische Behandlung, Herstellung der Ruhe, Reinigung des Nabels und möglicste Ernährung angezeigt. Bei der tuberculösen Peritonitis ist in der Regel schon Fieber hectica zugegen, und es kann auch hier von einer wirklichen Bekämpfung desselben keine Rede sein, sondern man muss sich begnügen, durch kleine Gaben Chinin und Morphium die Fiebersymptome möglichst zu beseitigen. Gegen die peritonitischen Schmerzen gebrauche ich feuchte, warme Compressen, die mit Guttapercha und dann mit einem trockenen Tuche bedeckt werden. Sie sind viel reichlicher und bequemer zu appliciren, als die Cataplasmen, die namentlich des Nachts häufig kalt und hart werden, und stehen in ihrer schmerzstillenden Wirkung keiner Art von Cataplasmen nach. Die traumatische Peritonitis endlich verträgt allerdings eine antiphlogistische Behandlung, bestehend in 3—12 Blutegeln, und im Falle keine Diarrhöe zugegen ist, in Darreichung von Calomel 0,03—0,06 täglich mehrere Dosen bis grüne Diarrhöe eintritt. Auch hier schaffen feuchte, warme, mit Guttapercha bedeckte Compressen, Tag und Nacht über den Leib gelegt, die grösste Erleichterung. Bei Fortdauer der Schmerzen ist das Opium, wie fast überall so auch hier, vollkommen an seinem Platze.

2) Ascites. Hydropischer Erguss in den Peritonealsack.

Der Ascites ist niemals eine primäre für sich allein bestehende Erkrankung, sondern immer nur ein Symptom irgend einer andern, constitutionellen oder Circulationsstörung. Bei kleinen Kindern ist er nicht bedeutend, einige Esslöffel Serum finden sich aber häufig im Peritoneum bei Section derselben. So haben die Kinder, die an hereditärer Syphilis, an Tuberculosis, an Marasmus in Folge von Enteritis, an angeborenem Herzfehlern oder an Zellgewebsverhärtung zu Grunde gehen, gewöhnlich einen kleinen serösen Erguss im Abdomen. Beträchtlicher, leicht nachweisbarer Erguss kommt nur bei Kindern, die über ein Jahr alt sind, vor und zwar in Folge von Scharlach, von Intermitiens und, was noch weniger genau beachtet worden ist, von Abdominaltyphus.

Pathologische Anatomie.

Bei grösseren Kindern kann die Quantität der Ascitesflüssigkeit bis zu mehreren Pfunden steigen. Die Farbe des Serums ist eine weingelbe, zuweilen ist auch etwas Blutfarbstoff beigemischt; die so entstehende röthliche Färbung kann aber auch dadurch sich gebildet haben, dass bei Oeffnung des Abdomens eine oder die andere Hautvene angeschnitten worden ist, die dann ihren Inhalt in den Bauchhohlsack

ergiebt. Die chemische Untersuchung ergibt einige Procente Eiweiß und die Salze, wie sie im Blutserrum enthalten sind. Das Peritonäum ist entweder ganz normal oder zeigt an einzelnen Stellen weisse Trübungen, was hauptsächlich bei lange bestehendem Ascites beobachtet wird. Zuweilen sind einzelne Darmschlingen oder die Leber mit einer leichten Exsudatschicht beschlagen, so dass wir es hier mit einem Uebergang zur wirklichen Peritonitis zu thun haben. Bei keiner Section darf man sich mit dem einfachen Ausfließen des Ascites begnügen, sondern man muss immer nach der Ursache desselben, nach einer der Eingangs erwähnten Krankheiten suchen, wobei besonders das Herz und die Nieren einer sorgfältigen Untersuchung zu unterwerfen sind.

Symptome.

Die Gegenwart des Ascites kann nur durch deutliche Fluctuation bewiesen werden. Kleine Ergüsse sind in der Rückenlage ziemlich zu erkennen, zuweilen können sie noch entdekt werden, wenn man die Kinder auf die rechte Seite lagert und das Becken etwas erhebt, wobei sich dann alles Serum im rechten Hypochondrium sammelt. Die kleinsten Quantitäten können dadurch noch nachgewiesen werden, dass man die Kinder auf den Bauch legen und sie dann so aufheben lässt, dass der Nabel die tiefste Stelle des ganzen Abdomens einnimmt. Es muss sich nun nach dem Gesetz der Schwere alles Serum zum Nabel herum sammeln und kann durch Percussion von unten nach oben leicht gefunden werden. Die Fluctuation wird auf diese Weise untersucht, dass man mit den Fingern der einen Hand flach gegen die Bauchwand drückt, während man mit den Fingerspitzen der anderen Hand auf der entgegengesetzten Seite oder wenigstens einige Zoll von der ange-drückten Hand entfernt rasch und elastisch an die Bauchwand anschlägt. Die hierdurch entstehende Welle wird, im Falle zwischen beiden Händen Serum sich befand, von der zupfählenden Hand als leichte Berührung empfunden. Ausser durch diesen freien Ascites entsteht noch Fluctuation durch diarrhöischen Darminhalt durch eine gefüllte, über die Symphyse emporgestiegene Harnblase und durch Oedem der Bauchdecken selbst, das namentlich bei Nephritis nach Scharlach sehr bedeutend zu sein pflegt. Letzteres unterscheidet sich aber leicht von wahren Ascites durch den Eindruck, den der untersuchende Finger hinterlässt und durch die Oberflächlichkeit der Schwellung. Die gefüllte Blase ist leicht zu entleeren und der Darmentstarr durch schleimige Kost und kleine Dosen Opium zu stillen, worauf sich dann der wahre Sachverhalt deutlich ergeben muss.

Bei geringeren Graden von Ascites ist äusserlich nichts zu entdecken und der Umfang des Abdomens hat nicht beträchtlich zugenommen, bei höheren Graden fällt aber schon bei der einfachen Beobachtung die Grösse des Leibes auf, die Haut ist glänzend und gespannt, die Percussion ist an dem unteren Parthieen des Abdomens in grosser Ausdehnung, gedämpft, der Nabelring ist ausgedehnt und der Nabel prominirt. Der Druck des Serums auf die Harnblase bedingt häufigen Harndrang, wobei nur kleine Quantitäten Urin auf einmal entleert werden.

Die allgemeinen Erscheinungen, Appetitmangel, Fieber, Respira-

tionsstörungen etc., richten sich nach den den Ascites veranlassenden Zuständen. In der Regel transpiriren die Kinder nur sehr wenig und lassen wenig Urin. Derselbe ist meist stark pigmentirt und enthält bei Nephritis Eiweiss und Fibrincylinder. Der Stuhl ist häufig diarrhoisch.

Die Prognose richtet sich nicht nach der Grösse des Ascites, sondern nach den ätiologischen Momenten. Fast bei allen Arten ist die Prognose ungünstig zu stellen, nur der Ascites nach Scharlach und Typhus und der in Folge von Milatumor und Febr. intermittens lassen bei gezügelter Behandlung einen günstigen Ausgang erwarten.

Behandlung.

Dieselbe ist je nach dem Ursachen natürlich eine verschiedene. Die Zustände, welche den Ascites bedingen, sind so trostloser Natur, dass ausser einem roborirenden Regime kaum eine spezielle Behandlung indicirt sein wird. Gegen die Nephritis nach Scharlach ist der Roob. Juniperi, den die Kinder unvermischt und unverdünnt gewöhnlich gerne nehmen, ein ausgezeichnetes diuretisches Mittel, von dem ich einen halben bis ganzen Kaffelöffel täglich nehmen lasse. Dasselbe gilt auch für den Ascites nach Intermitteus und Typhus, nur ist hierbei noch eine roborirende Behandlung mit Fleischkost, Bier, Wein und kleinen Dosen Eisentinctur zu befolgen; in allen Fällen geht die Abnahme des Ascites langsamer vorwärts, als in den nach Scharlach entstandenen.

3) Krankhafte Veränderungen der Mesenterialdrüsen.

Die Drüsen des Mesenteriums vergrössern und verhärten sich in allen Fällen von Enteritis folliculosa, und ihre Unwegsamkeit bewirkt höchst wahrscheinlich die hierauf so regelmässig folgende Atrophie, wovon das Ausführlichere schon bei jener Krankheit erwähnt wurde (pag. 144). Ausserdem kommen bei älteren Kindern käsige Tuberkel in denselben vor, und bei Kindern, die an Typhus zu Grunde gegangen sind, finden sich zuweilen Hypertrophieen oder kleine Abscesse in einzelnen Drüsen.

Symptome scheinen die Krankheiten der Mesenterialdrüsen nicht zu machen, nur die Ernährung leidet sehr rasch, wenn sie in grösserer Zahl hypertrophiren. Sie sind übrigens viel zu klein, und der Darm ist immer zu meteoristisch, als dass sie jemals gefühlt werden könnten, ein Irrthum, in welchem viele unserer älteren Aerzte befangen sind.

3. Capitel.

Krankheiten der Respirationsorgane.

1. Nasenhöhlen.

Nachdem die Krankheiten der Mundhöhle schon bei denen des Digestionsapparates besprochen worden sind, erübrigt nur mehr die Betrachtung der Nasenhöhle. Die Untersuchungsmethode ist einfach und bietet wenig Schwierigkeiten, indem sie sich lediglich auf Inspectio und Betastung mittels Sonden oder Catheter beschränkt. Wintrich hat gefunden, dass man durch Percussion des Larynx die Durchgängigkeit der Nasenhöhlen constatiren kann. Wenn man nämlich bei geschlossenem Munde den Larynx percutirt, so wird der dadurch entstehende tympanitische Percussionsschall sogleich tiefer, wenn man ein Nasenloch schliesst und noch deutlicher tief, wenn beide Nasenlöcher zugehalten werden. Acodest sich nun beim Verschliessen und Wiederöffnen von einem oder beiden Nasenhöhlern der tympanitische Schall in seiner Höhe nicht, so ist dies ein Beweis, dass die betreffende Nasenhöhle weiter oben verstopft ist. Zu dieser Untersuchung geben schon grössere Kinder, die auf Geheiss den Mund schliessen, sich gewillig die Nasenlöcher zuzuhalten und den Larynx percutiren lassen. Kinder aber, die zu dieser Einsicht gelangt sind, schnauben auch auf Geheiss aus und ein, und es kann auf diese Weise die Durchgängigkeit der Nasenhöhlen viel bequemer untersucht werden, als durch die Percussion des Larynx.

1) Epistaxis, Nasenbluten.

Die Epistaxis beruht, wie überhaupt alle Blutungen, auf einer Zerreissung von Gefässen, in diesem Falle der Capillaren der Nasenschleimhaut.

Ätiologie.

Die Ursachen theilen sich in locale und allgemeine. Die locale sind die Traumen aller Art, Schlag, Stoss, Quetschung, Zerrung u. dgl. Doch ist auch hier die individuelle Disposition nicht ausser Acht zu lassen, indem die verschiedenen Traumen je nach der bestehenden Neigung zum Nasenbluten überhaupt, auch verschiedene Wirkungen äussern. Eine locale Bedingung findet sich auch in den verschiedenen Geschwürsformen der Schleimhaut. Zu den allgemeinen Ursachen gehören alle Zustände, die mit Störungen des vorderen Kreislaufes verbunden sind, als Herzfehler, Emphyseme, Kröpfe, die sogenannte allgemeine Plethora, Pneumonie und Typhus; ferner die Krankheiten, bei welchen wirkliche Störungen im Capillargefässsystem vor sich gehen, Scorbut und Morbus maculosus, und ausserdem eine Blutkrankheit, die Chlorose. Endlich kommen noch vicarirende Nasenblutungen vor bei Mädchen zur Zeit, wo die Menstruation sich einstellen soll.

Symptome.

Das Blut kommt entweder tropfenweise als Stillecidium sanguinis zum Vorschein, gewöhnliche Form, oder es strömt in einem zusammenhängenden Strahle, Rhinorrhagia, hervor, was als seltener Ausnahmefall zu betrachten ist. Bezüglich der Menge des verlorenen Blutes wird man von den Angehörigen oft unwillkürlich getäuscht, indem sie vergessen, dass die Kinder in eine mit Wasser gefüllte Schüssel gebadet haben und nun, wenn sie das dunkelroth gefärbte Wasser erblicken, das ganze für reines Blut halten. Ich fing einmal bei einem neunjährigen Knaben, von dem mir berichtet wurde, dass er täglich „enorme Mengen“ Blut verliere, binnen 35 Minuten, nach welcher Zeit die Blutung spontan aufhörte, nicht ganz 30 Grm. Blut auf, eine Quantität, die gewiss keine Besorgnisse erregen darf.

Kleine Kinder unter 3—4 Jahren haben fast niemals Nasenbluten aus allgemeinen Ursachen, sondern nur in Folge von Traumen oder Geschwüren, wobei die Blutungen niemals bedeutend sind. Bei älteren Kindern sind alle die oben genannten Causalmomente in Betracht zu ziehen. Bei fieberkranken Kindern kommt es vor, dass Blut in den Pharynx hinunterfließt und verschluckt wird, worauf dann Bluthrechen oder schwarze zum Theil noch blutige Stühle eintreten. Die Blutungen dauern gewöhnlich keine ganze Stunde, können aber in Ausnahmefällen auch halbe Tage währen.

Ihre pathologische Bedeutung ist natürlich je nach der Stärke und der Ätiologie sehr verschieden. Als günstige Erscheinung sind sie zu betrachten bei allen fieberhaften Krankheiten, bei venöser Congestion und bei zu erwartender Menstruation, als ungünstig und den Zustand verschlimmernd müssen sie bei Chlorose und Scurbut angesehen werden.

Behandlung.

Aus den oben erörterten Erfahrungen geht hervor, dass die Behandlung eine mannigfach verschiedene ist. Rasch zu stillen ist die Blutung nur bei Chlorose und Scurbut, bei den übrigen Veranlassungen richtet sich das Verfahren nach der Stärke derselben, nach der häufigen Wiederholung und nach dem mehr oder weniger anämischen Aussehen des Kindes. Die beste Methode der Stillung ist, einige Stückchen Eis von der Grösse einer Erbse in das Nasenloch zu bringen und dann mit einem tüchtigen Charpietampon dasselbe zu verstopfen. Die Tamponade durch die Mundhöhle mittels der Bellac'schen Röhre befestigt die Kinder sehr und darf nur in den äussersten Fällen von Chlorose oder Scurbut in Anwendung kommen. Wo kein Eis zu haben, befeuchtet man den Tampon sehr zweckmässig mit Liqueur ferri sesquichlorati. Ein bekanntes altes Mittel ist auch das Festzuschnüren der oberen oder unteren Extremität und das Emporhalten der Arme.

Dass die Grundursache immer einer speziellen, therapeutischen Berücksichtigung bedarf, versteht sich von selbst. Um Wiederholungen zu vermeiden, muss bezüglich deren Behandlung auf die betreffenden Abschnitte verwiesen werden.

2) Coryza, Rhinitis, Schnupfen.

Unter Coryza versteht man einen Catarrh der Nasenschleimhaut einer oder beider Nasenhöhlen, wobei die Schleimhaut immer geröthet und geschwollen erscheint.

Symptome.

Das gelieferte Secret ist anfangs klar und flüssig, wird aber nach einigen Tagen glasig und trübe, bis es endlich wieder die Eigenschaften des normalen Nasenschleimes annimmt. Die Reaction ist immer erschlossen alkalisch und der Natrongehalt kann so zunehmen, dass eine leicht ätzende Wirkung auf die Oberlippe und die Nasenflügel eintritt. Diese Theile erscheinen geröthet und rothirt, und die Entzündung wird durch das fortwährende Abwischen, das die Kindsmägde sich gerade immer auf schonende Weise ausführen, beträchtlich gesteigert. So lange der Catarrh auf die Nasenschleimhaut beschränkt bleibt, ist er gewöhnlich fieberlos, wenn er aber, was nur bei älteren Kindern durch Ausfragen zu eruiiren ist, übergeht auf die Stirnhöhlen oder die Oberkieferhöhlen, so wird er fieberhaft und verursacht heftige Schmerzen in diesen Höhlen. Pflanzet sich die catarrhalische Entzündung der Schneider'schen Membran durch die Thränenkanäle auf die Conjunctiva fort, so tritt Röthung, Schmerz, Thränen, Lichtscheu, kurz Conjunctivitis catarrhalis ein, und setzt sie sich endlich durch die Tuba Eustachii bis in die Paukenhöhle fort, so entsteht Otitis media, Ohrschmerz und Schwerhörigkeit. Wieder in anderen Fällen wandert die catarrhalische Entzündung nach abwärts in den Larynx, macht Heiserkeit mit Schmerz, und von da in die Bronchien, wo sie in den Alveolen mit Bronchitis capillaris einigt, oder endlich es participirt der Magen mit Darmkanal, wobei Appetitmangel und Erbrechen von grösseren Mengen Schleim oder schleimige Diarrhöen sich einstellt.

Bei älteren Kindern sind diese Zustände, wenn auch alle genannten Complicationen dazu treten, immer gefahrlos, bei Neugeborenen und Säuglingen aber entsteht durch die Schleimhautschwellung und die Anhäufung des Secretes rasch eine complete Verstopfung der noch engen kleinen Nasenhöhlen. Der für gewöhnlich geschlossene Mund muss nun immer geöffnet bleiben, die Mundhöhle wird trocken und die Respiration laut und schnarchend. Versuchen nun aber diese Kinder in der Brust zu saugen oder sollen sie gefüttert werden, so geht ihnen gleich der Athem aus, sie müssen die Brust wieder fahren lassen, die Ernährung leidet dabei rasch und es tritt Abmagerung ein.

Ausserdem kommt bei kleinen Kindern, die an Scor der Nasenhöhle leiden, auch Verstopfung der Ohren mit Scorpilzen vor, wobei ebenfalls grosse Athemnoth sich einstellt.

Neben dieser einfachen catarrhalischen Coryza manifestiren sich noch verschiedene Dyskrasieen in den Nasenhöhlen. So gibt es die chronische, scrophulöse, eine syphilitische und in ganz seltenen Fällen auch eine durch Retrocontagium erzeugte Coryza, wobei der Ausfluss ganz anderer Beschaffenheit ist und einzelne Knochen nekrotisch zu Grunde gehen (Ozema). Das Nähere hierüber bei den betreffenden Dyskrasieen.

Aetiologie.

Der einfache Nasencatarrh kommt epidemisch und sporadisch vor; das epidemische Auftreten ist durch grösseren Ozongehalt der Luft, oder durch mechanische und chemische Verunreinigung derselben, z. B. durch Staub, Einathmen in einem längere Zeit nicht benutzten Ofen etc. bedingt. Auch ist die Ansteckungsfähigkeit durch Aanhängen nicht zu verkennen. Die sporadischen und ganz chronischen Fälle sind in der Regel dyskrasischer Natur.

Behandlung.

Bei der gewöhnlichen catarrhalischen Form gibt es keine strengen Indicationen. Jedenfalls gebietet die Vorsicht, die Kinder in gleicher Temperatur zu halten und starke Abkühlungen der Haut, das kalte Waschen und Baden auszusetzen. Die in neuerer Zeit vielfach versuchte Abortivbehandlung mit Einspritzungen von Zink-, Alaun-, Tannin- und Morphinlösung ist bei Kindern, die noch zu ungeschickt sind, die in die Nasenhöhle injicirte Flüssigkeit durch Ausathmen wieder zu entfernen und also grössere Quantitäten derselben verschlucken, durchaus unzulässig. Die geschwellenen und durch Secret verstopften Nasenhöhlen der Säuglinge müssen 3–4 Mal täglich mit einem in Olivenöl getauchten Pinsel, den man wenigstens einen Zoll tief einbringen muss, wieder wegsam gemacht werden, was um so sicherer gelingt, wenn die Kinder auf diesen Reiz einige Male niesen und dadurch die verhärteten Schleimkrusten herausbefördern. Die dyskrasischen Coryzen weichen einer örtlichen Therapie natürlich nicht, sondern müssen intern antidyskrasisch behandelt werden. Gegen die serofulöse Form ist das wirksamste Mittel der Leberthran, gegen die sypilitische das Quecksilber.

3) Neubildungen in der Nase.

Die Polypen sind die einzige Neubildung, die bei grösseren Kindern zuweilen, jedoch immer noch viel seltener als bei Erwachsenen vorkommt. Das jüngste Kind, dem ich einen fibrösen Polypen abdrehte, war vier Jahre alt. Unter Polypen versteht man zweierlei, von einander ziemlich verschiedene Geschwülste. Die weichen Polypen sind blasse gallertige Excrescenzen auf der Schleimhaut, die gewöhnlich von der inneren Wandung der Nasenhöhle ausgehen und wegen ihrer geringen Consistenz Blasen oder Schleimpolypen genannt worden. Die harten Polypen gehen nicht von der Schleimhaut, sondern vom submucösen Gewebe oder dem Perichondrium aus, sie bestehen aus Bindegewebe und haben eine roseirothe Farbe, wegen ihrer Härte hat man sie fibröse oder Fleischpolypen genannt. Beide Arten sind gestielt und vergrössern sich nach der Form der Nasenhöhle zu lingulichen Geschwülsten; die Faserpolypen können eine so beträchtliche Grösse, besonders nach rückwärts erreichen, dass sie in den Pharynx hineinhangen, die Deglutition und selbst die Respiration erschweren.

Die Aetiologie der Lebertheer, nach welchen die Polypen durch chronische Catarrhe bedingt sein sollen, steht auf schwachen Füssen und erfährt sehr viele Ausnahmen. Auch das seltene Vorkommen derselben bei Kindern spricht dagegen; denn gerade bei diesen ist die Schleimsecretion schon im physiologischen Zustande viel beträchtlicher

als bei Erwachsenen. Bei den wenigen Fällen, die ich bei Kindern zu beobachten Gelegenheit hatte, war kein chronischer Catarrh vorausgegangen und überhaupt kein eigenthümliches ätiologisches Moment zu entdecken.

Symptome.

So lange die Polypen noch klein sind und die Nasenhöhle nicht verstopfen, scheinen sie nur wenig oder gar keine Beschwerden zu machen. Wenn aber Unwegsamkeit der Höhle eingetreten ist, so verlieren die Kranken den Geruch, bekommen eine nieselnde Stimme, halten den Mund stets offen, was ihnen ein blödes Aussehen gibt und suchen vergebens durch Schnäuzen die Passage wieder frei zu machen. Durch heftiges Schnäuzen und Pressen platzt wohl hin und da ein Blasentyp, sein Inhalt entleert sich und die Luft kann wieder durch dieses Nasenloch eindringen. Da aber diese Blasentypen gewöhnlich mehrfach sind, so wachsen die kleineren rasch wieder nach, verstopfen die Höhle von neuem und der alte Zustand kehrt wieder. Feste Fleischpolypen sind auch im Stande, den Thränenkanal und die Tuba Eustachii zu verlagern und so Thränenrötheln und Schwerhörigkeit zu bedingen, bei Blasentypen wird diese nicht beobachtet. Bei beiden Formen entsteht eine schleimige oder eiterige Coryza und sogar Geschwürsbildung auf der Schleimhaut, in deren Folge häufig auch kleine Blutungen eintreten. Die Diagnose ist sehr leicht, gewöhnlich reichen 3 Polypen bis zum Nasenloch oder ragen selbst aus demselben heraus. Ist diese nicht der Fall, so kann man die Undurchgängigkeit der fraglichen Höhle durch Zuhalten des entgegengesetzten Nasenloches mit Schnäuzenlassen leicht entdecken. Von der Gegenwart fremder Körper unterscheiden sich die Polypen durch ihre langsame Entstehung, ihr geringe Schmerzhaftigkeit und ihren chronischen Verlauf. Die Blasentypen recidiviren sehr häufig, die Fleischpolypen bei gründlicher Abtreibung nicht leicht.

Behandlung.

Innere Mittel, sowie die örtliche Anwendung der Adstringentien erweisen sich als vollkommen fruchtlos, die einzige wirksame Behandlung besteht in Abtreiben und Ausreissen der Polypen, wobei hauptsächlich Sorge zu tragen hat, dass der Polyp nahe an seinem Ursprunge an der Schleimhaut gefasst wird. Bei Kindern bedient man sich hierzu am besten schlanker Korsetzungen.

Zur Entfernung fleischer Polypen mit breiterem Stiele eignet sich Middeldorpf's Galvanocaustik vortreflich. Die durch das Ausreissen erzeugte Blutung steht auf Injectionen von kaltem Wasser und Einbringung von Eisstückchen. Nach Entfernung der Blasentypen ist es zur Verhütung von Recidiven indicirt, mehrere Wochen hindurch Charpiébouffons, bestrichen mit rother Präcipitatölle, in die Nasenhöhle einzuführen. Von grossem Werthe ist in diesem Falle auch die tägliche Gebrauch der Weber'schen Nasendusche, durch welchen rasch der Apparat gleichzeitig beide Nasenlöcher ausgespült werden. Kinder unter fünf Jahren überwinden den Anfangs dadurch entstehenden Ekel nur schwer. Bei älteren Kindern konnte ich schon mehrmals nach Jahre langen Gebrauche dieser Dusche die Wiederkehr der Polypen vollständig und bleibend verhüten.

4) Fremde Körper in der Nase.

Kinder von 2—8 Jahren bringen ziemlich häufig bei ihren Spielen fremde Körper in die Nase. Die gewöhnlichsten sind: Kirschkerne, runde Steinchen oder Glasperlen, Erbsen, Bohren und Papierkugeln. Ausserdem gelangen aber auch Insekten, z. B. Fliegen und Wanzen, im Schlafe in die Nase, oder es verirrt sich wohl auch ein Spalwurm, wahrscheinlich während des Brochaktus in dieselbe. Sobald ein runder Körper in das Nasenloch gebracht ist, so bemühen sich die Kinder, ihn mit dem bohrenden Finger zu entfernen und schieben ihn nun bis in die Choanen, wo er liegen bleibt. Die Reaction, die die fremden Körper verursachen, ist sehr verschieden nach ihrer Beschaffenheit. Ist die Oberfläche an einzelnen Stellen rauh, so entsteht alsbald schmerzhaftes Anschwellen und Coryza, am stärksten ist die Reaction bei trocknen Erbsen und Bohren, welche in der feuchten, warmen Nasenhöhle alsbald aufquellen und sogar keimen können. Berühmt ist der von Beyer erzählte Fall, in welchem eine Erbse in der Nase eines Kindes keimte und 10—12 Wurzeln trieb, wovon eine $3\frac{1}{4}$ Zoll lang wurde.

Die Nase wird hierbei sehr schmerzhaft, und es ist ohne Chloroformanæsthesie keine gründliche Untersuchung möglich. Von dem sog. Rhinolithen, successiven Anlagerungen anorganischer Salze um den fremden Körper, die bei Erwachsenen zuweilen gefunden werden, ist meines Wissens in der Pädatrik nichts bekannt. Am günstigsten ist der Verlauf bei Papierkugeln, die bald erweichen und in Stücken wieder zum Vorschein kommen. Es sollen übrigens auch schon Fälle vorgekommen sein, wo fremde Körper heftige Reaction, Delirien, Meningitis und den Tod veranlasst haben.

Behandlung.

Ein schmerzloses und doch in vielen Fällen wirksames Mittel ist die Erregung von Nasenbewegungen, wozu bei Kindern eine Prise Schnupftabak, in das gesunde Nasenloch gebracht, vollkommen ausreicht. Wird der Körper hiedurch auch nicht ganz ausgestossen, so bewegt er sich doch immer nach vorwärts und wird gelockert. Ist er einmal sichtbar geworden, so kann er leicht mit einer feinen gezähnten Pincette oder mit dem Daviel'schen Löffel entfernt werden. Weichere Körper kann man auch mit einer stärkeren Kornzange zerdrücken, worauf dann die einzelnen Stücke rasch abgehen. Die Extractionsversuche dürfen nie lange fortgesetzt werden, weil dadurch eine zu bedeutende Schwellung der Schleimhaut entsteht. Sie sind dann erst nach einigen Tagen wieder aufzunehmen. Keinesfalls darf man voreilig sein mit der Spaltung der Nase, wie Dieffenbach empfiehlt, sondern muss diese Operation versparen, bis bedenkliche Gehirnsymptome, die übrigens nur sehr selten sich einstellen, dazu drängen.

B. Larynx und Trachea.

1) Der Krup. Laryngitis und Tracheitis maligna.

Nicht leicht findet man für ein- und dieselbe Krankheit so mannigfache Bezeichnungen als für den Krup. Die gangbarsten sind: Cy-

naso trachealis; *Angina laryngea exudatoria*, sive *polyposa*, sive *membranacea*, sive *strepitosa*; *perforata*; *inertalis*; *Laryngotracheitis exudativa*, *Pharyngolaryngitis pseudomembranacea*; *Morbus strangulatorius*; *Suffocatio stridula*; häufige Bezeichnungen. Der kürzeste Name hat die Oberhand unter allen diesen Benennungen behalten und bezeichnet eigentlich in der Schottischen Volkssprache jenes weisse Häutchen (Croup), das bei dem sog. Pips die Zunge der kranken Hühner überzieht.

Der Krup scheint im Alterthume wenig vorgekommen zu sein; denn in den Schriften der alten Aerzte, denen man scharfsichtige Beobachtungsgabe keineswegs absprechen kann, findet sich keine einzige charakteristische Beschreibung. Nach Friedrich ist Baillat der erste, der einer im Jahre 1576 vorgenommenen Krupsection gedenkt. Einem grossen Zuwachs erhielt die Krupliteratur durch den von Napoleon I. ausgeschriebenen Concurs, veranlaßt durch den raschen Tod in Folge von Krup, dem dessen Neffe, der Sohn des damaligen Königs von Holland, im Jahre 1807 erlegen ist. Dreinsächzig Arbeiten wurden eingereicht, Preise erhielten Jurine aus Genf und Albers aus Bremen, mehrere andere wurden rühmend erwähnt, keiner aber wußte eine Therapie, durch welche die Sterblichkeit nur einigermaßen gemindert worden wäre. Da es Napoleon I. vorzugsweise um die Letztere und nicht um eine Bereicherung der Symptomatologie oder der pathologischen Anatomie zu thun war, so muß nothwendig Weise die ganze Concursausstellung als eine resultatorische betrachtet werden.

Pathologische Anatomie.

Der Krup ist ein gewisser Complex von Symptomen, die in verschiedenen Individuen immer in derselben Weise wiederkehren. Damit ist aber noch nicht gesagt, dass diesen Symptomen, die sich kurz als Laryngostenose zusammenfassen lassen, auch immer dieselben pathologisch anatomischen Veränderungen zu Grunde liegen, für die Krup hat sich vielmehr zur Evidenz erwiesen, dass dreierlei verschiedene Processes auf der Larynxschleimhaut ihn bedingen können. Das von der entzündeten Schleimhaut gesetzte Exsudat kann entweder a) schleimig eiterig oder b) einfach fibrinös oder c) diphtheritisch sein.

ad a) Die bei Leukocyten reichthümlich und stark injicirte Larynxschleimhaut behält ihre Farbe im Tod gewöhnlich nicht bei, sondern ist nur wenig roth geröthet, ihre entzündliche Schwellung aber bewahrt und lässt sich deutlich durch senkrechte Einschnitte nachweisen. Die entzündliche Verdickung findet sich auch an der Stimmritze. Die ganze Larynx und die Trachea sind mit einem zähen, gelblichen Schleim, der sich nur schwer abreiben lässt, überzogen. An einzelnen Stellen zeigt die entzündete Schleimhaut kleine, catarrhalische Erosionen und ihre Follikel sind vergrößert, so dass wenn man durch Umbiegung der Trachea die Schleimhaut stark spannt, aus jedem Follikel ein kleiner perlartiger Tropfen grauweissen Schleimes hervorquillt. Diese schleimig eiterige Anschwellung kann sich bis in die kleinsten Branchien erstrecken.

ad b) Zu dem eben beschriebenen Befunde, der sich überhaupt bei jeder Krupsection vorfinden muss, gesellt sich gewöhnlich noch eine fibrinöse Anschwellung, die sich ziemlich hoch von der entzündeten Schleimhaut in Form fleckeriger oder dünnerer Häutchen abhebt.

lässt und keine wirklichen Substanzverluste derselben verursacht. Diese Häutchen bestehen makroskopisch aus bandartigen Fibrinsträngen, zwischen welchen massenhaft Eiterzellen eingelagert sind. Die letzteren sind nicht in dem Fibrin entstanden, sondern waren schon vorher auf der Schleimhaut, wurden von dem feinhaltigen Exsudate nachträglich umgeben und nach stattgehabter Gerinnung eingeschlossen. Die Ausdehnung der Membranen ist sehr verschieden. Man findet zuweilen ganz dünne, spinwebenartige, kleine Fettschen nur an einer oder einigen Stellen des Larynx, in anderen Fällen sind die Membranen messer-rückendick, gelblich weiss, an der Oberfläche mit einem rahmartigen Belage bedeckt und kleiden den ganzen Larynx, die Trachea und die Bronchien höherer Ordnung so vollkommen aus, dass sie als ein zusammenhängendes, detritisches Röhrensystem abpräparirt und herausgezogen werden können. Man hat diesen Zustand den absteigenden Krup genannt. Zuweilen sind auch die Mandeln und der Pharynx mit solchen weissen Membranen bedeckt.

ad c) Unter diphtheritischer Laryngitis versteht man eine grau-weiße Exsudation in, nicht auf einzelnen Stellen der Schleimhaut. Diese graue Exsudatmasse, über welcher die darauf befindlichen Schleimhautreste nebst dem Epithel bald zu Grunde gehen, besteht aus einem amorphen Detritus, in welchem sich keine Fibrinbänder und fast gar keine Eiterzellen finden. Sie lässt sich nicht so leicht von der Schleimhaut abziehen, wie die einfache fibrinöse Membran und bedeckt gewöhnlich ausser der Laryxschleimhaut auch das Gaumensegel, die Tonsillen und den Pharynx. Der Unterschied zwischen rein fibrinösem und diphtheritischem Krup ist lediglich ein mikroskopischer.

Wenn sich noch bei Lebzeiten der diphtheritische Belag list, so bleibt darunter ein oberflächliches Geschwür zurück, das sich abhald an den Rändern und der Basis mit einem neuen grauen Belage bedeckt. Die Diphtheritis ist nach Virchow's Anschauung als eine mit theilweiser Zerstörung und Nekrosirung der Schleimhaut einhergehende Entzündung zu betrachten. Die diphtheritische Laryngitis kommt epidemisch vor und entwickelt sich häufig nach Masern und Scharlach.

Das Lungenparenchym findet sich bei allen drei Formen verändert. Die Lungen collabiren bei Oeffnung des Thorax gewöhnlich nicht, weil die Luft in den Bronchien von der Mundhöhle durch das massenhafte Secret abgesperrt ist, häufig findet sich ausgedehntes Lungenödem, sehr gewöhnlich lobuläre, zuweilen auch lobäre Pneumonie oder Tuberculose.

Die benachbarten Lymphdrüsen am Hals und Nacken, sowie auch die Bronchialdrüsen sind bei Diphtherie regelmässig geschwellt und hyperämisch.

Die übrigen Organe zeigen mit Ausnahme der venösen Stase keine charakteristischen Veränderungen.

Symptome.

Die Vorboten des Krups sind selten besonders prägnant. Die Kinder haben einige Tage Husten, Niesen, geringen Appetit und sind zuweilen weniger lebhaft als gewöhnlich, doch kommt es auch vor, dass sie sich vollkommen wohl und munter zur Ruhe begeben, die ersten Stunden der Nacht noch schlafend und dann plötzlich mit Krup-

husten erwachen, worauf sich die Symptome bis zum nächsten Morgen mit so rapider Schädlichkeit entwickeln können, dass der herbeigerufene Arzt einen vollständigen exquisiten Krup vorfindet. Dieses erste Stadium, das Stadium prodromorum, ist also schon deshalb nicht anzuerkennen, weil es in vielen Fällen gar nicht vorkommt und in noch mehreren keine charakteristischen Merkmale bietet.

Den Anfang des Krups datirt man mit Recht von jenem Moment, in welchem die ersten Veränderungen des Larynx durch Stimme und Husten sich kund geben. Die Stimme wird heiser und belegt, immer leiser und leiser, bis sie endlich so vollständig verschwindet, dass nur die Kinder, wenn sie überhaupt noch zu sprechen Lust haben, nur mehr in der nächsten Nähe versteht. Selbst im empfindlichsten Schmerz oder äussersten Zorne vermögen die Kinder keinen lauten Ton hervorzubringen. Sobald die Stimme sank und hoher wird, stellt sich ein durch das ganze Zimmer hörbare Respiration ein. Am besten lässt sich das die Athembewegungen begleitende Geräusch nachahmen, wenn man die Lippen spitzt, als ob man pfeifen wollte, dann aber nicht pfeift, sondern einfach durch die zugespitzten Lippen aus- und einathmet. Es entsteht dadurch ein Geräusch, das die Mitte hält zwischen Hauche und Puffen. Im Krup ist es dem Hauche näher als dem pfeiferischen Tone. Die Inspirationen werden immer häufiger und es kann sich endlich die Zahl der Athembewegungen bis auf sechzig und mehr in der Minute steigern. Dabei werden sie ungleich, bald tief bald oberflächlich und es betheiligen sich immer mehr und mehr Hilfsmuskeln des respiratorischen Muskelapparates.

Zugleich mit der Heiserkeit und dem lauten Athmen tritt Hacks ein, dessen Ton ein so charakteristischer ist, dass man ihn kurzweg „Kruphusten“ genannt hat. Er ist bellend, klanglos, trocken, und man hat ihn nicht ganz unpassend mit dem ersten Krähversuchen eines jungen Hahnes verglichen; am Anfange ist er ziemlich kurz abgebrochen und endet mit einer einzigen Expiration, bald aber steigert er sich in Hustenparoxysmen, die eine und später selbst mehrere Minuten dauern. Am ersten Tage des Krups sind diese starken Hustenanfälle sehr selten und kehren nur alle vier bis sechs Stunden wieder. Bald aber nehmen sie sowohl an Heftigkeit wie an Häufigkeit zu, und lassen sich durch äussere kleine Reize, durch Trinken oder einen Druck auf die Zunge zum Behufe einer Inspection der Mundhöhle sogleich hervorrufen. Ist gegen das bethale Ende hin nehmen sie ab und verschwinden vollständig. Die Kinder werden hierbei im Gesichte blauroth, die Augen treten starr und congestionirt aus ihren Höhlen hervor, die Venen des Kopfes und des Halses schwellen zu dicken, prallen Strängen an, die Stirne wird mit Schweiß bedeckt, trotz der heftigsten Anstrengungen aber bleibt der Husten ganz aphonisch und fördert nur kleine Mengen schaumigen Schleimes zu Tage. Die Krupparoxysmen unterscheiden sich von den Keuchhustenparoxysmen, die auch im pfeifenden Inspirationen unterbrochen werden, durch ihren ersticken-aphonischen Ton, durch den Mangel der Expectoration und des Erbrechens. Ausserdem sind die Keuchhustenkinder nach heftigen Anfällen gleich wieder bei guter Stimme, während die Krupkinder vor wie nach aphonisch bleiben.

Man irrt, wenn man den Kruphusten und die laute Respiration

dem wahren Krup allein zuschreibt und alle Larynxerkrankungen, bei denen dieser Hustenton gehört wird, zum wahren Krup rechnet. Auf diesem Irrthum beruht gewiss eine grosse Menge von geheilten Krupanfällen, bei denen ein paar Blutegel oder irgend ein anderes therapeutisches Verfahren so „ausgezeichnete Dienste“ geleistet haben. Es kommen häufig ganz einfache, leichte Laryngitiden vor, bei denen die Kinder gar kein Fieber haben und ihren Appetit behalten, die aber dennoch von derselben Heiserkeit, demselben Hustenton und derselben lauten Respiration mehrere Tage hindurch begleitet werden. Dieser Zustand kann sogar chronisch werden, auch kann er durch eine um die Trachea herumwachsende Kropfdrüse bedingt sein und dann selbst Jahre lang bestehen.

Bei echtem Krup ist immer schon von Anfang an eine Erhöhung der Hauttemperatur zugegen, wodurch sich oben die Allgemeinerkrankung zu erkennen gibt. Die Beschleunigung des Pulses ist auch hier, wie in den meisten Kinderkrankheiten überhaupt, von geringerem Werthe, da auch schon unbedeutende Catarrhe dieselbe veranlassen. Kruphusten, Heiserkeit und lautes Athmen genügen zur Diagnose des Krupes nicht, es müssen die Symptome des anhaltenden Fiebers vorhanden sein. Dieselben bestehen vor allem in deutlich fühlbarer und messbarer Erhöhung der Hauttemperatur, in Appetitmangel, in vermehrtem Durst und in Beschleunigung des Pulses.

Bezüglich der Untersuchung der Mundhöhle stimmen die Autoren je nach dem Lande, in welchem sie ihre Beobachtungen anstellen, wenig mit einander überein. In den russischen Ostseeprovinzen, in Frankreich, besonders in Paris, wo fast nur der diphtheritische Krup vorkommen scheint, ist es eine seltene Ausnahme, dass bei einem Krupkinde nicht die hintere Pharynxwand, die Tonsillen und das Gaumensegel dunkel geröthet, mit zähem Schleim und selbst mit diphtheritischem Exsudat bedeckt gefunden würden. Bei den vielen Krupkranken, die ich in München schon zu behandeln hatte, sah ich fast nie Membranen, gewöhnlich auch keinen dicken Schleimbeleg, sondern nur eine leichte durchaus nicht frappante Röthung der hinteren Partien der Mundhöhle. Anders verhält es sich wieder in Mittel- und Norddeutschland, wo die Membranen häufig auf den Tonsillen sich finden und stärkere Pharyngitis beobachtet wird, während die englischen Autoren die kruptöse Angina zu den Ausnahmefällen zählen. Der Grund dieser verschiedenen Angaben liegt wohl in der Verschiedenheit der pathologisch-anatomischen Prozesse. Das eine Mal wird der Krup bedingt durch einfache plastische Exsudation im Larynx, die gewöhnlich nicht über den Kehlkopf hinaufreicht, das andere Mal durch Diphtheritis, die fast immer auch auf den Tonsillen zugleich auftritt.

Die Auscultation der Lungen ergibt immer weit vorbereitete Rasselgeräusche, das pfeifende Laryngealathmen ist so intensiv, dass es das Vesicularathmen ganz verdeckt. Hat der Krup ein bis zwei Tage bestanden, so findet sich wohl auch umschriebene oder ausgedehntere Dämpfung und Bronchialathmen vorzüglich an der Rückenflechte, herrührend von lobulärer und lobärer Pneumonie. Bei rachitischen Kindern nehmen auch die erworbenen Atelektasen, die rachitischen Carnificationen der Lungen rasch an Umfang zu und umgeben sich mit pneumonisch infiltrirtem Gewebe. Der Auswurf ist, wie schon erwähnt,

meist sehr gering, schaumig weiss, zuweilen aber werden in heftigen Paroxysmen Krupenmembranen ausgehustet, die bald einzelne Fetzen mit gezackten Rändern, bald ganze, geschlossene Böhren von engem oder weiserem Caliber, je nach der Grösse des Luftstrahs, von dem sie sich abgelöst haben, darstellen. Mit dem Ausheuten solcher Membranen tritt entweder gar keine oder eine nur vorübergehende Erleichterung ein und die Prognose gestaltet sich deshalb nicht viel besser. Es ist dies eine allgemein bekannte Thatsache, und doch hören die Ärzte nicht auf, die armen Krupkinder mit Brechmitteln zu quälen und ziehen dann triumphirend irgend ein hässliches Stückerhen aus dem Erbrochenen hervor. Wenn der Tod wie gewöhnlich doch erfolgt, „so hat der Therapeut doch seine Schuldigkeit gethan“.

Leichtes Zusammendrücken des Larynx verursacht gewöhnlich deutlichen Schmerz, während das Schlucken nur erschwert und schmerzhaft ist, wenn die Tonsillen und die hintere Pharynxwand mit ergriffen sind. Der Stuhl ist meistens angehalten, die Urinsecretion normal oder vermindert.

Haben nun die bisher angedeuteten Symptome einen oder längstens zwei Tage angehalten, so treten die Folgen der gehemmten Respiration deutlicher hervor. Die Lippen, Wangen und Fingerspitzen werden cyanotisch, der Lauffinger wird enorm, die Kinder sitzen, so lange es ihre Kräfte erlauben, aufrecht im Bett und halten den Kopf nach rückwärts. Alle respiratorischen Hilfsmuskeln sind in ausserordentlicher Thätigkeit, so dass bei jeder Inspiration der Kopf der Brust gerührt wird. Sie reissen mit verzweifelter Todesangst sich die Kleider von der Brust und greifen an den Hals, als ob sie versuchen wollten, die Veranlassung ihrer Athemnoth zu entfernen. Die Händchen klammern sich an die Bettstelle oder irgend einen feststehenden Gegenstand ihrer Umgebung an, damit die *M. pectorales* besser als Respirationsmuskeln dienen können. Sie bleiben nie lange in einer Stellung und versuchen durch Hin- und Herwenden eine erträglichere Position sich zu verschaffen. Der Puls wird fast unzahlbar, unrythmisch und ungleich. Einige Stunden vor dem Tode tritt gewöhnlich ein Nachlass äusserlicher laryngealer Symptome ein, die Athemnoth nimmt ab, doch bleibt die Respiration fortwährend accelerirt, die Kinder legen sich wieder zurück auf ihr Kopfkissen, sie haben nicht mehr den Ausdruck der bösartigen Angst, sondern den der Gleichgültigkeit oder der Unirksamkeit. Die unersahenen Angehörigen halten diesen Zustand gewöhnlich für den Beginn der Besserung, dem Ärzte genügt aber der klebrige kalte Schweiß, die zunehmende Cyanose, der ungleiche, unzählbare Puls hinlänglich, sich keiner solchen Illusion hinzugeben, sondern ein baldiges Ende zu prognosticiren.

Was die Erklärung der Athemnoth und der Hosterparoxysmen betrifft, so nimmt man für die erstere gewöhnlich die Krupenmembranen, für die letzteren einen Krampf der Stimmritze an. Es lassen sich aber gegen diese Annahmen gewichtige Einwurfe geltend machen. Jeder beschäftigten Arzte, der die an Krup verstorbenen Kinder zu secern nicht versäumt, ist es bekannt, dass die Dicke und Ausdehnung der Krupenmembranen nicht im geraden Verhältniss zu der bei Lebzeiten beobachteten Athemnoth steht. Wo man wegen der heftigsten Dyspnoe bedeutende Membranbildung erwartet, findet sich nur ein beschränkter,

bedünner Beleg, und umgekehrt, wo der Krup weniger schreckliche Symptome hervorrief, zeigen sich bei der Section oft der ganze Larynx, die Trachea und die Bronchien mit membranösendicken, röhrenförmigen Membranen ausgekleidet. Es scheint demnach mehr auf den Grad der ödematösen Schwellung, die die Schleimhaut der Stimmritze befüllt, als auf die übrige Membranbildung ankommen. Die Glottisschwellung entgeht aber dem pathologischen Anatomen meistens wegen der unbedeutenden Veränderung der Form.

Gegen den Krampf der Stimmritze liefert Schlautmann trüffige Erwärfte. Er nimmt an, dass bei einer derartigen Schleimhautentzündung eine Lähmung der darunter liegenden Muskeln durch collaterales Oedem stattfindet und vergleicht den Krup mit den Symptomen, die man bei Thieren nach Durchschneidung der Nn. vagi beobachtet. Auch hier tritt die enormste Athemnoth, Mitwirkung sämtlicher respiratorischer Hilfsmuskeln, lang gezogene, von einem Geräusche begleitete Inspiration und kurze Expiration ein. Auch der tiefe, rauhe, heisere, oft überspringende Ton der Stimme und des Hustens spricht vielmehr für eine Lähmung als einen Krampf der Stimmritze; bei letzterem sind die Stimmländer in höchster Spannung und es könnten somit nur hohe Töne entstehen und keine rauhen, tiefen. Die Glottisspalte erweitert sich bei jeder Inspiration durch Muskelcontraction; ist diese aufgehoben, so föhrt sie wie ein loses Segel hin und her und Blosslegung der Glottis nach Durchschneidung der N. vagi hat ergeben, dass sich die gelähmte Glottis bei jeder Inspiration verengt, und zwar um so mehr, je kräftiger diese ist. Die Dyspnoe ist daher bei Thieren nach Lähmung der Kehlkopfmuskeln am grössten, wenn das Thier zu tiefen Inspirationen gereizt wird. Aehnlich verhält es sich mit der Respiration der Krupkinder. So lange das Kind ruhig athmen darf, ist sie nicht so sehr gehindert, beim Husten, Weinen und Erwachen aus dem Schlafe, wobei immer tiefe Inspirationen erfolgen, schliesst sich die gelähmte Glottis und es beginnen die Symptome der heftigsten Dyspnoe. — So wäre denn die ältere Ansicht vom Krampf der Stimmritze durch diese Schlautmann'schen Angaben ziemlich beseitigt und muss der Lähmung weichen, wenn nicht weitere physiologische Versuche dieser Entdeckung eine andere Deutung zu geben vermögen.

So frappant die Krupsymptome sind, so ist die Diagnose doch keineswegs leicht zu stellen und es kommen hier mehr als in irgend einer andern Krankheit wissenschaftliche und unwissenschaftliche Täuschungen vor. Zur Constatirung eines echten Krupes gehören 1) die Symptome des anhaltenden Fiebers, heisse, trockene Haut, schneller Puls, Appetitmangel und gemüthliche Verstimmung, 2) Kruphusten, 3) Heiserkeit, 4) lautes Krupathmen und 5) Stückerfalle. Die hinteren Parttheilen der Mundhöhle brauchen hierbei nicht verändert zu sein, bei Diphtheritis sind sie aber gewöhnlich mit weissen inselförmigen Exsudaten bedeckt. Wenn eines dieser oben aufgezählten Symptome fehlt, namentlich wenn das Fieber nicht deutlich ausgesprochen ist, so haben wir keinen Krup, sondern eine einfache catarrhalische Laryngitis ohne gefährliche Schleimhautschwellung, einen sogen. Pseudokrup vor uns, von dem uns allerdings nach mehreren Tagen noch Uebergänge zu dem vollkommenen Krup eintreten und auch zum Tode führen können. Es ist das wahrscheinlich die Form, wo in der Leiche keine Membran, sondern

ner dicker, zäher Schleim, Röthung und Schwellung der Larynxschleimhaut gefunden wird, bei Lebzeiten aber die Symptome nicht minder heftig waren, als bei der membranösen Form.

Aus dem Mangel an Uebereinstimmung zwischen den Symptomen und dem pathologisch-anatomischen Befunde scheint mir hervorzugehen, dass der Krup keine locale Larynxkrankheit, sondern eine allgemeine Erkrankung, vielleicht eine Intoxication, mit Localisation auf den Kehlkopf ist und dass sich die Larynxerscheinungen zum Gesamtbilde ungefähr verhalten müssen, wie das Typhusgeschwür zum Abdominaltyphus. Ein weiterer Beweis, dass die Diphtheritis wenigstens keine örtliche Erkrankung ist, lässt sich aus der Membranbildung auf Vesicatorenwunden am Sternum entnehmen. Setzt man nämlich einem solchen Krupkranken nach der Methode Lurzevsky's ein Vesicans, so belegt sich dasselbe erst bis zweimal täglich mit einer Membran, die die grösste Aehnlichkeit mit jenen diphtheritischen Ablagerungen auf der Schleimhaut hat. Auch ist es nur bei dieser Anschauung erklärlich, wie eine frühzeitig und geschickt ausgeführte Tracheotomie so regelmässig ohne allen Erfolg sein kann, denn die geringen Folgen, welche dieser operative Eingriff in andern Larynxkrankheiten zu veranlassen pflegt, können unmöglich die Schuld an dieser Resultatlosigkeit im Krup tragen.

Vorkommen und Verlauf.

Was das Auftreten des Krups betrifft, so ist der diphtheritische, der sich besonders bei Märcen einstellt, entschieden ansteckend und ergreift sehr häufig nach einander mehrere Kinder einer Familie; bei der einfachen fibrinösen Auflagerung wird diese Contagiosität nicht beobachtet. Bei scharfen, kalten Nord- und Ostwinden und im Winter kommt die letztere Form am häufigsten vor, ich habe sie übrigens schon zu allen Jahreszeiten und unter allen Witterungsverhältnissen gesehen.

Der Krup ist in Deutschland eine ziemlich seltene Krankheit und kommt den beschäftigten Aerzten höchstens einige Mal im Jahre vor, weshalb es auch unbegreiflich erscheint, wie von so vielen Aerzten von Kruperepidemien gesprochen werden kann. Zum Begriff „Epidemie“ gehört jedenfalls eine Massenerkrankung und diese wird bei uns nicht beobachtet. Die zum Krup disponirende Lebensperiode erstreckt sich von 1.—12. Jahre, die Mehrzahl der Erkrankungen fällt zwischen das zweite und siebente Jahr. Im Säuglingsalter kommt er ausserordentlich selten vor und es verdienen die Krankengeschichten, denen kein Sectionsbericht beigelegt ist, deshalb weniger Vertrauen, weil eine Verwechslung mit der in diesem Alter so häufigen, spastischen Kehlkopfkrankung sehr leicht möglich ist.

Der Verlauf der Krankheit ist äusserst rasch. Die kürzeste Zeit vom Beginn derselben bis zum Tode, die ich bisher erlebt habe, war 21 Stunden, die längste acht Tage. Der Ausgang ist fast immer tödtlich. Von der reinen fibrinösen Form sah ich noch niemals ein Kind genesen, von der diphtheritischen drei Kinder unter ungefähr 20 bis 25 Kranken. In diesen Fällen erholten sich die Kinder erst nach mehreren Wochen, am längsten blieb die bessere Stimme und der bellende Ton des Hustens zurück. Von ausgehusteten oder erbrochenen Membranen konnte trotz fortgesetzter Aufmerksamkeit nichts entle-

werden. Die Symptome milderten sich nach und nach, die Kinder konnten 8—10 Tage nach Beginn der Erscheinungen wieder etwas lauwarme Milch genießen, ohne Hustenparoxysmen zu bekommen, das Fieber liess nach, die Dyspnoë nahm soweit ab, dass sie sich wieder zurücklegen und einige Stunden der Nacht schlafen konnten. Urin wurde in grösserer Menge mit reichlichem Niederschlag von Uraten gelassen. Die Kinder blieben lange Zeit sehr blass, abgemagert und lässig.

Die Frage von den Kruprecidiven kann ich aus eigener Erfahrung nicht beantworten, indem meine drei Genesenen, von denen keine recidierte, natürlich keinen Schluss erlauben. Die erfahrensten Autoren wie Valleix und Guersant sprechen sich gegen die Möglichkeit der Recidive aus, nur Rost erzählt einen Fall, in welchem bei ein und demselben Kinde zweimal echter Krup auftrat und beide Male mit Anhalten von Membranen endigte. Wenn manche Mütter erzählen, ihr Kind habe fünf oder sechs Mal den Krup gehabt, so beruht dies jedenfalls auf einem wesentlichen oder unwesentlichen Irrthum des behandelnden Arztes. Ich behandle die Kinder einer Familie, von denen das älteste in den ersten Lebensjahren sechs Mal den Krup gehabt haben soll. Es werden von dem damaligen Hausarzte drei Anfälle mit Venäsectionen, die anderen drei mit Blutegeln, deren Narben man noch in grosser Menge am Halse sieht, behandelt und in allen Fällen bekam das Kind mehrere Brechpulver. Die Folge dieser eingreifenden, oft repetirten Behandlung war, dass der Knabe im Wachstume sehr zurückgeblieben ist, fortwährend kränkelt und sich auch geistig sehr langsam entwickelt. Als eines seiner jüngeren Geschwister auch der Meinung der Mutter ebenfalls an Krup erkrankte, wurde ich geholt, fand aber nichts als fieberlose, catarrhalische Laryngitis mit Heiserkeit, Kruphusten und Krupathemen. Auf eine einfache Behandlung mit einer Solutio Kali carbon. 4.0—120.0, stündlich 1 Esslöffel, wichen sämtliche Symptome nach wenigen Tagen, und als im Verlauf von zwei Jahren sich dieses Krankheitsbild noch mehrere Male wiederholte, wurde immer dieselbe Behandlung mit demselben günstigen Erfolge eingeleitet, so dass das Kind in seiner Entwicklung durchaus nicht gehemmt worden ist. Die scharf beobachtende Mutter behauptet, die Krupanfälle ihres älteren Kindes hätten sich in nichts von denen des jüngeren unterschieden, nur habe der Ältere immer viel länger gebraucht, bis er sich von seinem Anfall erholt habe. Sie schiebt, wohl nicht mit Unrecht, diese Verzögerung der Genesung und überhaupt auch die mangelhafte Entwicklung desselben auf die frühere Behandlung.

Die Prognose ist bei einmal entwickeltem Krup fast lethal zu stellen. Am ungünstigsten ist sie beim reinen fibrinösen Krup bisher gesunder, gut genährter Kinder. Dieselben haben durch die kräftige Körperbeschaffenheit hier nur den Nachtheil, dass sie einen oder zwei Tage länger als die schwächlichen Kinder dem Uebel widerstehen, um dann eben so sicher zu Grunde zu gehen. Bei diphteritischem Krup, namentlich nach Masern, ereignet sich hier und da einmal Genesung, auf welche die Behandlung, wie wir weiter unten sehen werden, keinen sehr auffallenden Einfluss hat. Wo Collapse, Cyanose und unzählbarer Puls eingetreten sind, ist der sichere Tod in kürzester Zeit zu prognosticiren.

Behandlung.

Es gibt mit Ausnahme der Epilepsie wohl keine Krankheit, bei der schon so viele Mittel und Methoden empfohlen worden wären, als beim Krup, aber nicht nur bezüglich der Mannigfaltigkeit, sondern auch bezüglich der Wirksamkeit findet sich eine merkwürdige Uebereinstimmung zwischen den Mitteln, die gegen diese beiden Krankheiten gegeben werden.

Die ältere Schule unseres Jahrhunderts, die jeden Entzündungskranken für verloren gab, dem nicht eine grössere Quantität Blut gelassen werden konnte, drang natürlich bei der acutesten aller Entzündungen, dem Larynkrup, auf Venäsection und Blutegel. Man ging so weit, sogar die Jugularvenen zu öffnen, weil aus denselben mehr Blut zu bekommen sei, und nur die Schwierigkeit der Blutstillung bewirkte, dass diese Behandlung keine weitere Verbreitung fand. Bei dem Adorlasse rechnete man für jedes Lebensjahr 40,0 CC. Blut, die Blutegel wurden immer in doppelt so grosser Menge gesetzt, als das Kind Jahre zählte und man zog die Gegend des Sternums der Höhe des Halses vor, weil an letzterer keine Compression stattfinden konnte und deshalb die Blutungen oft schwer zu beherrschen waren. Ueber die Wirkung der Venäsectionen kann ich aus eigener Erfahrung nicht sprechen, indem ich niemals ein Krupkind auf diese Weise habe behandeln sehen. Sie sind aber jetzt auch von den Anhängern der Blutentziehung als unstatthaft verlassen. Der Wirkung der Blutegel entgegen habe ich schon oft beobachtet und muss offen gestehen, dass sie entschiedenen Schaden bringen. Die Kinder ängstigen sich sehr und sträuben sich nach Kräften gegen deren Application, die Athemnoth und die Stükanfälle werden durch diese Aufregung eher vermehrt als vermindert und regelmässig tritt rascher Collapsus ein. Hat man sich aber in der Diagnose getäuscht, was leicht geschehen kann, da ein frühzeitiges Ansetzen ein Hauptbedingnis eines guten Erfolges ist, so verzögert man durch die Blutegel nur die *Reconvalescentia*. Die *Laryngitis catarrhalis* vergeht auch ohne sie.

Die Brechmittel gegen Krup haben bei der grössten Zahl der Aerzte festwährend verschiedenen Beifall gefunden, obgleich die Natur ihrer Wirkung und hienit auch die Dosirung und Anwendungsweise vielfach verschieden waren. Während die einen in den das Brechen erzeugenden Mitteln, also im *Tartar. stip.*, im *Cupr. sulfur.* oder auch in der *Ipecacuanha* spezifische Wirkung suchen, sehen die Andern da, durch erzeugten Brechakt als das Erpresslichste der ganzen Behandlung an, gleichviel auf welche Weise derselbe zu Stande gekommen. Die Anhänger der ersteren Ansicht stritten sich hauptsächlich, ob der Brechwurmbaum oder das schwefelsaure Kupferoxyd, der Alaun oder endlich das schwefelsaure Zinkoxyd das beste Mittel war, ob man in ganzer oder in reflecta dosi anzuwenden müsse etc. Es kann hier mannigfache Extravaganzen und raffinierte, mehrtägige Qualereien der armen Krupkinder vor, die in ihren letzten Lebenstagen neben der fortwährenden Athemnoth noch mit einem ebenso unerträglichen Zustand, mit beständiger Ueblichkeit, mit einer künstlich erzeugten Seerkrankheit zu kämpfen hatten. Es lässt sich dagegen nichts einwenden, dass man bei der anerkannten Wirkungslosigkeit der früher versuchten Mittel auch diese Methoden an einer Reihe von Kindern versuche.

Unrecht aber ist es, jetzt, nachdem die Nausea hinlänglich als unwirksam erkannt worden, sie in kleiner Dosis immer wieder fort zu reichen.

Man hat auch behauptet, dass die Krupkinder schwer erbrechen und dass sie hierzu grosser Dosen bedürfen. Es beruht sich diese Behauptung aber nur auf das der Agone kurz vorausgehende Stadium des Krupes, wo der Puls kaum mehr zu zählen und Collapsus eingetreten ist. Im Anfange der Krankheit brechen sie auf alle Brechmittel so gut wie alle anderen Kinder und es genügt ein Infus. Ipecac. (4,0—30,0) vollkommen, dasselbe zu bewirken. Es kann nicht geleugnet werden, dass der Brechakt, 1—3 Mal wiederholt, oft einen sehr günstigen Einfluss auf die Athemnoth hat, indem hiedurch jedenfalls die leicht flüchtigen Beläge schleimiger und membranöser Natur aus dem Kehlkopf ausgestossen werden. Freilich ist hiedurch noch keine Heilung gesichert, denn die Ausschwitzungen erneuern sich gewöhnlich wieder und die frühere Athemnoth stellt sich mit allen sie begleitenden Symptomen von neuem ein. Auch wenn keine Membranen mit dem Brechen entleert werden, bemerkt man doch in vielen Fällen momentane Verminderung der Dyspnoe, so dass der Brechakt auch einen günstigen Einfluss auf die entzündliche Schwellung der Stimmritze selbst zu haben scheint. Für 1—2malige Brecherregung genügt die Ipecacuanha vollständig, die später nachgegebenen grossen Dosen von Brechweinstein oder Kupfervitriol bewirken wohl noch Erbrechen, schaffen aber selten mehr Erleichterung, sondern führen rasch zum Collapsus. Das Ipecacuanha-Infus hat ausserdem, dass die Kinder es verstehen ohne Sträuben zu nehmen, noch den Vortheil, dass es viel seltener Diarrhöe macht, als jene Metallsalze. Ich gebe gewöhnlich, sobald ich zu einem entwickelten Krup komme, 1—2 Mal ein derartiges Brechmittel, halte es aber für eine unnütze Quälerei, den Kindern Tage lang hindurch Ueblichkeiten zu bereiten. In neuester Zeit wurde auch die subcutane Injection einer 1% Apomorphinlösung empfohlen. Die exakte Wirkung dieses Mittels hat sich schon vielfach bewährt und es kann dasselbe, namentlich wenn Schlingbeschwerden bestehen, von grossem Nutzen sein.

Die Kalischwefelleber galt eine Zeit lang als Specificum gegen Krup und scheint sich ihren Ruhm hauptsächlich dadurch erworben zu haben, dass einer der Napoleonischen Preiskrämper, der seine Arbeit anonym einschickte, sie als einziges Mittel bei allen Krupfällen anzuwenden rath. Die Unwirksamkeit dieses Mittels hat sich in so vielen Fällen herausgestellt, dass man jetzt wieder allgemein davon abgekommen ist. Die Dosis war nämlich 0,03—0,12. — Das Quecksilber ist nach den Brechmitteln das am öftesten angewendete Mittel. Die graue Salbe wird auf den Hals und grössere oder kleinere Flächen des Thorax eingerieben, das Calomel gibt man in grossen oder kleinen Dosen innerlich. Wenn man die eigenthümliche resorbierende Wirkung der Quecksilberpräparate auf die entzündete Larynxschleimhaut anzuwenden versucht, so ist dass jedenfalls eine ganz rationelle, durch mannigfache Analogien gestützte Handlungsweise, wenn man aber das Calomel in grossen Dosen bloss gibt, um eine Abösung auf den Darmkanal zu bezwecken, so kann man diesen Zweck viel schädlicher durch Mittelstee oder kleine Dosen drastischer Arzneikleeper erreichen. Von den wenigen Fällen, die ich mit

Quecksilber äusserlich und innerlich behandelte, genasen zwei. Bei dem ersten Falle, einem 5jähr. Mädchen, wurde innerlich Calomel 0,5 in Dosen von 0,03 gegeben und der Hals mehrmals mit grauer Salbe eingerieben. Ausserdem wurde das Kind aber mit Blutegeln und Brechmitteln mehrfach bedacht, so dass die Beobachtung keine reine genannt werden darf. Bei dem zweiten Kinde, einem 2jähr. Knaben, bei welchem die Larynxstenose sehr hochgradig war und massenhafte, diphtheritische Beläge an den Mandeln sich zeigten, wurde ausser der internen Behandlung mit chloresaurem Kali nichts versucht als sehr reichliche Einreibungen mit grauer Salbe. Das Kind wurde stündlich am ganzen Leibe eingerieben, so dass täglich mehr als 300 vier Tage hindurch verschmiert wurden. Da fortwährend chloresaures Kali gereicht wurde, trat weder Speichelfluss noch Stomatitis ein, der Husten wurde lockerer, die Membranen an den Mandeln lösten sich ab und das Kind, das schliesslich etwas anämisch geworden war, genas nach einigen Wochen vollständig.

Die kohlensauren Alkalien sind wegen ihrer lösenden Eigenschaft, die sie auf alle animalischen Stoffe, also auch auf die Krupenentzündung ausüben, längst gegen Krup empfohlen. Hellweg, Voss, Darmmüller, Eggert, Hufeland und mehrere Aerzte haben sich sehr zu Gunsten derselben erklärt und neuerdings ist Luzinsky in Wien als specieller Vertheidiger des Kali carbonicum aufgetreten. Er gibt das kohlensaure Kali, zu 2/5 bis 4/6 pro die in Lösung und schreibt ihm spezifische Wirkung zu. Seine Therapie besteht darin: 1) der krankhaften Blutmischung durch kohlensaures Kali entgegen zu wirken, 2) der Localisirung im Kehlkopf durch ein in Eiterung erhaltene Vesicans am obersten Theile des Sternums vorzubeugen, 3) die Athemnoth und die Hustenparoxysmen durch Opium zu mildern und 4) die schon bestehenden Membranen mit Höllestein zu lösen oder durch Emetica heraus zu befördern.

Wenn ich nun auch die spezifische Wirkung des kohlensauren Kali's nicht bestätigen kann, indem ich von fünf ganz rein nach Luzinsky's Methode behandelten Kindern nur eines retten konnte, so hat die Letztere vor der früheren Behandlungsweise mit Blutegeln und Nauseas doch den Vorzug, dass die Kinder dabei wenig oder gar nicht gequält werden und dass jedenfalls ebenso viel, wahrscheinlich aber mehr Kinder dadurch erhalten werden.

Die übrigen Behandlungsweisen mit Chinin, mit grossen Dosen narcotischer Mittel, die hydropathische Methode etc., von denen jede ihre Lobredner und Schmeiher in hinreichender Menge hat, habe ich nicht selbst versucht und enthalte mich deshalb eines bestimmten Urtheils hierüber.

Die örtliche Behandlung hat auch schon mannigfache Variationen erfahren. Die Einen binden den Hals mit trockener Wolle ein, Andere mit feuchten warmen Tüchern oder mit feuchten Waschwässern oder gar mit in Milch gekochten Schwallbennestern (ein berühmtes Volksmittel). Andere lassen den Hals beständig mit einer Schicht Fett aus allen möglichen Thierklassen bedecken, Andere wenden verschiedene Hautreize an und wieder Andere behaupten, die Athemnoth sei am geringsten, wenn Hals und Brust ganz entblösst wären. Die französischen Aerzte legen auf Bretonneau's Anweisung des Larynx

fortwährend grossen Werth. Man bedient sich hierzu eigener Fischbeinstäbchen, an welche vorne ein erbsengrosses Schwämmchen befestigt ist, dasselbe wird in eine Höllesteinlösung (1,0—4,0 auf 30,0 Wasser) getaucht und dann in den Pharynx gebracht, nachdem die Zunge mit einem Spatel möglichst tief niedergedrückt worden. Am längsten verweilt man auf dem Kehlkopf und sucht durch Andrücken des Schwämmchens auf denselben die Höllesteinlösung zu entleeren. Vor Actung des Larynx selbst und vor Eindringen zwischen die Stimmbänder braucht man nicht speciell zu warnen, denn es gehört hierzu eine spontane tiefe Inspiration, bei der sich der Kehlkopf hoch nach oben begibt, wozu sich die Kinder mit dem Höllesteinschwämmchen im Munde kaum jemals vorstellen dürften. Die Höllesteinlösung hat einen entschieden günstigen Einfluss auf die von ihr berührte, entzündete Schleimhaut, die in 24 Stunden in der Regel ihre Membranen abstösst und oft sich nicht mehr mit neuen bedeckt. Bei wirklichem, fibrinösem Krup habe ich aber keinen Erfolg von der Cantharisation der meist intakten Pharynxschleimhaut gesehen. Ausser der Höllesteinlösung hat man Alampulver, rothen Präcipitat (1 Theil auf 12 Theile Zucker), Cuprum sulfuratum, ungereinigte Schwefelblumen und Calomel in den Pharynx eingeblasen. Alle diese örtlichen Methoden sind jetzt mit Recht von den Inhalationsapparaten verdrängt worden. Die Application der Medicamente auf die Kehlkopfschleimhaut geht hier in der schonendsten Weise von Statten. Unter allen zur Inhalation verwendeten Mitteln gebührt dem Kalkwasser weitans der Vorzug, und ich sah unter dieser localen Behandlung bei innerlicher Darreichung von chlorsaurem Kali einmal eine vollständige Genesung von einem schweren, diphtheritischen Krup eintreten. Wenn die Kinder nicht in Güte dahin gebracht werden, freiwillig alle Stunden fünf Minuten lang zu inhaliren, so darf man sich keinen Erfolg versprechen. Eine zwangweise ausgeführte Inhalation regt zu sehr auf und ist mit zu grossen Schwierigkeiten verbunden, als dass sie stündlich repetirt werden könnte.

Die Luft, in welcher ein Krupkind sich befindet, sei rein und feucht, was durch häufiges Lüften und durch stetes Verdampfen von Wasser in flachen Gefässen am besten bewerkstelligt wird.

Als Resumé des bisher Angeführten lasse ich die Kurmethoden der Hauptautoritäten folgen, ohne dabei mich für die Zweckmässigkeit der einzelnen Mittel zu verbürgen:

1) Jurine. Im ersten Stadium Blutentziehung nach dem Grade des Uebels und dem Stande der Kräfte; nach der ersten Blutentleerung leichte Brechmittel, mit diesen in gebrochenen Gaben während des zweiten Stadiums (bei Athemböth und Stickenfällen) fortgefahren. Bei Zunahme des Uebels überdiess Senfteige und Blasenpflaster auf Hals, Brust u. s. w. Zur Unterstützung Einathmen erweichender Dämpfe. In dem zweiten Zeitraum auch Brechmittel in vollen Gaben und später stärkere Expectorantien, nach Umständen Antispasmodica.

2) Gölis. Blutegel, Calomel in grossen Dosen, Einreibung von Ung. eibor. auf Hals und Brust; in der Zwischenzeit Salpeter: frühzeitig Blasenpflaster, bei Athemböth Brechmittel.

3) Hufeland. Zuerst dessen Linctus emeticus. (0,05 Brechweinstein, 1,20 Ipecacuanapulver auf 75,0 Lösung.) Warme Dämpfe,

daneben Salpeter und Oestiere mit 1 Esslöffel Weissessig. Sogen gleichwohl die Athembeschwerden (was eben im wirklichen Krup regelmässig geschieht), *Caprum sulfuricum* in brechenerregender Gabe, dann 2stündlich zu 0,015. Sobald die Erstickungszufälle wieder annehmen, in voller Gabe, jetzt auch Quecksilberreibungen auf den Hals und Haartreite.

4) Luxsinsky. Gleich nach gestellter Diagnose ein Blasenpflaster von wenigstens Thalergrösse auf das Manubrium sterni. Innerlich Solut. Kali carbon. 4,0—120,0 in 24 Stunden zu verbrauchen. Die Vesicatorwunde mit spätspatischem Papier bedeckt und möglichst lang in Eiterung erhalten. Bei grosser Athemnoth kleine Dosen Morphin, nach heftigen Stickenfällen ein Brechmittel. Caeteration des Pharynx mit Höllensteinlösung.

Diese letztere Methode hat mit Ausnahme des Vesicators des grossen Vorzug, dass den Kindern keine neuen Qualen bereitet werden.

5) Pareire Schmeizereien mit Ung. ciner. täglich 30,0. Stündlich eine Inhalation mit Kalkwasser, täglich 4,0 Kali chloric. In der Noth die belichteste und glücklichste Methode.

Schliesslich einige Worte über die Tracheotomie. Der Gedanke, bei Menschen, die in Folge einer Unwegsamkeit des Larynx an Ersticken sind, der Luft durch eine Oeffnung in der Trachea Zugang zu verschaffen, ist sehr alt und, was den Krup betrifft, so alt fast als die Kenntnis vom Krup selbst, indem schon Home 1763 diese Indication aufgestellt hat. Seit jener Zeit wurde die Operation von Zeit zu Zeit ausgeführt, aber immer mit Unglück, so dass die Preisbewerber 185 erst einen einzigen günstigen Fall von Andrée, wobei aber die Diagnose zweifelhaft gewesen sein soll, anführen konnten. Bretonneau brachte 1823 die Operation wieder in Schwung und seit jener Zeit wird sie von einzelnen französischen Aerzten fortwährend ausgeübt und vertheidigt, wobei jedoch zu bemerken ist, dass die meisten Operationen in den Kinderspitälern, wo ansteckende Diphtheritis herrscht, gemacht werden, dass also an Krup Kranken operirt wurde, von denen überhaupt eine ziemlich Anzahl auch ohne Tracheotomie genes. Traussneau hat bis zum Jahre 1842 119 Mal operirt und darunter 25 Mal Genesung erzielt, dann wurde das Princip aufgestellt, man müsse sehr frühzeitig operiren, worauf das Verhältniss so günstig sich gestaltete, dass unter 24 Operationen 14 Heilungen vorkamen. Nach einer anderen Zusammenstellung von Esambert genesen unter 25 operirten Krupkindern 47 oder 22%. Das Schlimme hierbei ist, dass die Chirurgen verlängern, die Operation müsse sehr frühzeitig vollzogen werden, und dass die Pädiatriker und also noch viel weniger die Chirurgen am ersten und zweiten Tage der Erkrankung eine krupöse Laryngitis von einer catarrhalischen nicht unterscheiden können. In Deutschland erhoben sich zwar vereinzelt Stimmen, z. B. von Esst und Passavant, für die Operation, die deutschen erfahrensten Kinderärzte aber und selbst die meisten deutschen Chirurgen wachen der Tracheotomie bei Krup nicht. In England ist man allgemein dagegen und auch in Frankreich beginnt, scheint es, eine Reaction, indem Bouchut (Gaz. médic. 1858, Nr. 41) veröffentlicht hat, dass auf 100 Einwohner von Paris die Zahl der Todesfälle durch Krup von Jahr zu Jahr zunahme und nie so gross war, als im letzten Decennium. 1853

starben zweimal so viel Kinder an Krup als 1837 und in einem Mittel aus den Jahren 1847—1858 fünf Mal so viel als 1838, während nach einer approximativen Berechnung nicht fünf Mal so viel Erkrankungen an Krup vorgekommen sind. Er gibt direkt der jetzigen öftlichen Behandlung, dem Aetzen und der Tracheotomie, die Schuld an dieser grösseren Mortalität. Der Grund, warum bei uns in Deutschland und dann in England die Operation so wenig Anklang findet, ist wohl der, dass wir eben wenig diphtheritische, sondern mehr echte fibrinöse Krupkrankungen zu behandeln bekommen.

Die Operation selbst ist durchaus kein lebensgefährlicher Eingriff, und wird nach Troussseau auf folgende Weise ausgeführt:

Das Kind wird auf einen Tisch gelegt und unter die Schultern kommt ein zusammengerolltes Kissen, das nur bis zum Halse reicht, so dass der Kopf etwas nach hinten überhängt und die Luftröhre gehörig vorspringt. Man macht nun einen Längsschnitt von 4 Ctm. Länge, der am Ringknorpel beginnt und gerade nach abwärts geführt wird. Man setzt nun zu beiden Seiten feine, spitze Haken ein und zieht die Venen möglichst, indem man sie durch die Haken abziehen lässt. Liegt endlich die Trachea frei zu Tage, und zwar in einer Ausdehnung von wenigstens 3—4 Luftröhrenknorpeln, die an ihrer weissen Farbe und grösseren Resistenz zu erkennen sind, so nimmt man ein geknüpft Bistouri, den Dilatator und die doppelte Canüle, eigens für die Tracheotomie gefertigt, zur Hand. Man macht hierauf einen Einstich in die Trachea, erweitert die Öffnung mit dem geknüpften Bistouri und dem Dilatator und fährt alsdann die Canüle ein, indem man sie zwischen den geöffneten Branchen des Dilatators durchschiebt. Hat man sich überzeugt, dass die Luft durch die Canüle geht, so zieht man den Dilatator zurück, befestigt die Canüle mittelst ihrer Schnüre und setzt das Kind, das nun plötzlich frei athmet, wieder auf.

Als üble Zufälle während der Operation bespricht Troussseau vor Allem die Blutung. Venenblutungen werden einfach mit den Fingern comprimirt und stehen, sobald die Canüle eingezogen worden; arterielle Blutungen müssen natürlich durch Unterbindung gestillt werden. Die Angst vor dem Eindringen des Blutes in die Trachealwunde scheint übrigens etwas übertrieben zu sein, indem ja bei Hämoptöekranken jedenfalls auch grössere Mengen Blut in der Trachea und den Bronchien bleiben, ohne besondere Erstickungsanlässe zu veranlassen.

Ohnmacht tritt sehr häufig nach der Operation ein und ist bedingt durch die plötzliche cerebrale Circulationsstörung in Folge der frei gewordenen Respiration. Troussseau sah sie einmal eine Stunde währen, aber noch nie tödtlich endigen.

Hebt sich die Respiration nach vollendeter Operation nicht, so ist die Canüle durch Blutcoagula oder Pseudomembranen verstopft und es müssen dieselben mittelst geeigneter Pincoetten entfernt werden.

Bei der Nachbehandlung ist das grösste Augenmerk auf die Canüle zu richten. Man bedeckt die Wunde mit Wachstafel, der in der Mitte ein Loch hat zur Aufnahme der Canüle, führt eine zweite Canüle in die erste ein, damit zum Behuf der Reinigung am ganzen Verbands nichts geändert zu werden braucht, und bindet ein leichtes Tuch um den Hals, wodurch die Luft nicht so direkt mit der Trachealschleimhaut in Berührung kommt, sondern erst, nachdem sie durch das Tuch von

Staub gereinigt ist. Die innere Canüle muss alle 3—4 Stunden herausgenommen und gereinigt werden. Ein einziges Mal konnte Tronsséan schon am vierten Tage die Canüle definitiv herausnehmen, einige Male am sechsten und achten, gewöhnlich zwischen dem zehnten und dreizehnten, einmal erst nach 42 und einmal nach 53 Tagen. Niemals blieb eine Luftröhrenfistel zurück.

Unmittelbar nach der Operation trinken und essen die Kinder ohne Beschwerden. 4—5 Tage später aber stellt sich ein spasmodischer Husten ein, so oft die Kinder trinken, und es kommt ein Theil des Getrankes zur Canüle heraus, ein Beweis, dass die Epiglottis sich nicht so exakt zu functioniren vermag als in gesunden Tagen. Dieser Zustand dauert 1—2 Wochen und heilt sich dann von selbst. Bei öfteren Stickenfällen verbietet Tronsséan alle düsigen Nahrungsmittel.

So viel von der Ausführung dieser ungünstigsten aller Operationen, auf welche ich für meinen Theil niemals dringe, sondern mich lediglich nicht widersetze, wenn sie von andern Collegen, oder noch besser von den Eltern selbst, vorgeschlagen wird.

Nehmen wir an, dass alle Kinder, die operirt wurden, echten Krup hatten, so ist das Genesungsverhältniss von 22% dennoch ein enorm ungünstiges, zumal die operirten Kinder grössten Theils an der leichteren diphtheritischen Form erkrankt waren. Bedenken wir ferner, dass die übergrössere Mehrzahl erfahrener Praktiker die Operation bei Krup gänzlich verwirft, dann, dass wir einigen Grund haben, im Krup als eine Allgemeinerkrankung mit Localisation auf den Kehlkopf anzusehen, so müssen wir von dieser Operation absehen und schliessen mit folgenden Worten des alten Celsus: *Ad tracheotomiam, cum remedium incertissimum colligere res ardua est; parentes alioquin avertantur agnati et periclitatur medici fama, quam infans si fieri operatio ac votis illudens, lacrymis multis velut homicidam pectus amato detestantur parentes.*

2) Pseudokrup. Laryngitis catarrhalis.

Wenn ein Erwachsener sich einen Larynxcatarrh zuzieht, so wird er heiser, bekommt Keuchen und Kratzen im Kehlkopf und hustet dabei. Athemnoth und Stickenfälle kommen aber in der Regel nicht vor. Erkrankt hingegen ein Kind an einer einfachen, catarrhalischen Schwellung der Larynxschleimhaut, so treten alsbald heftige Respirationstörungen ein, die ihren Grund in der Enge der kindlichen Stimmritze haben. Es scheint im Kehlkopf des Kindes zwischen Schleimhautschwellung und Weite der Stimmritze ein anderes Verhältnis zu bestehen als bei Erwachsenen. Während die Stimmritze der letzteren einen gewissen Grad von catarrhalischer Infiltration und verträgt, ohne dass beträchtliche Athemnoth entsteht, so kommt es sehr häufig vor, dass Kinder, die kaum merklich heiser sind, plötzlich Stickenfälle bekommen und vorübergehend eine täuschende Ähnlichkeit mit wirklichem, fibrinösem Krup bieten.

Symptome.

Die Kinder haben einen ganz einfachen Catarrh der Nase oder der Bronchien oder beider zugleich, sind den ganzen Tag über leiser.

essen mit dem gewöhnlichen Appetit und sind, einiges Niesen und Husten abgerechnet, in vollkommen physiologischem Zustand. Sie schlafen zu rechter Zeit ein, husten vielleicht etwas im Schlafe oder schnarchen ungewohnter Weise, plötzlich aber wachen sie mit einem completen Krupenfälle auf. Es tritt sogleich Kruphusten, vollkommene Heiserkeit, Krupathemen und ein sehr heftiger Stöckanfall ein, so dass kein Mensch im Stande ist, diese Erkrankung vom leichten Krup zu unterscheiden. Es stellt sich auch dieselbe Angst und Beklemmung ein, die Kinder richten sich auf, das Gesicht wird geröthet und der Puls bedeutend beschleunigt. Nachdem dieses Bild eine, längstens zwei Stunden gedauert hat, lassen die Symptome nach, das Athmen und die Stimme verhalten sich zwar noch wie bei dem leichten Krup, die Kinder legen sich aber wieder zurück, verlangen zu trinken und schlafen alsdahl wieder ein, worauf ein allgemeiner Schweiß eintritt. Der gewöhnlich erst jetzt herbeieilende Arzt findet ein ganz gesundes, schlafendes Kind mit leicht schnarchender Respiration, das sehr ungehalten über die neue Störung seiner Nachtruhe aufwacht. Selten erfolgen in einer Nacht zwei oder mehrere Anfälle, oft bleibt ein solcher Anfall ganz isolirt, gewöhnlich aber wiederholen sie sich in den folgenden Nächten und kehren auch noch wieder, nachdem sie mehrere Tage und selbst Wochen ausgeblieben waren. Nach dem Anfalle bleibt gewöhnlich etwas Heiserkeit, ein heftiger Husten und lautes Schnarchen im Schlafe zurück, die Hauttemperatur kann an Stirne und Händen wohl etwas vermehrt sein, wirkliches Fieber mit allgemeinem Uebelnutzen und grössere Abgeschlagenheit kommt jedoch nicht vor. Die Kinder verlangen ausser Bett und geniessen ihre Mahlzeiten, wenn auch nicht mit vollem Appetit. Eigenthümlich ist, dass unter Tags niemals heftige Anfälle erfolgen, was seinen Grund in grösserer Empfindlichkeit des Larynx gegen sich ansammelnde Schleimmassen haben dürfte. Derselben erzeugen, sobald sie in einiger Menge vorhanden sind, einen Hustenreiz und werden noch rechtzeitig aus dem Larynx in den Pharynx gehustet, während sie bei Nacht länger liegen bleiben und dann endlich heftige Reflexerscheinungen hervorrufen.

Die ganze Dauer der Krankheit ist 3—8 Tage. Der gewöhnliche, fast constante Ausgang ist der in Genesung, es kommen aber auch Fälle vor, in denen die Kinder mehrere Tage lang deutliche catarrhalische Laryngitis zeigen und doch endlich unter allmählicher Zunahme der Allgemeinerkrankung in den echten Krup übergehen, der dann auch meistens mit dem Tode endigt. Bei der Section findet man in diesen Fällen gewöhnlich keine Membranen, sondern bloss eine beträchtliche Schwellung, zum Theil auch Röhung der Larynxschleimhaut und auf derselben so wie auf der Trachea und dem Pharynx einen dicken, zähen Schleimbefug.

Zu Recidiven ist der Pseudokrup sehr geneigt, wie schon aus den vielfachen Erzählungen Erwachsener erhellt, die in ihrer Jugend sechs und acht Mal den Krup gehabt haben wollen. Am häufigsten befällt er Kinder, die mit dem Durchbruch der letzten Backenzähne umgehen, versichert aber auch grössere nicht, während bei kleinen Kindern, die noch an den Schneidezähnen laboriren, die spasmodische Form der Larynxerkrankung ohne allen Catarrh die häufigere ist. Uebrigens gibt es auch Uebergangsformen, bei denen sehr schwer zu entscheiden

ist, ob man es mit einem einfachen Glottiskrampf zu thun hat. Erst die Heiserkeit der Stimme und der Krampf des Hustens in den Intervallen lassen die Diagnose für diese oder jene Form feststellen, indem diese Symptome bei reinem Stimmritzenkrampf niemals vorkommen. Vom ächten Krup unterscheidet sich der Pseudokrup nach nur durch die Intervalle. Während bei letzterem am Tage die Stimme wohl heiser und der Husten mit dem Krampf behaftet ist, so wird doch das Fieber und die Allgemeinerkrankung niemals Besorgnisse erregend. Die Kinder stehen auf, sind munter, gehen an ihr Spielzeug und nehmen auch einige Nahrung zu sich. Von alledem ist im ächten Krup das Gegentheil der Fall, und die Larynxsymptome sind bei diesem jederzeit viel ausgeprägter.

Behandlung.

Der Pseudokrup darf auch in seinen leichtesten Formen niemals leicht genommen werden; denn es kommen ganz allmähliche Uebergänge zum ächten Krup vor, nach dessen tödtlichem Ende die kleinste Vernachlässigung der ersten Heiserkeit als Ursache desselben angeschuldigt wird. Man halte die Kinder in vollkommen gleicher Temperatur, lasse den Hals ein und reduciere sie auf Milchkost und einfache Suppen. Die feuchten Umschläge um den Hals wirken, wenn sie richtig und aufmerksam gemacht werden, sehr günstig. Es gehört aber dazu, das die feuchte Cravatte sehr schmal ist, mit Guttapercha-Taffet überdeckt und mit einem breiteren, trocknen Tuche so an den Hals gebunden ist, dass das Wasser des feuchten unteren Tuches nicht so schnell verdunstet und eine partielle Abkühlung des Halses erzeugt, wodurch gewöhnlich die Heiserkeit vermehrt wird. Diese Gefahr einerseits und andererseits die Ueberzeugung, dass die feuchte Cravatte nicht unbedingt notwendig ist, veranlassten mich, sie überall da wegzulassen, wo nicht eine specielle, erfahrene Wartfrau die Pflege des Kindes übernommen hat. Innerlich gebe ich gewöhnlich die Solutio Kal-carbon (0,5—1,0 auf 100,0 Wasser) und lasse die Kinder möglichst viel trinken, weil erfahrungsgemäss eine Anregung der Diurese und Diaphoresis eine Verminderung des catarrhalischen Secretes auf der Respirationsschleimhaut veranlasst. Zu Brechmitteln wird man sich nur selten gezwungen sehen.

3) Neurosen des Kehlkopfes.

Motilitätsstörungen der Kehlkopfmuskeln kommen in dem Kindesalter ziemlich häufig und fast ausschließlich nur in diesen beiden Formen, der Krampf und die Lahmung, werden beobachtet, der erstere aber ist viel häufiger als die letztere. Im Allgemeinen muss gleich vorausgeschickt werden, dass alle jene Kehlkopfaffectationen ausgeschlossen werden müssen, bei welchen irgend Symptome von materieller Veränderung der Schleimhaut nachweisbar sind, denn da dabei immer die Kehlkopfmuskeln alterirt werden und Veränderungen in der Stimme, in der Art zu athmen und zu husten, sich einstellen, so muss man alle Kehlkopfkrankheiten, die es überhaupt gibt, bei den Neurosen abhandeln. Bei den geringen Abweichungen von der normalen Beschaffenheit, welche in der Leiche eine pathologisch veränderte Schleim-

haut bittet, ist es in manchen Fällen schwer zu entscheiden, ob der Tod in Folge einer reinen Neurose oder einer Schleimhautschwellung, eines Glottisödemes, eingetreten ist.

a) Spasmus glottidis.

Dass die Stimmritze sich krampfhaft contrahiren kann, unterliegt keinem Zweifel. Es kann dies durch Vivisectionen experimentell nachgewiesen und anatomisch durch die Ansatzpunkte der Glottismuskeln begründet werden. Die Muskeln, welche hierbei in Betracht kommen und von N. recurrens Vagi abhängen, sind 1) die *Mm. thyroarytaenoides*, 2) die *Mm. cricoarytaenoides laterales* und 3) der *M. arytaenoides transversus*.

Man kann eine acute und eine chronische Form unterscheiden. Es gibt Glottiskrämpfe, bei denen schon nach wenigen Anfällen der Tod durch Erstickung erfolgt, und wieder andere, die Monate lang dauern und nach längeren Pausen recidiviren können. Die Schriftsteller des vorigen und dieses Jahrhunderts, aus früheren Zeiten datiren keine präzisen Berichte hierüber, weichen in ihren Anschauungen dieses Zustandes auffallend von einander ab und haben deshalb eine Menge Namen erfunden, die, meist auf ätiologische Momente basirt, eine grosse Verwirrung in den Köpfen der nicht auf eigener Forschung fußenden Aerzte veranlaßt haben. So gab es ein *Asthma acutum et chronicum* Millari, dessen Symptome aber mehr auf unseren Pseudokrup, als auf einen reinen Spasmus glottidis passen, — ein *Asthma thymicum* Kopii, — ein *Asthma dentium* — *Asthma thymico-cyanoticum* — eine *Suffocatio stridula* — eine *Angina stridulosa* — *Aproton infantum* — *Catalepsia pulmonum* (Hufeland) — einen *Larygismus stridulus* — *Phrenoglottismus* — *Laryngospasmus infantilis* — *Tetanus aprotonis infantum* — und endlich gar einen *Cerebralkrup*, worunter die Engländer, namentlich Clarke, einen Krup verstanden, bei dem man in der Section den Larynx frei fand und der auf eine freilich nicht nachgewiesene Gehirnkrankung zurückgeführt wurde.

Symptome.

In allgemeinen Umrissen lässt sich folgendes Krankheitsbild entwerfen. Ganz gesunde, fette Kinder bekommen gewöhnlich während des Zahmungsprocesses einen plötzlichen Stickenfall. Auf einmal wird das Gesicht stark injicirt, der Kopf nach rückwärts gelogen, der lautlose Mund öffnet sich leicht oder macht schnappende Bewegungen, die Extremitäten sind steif oder hängen schlaff herab, auch greifen sich die Kinder an den Hals, als wollten sie die Einschnürung heben. Endlich nach einem höchst qualvollen Kampfe von $\frac{1}{2}$ —1 Minute erfolgen einige kurzabgesetzte, pfeifende Inspirationen, mit welchen keine Expirationen abwechseln, worauf dann entweder der ganze Anfall beendet ist und die normale Respiration sich wieder mit einem langgezogenen, laut pfeifenden Athemzuge einleitet, oder ein neuer Stickenfall mit vollkommen unterbrochener Respiration beginnt. Dieser ganze Vorgang kann sich mehrmals auch einander in continuo wiederholen, so dass die Kinder erst nach einigen Minuten wieder ganz zu sich kommen. Es ereignet sich deroelbe ebenso häufig am Tage wie in der Nacht, repetirt sich in 24 Stunden 2—40 Mal, und wird namentlich durch

tiefe Inspirationen hervorgerufen. Hat das Uebel eine Zeit lang bestanden, so gesellen sich allgemeine Convulsionen zu den Glottiskrämpfen, was von einzelnen Autoren als zweites Stadium bezeichnet wird.

Analysiren wir die einzelnen Symptome genauer, so lassen sie zuerst in zwei Gruppen gebracht werden: 1) in Symptome während des Anfalles und 2) in Symptome in der Zwischenzeit zw. Anfällen.

ad 1) Das Charakteristische bleibt immer der Ton, der die erste Inspirationen nach dem Stickenfalle, dem sog. „Ausbleiben“ der Vokalsprache begleitet. Es ist ein kräbender, pfeifender Schrei (crying inspiration der Engländer), der sich ziemlich genau dadurch laßt, dass man mit fast geschlossener Stimmritze eine schlurfende Inspiration ausführt und dabei den Vocal i hervorzubringen sucht. Zuweilen wird auch das Ausbleiben mit einigen solchen Inspirationen eingeleitet, in den meisten Fällen tritt aber der Anfall so plötzlich ein, dass den Kindern nicht mehr die Zeit laßen gelassen wird, sondern dass sie wie strangulirt lautlos nach Luft schnappen, wobei sie im Gesichte blauroth werden und zur möglichsten Erweiterung der Stimmritze den Kopf nach rückwärts beugen. Die Expiration ist unmittelbar nach dem Anfall oberflächlich und ängstlich, wird aber bald wieder ganz normal und ist von keinem pfeifenden Geräusch begleitet, wie dies beim Krampfkrampf gehört wird.

Prognostisch wichtig ist das Hinzutreten der allgemeinen Convulsionen vom Spasmus glottidis (2. Stadium). Es werden hierbei die Daumen eingeschlagen, die Vorderarme befinden sich in starker Flexion und sämtliche Adductoren der oberen Extremitäten gerathen in krampfartige Zusammenziehung. Die Füsse hingegen sind nur ausgestreckt, die grosse Fußzehe ist abducirt und nach aufwärts gezogen. Die Gesichtsmuskeln kommen in convulsivische Bewegung und der Rücken wird böh. Die Temperatur der Extremitäten ist eher vermindert als vermehrt. Diese allgemeinen Krämpfe sind offenbar von jenen der Glottis abhängig; denn sie kommen viel gekn mit diesen.

Das Gesicht wird während des Anfalles natürlich geröthet und selbst cyanotisch. Die congestionirten Augäpfel treten starr aus den Hüllen, die Zunge wird bläulichroth und die Halterennen strotzen. Im Gesichte prägt sich der Ausdruck der höchsten Angst aus. Während des Anfalles selbst ist es sehr schwer, den Puls zu fühlen oder das Herz zu auscultiren, es erscheint übrigens auch sehr theilnahmslos und deshalb ungeeignet, wenn der Arzt im Moment der höchsten Lebensgefahr seine Zeit auf eine derartige Untersuchung verwendete. Einige Minuten nachher ist der Puls noch deutlich unrythmisch und ungleich zu fühlen. Häufig geht der Stuhl, seltener der Urin während des Anfalles ab.

ad 2) Die Symptome zwischen den Anfällen sind verschieden; nach der Heftigkeit und Dauer derselben. Die meisten Kinder sind in der freien Zeit matt und verdriesslich, nur in leichten Fällen könt der vollkommene Appetit und ruhige Schlaf wieder, in den meisten, und hauptsächlich dann, wenn die Spasmi intensiv und schnell aufeinander folgen, klagern die Kinder ab, fiebern und verlieren den Appetit.

Dauer, Verlauf und Prognose.

Die Dauer dieser Krankheit lässt sich nicht durch einfache Terminbestimmung schildern. Zuweilen tödtet schon der erste Anfall, so dass in wenigen Secunden ein eben noch vollkommen gesundes Kind dem Tode verfallen ist. In anderen nicht so häufigen Fällen bekommen die Kinder viele Monate lang, so oft ein Zahn durchbricht, zeitweise eine krätkende, pfeifende Inspiration, es kommt aber nicht zu einem vollkommenen Stimmritzenverschluss, sondern es stellt sich nach einigen Secunden das normale Athmen wieder ein. Meistens aber verläuft die Krankheit in einem gewissen Cyclas, wobei eine Zunahme, ein Höhestadium und eine Abnahme derselben zu erkennen ist. Am Anfänge sind die Anfälle selten, wiederholen sich alle 8—14 Tage, mit der Zeit aber werden sie häufiger, sie treten endlich mehrmals täglich ein und nehmen an Intensität zu. Bis dieses Höhestadium erreicht ist, vergehen gewöhnlich 4—6 Wochen. Die Kinder gehen entweder in einem Anfälle zu Grunde oder sie bekommen nach 8—14tägiger Dauer dieses Höhestadiums Fieber, mageren ab, und es tritt wohl auch locale Pneumonie oder ein profuser Darmcatarrh hinzu, deren Folge ebenfalls der Tod ist. Die Genesung ist leider der seltenere Ausgang und eignet sich nur sehr selten, wenn einmal die Krankheit einen gewissen Grad von Heftigkeit überschritten hat. In diesem günstigen Falle lassen die Anfälle an Frequenz nach und hören endlich ganz auf. Die Kinder bleiben aber sehr in ihrer Entwicklung zurück, sind immer blass, schwächlich und zu Recidiven, die dann selten mehr ungünstig endigen, geneigt. Von 15 Fällen, die ich mir notirt habe, starben acht. Billiet und Barthoz beobachteten unter neun Fällen, Hérard unter sieben ein einziges Mal Genesung. Im Allgemeinen ist anzunehmen, dass diese Mortalitätsverhältnisse doch etwas zu ungünstig ausgefallen sind, indem man nur die schweren Fälle und diejenigen, wo man selbst Anfälle beobachtet hat und oft zu Hilfe gerufen worden ist, im Gedächtniss behält, während man die leichteren Formen, die dem Arzte wenig Mühe und dem Eltern keine so grosse Angst bereiten haben, eher übersieht.

Die Prognose richtet sich nach der Intensität und Frequenz der Anfälle, nach den Complicationen und nach den Ernährungsverhältnissen des Kindes. Am häufigsten genesen die Brustkinder, am seltensten mageren zur Atrophie geneigte Kinder. Je entwickelter und ausgedehnter die Craniotabes, deren Zusammenhang mit dem Spasmus glottidis im folgenden Absatze, der Aetiologie, genauer erörtert werden wird, um so ungünstiger gestaltet sich die Prognose.

Aetiologie.

Wir müssen unterscheiden zwischen den Ursachen, welche den einzelnen Anfall bedingen oder ihn begünstigen, und zwischen den allgemeinen zu dieser Erkrankung überhaupt disponirenden.

Zu den ersteren, den momentanen, gehört der Schrecken. Ein starkes, plötzlich entstehendes Geräusch genügt zur Erzeugung des Glottiskrampfes. Derselbe kann auch veranlasst sein durch Hinausdrücken der Zunge zum Zwecke einer Untersuchung der Mundhöhle, durch Schlingbewegungen, durch Husten und durch Schreien. Von dem durch Schreien entstehenden Stimmritzenverschluss ist aber jenes

Anbleiben streng zu scheiden, das sich sehr häufige, schon etwas ältere Kinder von 2–4 Jahren willkürlich erzeugen können. Es gibt sehr viele hauptsächlich schlecht erzogene, verwöhnte Kinder, die bei jeder geringen Gelegenheit ein Zetergeschrei anheben und sich dabei so gewaltig anstrengen, dass sie momentan keine Luft mehr bekommen, einen Augenblick dunkelroth oder selbst blauroth werden und dann mit einer pfeifenden Inspiration ihr Geschrei von neuem beginnen. Diese Art von willkürlichem Anbleiben ist durchaus nicht gefährlich und es ist gar kein Grund vorhanden, dass solchen Kindern ihr Willgeschrei, um diesen Zustand zu verhindern. Das schnellste, psychologische Heilmittel hingegen ist ein mit einem Male in das Gesicht gegossenes Glas Wasser.

Auf der Höhe der Krankheit bedarf es keiner näheren Ursache mehr. Der Anfall tritt im ruhigsten Schlafe, bei der ruhigsten Umgebung und zu jeder Zeit ohne alle Veranlassung ein.

Bei der Analyse der allgemeinen Ursachen ergeben sich ganz eigenthümliche Erscheinungen. Vor allem ist der Spasmus glottidis bezüglich des Geschlechtes dadurch ausgezeichnet, dass er Kinder viel häufiger befällt als Mädchen, was von den Autoren fast einstimmig anerkannt wird. Auch unter meinen 15 Fällen treffen 11 auf Knaben, so dass es scheint, als ob der Larynx der männlichen Kinder sich schon in frühester Jugend von dem der Mädchen durch die Form oder wenigstens die physiologische Thätigkeit zu unterscheiden beginne.

Das Alter, in welchem das Uebel auftritt, schwankt zwischen $\frac{1}{2}$ –3 Jahren, d. h. es tritt auf mit dem Durchbruch des ersten Zahns und endigt mit dem des letzten. Bei den Schneidezähnen, also im ersten Lebensjahre, stellt es sich viel häufiger ein, als bei den Eck- und Backenzähnen. Der Gedanke liegt sehr nahe, dass man eine direkte Fortpflanzung der in Folge der Zahnung gerötheten und geschwollenen Mundschleimhaut auf die des Larynx annähme. Es müsste aber bei der Glottiskrampf da am sichersten eintreten, wo die gefährlichen Zahnbeschwerden am ausgesprochensten sich zeigen, was nach meinen Beobachtungen der Fall durchaus nicht ist. Ich fand bei den meisten dieser Kinder die Mundhöhle nicht besonders geröthet und ohne reichliche Secretion.

Interessant ist die Erblichkeit. Es gibt Familien, in welchen alle Kinder mehr oder minder daran leiden und Powell erzählt sogar, dass von 13 von denselben Eltern erzeugten Kindern nur ein einziges verschont blieb. So viel ich die Mütter der von mir behandelten Kinder zu sehen bekam, waren sie alle ziemlich erregbarer Natur und erschwerten durch mannigfache hysterische Insulte die Pflege ihrer Kinder.

Der Zusammenhang der Craniotabes mit Spasmus glottidis (Tetanus apnoicus) wurde von Elsässer, dem Entdecker des weichen Hinterkopfs, zur Evidenz nachgewiesen. Nicht die Weichheit und Dehnbarkeit des Hinterkopfes an sich, sondern deren Folgen sind die veranlassende Momente anzuklagen, indem hierdurch die Gehirnhäute in einen unemwünschten Congestionzustand versetzt werden können; während plastische Auswürfungen findet man bei Kindern, die an diesem Uebel gestorben sind, gewöhnlich nicht. Elsässer's Entdeckung wurde nachträglich von vielen anderen Autoren, namentlich von Lederey

vollkommen bestätigt und es sind sogar einzelne Fälle bekannt gemacht worden, in welchen man durch einen Druck auf die erweiterten Stellen des rachitischen Hinterhauptes willkürlich den Glottiskrampf hervorrufen konnte. Ohne diese mechanische Ursache in Zweifel zu ziehen, muss sie doch nur als Ausnahme betrachtet werden; denn wenn dieselbe eine allgemeinere Geltung hätte, so müsste doch der Anfall häufiger im Schlafe, während die Kinder auf dem Hinterkopf liegen, als im wachen Zustande, wo sie meist schon aufrecht getragen werden, sich einstellen. Gerade das Gegentheil aber ist der Fall. Die von Elsässer besonders urgirten Hyperämien des Gehirnes und seiner Hülle sind viel wahrscheinlicher die Folge als die Ursache des Uebels, und wenn man ex juvenilibus et senilibus einen Schluss auf das Wesen einer Krankheit machen darf, so stehen sie in keinem ursächlichen Zusammenhang mit den Krämpfen, weil sonst durch örtliche Blutentziehungen und durch Ableitungen auf den Darmkanal dieselben gehoben oder gemindert werden müssten, was bekanntlich höchst selten zu erreichen ist. Wir müssen uns demnach darauf beschränken, das ausserordentlich häufige Zusammentreffen der Glottiskrämpfe mit Craniotabes als unwiderlegliche Thatsache hinstellen, den innern Zusammenhang zwischen beiden aber weiteren physiologischen und pathologisch-anatomischen Untersuchungen vorbehalten. Nach den neuesten sehr eingehenden Untersuchungen Oppenheimers ist dieser Glottiskrampf als Folge einer Reizung der centripetalen Vagusfasern aufzufassen, die durch Druck der erweiterten Vene im Foramen jugulare bei pathologischer Nachgiebigkeit des Ligamentum intrajugulare in Folge von Rachitis zu Stande kommt.

Störungen in der Verdauung können ebenfalls den Glottiskrampf verursachen, was auch schon daraus hervorgeht, dass eine vernünftige Regulirung der Diät, Weglassung schwerverdaulicher Nahrungsmittel eine deutliche schnelle Besserung bringt, während alle Behandlung fruchtlos bleibt, so lange die Verdauung in Unordnung, Flatulenz und Diarrhöe zugegen ist. Brustkinder erkranken nur äusserst selten an diesem Uebel, und von den künstlich aufgezogenen hauptsächlich die, welche die ihnen zugemuthete Kost nicht gehörig vertragen. Dass die Kinder wohlhabender Eltern ganz verschont bleiben, wie Rilliet in Genf beobachtet hat, kann man bei uns in München nicht behaupten. Es erkranken allerdings häufiger die Kinder armer Leute, man darf aber auch nicht vergessen, dass es deren in allen Städten eben viel mehr als reiche gibt.

Endlich hat Kopp und nach ihm eine grosse Anzahl von Aerzten die Thymusdrüse als veranlassendes und sogar als einziges Moment angenommen, so dass die Bezeichnung „Asthma thymicum Kopp“ häufig noch jetzt von älteren Aerzten gebraucht wird. Durch die pathologische Anatomie ist diese Theorie unhaltbar geworden. Man hat zu oft eine grosse Thymusdrüse in Leichen von Kindern gefunden, die an ganz anderen Krankheiten gestorben und niemals von Glottiskrampf befallen worden sind, und umgekehrt hat man in Fällen, wo dieser die Todesursache war, eine normale, selbst eine verkleinerte Thymus beobachtet. Es scheint deshalb gerechtfertigt, dass das Asthma thymicum als Krankheitsbenennung vollkommen aufgegeben wird.

Pathologische Anatomie.

Was den Larynx selbst betrifft, so ist der Leichenbefund regelmäßig ein negativer, und es wird also auch durch die anatomische Untersuchung die spasmodische Natur des Uebels bestätigt. Die übrigen Befunde sind nicht constant und deshalb auch nicht charakteristisch. Am häufigsten findet sich noch die Rharitis, am ausgeprägtesten an Hinterhaupt, ausserdem an den Rippen. Die Thymus ist bald gross, bald klein, bald in vollständiger Resorption begriffen. Im Darne finden sich zuweilen solitäre Schwellungen, in den Bronchien Catarrh, in der Lungen wohl auch Tuberculosis. Die Bronchiadrüsen namentlich sind dann zu grossen käsigen Tuberkeln entartet. Die Verdickung und Injection der Meningen ist ein häufiger Befund. Die Nu. vagi werden von einzelnen Autoren hart, von andern wieder weich gefunden.

Behandlung.

a) Prophylaxis. Wenn in einer Familie schon ein oder einige Kinder an Glottiskrampf zu Grunde gegangen sind, so schwelen die Eltern natürlich und mit Recht in fortwährender Angst, dass sie die nachfolgenden Kinder zur Zeit der Dentition ebenfalls wieder verlieren werden, weshalb sie sich auch zu jedem Opfer bereit erklären, um dieses Unglück verhütet werden kann. Es wurde in dieser Beziehung namentlich die Landluft empfohlen, wogegen jedoch einzuwenden ist, dass dieselbe nur während einiger Sommermonate, wo die Kinder wirklich in's Freie gebracht werden können, geniesbar ist, dass die Mutter sich in solchen Fällen nur sehr ungern von ihrem gewohnten Arzte trennt und dass der Aufenthalt auf dem Lande durchaus keine bestimmte Garantie gegen den Eintritt des Anfalles bietet. Ich selbst bin schon zweimal auf das Land zu Kindern mit exquisiten Glottiskrämpfen gehet worden, die dort geboren und noch niemals in die Stadt gekommen waren. Es scheint deshalb zweckmässiger, die Kinder unter der ärztlichen Aufsicht im östlichen Hause zu lassen und so mehrstündigen Genuss frischer Luft in einem nahegelegenen Garten zu sorgen. Solche Kinder müssen möglichst lange, wenigstens bis zum Durchbruch der ersten sechs Schneidezähne, an der Brust der Mutter bleiben. Den Eintritt der des Laryngismus meistens bedingende Schädelsrachitis sucht man durch fleissige Ventilation des Zimmers, durch Kühlen und kalte Waschungen des Kopfes und auch aromatische Bäder zu verhüten. Allenfallsige Verdauungsstörung müssen durch kleine Dosen kohlensaurer Alkalien, denen man in Verstopfung etwas Rheum beifügen kann, möglichst rasch beseitigt werden.

b) Behandlung des Anfalles. Bei der kurzen Zeit von einer Minute ist die Wahl der anzuwendenden Mittel eine sehr kleine, und es ist nicht zu begreifen, wie einzelne Autoren den Anfall mit Seilzügen, Brechmitteln, Clystieren verschiedener Art und mit warmen Bädern behandeln wollen, indem zu allen diesen Verfahren eine viel längere Zeit der Vorbereitung gehört. Das erste ist immer, das mit dem Kind aufhebt, um dem Larynx durch Zurückbeugung des Kopfes eine möglichst günstige Lage zu verschaffen, und dass man die die Brust beengenden Kleider so schnell als möglich beseitigt. In den wenigen Fällen, wo ich bei einem Anfalle selbst zugegen war, führte

ich den Zeigefinger in den Mund bis an die hintere Pharynxwand, bog dann den Kehlkopf mit der Fingerspitze in die Höhe und berührte die Stimmbänder selbst, worauf sogleich bedeutende Würgbewegungen und dann die bekannte prüfende schneidende Inspiration erfolgte. Die Laien können dieses Manöver nicht ausführen, und ich begnüge mich damit, ihnen zu zeigen, wie man durch einen Fingindruck auf die Zungenwurzel ganz constante Würgbewegungen erzeugen kann. Die Entstehung dieser Würgbewegungen ist das einzige ungefährliche Mittel, den Anfall abzukürzen. Von Auspritzen mit kaltem Wasser und von dem gewaltsamen Hin- und Herschwingen in der Luft, wie dies den Wärterinnen eigen ist, habe ich keinen bestimmten Erfolg gesehen, das Chloroform wird von einzelnen Aerzten, namentlich von Cox und Sinige, ausserordentlich empfohlen, es scheint mir aber doch unsatthaft, dasselbe von Laien ausüben zu lassen. Zur Tracheotomie, die auch als letzte Vitalindication aufgestellt worden ist, wird es wegen Mangel an Zeit noch niemals gekommen sein.

a) Causale Behandlung. Zur Bekämpfung des ausgebildeten Glottiskrampfes hat man eine so grosse Reihe von Mitteln empfohlen, dass die Menge derselben schon Misstrauen erregen muss. Das beliebteste war früher das Zinkoxyd von 0,12–0,6 pro die, ferner das Argent. nitric. 0,01–0,03 pro die, der Kupferazul, die Aca foetida, die Moschustinctur, die Aq. amygdalar. amar., Belladonna, Hyoscyamus, Opium, Tinct. cannab. indic., stündl. 5 Tropfen, kleine Dosen Calomel, Bromkalium, stündl. 0,03. In neuester Zeit kam das Chloralhydrat 0,06 pro dosi in Aufnahme. Bedenklich erscheinen die von Lang in Schaffhausen empfohlenen subcutanen Injectionen von Curare. Er bedient sich einer Lösung von 0,004 Curare auf 10 Gramm Wasser und spritzt von dieser Lösung 0,4–0,6 in die Nackengegend ein. Alle diese Mittel sind unsicher und haben durchaus keine spezifische Wirkung, indem die Mehrzahl der Kinder trotz aller Behandlung zu Grunde geht. Ein Mittel, wodurch die Rhachitis sicher zum Stillstand gebracht werden kann, ist der rohe, stark rauchig riechende Leberthran, und wenn man nun das häufige Zusammentreffen der Schädelrachitis mit dem Glottiskrampfe im Auge fasst, so hat derselbe den meisten Anspruch auf eine rationelle Behandlungsweise. In der That habe ich schon drei Kinder auf den einfachen Gebrauch des Ol. jecoris gesehen, nur schade ist es, dass es sehr häufig nicht vertragen wird, sondern Gastricium und Erbrechen verursacht, worauf es dann natürlich weggelassen werden muss.

Die Scarificationen des Zahnfleisches, von denen die Engländer vielfach Gebrauch machen, haben bei uns wenig Anklang gefunden. Ich habe sie bei einem einzigen Kinde, bei dem der siebente und achte Schneidezahn dem Durchbruch ganz nahe waren, energisch jedoch ohne allen Erfolg angewendet. Die Anfälle repetirten sich immer öfter, wurden intensiver und das Kind ging zu Grunde, obwohl das geschwollene Zahnfleisch ganz abgetragen war und die scharfen Ränder der Zähne vollkommen sichtbar wurden.

In neuerer Zeit habe ich neben dem innerlichen Gebrauch des Ol. jecor. zwei Kinder fortwährend in einer gelinden Campheratmosphäre erhalten, indem ich ihnen ein Stückchen Campher, in Leinwand eingewickelt, um den Hals hängen liess. Beide Kinder kamen durch; ob

diese Camphoratmosphäre etwas dazu beigetragen hat, kann erst nach deren öfterer Anwendung entschieden werden.

a) Paralysis glottidis.

Die Lähmung der Stimmritze ist eine seltene Krankheit, was eigentlich auffallend erscheinen muss, da am Halse so häufig Geschwülste vorkommen, die einen Druck auf den N. vagus und recurrens ausüben und hienit Lähmung der Kehlkopf Muskeln bedingen könnten. Bei Virisectionen sieht man nach Durchschneidung der Nn. recurrentes die Stimmritze sich weder bei der Inspiration erweitern noch bei der Expiration verengern, nur bei tiefen Inspirationen verengt oder verschliesst sie sich mechanisch, indem der stärker andringende Luftstrom den schlaffen Stimmritzebändern die Form zweier Kugelsegmente giebt, und dadurch die Ränder derselben einander nähert oder gar mit einander in Berührung bringt. Die centrale Glottidlähmung wird bei den meisten Sterbenden beobachtet und kann auch in ganz seltenen Fällen durch Geschwülste, grosse Tuberkel oder Krebse an der Basis des Gehirns längere Zeit vor dem Tode bestehen. Die periphere Glottidlähmung entsteht durch Druck auf den Halsheil der Nn. vag oder auf die Nn. recurrentes, welche nach den übereinstimmenden Untersuchungen von Volkmann, Langet etc., sowohl die Erweiterung als die Schliessung der Stimmritze allein vermitteln. Dieser Druck wird in der Regel ausgeübt durch scrofulöse Vergrösserung der längs des Vagus liegenden Lymphdrüsen, in welche man bei Sectionen den Vagus und Recurrens schon vollständig eingebettet, comprimirt, verdünnt oder abgeplattet gefunden hat. Nur auf diese Weise lassen sich die zuweilen aufretenden gewaltigen Respirationsschwierigkeiten scrofulöser Kinder erklären, bei denen die Drüsenschwellung oft so geringfügig ist, dass an eine direkte durch ihren Druck verursachte Athemböth gar nicht zu denken ist.

Symptome.

Das Hauptsymptom ist eine unausgesetzt erschwerte, rasche Athembewegung, welche bei jeder tieferen Inspiration durch Schreien, Lachen, stärkere Anstrengungen etc. veranlasst, in Hustenparoxysmen ausartet.

Das Athmungsgeräusch ist so laut wie beim Krup, unterscheidet sich aber vom Krupathmen durch den weniger schneidenden, mehr raselnden Ton und ausserdem durch die viel geringere Dyspnoe, die für gewöhnlich sehr unbedeutend, nur während der Hustenparoxysmen deutlich hervortritt und bis zur Orthopnoe sich steigern kann. Der Zustand ist immer chronisch und, wenn nicht andere Erkrankungen zufällig vorhanden, fieberlos. Die Stimme ist dabei rauh, heiser oder es ist selbst vollständige Aphonie zugegen.

Die Dauer dieses Übels lässt sich nicht bestimmen, einmal es sich spontan schwinden, obwohl die äusserlich sichtbaren Drüsenpoquete an Grösse zunehmen, so dass in der Tiefe eine Erweichung oder Resorption angenommen werden müsste. Die Prognose ist gewöhnlich ungünstig, es stellt sich bald eine ausgebreitete Bronchitis häufig auch Lungentuberculosis ein, welcher die Kinder in kurzer Zeit erliegen.

Behandlung.

Da die Scrofulesis fast regelmässig der Boden dieser Krankheit ist, so wird eine antiscrofulöse Behandlung dringend angezeigt sein. Der Leberthran ist entschieden das beste Mittel hiergegen, örtlich bewirkt eine 2—3 Mal wöchentlich wiederholte Einpönselung mit Jodtinctur am schnellsten eine Verkleinerung der Drüsen. Gelingt es auf diese Weise nicht, in 8—14 Tagen das Uebel zu heben oder wenigstens zu mindern, so ist die Exstirpation der betreffenden Drüsen dringend indicirt. Die Wirkung, welche die geschwellenen Drüsen äussern, zeigen zur Genüge, dass sie tief hinein sich erstrecken, und verlangen deshalb einen geübten, mit gründlichen anatomischen Kenntnissen versehenen Operator.

C. Schilddrüse.

Wenn wir von der ausserordentlich seltenen Thyreoiditis inflammatoria, traumatica, welche in Folge unserer Verletzungen, von Drusseln, Einklemmungen etc. auftreten kann, wie billig, absehen, so bleiben nur noch die verschiedenen Arten von Hypertrophie der Schilddrüse für die Betrachtung übrig.

Struma.

Unter Struma versteht man eine jede Vergrößerung der Schilddrüse. Die Volumzunahme ist bisweilen nur eine vorübergehende, gewöhnlich aber eine bleibende und zwar stetig zunehmende. Es hypertrophirt entweder die ganze Drüse oder nur ein Lappen und selbst nur kleinere Abschnitte eines Lappens, und je nach der Richtung, in welcher die Vergrößerung eintritt, sind die Compressionssymptome verschieden. Vergrössert sich die Drüse nach vorne und aussen, so dehnt sich die darüber befindliche Haut allmählig aus, und mit Ausnahme der hässlichen Formveränderung tritt keine weitere Störung in der Function der Nachbarorgane ein. Vergrössert sie sich aber nach den Seiten und nach rückwärts, so werden die Mm. sternocleidomastoidei, die grossen Gefässe und Nerven des Halses verschoben und es treten dann mannigfache Störungen der Circulation und Innervation ein. Dazu gesellen sich heftige Schling- und Respirationsschmerzen, wenn, was jedoch nur selten geschieht, die Struma den Oesophagus und die Trachea ringförmig umfaßt, und am schwersten werden die Symptome, wenn der untere Rand der Drüse sich in die Länge vergrössert, unter das Manubrium sterni hinterwächst und am nachträglich hier noch allen Seiten an Volumen zunimmt.

Die Vergrößerung der Drüse findet auf zweierlei Weise statt. Entweder entwickeln sich die Körner der physiologisch beschaffenen Drüse in grösserer Menge, wodurch eine ganz normale, nur an Masse hypertrophirte Drüsensubstanz entsteht (Struma lymphatica), oder es vergrössern sich einige Thyroidealkörner zu angedehnten Cysten, die selbst bei Kindern von einigen Jahren schon einen Durchmesser von 1 Zoll und darüber erreichen können (Struma cystica). Der Inhalt dieser Cysten ist eine dickflüssige, leimähnliche gelbe oder bräunliche Flüssigkeit, für die man den Namen Colloid erfunden hat. Die Cystenwandung ist bei den Kröpfen der Kinder regelmässig sehr dünn und

weich, während bekanntlich bei älteren Individuen beträchtliche Verdickungen und selbst Verkalkungen beobachtet werden. Die Cystenkröpfe fühlen sich blickrig und ungleich an, grössere Cysten fluctuiren deutlich, die lymphatischen Kröpfe zeigen nirgends eine kugelige Aufreibung und haben an allen Stellen gleiche Consistenz.

Zuweilen kommen Kinder mit angeborener lymphatischer Struma zur Welt, sind gewöhnlich asphyktisch und können nur schwer zum Leben gebracht werden, worauf sie dann fortwährend laut und mühsam respiriren. Die Kröpfe der Neugeborenen verschwinden merkwürdiger Weise nach einigen Wochen spontan. Gewöhnlich aber leiden ältere Kinder nach beendigter zweiter Dentition, namentlich häufig Mädchen, daran, und es kommen hier ebenso häufig lymphatische wie cystische Strumae zur Beobachtung. Die oben angeführten schweren Symptome von Verschiebung und Druck der Organe des Halses und von Compression der Trachea unterhalb des Sternum sind bei Kindern übrigens ausserordentlich selten, gewöhnlich wird die Hilfe bloss wegen des Schönheitsfehlers gesucht.

Behandlung.

Chirurgische Eingriffe sind bei der Gefährlichkeit der Kropfextirpation und selbst der einfachen Punction und Injection der Cysten nur gestattet bei lebensgefährlichen Symptomen, und sollten niemals wegen des Schönheitsfehlers allein unternommen werden. Die lymphatische Strumae verschwinden ohne Ausnahme auf 6—12malige Einspritzung mit Jodtinctur, in Intervallen von 3—6 Tagen angestellt. Die Cystenkröpfe verschwinden hiedurch nicht, verkleinern sich aber auch sichtlich und wachsen wenigstens nicht mehr weiter, so dass bei zunehmender Körpergrösse des Kindes die Formveränderung nur wenig mehr in die Augen springt. Die Jodtinctur wirkt auffallend rascher und sicher, als die Jodkaliumsalze, weshalb ich die letzteren niemals mehr benutze. Die Jodtinctur ist selbstverständlich contraindicirt bei allen schwächlichen männlichen Kindern und besonders auch bei Verdacht auf Tuberculosa. Schimmernde Tuberculosa kommt durch dieses perfide Mittel oft rasch zur Entwicklung.

D. Thymsdrüse.

Nachdem pag. 3 die Anatomie und Physiologie der Thymsdrüse schon erörtert worden, bleibt nur noch übrig, der wenigen pathologischen Befunde, die in seltenen Fällen vorkommen, zu gedenken.

Was das Asthma thymicum betrifft, so wurde schon oben im Abschnitte von Spasmus glottidis berichtet, dass die Grösse und Lagerung der Thymsdrüse wahrscheinlich gar keinen Einfluss auf diese Glottiskrämpfe hat, indem sie bei den Sectionen bald gross, bald klein gefunden wird. Der Name Asthma thymicum Keppii ist aber doppelt unrichtig, 1) weil die Thyms mit Asthma nichts zu schaffen hat und 2) weil lange vor Kepp, der seine Arbeit 1829 veröffentlichte, die grössten Autoritäten, wie Morgagni, P. Frank, Allan Burns etc. die Ansicht, dass die Thyms Stückerfülle veranlassen könne, vertreten suchten.

F. Weber fand bei Neugeborenen und bei Kindern, welche sich

zur Welt kamen, kleine Hämorrhagien im Parenchym der Thymus. Sie kommen neben starker Hyperämie des ganzen Organes vereinzelt oder in grösserer Menge vor und übersteigen nicht leicht die Grösse eines Stecknadelskopfes. Gewöhnlich finden sich auch Ecchymosen in anderen Organen. Weber führt alle diese Extravasate auf den Geburtsakt selbst zurück und gibt an, dass sie nur in den seltenen Fällen vermist werden, wo kleine Kinder bei weitem Becken aus irgend einer Ursache, die nicht auf Druckverhältnisse zurückzuführen ist, todt geboren werden. —

Bei todtgeborenen Kindern von syphilitischen Eltern sieht man in seltenen Fällen wirkliche Abscesse in der Thymus, muss sich aber wohl hüten, die physiologischen Hohlräume, welche einen weissen Saft enthalten und bei allen Kindern vorkommen, für Abscesse zu halten. Der Inhalt jener Hohlräume reagirt immer sauer, der der Abscesse, wie jeder Eiter, alkalisch. Im Allgemeinen muss bemerkt werden, dass bei den meisten an hereditärer Syphilis verstorbenen Kindern von diesen Eiterhöhlen nichts entdeckt werden kann. Ich habe wenigstens schon ein Dutzend solcher Kinder sectirt und erst ein einziges Mal eine Höhle gefunden, die einem Abscesse ähnlicher war als einem physiologischen Hohlraum, die Untersuchung der Reaction wurde leider verstimmt. Bodnar beobachtete auch Cystenbildung in der Thymus syphilitischer Kinder. Er fand bohnen-grosse mit heller, gelblicher Flüssigkeit gefüllte Cysten in der Drüse, oder die ganzen Lappen zu zwei grossen, gelben Cysten umgewandelt.

Tuberculosis der Drüse kommt nicht selten vor, man hat sogar die grosse genuine Tuberkelmasse, welche gewöhnlich ihren Sitz in den Bronchialdrüsen hat, in der Thymus gefunden, während erstere frei waren.

Zweimal schon fand ich bei Knaben von fünf und sechs Jahren Carcinom des Mediastinum anticum, das sich in beiden Fällen nur wenig auf die Lungen, die Pleura und den Herzbeutel ausdehnte, und demnach höchst wahrscheinlich seinen Ursprung von der Thymus genommen hatte.

Die Thymuserkrankungen sind mit Ausnahme des Krebses im Mediastinum anticum, der sich durch ausgedehnte Dämpfung an der vorderen Brusthälfte und durch die Zeichen des Druckes auf das Herz, die grossen Gefässe und die Lungen zu erkennen gibt, nicht zu diagnosticiren; denn die allerdings percuthbare Dämpfung in der Gegend des Sternums erlaubt noch keinen Schluss auf die Beschaffenheit der Drüse. Gegen pathologisch-anatomische Veränderungen, deren Symptome bei Lebzeiten aus entgehen, kann natürlich auch keine Behandlung eingeleitet werden.

E. Lungen.

- 1) Bronchialeatarrh. Catarrhus bronchialis acutus, chronicus.
Bronchitis.

Alle Schleimhäute sind im physiologischen Zustande mit einer gewissen Menge von Secret bedeckt, das die Function der Schleimhaut vermittelt. Die Bronchialschleimhaut secernirt nun ebenfalls eine

gewisse Quantität von Schleim und zwar gerade in einer Menge, welche hinreicht, ihre Verstockung zu verhindern. Eine jede Hyperämie derselben voraussetzt eine Vermehrung des Secretes, es wird mehr abgeschieden, als verdampfen kann, und die Folge hiervon ist eine Anammlung von Schleim in den Bronchien, welcher Zustand als Bronchialcatarrh oder in heftigeren Fällen als Bronchitis bezeichnet wird.

Pathologische Anatomie.

Der Bronchialcatarrh kann vorkommen entweder in den kleinen, erster und zweiter Ordnung allein, die kleineren sind intakt, oder umgekehrt die Hauptveränderungen finden sich in diesen, während die grossen Bronchien normal bleiben, oder endlich es können die Bronchien jeder Ordnung gleichmässig catarrhalisch afficirt sein. Selten werden beide Lungen zugleich ergriffen, was hauptsächlich im Typhus und den acuten Exanthemen vorkommt, und selten nur ist es die Bronchien einer Lunge der Catarrh überall gleich stark entwickelt. Gewöhnlich ist die Secretion in den unteren Lappen profuser und die Schleimhautveränderung bedeutender als an den Lungenspitzen, was wahrscheinlich auf rein mechanischen Verhältnissen beruht, indem an den oberen Lappen das Secret grössten Theils durch seine eigene Schwere in den Hauptbronchus gelangt, während es aus den unteren Lappen nur durch die Flimmerbewegung und gewaltsame Expirationen, Husten, dahin gefördert werden kann.

Die Schleimhaut ist an den erkrankten Stellen rosearoth, bei höheren Graden blassrothlich injicirt, diese Injection nimmt mehr und mehr zu und wird endlich in den höchsten Graden so dicht, dass die Schleimhaut einem schwarzrothen Sammet ähnlich sieht. Zu gleicher Zeit nimmt sie an Dicke zu, was man aus Querschnitten besonders leicht ersahen kann, wenn man den Querschnitt eines gesunden Bronchus mit dem eines catarrhalischen derselben Ordnung vergleicht. Die Schleimhaut erscheint übrigens leicht zerreiblich und lässt sich abheben in Lappchen vom unterliegenden Gewebe abheben.

Von der entzündlichen Rötthe muss jedoch eine Inhibitionsrötthe genau unterschieden werden, die man in allen Leichen findet, was die Färbung begrenzt hat. Bei Morbillen soll zuweilen, nicht immer, die Bronchialschleimhaut mit ähnlichen rothen Flecken wie die ganze Haut bedeckt sein, bei Variola kommen in der Trachea und in den Bronchien erster und zweiter Ordnung Varicellagusteln vor. Die Erisiemen, welche den chronischen Bronchialcatarrh Erwachsener begleitet, hat man bei Kindern, selbst wenn sie Jahre lang gehustet haben, nicht finden können.

Das Secret ist bald fein schaumig, weisslich, bald füllt es, wie nur wenigen Luftblasen durchsetzt, als dickflüssige gelbe Masse den ganzen Lumen eines Bronchus aus. Es besteht mikroskopisch aus wenig charakteristischen Epithelien, von denen die meisten eiförmig eine fertig gebildete Winkel erscheinen, und aus Eiterzellen, die hier ungewöhnlich gross, fein granulirt und kugelförmig sind. Ausserdem finden sich Entzündungskugeln und wohl auch hier und da ganze Stückchen erweichter Schleimhaut.

Uebt man auf den Durchschnitt einer catarrhalischen Lunge einen sanften Druck aus, so quillt aus allen erkrankten Bronchien ein

Tropfen dieses Secretes hervor, die Menge und Grösse der so entstehenden gelben Punkte im rothen Lungengewebe gestattet eine Taxirung der Ausdehnung und Heftigkeit des Catarrhs. Ob auch Fibrincoagula in diesen Secreten vorkommen, wie einzelne Autoren angeben, vermag ich nicht zu entscheiden, indem ich noch nie dergleichen gefunden habe. Eigenthümlich ist, dass solche catarrhalisch erkrankte Lungen bei Eröffnung des Thorax nicht collabiren, indem die massenhaft angelagerten Secrete eine Communication der äusseren Luft mit der in den Lungen verhindern. Bei lang bestehendem Catarrh erweitern sich die Bronchien etwas, indem eine Atonie der Schleimhaut sich einstellt. Die Erweiterung ist aber immer nur eine geringe, cylindrische, niemals eine blasige; die blasigen Bronchiektasien kommen im Kindesalter überhaupt nicht vor. Sehr gewöhnlich erkrankt bei Bronchialcatarrh schliesslich auch eine oder die andere Partie des Lungengewebes als lobuläre Pneumonie, die in dem folgenden Abschnitte speciell besprochen werden wird.

Symptome.

Dieselben theilen sich in subjective und objective. Die subjectiven kommen erst bei Kindern, die über zwei Jahre alt sind, in Betracht und bestehen in Schmerz längs des Sternums, wenn sich während des Hustens ein gürtelförmiger Schmerz, der Insertion des Zwerchfelles entsprechend, gesellt, und zuweilen in einem allgemeinen Unbehagen, das sich durch Weinerliches Wesen und Unlust an den gewohnten Spielen zu erkennen gibt. Die objectiven ergeben sich aus der physikalischen Exploration, aus der Beschaffenheit des Hustens, des Auswurfes und des allenfalls vorhandenen Fiebers. Das auffälligste Symptom ist immer der Husten, er allein ist es, der die Angehörigen veranlasst, Hülfe zu suchen. Gewöhnlich sind die Hustenanfälle ziemlich heftig und dauern $\frac{1}{2}$ —1 Minute, wiederholen sich stündlich mehrmals, werden im Schlafe wohl seltener, sistiren aber nicht vollständig. Viele Kinder schlafen trotz des Hustens fort, andere aber wachen jedesmal auf und kommen durch diese häufigen Unterbrechungen der Nachtruhe sehr herunter. Sehr verdächtig ist das kurze, sogleich wieder abgesetzte, frequente Hästeln, welches gewöhnlich auf Tuberculosis deutet. Ein schlimmes Zeichen ist ferner, wenn die Kinder auf eine oder die andere Seite gelagert stärker husten als in der Rückenlage, indem diesem Husten auch meist materielle grössere Veränderungen des Lungengewebes zu Grunde liegen. Die Kinder mit einfacher Bronchitis husten in der Rückenlage weniger als in aufgerichteter Stellung, ein Unterschied zwischen Rücken- und Seitenlage ist bei ihnen nicht zu bemerken. Auch ist der dadurch entstehende Schmerz nicht so heftig, dass die Kinder jedesmal schmerzlich das Gesicht vorziehen und auch vollendetem Husten weitere Schmerzensäusserungen von sich geben müssten.

Der Auswurf, bei Erwachsenen ein so wichtiger Anhaltspunkt für die Beurtheilung der Lungen, kommt bei Kindern fast niemals zu Tage. Man hört wohl am Tone des Hustens, ob aus dem Larynx Schleim heraufbefördert wird oder nicht, die räusperten und rotirenden Bewegungen der Zunge aber verstehen Kinder bis zum dritten und selbst fünften Jahre noch nicht zu machen, sondern schlucken das

an der Zungenwurzel angelangte Sputum regelmäßig wieder hinaus. Nur wenn die Hustenanfälle sehr heftig sind und die Kinder dabei den Mund weit öffnen, bemerkt man zuweilen einzelne Sputa, öfter kann man sie sich leicht verschaffen, wenn man unmittelbar nach einem lockeren Husten mit einem reinen Leinwandlappen über die Zungenwurzel streift, wobei sie an dem Lappchen hängen bleiben. Beim Bronchialcatarrh sind die Sputa entweder weiss und feinschaumig oder gelblich und dann in der Regel weniger reich an Luftblasen. Sie sind niemals blutig gefärbt, doch können, wie bei jeder heftigen Anstrengung, auch durch Husten einzelne kleine Blutungen im Kehlkopf, dem Rachen oder der Mundhöhle eintreten, deren Blut sich aber niemals mit den Sputis gleichmässig mischt, sondern immer nur in einzelnen Streifen oder Klümpchen sich zeigt. Der Ausdruck des Gesichtes ist in den meisten Fällen von einfachem Bronchialcatarrh nur wenig verändert; da in der Regel kein Fieber zugegen, so ist auch die Hauttemperatur am Kopfe nicht erhöht und keine Rötung der Wangen bemerkbar. Ist aber die Bronchitis sehr verbreitet, sind die Bronchien aller Ordnung in beiden Lungen ergriffen, so tritt eine sehr auffallende Cyanose ein, für die man, wenn man ein solches Kind zum ersten Male zu Gesicht bekommt, vergeblich eine andere Ursache in der Circulation sucht. Eine so ausgedehnte Bronchitiserkrankung ist höchst gefährlich, die Respiration mühsam wie bei Pneumonie und der Tod erfolgt gewöhnlich durch Erstickung. Nur ausnahmsweise findet man bei der Section das Lungenparenchym vollständig intakt, gewöhnlich ist an einigen Stellen lobuläre Pneumonie eingetreten.

Die physikalische Untersuchung der Lungen kleiner Kinder wird schon im Allgemeinen Theile pag. 16 eingehend besprochen. Als dort angegebenen Cautelen und Abweichungen von der Untersuchung der Erwachsenen müssen in den nun folgenden Abschnitten der verschiedenen Lungenkrankheiten fortwährend berücksichtigt werden. Die Untersuchung grösserer Kinder, die über das fünfte Jahr hinaus sind, unterscheidet sich in nichts mehr von der der Erwachsenen, bei Kindern vor 1—5 Jahren aber hängt die Möglichkeit einer solchen vollständig von dem Benehmen des Arztes ab. Die Hauptsache ist und bleibt immer, dass man sich mit dem Kinde zuerst befreundet und es erst nach einiger Zeit untersucht. Wenn man das Kind einfach aussticht lässt und ohne weiteres Percussion und Auscultation beginnen will, so wird man unter 100 Kindern wenigstens 99 Mal ein Zorngehoi veranlassen, das nicht eher aufhört, als bis der Verursacher desselben sich gänzlich zurückzieht, ja noch mehr, es wird immer wieder so gehen, so oft der misliebige Kinderarzt wiederkehrt, wobei natürlich von einer Diagnose und rationalen Behandlung niemals die Rede sein kann.

Die Percussion gilt im Bronchialcatarrh durchaus negative Resultate, der tympanitische Beiklang ist gewöhnlich sehr exquisit vorhanden und die während der Bauchpresse auftretende physiologische Dämpfung rechts hinten ist bei kleinen Kindern, die an Bronchialcatarrh leiden, um so deutlicher, als durch die angehäuften Schleimmassen noch leichter eine momentane Absperrung der Bronchialluft zu Stande kommen kann.

Die Palpation ist die nützlichste und zugleich einfachste Untersuchungsmethode. Man fühlt beim Bronchialcatarrh ein deutliches Schnarren und Rasseln am ganzen Thorax, am stärksten in der Regel am Kehlkopf und an der Trachea, weil eben hier am häufigsten die grossen Schleimblasen platzen und einzelne zähe Schleimlamellen durch die auf- und abströmende Luft in Schwingungen versetzt werden. Wenn man von der Ausdehnung, in der man die Rasselgeräusche am Thorax fühlt, einen Schluss machen wollte auf die Ausdehnung des Catarrhes, so wäre dies ein arger Irrthum. So oft ein einigermaßen lautes Rasselgeräusch im Larynx sich bildet, fühlt man dasselbe am ganzen Thorax, und es genügt zuweilen eine einzige kräftige Hustenbewegung, welche den das Geräusch veranlassenden Schleim aus dem Kehlkopf herausbefördert, den Rhonchus auf der ganzen Brust verschwinden zu machen. Nur wenn man im Halbe keine Rasselgeräusche fühlt, hingegen auf einer Seite oder nur an einer umschriebenen Stelle solche wahrnimmt, verschwinden dieselben nicht nach so kurzer Zeit, sondern werden meist mehrere Tage oder Wochen lang beobachtet. Wenn überhaupt auf das Fühlen der Rhonchi grosses Gewicht gelegt werden soll, so ist ihr Auftreten auf einem kleinen Fleck ein ungünstigeres Zeichen als ihre Verbreitung über das ganze Brust, insofern im ersten Falle der Bronchialcatarrh sich in Bronchien 3.—4. Ordnung etablirt hat, während im letzteren möglicher Weise ein einziges Spatium in der Trachea, das in den nächsten Stunden ausgehustet wird, die Ursache sein kann. Ist das über den ganzen Thorax verbreitete Rasselgeräusch aber constant, Tage und Wochen lang zu fühlen, so ist dies ein Beweis von ausgedehntestem Bronchialcatarrh, der gewöhnlich schon mit ziemlicher Dyspnoe verbunden ist.

Durch die Auscultation lernen wir im Bronchialcatarrh wenig mehr als durch die Palpation. Bei einiger Uebung kann man die Rhonchi ebenso gut fühlen als hören, ja man ist sogar im Stande, die Höhe und Rauigkeit zu unterscheiden und hat dabei den Vortheil, dass man die Untersuchung schneller, genauer und bei geringeren Widerstände von Seite des Kindes vornehmen kann. Die Auscultation ist nur deshalb wünschenswerth, weil man durch sie eine Complication mit Pneumonie, die sich durch Knisterrasseln und später Bronchialathmen zu erkennen gibt, diagnostiziren kann. Der Annahme einzelner Autoren, dass bei Bronchitis capillaris Knisterrasseln gehört werden soll, kann ich nicht beitreten. Es fiel durch diese Annahme das letzte Unterscheidungsmerkmal zwischen Bronchitis und Pneumonie weg und die ohnedies schon heillose Verwirrung würde hiernach nur noch vergrößert. Wo Knisterrasseln bei einem Kinde gehört wird, da ist kein einfacher Catarrh der kleinen Bronchien mehr, sondern eine pneumonische alveoläre Erkrankung anzunehmen. Für den Bronchialcatarrh und die Bronchitis spricht bloss die Anwesenheit von Rhonchi der verschiedensten Art und von rauhem Vesiculärathmen; Knisterrasseln oder gar Bronchialathmen darf hier nicht vorkommen.

Die Art der Athembewegung ist bei Kindern mit gewöhnlichem Bronchialcatarrh nicht abweichend von der physiologischen Beschaffenheit, nur bei grosser Ausdehnung wird die Respiration frequenter und mühsamer, da sich aber hiezu meistens Fieber gesellt, das an und für sich die Bewegungen auch ganz gesunder Lungen beschleunigt, so ist

nicht zu ermitteln, wie viel von der frequenten Respiration auf den Catarrh, wie viel auf das Fieber zu schieben ist. Die jede Inspiration begleitenden Bewegungen der Nasenflügel sind im Bronchialcatarrh sehr selten und zeigen fast ohne Ausnahme eine Complication mit Pneumonie an.

Die Dauer dieses Uebels ist eine sehr verschiedene, je nach der Ursache und der Constitution des Kindes. Ein nicht zu Catarrhen geneigtes Kind kann durch äussere Reize, Abkühlung des Thorax, zu kalte Luft, schädliche, verunreinigte Luft sich Husten ziehen. Derselbe wird aber niemals lange dauern, sondern in wenigen Tagen wieder verschwinden. Hingegen gibt es andere Kinder, welche, ohne von tuberculösen Eltern zu stammen oder selbst tuberculös zu sein, Jahre lang an Bronchialcatarrh mit einzelnen Remissionen leiden, und endlich haben wir die wirklich tuberculösen, welche ihn fast niemals verlieren. Die Prognose ist nicht immer so günstig zu stellen, als man bei dem allgemeinen Wohlbefinden anzunehmen geneigt wäre. Die einfache Bronchitis kann bei grosser Ausdehnung durch Ersticken tödtlich werden, die auf Tuberculose basirte gestattet natürlich nur eine höchst zweifelhafte Prognose.

Aetiologie.

Es gibt kaum ein Kind, das nicht in den ersten Lebensjahren einen Bronchialcatarrh gehabt hätte, und es gibt kein Alter, in welchem derselbe so constant verkäme, als in dem der ersten Kindheit, namentlich zur Zeit der ersten Dentition. So husten z. B. alle Kinder, die während des Zahnens geifern, indem der Speichel fortwährend die Kleider durchnässt und eine Abkühlung der Brust bedingt. Im Winter ist der Bronchialcatarrh allgemeiner verbreitet als im heissen Sommer, in den Städten und den Quartieren der Armen häufiger als auf dem Lande. Kinder, die in staubigen Werkstätten aufgezogen werden, leiden gewöhnlich und Kinder von tuberculösen Eltern so regelmäßig daran, dass es den letztern gar nicht mehr auffällt und so liess es nichts mehr erwähnen, wenn sie nicht speciell gefragt werden. Ausser diesen mehr äusseren Veranlassungen gibt es aber auch noch ein Contagium, das den Bronchialcatarrh von einem Individuum auf das andere fortpflanzt, nämlich die Influenza, die Grippe. Dieselbe besteht im Wesentlichen auch nur aus einem Bronchialcatarrh, der durch heftige Symptome und Appetitmangel eingeleitet wird, und verschont kein Alter, selbst das der jüngsten Säuglinge nicht. Bei gesunden Kindern nimmt die Grippe ihren regelmässigen Verlauf und endet nach 2—3 Wochen mit vollständiger Genesung, bei tuberculösen hingegen leitet sie oft die Weiterentwicklung der Dyskrasie ein, die Kinder husten fort und fort, bekommen Fieber und gehen endlich hektisch zu Grunde.

Der Bronchialcatarrh tritt ferner als Complication bei einer Menge allgemeiner Erkrankungen auf. So leidet die Bronchialschleimhaut gleich der Darmschleimhaut bei jedem Typhus mit, und in leichten Fällen von Febris typhoides ist dieses nie fehlende Symptom der wichtigste für die Aufrechterhaltung der Diagnose.

Bokitsansky ist sogar der Meinung, dass die Bronchitis, die Bronchostase, die Grundlage der exanthematischen ansteckenden Typhus, wie sie z. B. in Irland vorkommen, bilde.

Die ausführlicheren Angaben hierüber wurden schon pag. 170 bei Abdominaltyphus gemacht.

Endlich ist der Bronchialcatarrh ein nie fehlendes Symptom bei Morbillen, wo er wahrscheinlich durch eine morbilläre Efflorescenz der Schleimhaut entsteht und deshalb ohne jegliche Ausnahme vorkommen muss. Häufig, jedoch nicht immer, findet er sich bei Scharlach, Scloten und mächten Pocken.

Behandlung.

Es gibt kein Mittel, welches einen entschiedenen, direkten Einfluss auf den Verlauf des Bronchialcatarrhs hätte. Alle bisher angegebenen Behandlungsmethoden versagen häufig ihre Dienste. Zwei Symptome sind es hauptsächlich, deren Bekämpfung angestrebt werden muss, die Dyspnoe und die übermässige Secretion. Die erstere entsteht durch massenhafte Anhäufung von Bronchialschleim, mit dessen Entfernung auch die Athemnoth verschwindet, und das beste Mittel, diese zu bewirken, ist der Brechakt. Es ist nicht nothwendig, starke Brechmittel zu geben, es entsteht hiedurch das Erbrechen zu rasch und die Würgbewegungen, auf die es hierbei eigentlich ankommt, stehen durchaus nicht im geraden Verhältniss zur Grösse der Basis. Eine sehr gute Art anhaltendes Wirken und Erbrechen zu bewirken, besteht in Darreichung eines starken Ipecacuanakinfusses (4,0 auf 30,0 Wasser), von dem schon ein Kaffeelöffel die kräftigste Wirkung macht, ohne den Darm in Mitleidenschaft zu ziehen. Wenn mit und unmittelbar nach dem Erbrechen nicht grössere Mengen Schleim sich entleeren und die Respiration dadurch freier wird, so nützen fernere Brechmittel auch nichts mehr, sondern erzeugen nur einen chronischen Magencatarrh, wobei die Kinder ausserordentlich herunterkommen. Aus der Klasse der Expectorantien sind vorzüglich die vegetabilischen anzurathen und nur da in Anwendung zu bringen, wo keine Verdauungsstörung besteht. Stellt sich die letztere ein, so ist der Schaden der Expectorantien viel greifbarer als ihr überhaupt problematischer Nutzen, was hauptsächlich für die Antimonialien, Brechweinstein, Goldschwefel, Kermes-mineralis und das weisse Antimonoxyl gilt. Der in der Bronchitis Erwachsener so sehr beliebte Salmiak ist den Kindern gewöhnlich unter keiner Form beizubringen. Am besten eignet sich bei acutem Bronchialcatarrh ein ganz leichter Infus. Ipecac. 0,05 : 30,0 mit etwas Oxymel simplex oder eine sehr verdünnte Lösung kohlensauren Kalis 0,10 : 30,0. Terpentineinreibungen werden von Little als vorzüglich empfohlen, alle 2—3 Stunden repetirt und die Brust dann mit Flanell bedeckt. Werden die Anfälle mehr spastisch, so sind die Antispasmodica und Narcotica angezeigt, welche nicht nur eine günstige abkürzende Wirkung auf die Heftigkeit des Hustens, sondern auch auf den Verlauf im Allgemeinen haben. Hierher gehört vor Allen die *Aq. amygdal. amar.* 2—3 Mal so viel Tropfen pro dosi als das Kind Jahre zählt, täglich 3—4 solche Dosen, dann die Opiumtinktur in der schon mehrmals angegebenen Dosis, das Extr. belladon. 0,003—0,005 mehrmals täglich etc.

Liegt Tuberculose dem Catarrh zu Grunde, so bleibt diese symptomatische Behandlung in der Regel ganz fruchtlos. Es muss in diesen Fällen *Ol. jecor.*, Eisen oder China versucht werden. Chinapulver, messerspitzenweise gereicht, ist fast allen Kindern gut beizubringen.

leiden, und ich sah schon mehrmals auf seinen 4—8 Wochen lang fortgesetzten Gebrauch höchst verdächtige Bronchialcatarrhe, von häufigen Fieberexacerbationen und Abmagerung begleitet, wieder verschwinden. Die Temperatur, in welcher sich solche Kranke befinden, sei gleichmäßig warm, die Kleidung wärmer als in gesunden Tagen, das Getränk werde möglichst oft gereicht, damit ergiebige Schweisse sich einstellen. Wo die Ursache des Catarrhes noch fortbesteht, muss natürlich für deren Entfernung Sorge getragen werden, namentlich ist darauf zu dringen, dass die Kinder nicht in stäubigen Werkstätten liegen, wie dies bei der arbeitenden Klasse so häufig vorkommt.

Zur Verhütung weiterer Bronchialcatarrhe, zur Abtölpelung der Disposition ist eine systematische Abhärtung dringend anzurathen. Bezüglich der Kleidung lassen sich keine bestimmten Vorschriften geben, sie darf jedenfalls nicht so warm sein, dass sie dem Kinde lästig fällt und dass es schon bei mässiger Körperbewegung in Schwitzgerüth. Es werden durch eine solche Verweichlichung gewiss viel mehr Catarrhe erzeugt als verhütet. Die beste und rationellste Abhärtung ist eine kalte Waschung des ganzen Körpers, bevor die Kinder Abends zu Bett gehen, womit schon nach dem Durchbruch der Eekathie begonnen werden kann.

2) Lobuläre und lobäre Lungenentzündung. *Pneumonia lobularis et lobaris.*

Die Lungenentzündungen kommen bei Kindern ausserordentlich häufig vor, gewöhnlich aber in einer Form, welche pathologisch anatomisch ein ganz anderes Bild bietet, als wir es bei Sectionen von Erwachsenen zu sehen pflegen. Die Lungen entzündet sich nämlich nicht in grosser Ausdehnung durch ganze Lappen, sondern nur an einzelnen kaum erbsengrossen Stellen, zwischen welchen sich wieder normales Gewebe in ziemlicher Menge findet. Ein Process, den man richtig bezeichnend lobuläre Pneumonie genannt hat. Es kommt wohl auch lobäre Pneumonie vor, allein verhältnissmässig viel seltener, sie kann idiopathisch und mit einem Schlage, wie bei Erwachsenen, sich einstellen, gewöhnlich aber ist sie, gleich der Pleuritis der Neugeborenen, pyämischer Natur. Im letzteren Falle endet sie immer tödtlich, übrigens ist auch bei der nicht pyämischen, lobulären Pneumonie die Prognose höchst ungünstig. Die lobuläre Pneumonie ist im Säuglingsalter eine ausserordentlich häufige Krankheit und rafft besonders viele Kinder während der Zahperiode fort. In den Firdelhäusern sterben viele Kinder daran und man hat als Ursache auch die anhaltende Horizontalage, in welcher die Kinder Tag und Nacht gehalten werden, beschuldigt. Es spricht für diese Ansicht auch in der That der Umstand, dass bei den meisten Sectionen die hinteren und untern Parthieen der Lungen, also die am tiefsten gelegten Theile, am häufigsten erkrankt gefunden werden. Ausserdem hat sich statistisch herausgestellt, dass im Winter viel mehr Kinder daran erkranken als im Sommer und dass man niemals eine Stelle der Lunge lobulär entzündet findet, zu der nicht auch Bronchien führten, die einen beträchtlichen Grad von Catarrh zeigen. Es gestaltet sich das Verhältniss der lobulären Pneumonie zum Bronchialcatarrh wahrscheinlich so, dass das sich

senkende Secret auf die Endigung des betreffenden Bronchialgebietes chemisch und mechanisch reizend wirkt und dass sich secundär an den gereizten Stellen kleine Pneumonien entwickeln. Wir haben hier also das Verhältniss der Ursache zur Wirkung. Dasselbe ereignet sich auch in den meisten Fällen von Krup, doch ist hier die lobäre Pneumonie fast ebenso häufig als die lobuläre, und die Ausdehnung der Membranen — ob dieselben dick oder dünn, auf kleine Stellen beschränkt sind oder allseitig weit in den Bronchialbaum hinabsteigen, — ist von keinem besonderen Einfluss auf die Entstehung der Pneumonie. Ferner findet sich dieselbe fast in allen Leichen des an Zellgewebeverhärtung verstorbenen Kinder und tritt auch häufig als Schlussakt in tuberculösen Lungen auf.

Pathologische Anatomie.

Die pathologisch anatomischen Vorgänge sind, wie schon die Namen bezeichnen, zweierlei Art, allein nicht nur der Ausdehnung, sondern auch der Qualität des Exsudates nach unterscheidet sich die lobuläre Pneumonie von der lobären.

Die lobäre oder krupöse Pneumonie ist mit Ausnahme der metastatischen, pyämischen in Gebärd- und Findelhäusern vorkommenden, im Säuglingsalter merkwürdig selten, wo sie aber vorkommt, zeigt sie dieselben anatomischen Veränderungen, wie bei Erwachsenen. Auch hier haben wir eine rothe und eine graue Hepatisation, je nach der Zeit des Eintrittes des Todes. Das Exsudat ist nicht zwischen den Lungenalveolen, noch in deren Wandungen, sondern in die Höhlen selbst eingeschoben, füllt sie total aus und hat die Eigenschaften des rein krupösen Exsudates. Die roth hepatisirte Lunge collabirt nicht bei Eröffnung des Thorax, sie ist ganz luftleer, die Schnittfläche ist trocken, braunroth, meist gleichmässig körnig und es lassen sich solche Lungenparticlen brechen wie das Parenchym der Leber. Die körnige Beschaffenheit des Durchschnittes entsteht, indem die durch starres Exsudat geschwollenen Alveolen durch die dazwischen liegenden, elastischen Fasern stellenweise gehoben werden. Die rothe Färbung des Exsudates rührt von eingestreuten Blutkörperchen her.

Das anfangs bis auf die Blutkörperchen amorphe Exsudat erweicht alsbald zu eierse- und schleimartigen Massen, und bald tritt Bildung von Zellen ein, welche sowohl von der Alveolenwand als dem Exsudat aus sich bilden. Mittlerweile lösen sich die Blutkörperchen auf, ihr Farbstoff verschwindet, die ganze Masse entfärbt sich, — graue Hepatisation, — und das Exsudat wird dem Eiter immer ähnlicher, weshalb die Franzosen es auch Infiltration purulente genannt haben. Der endlich zu einer Milch verfließende Inhalt der Alveolen wird sofort resorbirt, und es ereignet sich hier der im Körper ziemlich seltene Vorgang einer vollkommenen Restitutio in integrum. Ausnahmsweise bilden sich auch wirkliche grössere Abscesse, noch seltener kommt eine völlige Verödung und Verhärtung, Induration des Lungengewebes oder gar Gangrän zu Stande. Zur Tuberculisirung einer lobären Pneumonie, wie sich diess bei Erwachsenen zuweilen findet, kommt es bei Kindern fast nie, indem tuberculöse Kinder gewöhnlich schon in den ersten Tagen, nachdem sie ihre krupöse Pneumonie acquirirt haben, zu Grunde gehen.

Die lobuläre Pneumonie, inselartige Verdichtung, ist keine krupöse, sondern eine catarrhalische Entzündung. Es erkranken hier kleine Stellen im gesunden Lungensparenchym, die, wenn sie sich zuweilen coalesciren, doch nicht das Bild der krupösen lobären Pneumonie bieten. Die Erkrankung ist gewöhnlich auf beiden Lungen, rechts meistens stärker, und befällt am öftesten die hinteren Parttheen der unteren Lappen. Solche Lungen collabiren nicht vollkommen, was nicht so fast von der lobulären Pneumonie als von dem stets sie begleitenden Bronchialcatarrh herrührt, und betastet man sie nach verschiedenen Richtungen, so findet man in der Tiefe oder an der Oberfläche einzelne härtere Stellen. Schneidet man nun auf diese Stellen ein, so sieht man auf dem Querschnitte bläulichrothe, dichtere Flecken ohne scharfe Abgrenzung. Die Wände der Alveolen sind stark gewulstet und durch Abstreifen der Schnittfläche mit der Messerklinge erhält man ein röthlich schleimiges, nur spärlich schäumendes Secret. Indem die umgebende Lungensubstanz meist emphysematös ist, so erscheinen die lobulären Pneumonien etwas unter dem Niveau der Lungenoberfläche und sind sogleich durch ihre dunklere Färbung kenntlich. Schneidet man solche Stellen mit Vorsicht aus, so dass keine normale Lungensubstanz damit in Verbindung bleibt, so gehen sie vollkommen im Wasser unter und zeigen keine Spur mehr von Crepitation. Durch Aufblasen der ganzen Lungen werden sie aber einigermaßen wieder lufthaltig, zum Unterschied von der krupösen Pneumonie, bei der das Einblasen ohne alle Wirkung bleibt, doch behalten die aufgeblasenen, lobulär entzündeten Stellen immer eine dunklere Röthung und fühlbare Härte. Die mikroskopische Untersuchung ergibt, dass die Lungenbläschen mit massenhaft gebildeten Epithelien und flüssigem Exsudat erfüllt sind. Wir haben also keine rothe und keine graue, überhaupt keine Hepatisation, wenn immer ein starkes Exsudat gehört, und deshalb auch keine verschiedenen Stadien. Wenn lobuläre Pneumonien coalesciren, so unterscheiden sie sich doch noch immer von den krupösen lobären durch das Fehlen der Brüchigkeit, durch die Möglichkeit des Luft Eindringens mittelst Aufblasen, durch grössere Feuchtigkeithalt und durch die jeder Zeit ruhenden, dazwischenliegenden, freien Parttheen. Der Process bleibt immer catarrhalischer, wird nie krupöser Natur, und charakterisirt sich besonders durch das gleichzeitige Auftreten in verschiedenen Stellen in beiden Lungen, weshalb auch Lebert's Bezeichnung „inselartige Verdichtung“ die zweckmässigste sein dürfte.

Ausserdem findet man bei oberflächlicher Lage der Pneumonie Anschwellungen auf der Pleura und regelmässig Bronchitis in den zu den entzündeten Stellen führenden Bronchien. Im Anschlusse an den des Rückenmarks soll das Secret vermehrt sein. Die gewöhnlichsten Complicationen sind Scur, Enteritis folliculosa und Zellgewebeerkrankung.

Symptome.

Die Symptomatie der lobulären und lobären Pneumonie lassen sich fuglich zusammenfassen, da sie sich bis auf ein einziges, durch Perussion zu eruirendes, nur wenig von einander unterscheiden. In der aus folgenden Schilderung sind nur kleine Kinder bis zum besetzten zweiten Lebensjahre gemeint. Kinder, die über die erste Dentition

hinaus sind, haben nur selten mehr lobuläre Pneumonie, sondern lobäre, die sich aber in keiner Weise von der der Erwachsenen unterscheidet. Die physikalische Diagnose der kindlichen Pneumonie hat grosse Schwierigkeiten und erfordert viel Zeit und Geduld. Die Kinder sträuben sich fast regelmäßig und heben ein Geschrei an, das alles fernere Untersuchen unmöglich macht. Dann fehlen auch die Sputa gänzlich, und erst wenn sie fehlen, empfindet man, wie sehr man ihrer bedarf zu einer bestimmten Diagnose. Dafür aber wird man durch das charakteristische Aussehen und die ganz eigenthümliche Art der Respiration entschädigt, deren Zeichen oft so ausgesprochen sind, dass man bei einiger Uebung eine solche Säuglingspneumonie diagnostiziren kann, bevor das Kind entkleidet worden.

Der Anfang der lobulären Pneumonie ist selten genau zu constatiren, indem immer längere Zeit Bronchialcatarrh vorausgeht und der Uebergang in die Pneumonie nicht mit einem Male erfolgt. Gewöhnlich beginnen die Kinder mit einem fieberlosen Husten, derselbe nimmt mehr und mehr zu, es stellt sich etwas Fieber ein, die Hauttemperatur wird immer höher und nach einigen Tagen hat sich die ganze Symptomengruppe der Pneumonie entwickelt.

Das augenfälligste Symptom ist eine enorme Beschleunigung der Athembüge, die auf 60–80 in der Minute steigen können und einen umgekehrten Rhythmus annehmen. Während in gesunden Tagen der Accent auf der Inspiration liegt, und wenn überhaupt ein Respirationsekt hörbar, der des Einathmens vernommen wird, so fällt bei der Pneumonie der Accent auf die Expiration, welche von einem viel lauterem Geräusche begleitet wird als die Inspiration. Lässt man nun die Kinder entkleiden, so sieht man die lebhaftesten und angestrongtesten Zwerghellocontractionen. Bei jedem Athembüge werden die unteren Rippen tief nach einwärts gezogen, wodurch unter den Brustwarzen gegen das Sternum hin momentane Gruben entstehen. In einem höheren Grade von Pneumonie participiren auch die Gesichtsmuskeln, die Nasenflügel gehen auf und nieder, eine Erscheinung, auf die man nicht scharf genug sein Augenmerk richten kann, der Mund ist geöffnet, die Mundwinkel sind schmerzhaft nach abwärts verzogen, die Augen sind glänzend, stier oder blicken ängstlich umher.

So prägnant diese Symptome des Respirationsmodus und der Gesichtsmuskeln sind, so unbestimmte Resultate liefert die physikalische Untersuchung.

Die Percussion hat einen rein negativen Erfolg bei der lobulären Pneumonie; bei der lobären findet man deutliche Dämpfung an der entzündeten Stelle, eine Dämpfung, die, zum Unterschied von der physiologischen Dämpfung während der Bauchpresse, auch ohne dieselbe sowohl bei In- als Expiration nachweisbar sein muss. Dass die physiologische Dämpfung rechts hinten sehr häufig mit der pneumonischen verwechselt werden ist, ist nur zu klar, indem in allen Lehrbüchern eigens bemerkt wird, dass die krupöse Pneumonie sich vorzugsweise im rechten unteren Lappen etablirt.

Auch der rasche und gewöhnlich günstige Verlauf, der in den Jahresberichten der Kinderpitäler und Ambulatorien den Pneumonien vindicirt wird, spricht ziemlich deutlich für die häufig stattfindende Verwechslung.

Die weiteren Casteln, die man bei der Percussion zu beobachten hat, finden sich schon im allgemeinen Theil pag. 17 angegeben.

Durch Auscultation kann man bei der lobulären Pneumonie grobes Knisterrasseln entdecken, ohne dass damit behauptet werden soll, dass keine Pneumonie vorhanden, wo dieses Knisterrasseln vermischt wird, indem ja die dasselbe bedingenden, verdichteten Stellen nicht immer peripherisch liegen. Daneben ist immer Bronchialcatarrh vorhanden, dessen Rasselgeräusche das viel leisere Knistern oft verdecken, auch hört man letzteres nicht, wenn die ergriffenen Stellen nicht streut zwischen grösseren Strecken gesunden Parenchyms auftreten. Da es gewöhnlich nur in kleinem Umfange vorgenommen wird, so ist hienzu eine genaue, keine Stelle der Rückenfläche unberührt lassende Untersuchung nothwendig, die bei unruhigen, einmal unwillig geworden Kindern selbst mit der grössten Geduld und Ausdauer nicht vollständig durchgeführt werden kann. Rasselgeräusche hört man ohne Auscultation auf beiden Lungen. Knisterrasseln ist ein werthvolles Zeichen für die Bestätigung der Diagnose, sein Fehlen aber schliesst die lobuläre Pneumonie nicht aus.

Bei der lobulären Lungentzündung hört man, wie bei Erwachsenen, anfangs feines Knisterrasseln, dann mehrere Tage hindurch deutliche Bronchialathemen, starke Consonanz des Hustens, der Stimme und der Rhonchi und hierauf wieder Knistern, bis endlich im Falle der Genesung nach 8—9 Tagen normales vesiculäres Athmen sich einstellt, von nicht der noch bestehende Bronchialcatarrh einige Zeit hindurch abgedehnte Rasselgeräusche bedingt.

Durch die Palpation fühlt man bei der lobulären Pneumonie nichts als Rasselgeräusche, die Vibrationen des Thorax, durch Husten oder Schreien veranlasst, sind auf beiden Seiten gleich. Bei der lobären Pneumonie fühlt man der Dämpfung entsprechend stärkere Vibration der Stimme, der Rhonchi und des Hustens, oder es ist gar nichts zu fühlen, wenn der zur verdichteten Lungenpartie führende Bronchus momentan mit Schleim verstopft ist. Die Palpation des Thorax, kann nicht fleissig genug geübt werden, denn sie allein kann auch bei schreienden Kindern mit Vertheil in Anwendung kommen.

Das Geschrei pneumonisch erkrankter Kinder ist insofern charakteristisch, als es nie sehr laut und noch weniger andauernd ist, es ist vielmehr ein kurz abgesetztes Stöhnen und Aechzen genannt werden. Der Husten ist in allen Fällen häufig und anhaltend. Wenn heftige Hustenanfälle sich einstellen, so bringen auch die kleinsten Kinder schon etwas weissen Schaum vor die Lippen, gewöhnlich aber bekommt man gar keinen Auswurf zu sehen. Der Husten ist, zum Unterschied vom Bronchialcatarrh, immer schmerzhaft, die Kinder stöhnen kläglich nach jedem Anfälle und verzerrten die Gesichtszüge schmerzhaft dabei.

Die allgemeinen Symptome sind verschiedenen nach der Ausdehnung des Uebels und seinen Complicationen. Das Fieber der lobulären Pneumonie beginnt gewöhnlich nach länger bestehendem, febrischem Bronchialcatarrh des Abends, verschwindet wohl wieder nach einigen Stunden, kelet aber immer öfter und heftiger wieder, bis es endlich zu einem kontinuierlichen wird. Die Haut fühlt sich dabei trocken heiss an, nur die Füsse sind kühl und schwer zu erwärmen. Der Puls wird ungemein schnell und kann sich bis zu 200 in der Minute steigen.

Es ist das die äusserste Grenze, die man bei einiger Uebung zu zählen im Stande ist.

Bei der lobulären Pneumonie beginnt das Fieber meist plötzlich, bevor noch Symptome der gestörten Respiration wahrnehmbar sind, und ist so heftig, wie beim Ausbruch eines acuten Exanthemes. Am folgenden Tage stellt sich dann die Pneumonie ein und nimmt ihren cyclischen Verlauf. Die consensuellen Hirnsymptome richten sich nicht nach der Ausdehnung der Lungenerkrankung, sondern nach der individuellen Reizbarkeit. Es gibt Kinder, die bei der heftigsten lobären Pneumonie ein freies Sensorium behalten, und wieder andere, die bei der geringsten Erkrankung Convulsionen und Nervenerscheinungen aller Art bekommen.

Der Appetit ist natürlich vollkommen verschwunden, der Durst gross, die Urinsecretion der Menge des Getränks entsprechend. Der Stuhl ist häufig diarrhoisch, weil die Mehrzahl der Erkrankungen in die Dentitionszeit fällt und hier eben in der Regel diese Stühle sich einstellen. Dieselben rühren auch oft genug von der Behandlung her, das ungesignete dieser Behandlungsweise aber wird unten ausführlicher erörtert werden.

Der Verlauf ist bei der lobären Pneumonie ausserordentlich rasch, indem in 6–8 Tagen Tod oder Besserung eintritt. Bei kleinen Kindern ist der lethale Ausgang häufiger als ein Umschlag zur Genesung. Kinder über zwei Jahre ertragen die lobäre Pneumonie so gut als Erwachsene. Der Anfang der lobulären Pneumonie ist schwer zu bestimmen wegen des allmählichen Ueberganges aus einfachem Bronchialcatarrh, derselbe muss mindestens 4–5 Tage vorausgegangen sein, kann aber ebenso gut auch Wochen und Monate lang bestanden haben. Ihr Verlauf ist durchaus nicht cyclisch, bald so rapid und mit so ausgesprochenen Symptomen, dass jeder Laie eine Veränderung der Lungen erkennt, bald so schleichend und wenig markirt, dass sie dem geübtesten Diagnostiker entgeht. Selten genesen solche Kinder vor 2–3 Wochen vollständig; neigt es sich aber zum lethalen Ende, so steigern sich alle Symptome: die Athemnoth und die Pulsfrequenz nehmen zu, die Extremitäten werden kühl, die Nägel cyanotisch, die Gesichtsmuskeln verzerren sich mehr und mehr und die Expiration ist nicht mehr besonders accentuirt. Endlich werden die Athemzüge immer seltener, röchelnd oder schnappend und der Tod tritt unter Convulsionen ein. Derselbe ereignet sich in der lobulären Pneumonie selten vor der zweiten bis dritten Woche. Bouchut hat unter 55 Kranken in einem Alter von einigen Tagen bis zwei Jahren dreissig verloren. Nach Valleix starben alle davon befallenen Neugeborenen im Pariser Findelhaus (unter 128 Kindern starben 127). Transseau hat ein besonders prognostisches Zeichen angegeben, nämlich eine Anschwellung der Venen des Handrückens, wodurch die Prognose sehr verschlimmert werden soll. Dieses Zeichen hat nur insofern eine Bedeutung, als man eben nur bei abgemagerten Kindern die Hautvenen zu sehen bekommt und diese letzteren überhaupt die Pneumonie seltener überstehen. Bei fetten Kindern, die daran zu Grunde gingen, sah ich niemals während des ganzen Verlaufes eine Venenschwellung an den Händen.

Behandlung.

Da einer jeden lobulären Pneumonie Bronchialcatarrh vorausgeht, so ist einleuchtend, dass derselbe bei einem kleinen Kinde niemals und

unter keiner Bedingung ignoriert werden darf. Es sind sogleich zu im vorigen Abschnitte angegebenen Mittel in Anwendung zu bringen. Die Kinder müssen in einer ganz gleichmässigen Temperatur leben, dürfen auch im Sommer, wenn die Luft nicht vollkommen windstill ist, nicht aus dem Zimmer getragen werden und müssen besonders auf die Brust trocken und warm gehalten werden. Innerlich gibt man ihnen zu zweckmässigsten ganz kleine Dosen Opium, Belladonna oder Aconitum. Mit dieser Behandlung und strengen Ueberwachung muss fortgefahren werden, bis die letzten und leinsten Spuren von Husten verschwunden sind. Wer schon viele Kinder an lobulärer Pneumonie behandelt hat und die Wirkung der vielgepriesenen Mittel hat an Schanden werden sehen, der wird diese minutöse und sorgfältig prophylactische Behandlung eines einfachen Bronchialcatarrhs nicht für pedantisch und langstlich halten. Man muss sich nur daran gewöhnen, einen jeden Bronchialcatarrh eines kranken Kindes als den möglichen Beginn einer Pneumonie zu halten, und man wird leider nur zu oft erfahren, dass diese Anschauung eine vollkommen gerechtfertigte ist.

Gegen die einmal entwickelte lobäre und lobuläre Pneumonie werden noch ziemlich allgemein Blutentziehungen empfohlen und es werden hier mit besonderer Vorliebe die Blutegel angewendet, indem die Schröpfköpfe zu schmerzhaft und bei den kleinen Flächen des kindlichen Thorax schwer zu appliciren sind, der Aderlass aber wegen Kleinheit der Hautvenen und Mächtigkeit der subcutanen Fettschicht gewöhnlich misslingt. Die Blutegel, 2—3 an der Zahl, werden in die Gegend der Brustwarzen, auf das Sternum oder nach Bouehut an die Innenseite der Schenkel gesetzt. Die Nachblutung soll eine Stunde lang unterhalten werden. Ich wende sie seit vielen Jahren nie mehr an und muss gestehen, dass ich mit meinen Heilergebnissen seit jener Zeit zufriedener bin. Ich habe noch oft in Consilien Gehörtes, Kinder zu beschreiben, denen von andern denkenden Collegen vor meiner Beisehung Blutegel gesetzt wurden, und kann durchaus nichts günstiges über den Verlauf der so behandelten Pneumonien berichten. In meisten Kinder legen anämisch mit blassen Lippen und Wangen hin und sollen momentane Erleichterung ihrer Athemnoth gehabt haben, wovon aber schon am folgenden Tage nichts mehr zu entdecken ist. Der Verlauf wird nur insofern deutlich abgekürzt, als diese Kinder gewöhnlich schneller sterben als die expectativ behandelten. Die Reconvalescenz dauert bei den ersteren ganz entschieden länger, sie behalten ihre blasser Farbe und ihre anämischen Symptome noch lange Zeit und bleiben in ihrer Entwicklung überhaupt enorm zurück. Wenn ich am noch niemals entschiedenen Nutzen und schon viele Dermal Mal einen ganz kläglichen Zustand auf Blutegel habe entstehen sehen, so wäre es irreuell, wenn ich diese Erfahrung nicht veröffentlicht und direkt vor den Blutentziehungen warnte. Die Autoritäten Barthez und Legendre sprechen sich ebenfalls ganz entschieden gegen jede eingreifende Behandlung aus.

Ähnlich wie mit dieser verhält es sich auch mit dem so beliebten Brechweinstein, dem sogar einst klar sehende Männer wie Valleix das Wort reden. Nach vielfachen Erfahrungen ist der Catarrh die gefährlichste Complication der Pneumonie und es sind des-

halb alle jene Mittel zu meiden, die denselben veranlassen können. Hierher gehört nun vor Allem der Tartar. stibiatus, der gerade in kleinen Dosen, bei denen es nicht zum Erbrechen kommt, fast regelmässig eine schwer zu stillende Diarrhöe bewirkt. Die schädliche Wirkung desselben auf den Darmkanal tritt viel schneller und sicherer ein, als seine günstige als Antiphlogisticum und Expectorans. Selbst die Ipecacuanha kann, obwohl viel seltener, in dieser Beziehung Schaden anrichten, doch sind die hierauf erfolgenden Diarrhöen von kürzerer Dauer, weniger perniciös, stoßen bald von selbst oder lassen sich doch durch Opium zum Stillstand bringen. Bei Athemnoth und Stückenfällen wirken einige Kaffeeöffel eines starken Ipecacuanhainfusses (4,0 auf 30,0 Wasser) entschieden günstig, es darf aber nicht öfter als höchstens einmal in 24 Stunden von diesem Verfahren Gebrauch gemacht werden. Gegen eine dadurch entstehende Diarrhöe muss man sogleich mit kleinen Dosen Opium, höchstens einem Tropfen Tinct. pro dosi einschreiten. Ein schwaches Ipecacuanhainfus (0,06 oder 0,12 auf 30,0 Wasser) reizt die Kinder weder zum Brechen noch zum Stühle, ist also in dieser Beziehung jedenfalls unschädlich; ob die Expectoration des catharrhalischen Secretes hierdurch wesentlich befördert wird, ist eine andere Frage. So viel kann ohne allen Schepticismus behauptet werden, dass die hierauf eintretenden Aenderungen in der Art und Häufigkeit des Hustens keine frappanten sind.

Meine Behandlung besteht regelmässig darin, dass ich bei Brennhitze der Haut, wenn keine Diarrhöe zugegen, Calamel 0,01 täglich 4—5 Mal gebe, bis grüne, halbflüssige Stühle sich einstellen, worauf dann ein einfacher Mucilage g. arb. mit etwas Syrup und Tinct. Opii simpl. gtt. j—jj so lange fortgereicht wird, bis wieder Verstopfung eintritt. Das starke Ipecacuanhainfus wird so lange als möglich unterlassen, kann aber Vortheilhafter gleich am ersten Tage bereitet und an einem kühlen Orte aufbewahrt werden. Bei rasch zunehmender Athemnoth wird durch einen ergiebigen Brechakt plötzlich eine grössere Menge Bronchialschleim entleert und auf diese Weise zweifeln sehr sichtliche Erleichterung erzielt. Die örtliche Behandlung besteht in allen Fällen in einem feuchten Gürtel, der auf folgende Weise applicirt wird. Man legt eine Serviette zu einem 6—7 Finger breiten Gürtel zusammen, und macht es ebenso mit einem grossen, weissen Taschentuche, nur dass diese letztere Binde etwas schmaler ausfallen muss. Das Taschentuch wird hierauf in warmes Wasser getaucht, soweit wieder ausgepresst, dass es nicht mehr tropft, und nun auf die Serviette in der Weise gebreitet, dass deren trockene Ränder beiderseits über das feuchte Taschentuch hervorragen. Hierauf bringt man beide Tücher zusammen auf das Kopfkissen des Kindes, entlässt dessen Rücken und legt den Patienten nun auf die feuchte Unterlage. Dann schlägt man die Enden der beiden Tücher vorn über der Brust möglichst hoch nach oben zusammen und befestigt sie mit zwei Sperrnadeln. Sehr gut thut man, wenn man zwischen das feuchte und trockene Tuch eine Lage Guttapercha oder Kautschuk bringt, wodurch einerseits die Feuchtigkeith des ersten länger conservirt wird, während andererseits das letztere nicht durchnässt werden kann. Wenn das Wasser, womit der Umschlag gemacht wird, nicht zu kalt ist, so lassen sich die Kinder ihn willig gefallen, und man bemerkt schon nach kurzer Zeit

eine kleine Verlangsamung der Respiration und eine geringere Beteiligung der Nasenflügel. Mit diesen Umschlägen kann 4—6 Tage lang fortgefahren werden, man braucht den feuchten Gürtel während dieser ganzen Zeit gar nicht abzunehmen, sondern kann nach Entfernung der Guttapercha sogleich einige Kaffeelöffel warmes Wasser auf die trockene gewordene Binde bringen, oder sie mit gehörig getränktem Schwamm ein paar Mal annetzen. Die Hauptsache ist, dass man keine anhaltende Abkühlung der Haut durch Verdampfung entstehen lässt, dass also das trockene Tuch das feuchte an allen Seiten gehörig überdeckt und dass es, da einiges Feuchtwerden nie vermieden werden kann, täglich mehrmals gewechselt wird. Ich habe diesen Gürtel gewiss schon vierhundert Mal angelegt und schon sehr oft rasche Besserung entstehen sehen, doch kann freilich auch nicht verschwiegen werden, dass dennoch ungefähr die Hälfte dieser Kinder zu Grunde geht. Wenn man den Kindern die von einigen Autoren empfohlenen kalten Umschläge anlegt, so entsteht jedesmal ein ängstliches Geschrei, eine ziemlich Beklemmung und Beschleunigung der Respiration, die erst wieder nachlässt, wenn das kalte Wasser durch die Temperatur der Haut erwärmt worden ist. Es scheint demnach rationeller, die Umschläge lieber gleich mit erwärmtem Wasser zu machen, um jene vorübergehende Unruhe zu vermeiden.

3) Erworbene Atelektase der Lungen.

Bei den Krankheiten, die als unmittelbare Folge der Geburt zu betrachten sind, wurde die angeborene Atelektase schon abgehandelt (pag. 50); es erübrigt also hier nur mehr die erworbene zur Besprechung. Dieselbe steht in innigem Zusammenhang mit der Elasticität des Brustkorbes und betrifft deshalb meistens Kinder im Alter von sechs Monaten bis zu drei Jahren. In seltenen Fällen rührt die Zunahme der Dichtigkeit des Lungengewebes und die endliche Atelektase von bedeutenden Verkrümmungen der Wirbelsäule, von erweitertem Herzbeutel, vergrößerten Herzen, von Aneurysmen oder Neoplasmen her. Am exquisitesten findet man sie bei pleuritischen Exsudaten, wo die Lunge bis zur Dicke eines Fingers comprimirt und entsprechend verdichtet ist.

Pathologische Anatomie.

Die Grade der Atelektase sind sehr verschieden. Es kommt eine einfache Zunahme der Dichtigkeit vor, die sich durch verästelte Consistenz, grösseren Blutreichthum und gedrängteres Gewebe zu erkennen gibt, die Compression kann aber auch einen so hohen Grad erreichen, dass die Zellerräume verschwunden, das Gewebe verodet und der capillare Kreislauf beeinträchtigt ist. Am Anfange enthalten diese comprimierten, atelektatischen Stellen noch Blut und haben Aehnlichkeit mit Muskelfleisch, weshalb man diesen Zustand auch Carnification genannt hat; nach längerem Bestehen aber werden sie bläulichbraun oder grau, schrumpfen zu einer lederartigen Schwarte zusammen, das Lungengewebe ist nicht mehr zu erkennen und wird zu einer völlig thönen Masse, die von der etwas emphysematösen Umgebung nach und nach verdrängt wird und schliesslich ganz verschwindet. Man findet wenig

sims fast nie bei ältern Kindern oder Erwachsenen solche einzelne atelectatische Stellen mehr. Zuweilen gelingt es noch, die kürzer bestehenden Atelektasen aufzulösen, gewöhnlich aber bleibt dieses Experiment fruchtlos, indem die Alveolen wirklich geschwunden sind und durch eine zellig fibröse Masse ersetzt werden.

Ist die Veränderung eingemassent ausgebreitet, so hat sie eine ähnliche Wirkung auf den Kreislauf wie das Lungenemphysem. Es wird hiedurch der capillare Kreislauf so geschmilert, dass eine Stase im Stamme der Lungenarterie, Erweiterung des rechten Herzens und endlich venöse Stauung, Cyanose, eintritt.

Der Grund der erworbenen Atelektase ist also meistens im rhachitischen Thorax zu suchen, der letztere aber entsteht folgendermassen: Die Inspiration kommt zu Stande, indem die Inspirationsmuskeln sich contrahiren und hiedurch eine Erweiterung der Lungenbläschen veranlassen. Es entsteht dabei eine momentane Verdünnung der Luft in denselben, die äussere Luft drückt stärker auf den Thorax, zu gleicher Zeit zerrt das elastische Lungengewebe an der Costalpleura, und die Wirkung dieser Kräfte ist eine Einwärtskrümmung der Intercosträume und bei mageren Menschen auch der Claviculargegend bei jeder Inspiration. Am frappantesten wurde mir dies Verhältniss durch die Beobachtung eines Kindes, dem durch eine entgegenfahrende niedere Wagendeichsel eine Rippe zweimal zerbrochen wurde. Das bei heiler Haut ganz ausser Continuität gesetzte Stück Rippe hatte eine Länge von 1½ Zoll und bewegte sich bei jeder Inspiration gleich der Klappe eines Blasbalges nach innen, bei jeder Expiration nach aussen. Haben nun die knöchernen Rippen durch Verarmung an Kalksalzen ihre Festigkeit verloren, so theilnehmen sie sich auch an diesen Bewegungen nach einwärts, die sonst die Intercostralmuskeln allein zu machen pflegen, und verlieren hiedurch ihre nach aussen convexe Gestalt. Ausserdem folgen sie dem Zuge des Diaphragma's, weichen andererseits auch den andrängenden Baucheingeweiden während der Bauchpresse weiter aus und bleiben zu allem Ueberflusse in ihrem Längswachsthum zurück (rhachitische Knochenverkürzung), so dass endlich ein verkrümmter, eingedrückter, miostaltischer Thorax entsteht, dessen Inhalt notwendiger Weise comprimirt werden muss, da er ja in Folge der Verkrümmung und des verlangsamtten Wachsthums der Wirbelsäule auch nicht nach unten ausweichen kann.

Symptome.

Durch eine Verminderung der lufthaltigen Alveolen muss eine Beschleunigung der Respirationen erfolgen, wenn ein dem Körpergewicht entsprechender Gasaustausch stattfinden soll. Die Respirationen vermehren sich nun auch in der That und werden mit beträchtlicher Anstrengung ausgeführt, so dass sich auch die Nasenflügel dabei theilnehmen. Die Anwendung des Stethoscopes ist beim rhachitischen Thorax mit vielen Schwierigkeiten verbunden, indem die Knöpfe der Stethalenden und die Concavitäten in der Gegend der Brustwarzen ein flaches Auflegen desselben nicht gestatten. Man muss sich beinahe immer auf die unmittelbare Auscultation der Rückenfläche beschränken, und hört hier fast ohne Ausnahme überall Rasselgeräusche, weil die zu den atelectatischen Stellen führenden Bronchien catarrhalisch afficirt

sind. An den ergriffenen Stellen selbst hört man, wenn die Bauchgeräusche nicht alles übertönen, Knisterrasseln oder Bronchialathmen. Am kindlichen Thorax und namentlich dem rachitischen ist das vocale, puerile Athmen aber so scharf und die Expiration so lang, dass der Unterschied zwischen puerilem und Bronchialathmen nur in einer feinen Nuance des Geräusches besteht und die grössere Übung dazu gebietet, beide sicher zu unterscheiden.

Durch Percussion lassen sich die atelektatischen Stellen nur sehr deutlich nachweisen, indem sie meist zu wenig ausgedehnt sind und am häufigsten an die Leber grenzen, wo durch Einklemmung der Lungenränder zwischen die Oberfläche der Leber und die einwärts gebogenen Rippen eine Verdichtung des Gewebes begünstigt wird. Ueberdies haben wir immer die physiologische Dämpfung während der Bauchpresse, die rachitische Verdichtung der Schulterblätter und die sehr häufig hierbei vorkommenden Verkrümmungen der Wirbelsäule zu berücksichtigen, bevor wir eine aufgefundenen Dämpfung der Atelektase zuschreiben dürfen.

Aus dem bisher Gesagten wird man noch keinen Unterschied zwischen den Symptomen der Pneumonie und der erworbenen Atelektase haben entdecken können, und es gibt wirklich nur ein Symptom, durch welches wir bei der ersten Beobachtung diese beiden Zustände deutlich unterscheiden können. Bei der Pneumonie nämlich ist immer Brennpunkt der Haut und Fieber zugegen, bei der Atelektase fehlt dasselbe. Wenn aber bei einem rachitischen Kinde mit erworbener Atelektase zufälliger Weise durch Dentition oder irgend ein sonstiges Leiden Fieber entsteht, so ist niemand im Stande, gleich nach der ersten Untersuchung eine bestimmte Diagnose zu stellen. Erst der Verlauf der zufälligen Complication, das Fortbestehen der Athemnoth und des Respirationsmodus nach Verschwinden des Fiebers können Klarheit bringen, und es ist diese diagnostische Schwierigkeit ein weiterer Grund, die Pneumonien nicht gleich mit Elixiren und antiphlogistischen Mitteln zu behandeln. Den rachitischen Kindern bekümmert eine solche Behandlung in allen Fällen sehr schlecht.

Die Entstehung der erworbenen rachitischen Atelektase ist immer eine allmähliche, der Verlauf ein chronischer und kann sich Jahre lang hinziehen. Mit zunehmender Kräftigung und wieder beginnendem Längswachthum der Rippen verlangsamen sich die Respirationen. Je starke Einwärtsbiegung der vierten bis achten Rippe bei jeder Inspiration nimmt ab, die Hühnerbrust wird wieder flacher, die respiratorischen Hilfsmuskeln am Hals und die Nasenflügel werden seiner Thätigkeit gesetzt.

Trifft aber nach einigen Monaten eine solche Consolidierung des Brustkorbes nicht ein, und dehnt sich somit die Atelektase auf immer grössere Strecken aus, so vermögen endlich die intakt gebliebenen Lungenparthieen nicht mehr gehörig zu vicariiren, es tritt eine intensive Bronchitis ein und die Kinder sterben an erstickender Hustenanfällen, nachdem sie Wochen und selbst Monate lang an dem höchsten Grade von Athemnoth zu leiden hatten, zu welcher sich einige Wochen vor dem Tode noch Oedem der Füsse gesellen kann.

Die Prognose richtet sich nach dem Grade und der Dauer der Erscheinungen. Je entwickelter die Hühnerbrust, um so ungünstiger

ist die Verdichtung des Gewebes, um so grösser die Athemnoth und um so näher liegt die Gefahr, dass die Kinder an einem geringfügigen Bronchialcatarrh oder an Hydrämie in Folge des mangelhaften Stoffwechsels zu Grunde gehen. Uebrigens heilen auch sehr bedeutende Formveränderungen des Thorax und daraus entstehende Atelektasen oft vollständig.

Behandlung.

Die erste Frage ist immer die der Ernährung, die zweite die der Wohnung. Da die Hülsenbrust sich erst im sechsten bis neunten Lebensmonat entwickelt, so sind die Kinder gewöhnlich nicht mehr an der Brust, sondern bekommen die verschiedensten Arten von Brei und Suppen. Es lässt sich nun von keiner dieser Ernährungsweisen behaupten, dass sie absolut schädlich wäre; denn bei einer jeden gedeiht oder stirbt eine Anzahl von Kindern, und es lässt sich auch nicht bestimmen, welche von ihnen die Rachitis besser verhüte, indem sie bei allen Arten von Kost sich einstellt. Das wesentliche dabei ist, dass die Kost überhaupt vertragen wird und dass keine Darmcatarrhe oder anderweitige Verdauungsbeschwerden dadurch entstehen. Kinder mit vollkommen geregelter Verdauung werden nur ausserst selten rachitisch.

Der Aufenthalt in feuchten, dampfen Zimmern befördert entschieden die Entstehung der Rachitis, weshalb sie auch im Winter viel häufiger vorkommt als im Sommer und bei der armen Klasse der Bevölkerung häufiger als bei der besitzenden. Die Behandlung hat also ihr Hauptaugenmerk auf gut ventilirte, trockne Zimmer und möglichst anhaltenden Aufenthalt in freier Luft zu richten. Wo diese Bedingungen nicht erzielt werden können, da wird der Ausgang gewöhnlich ein ungünstiger sein. Ueberhaupt wird man sich meist vergeblich bemühen, durch Expectorationen, Narcotica, oder was immer für Mittel den die Atelektasen begleitenden Bronchialcatarrh zu vertreiben. Derselbe vergeht spontan, sobald die Lungen wieder unter bessere räumliche Verhältnisse gelangen. Ich beschränke mich auf Fetteinreibungen, die mehrmals täglich über die Brust gemacht werden, und gebe das Ol. jecoris oder die apfelsaure Eisentinctur, deren genauere Indicationen weiter unten bei der Behandlung der Rachitis gegeben werden sollen.

4) Lungenemphysem (τὸ ὑπέρμετρον, das Aufblähen).

Das bekannte grossbläsige Lungenemphysem, wodurch erwachsene Kranke den faasförmigen Thorax bekommen, und Herz und Diaphragma verdrängt werden, wird in dieser Ausdehnung bei Kindern kaum jemals beobachtet, ja es scheint diese Art von Rarefaction des Lungengewebes dem kindlichen Organismus ganz zu fehlen. Hingegen findet man häufig das vesiculäre und interstitielle Emphysem unter folgenden anamnestischen Erscheinungen.

Pathologische Anatomie.

Das reine vesiculäre Emphysem besteht in einer bleibenden Erweiterung einer grossen Parthie von Lungenbläschen, die jedoch hiebei

nicht zerreißen, sondern nur vielleicht um das Doppelte anschwellen. In dieser Weise verändert sich fast regelmäßig das lufthaltige Lungengewebe in der Nachbarschaft luftleerer Stellen, also neben Pneumonie, Atelektase und Tuberculose. Die emphysematöse Lunge collabirt nach Eröffnung des Thorax nicht, fühlt sich eigenthümlich, wie ein mit Luft gefülltes Kissen an, ist graugelb anämisch und sinkt beim Anschneiden mit einem diffusen, kaum knisternden Geräusche zusammen. Bei längerem Bestehen und zunehmender Atrophie der Alveolarwand gewellt sich hienzu immer das interlobuläre Emphysem.

Dasselbe besteht in einer Ansammlung von Luft in dem Zellgewebe, das die einzelnen Lungenlappchen mit einander verbindet, und kann nur durch Zerreißen einzelner Lungenzellen und durch Anströmen der Luft in die anstossenden, interlobulären Interstitien entstanden gedacht werden. Es erscheinen dann an der Oberfläche unter der Lungenpleura kleinere und grössere durchscheinende Luftblasen oder Ströme, welche sich in der Richtung der Interstitien verschieben lassen und auch in die Tiefe der Lunge sich verzweigen. Zuweilen umschreiben sie ein Lungenlappchen inselförmig und bilden, wenn zwischen vielen benachbarten Lappchen das interlobuläre Emphysem sich entwickelt, grössere Luftblasen, welche über ausgedehntere Strecken der Pleurahöhle- und hergeschoben werden können. Ein ganz seltenes Ereignis ist das Anströmen von Luft in das die Bronchien umgebende Bindegewebe, in das Mediastinum anticum und von da aus in das Zellgewebe des Halses und der Brust. Es gehen diese Fälle fast immer tödtlich aus.

Ueber die Entstehung des gewöhnlichen Emphysems cursiren mehrere, zum Theil nicht stichhaltige Ansichten. Gewiss ist nur, das Verdichtungen eines Theiles des Lungenparenchyms ein vicariäres, vasculäres Emphysem des übrigen Gewebes veranlassen, und das in den Sectionen atrophischer Kinder hauptsächlich in Folge von Emphysematose und *Chlorea nostras* gewöhnlich interlobuläres Emphysem gefunden wird. Ueber das in vielen Büchern erwähnte Vorkommen des Emphysems nach Keuchkrusten habe ich keine positiven Erfahrungen gemacht, ich kann mich im Gegentheile nicht entsinnen, dasselbe jemals bei einem an Keuchkrusten oder dessen Nachkrankheiten verstorbenen Kinde beobachtet zu haben. Auch Rilliet und Barthex wollen von dieser Complication nichts wissen, und es geht eben hieraus hervor, dass ausser der mechanischen Ausdehnung der Alveolen, welche sich bei pressender Expiration auf Kosten des Blutgelahes der Lunge denkbar ist, noch eine specielle Ernährungsstörung der Alveolarwand zuzugewen sein muss, ohne welche trotz aller Gelegenheitsursachen kein Emphysem zu Stande kommt. Als eine fernere Ursache hat man auch noch das Einblasen von Luft bei asphyktischen Neugeborenen geführt, was aber nach nur wenig Wahrscheinlichkeit für sich hat, wenn man berücksichtigt, dass bei Sectionen die Lungen Neugeborener mit aller Kraft aufgeblasen werden können, ohne jemals zu zerreißen. Die Lungen sind so dehnbar und lassen sich durch forcirtes Einblasen so vergrössern, dass eine einzige die ganze Brusthöhle ausfüllt: wenn man aber die Luft wieder ausströmen lässt, so collabiren sie wieder, ohne die geringste Spur von Emphysem zurückzulassen.

Symptome.

Da wir bei Kindern, wie es scheint, fast niemals chronisches, sondern immer nur acutes Emphysem haben, so entwickelt sich auch bei ihnen nicht die Fassaform des Thorax und es kommt auch nicht zu einem Tiefstand des Zwerchfelles. Wir haben demnach kein physikalisches Zeichen und es fragt sich sehr, ob die in den Büchern beschriebene Beschleunigung der Respiration nicht besser den das Emphysem bedingenden Lungenkrankheiten als diesem selbst zugeschrieben werden muss. Es hat also nur pathologisch-anatomische Bedeutung. Von einer Prognose und Therapie kann bei einer Veränderung, die sich der Diagnose entzieht, natürlich keine Rede sein.

5) Oedema pulmonum (*ré oîdῆμα*, die Geschwulst).

Bei den meisten Krankheiten des Herzens, der grossen Gefässe und der Lungen tritt als Schlussakt der ganzen Krankheit oder auch erst in Agone ein rasch tödtendes Lungenödem auf. Dasselbe hat natürlich als pathologischer Zustand wenig Bedeutung mehr, sondern muss als Anfang des Todes betrachtet werden. Hingegen kommt bei Masern und hauptsächlich bei Scharlach ein rasch auftretendes Lungenödem vor, das nicht immer zum Tode führt, sondern spontan oder durch Anwendung geeigneter Mittel wieder verschwindet. Dieses letztere ist es, worauf unser Augenmerk sich besonders zu richten hat.

Pathologische Anatomie.

Wir verstehen unter Lungenödem eine seröse Anschwellung in die Lungenalveolen, die feinsten Bronchien und in das interstitielle Gewebe. Weder das erste noch das letzte kann allein ohne Bethöpfung des andern serös infiltrirt werden, und es kann desshalb der Streit einzelner Autoren, ob das Oedem in den Alveolen oder in den Interstitien seinen Sitz habe, zum Vortheile beider Partheien entschieden werden. Oedematöse Lungen sinken bei Eröffnung des Thorax nicht zusammen, sind von einer graublauen oder grangösen Farbe, je nach dem Blutgehalte der ergriffenen Lungenparthien, und von schwerem Gewicht, schwimmen im Wasser und knistern stark bei Druck. Der Eindruck des Fingers hinterlässt eine leichte Delle, indem auch die entsprechende Pleura ödematös infiltrirt ist. Auf dem Durchschnitt bietet sich eine glatte glänzende Fläche, aus welcher beim leichtesten Druck ein rother oder gelber feinschäumiger Schaum in grosser Menge hervorquillt. Der Austritt dieses Schaumes ist ebenfalls von einem knisternden Geräusche begleitet. Das Lungenödem beschränkt sich niemals auf kleine Parthien des Lungengewebes, sondern ergreift gewöhnlich die unteren Lappen beider Lungen, ein Beweis, dass seine Ursache keine locale, sondern eine allgemeinere, auf Circulationsstörungen beruhende, sein muss. Die ödematösen Lungen lassen sich aufblasen, und es sind nicht alle Alveolen mit Serum gefüllt. Die entsprechenden Bronchien sind schleimhaltig und in den Bronchien höherer Ordnung findet sich immer ein ähnlicher röthlicher Schaum, wie er beim Einschnneiden auf der Schnittfläche hervortropft.

Symptome.

Das vorherrschendste Symptom ist eine beträchtliche Athemnoth, die sich rasch bis zur Erstickungsgefahr steigern und in wenigen Stunden tödtlich endigen kann. Sind die Kinder schon gross genug und erlauben es ihre Kräfte, so richten sie sich auf und setzen sich gerade in ihr Bett, um eine mögliche Ausdehnung des Thorax zu erzielen. Die kleinen Kinder bekommen im Liegen heftige Stiefatfälle, wodurch es notwendig wird, sie aufzuheben. Das Athmen wird ausserordentlich frequent, laut keuchend und rasselnd, und die Sprache wird leise, undeutlich. Der Husten ist locker und grössere Kinder bringen auch etwas weissen Schaum aus dem Munde. Der Puls ist sehr klein, steht aber, was die Zahl der Schläge betrifft, in keinem Verhältnisse zur Frequenz der Athemzüge.

Die physikalische Untersuchung ergibt bei grosser Ausdehnung des Oedems einen weniger sonoren, niemals ganz gedämpften Percussionshall. Da das Lungenödem in den meisten Fällen doppelseitig und die Dämpfung keine exquisite ist, so gibt die Percussion häufig keine genügende Auskunft über die vorhandene Veränderung des Lungengewebes. Wichtiger ist die Auscultation. Man hört über den ödematösen Stellen ein weit verbreitetes, feuchtes Knisterrasseln, das sich für ein geübtes Ohr durch ein gröberes und unregelmässiges Geräusch vom pneumonischen Knistern unterscheidet. Oft wird dasselbe überhört durch die lauten Rasselgeräusche, welche durch den in den grösseren Bronchien angesammelten Schleim erzeugt werden, mit einer kräftigen Hustenbewegung aber momentan verschwinden. Die aufgelegte Hand fühlt diese Rhonchi ausserordentlich stark, während das Knisterrasseln sich gewöhnlich nicht durch Palpation erkennen lässt. Von einer Pneumonie ist das Oedem schwer zu unterscheiden, hauptsächlich in jenen acuten Fällen von Oedem, wo dasselbe von starkem Fieber begleitet wird. Die Athemnoth ist bei Oedem womöglich noch grösser als bei Lungenentzündung, die physikalische Untersuchung gibt keine charakteristischen Unterschiede, und das einzige, was Oedem mit ziemlicher Bestimmtheit vermuthen lässt, ist das doppelseitige Auftreten des Knisterrassels, während die lobäre Pneumonie gewöhnlich nur halbseitig beobachtet wird.

Die Prognose ist, wenn der Ursprung derselben nicht auf ein Herzleiden oder eine chronische Lungenkrankheit zurückzuführen ist, nicht so ungünstig, als man dem ersten Eindrucke nach glauben sollte. Die nach Scharlach von Nephritis und consecutivem Lungenödem befallenen Kinder haben oft die grösste Athemnoth, ihre Gesichtszüge sind entstellt und man glaubt ein baldiges Ende sicher prognosticiren zu können, nach und nach erholen sie sich dennoch mit Abnahme des Erweises und der Cylinder im Urine und mit gleichzeitiger Zunahme der Urinquantität.

Behandlung.

Gegen die Nephritis nach Scharlach als veranlassendes Moment dieser Lungenkrankung erweist sich die antiphlogistische Behandlung mit Calomel, Purgantien und Blutentziehung als entschieden schädlich. Es kann zwar allerdings durch eine Venasection bei grösseren Kindern die Athemnoth rasch beseitigt werden, sie kehrt aber sehr bald wieder.

und es wird nun der Zustand, da noch Anämie sich dazu gesellt hat, bedeutend verschlimmert. Eine grosse Anzahl trockner Schöpfköpfe, auf Brust und Rücken gesetzt, erleichtert die Dyspnoe sehr beträchtlich und es kann dieses Mittel ein- bis zweimal täglich ohne allen Schaden und ohne besondere Umstände wiederholt werden. Der Pflege der Haut muss natürlich besondere Sorgfalt zugewendet werden, was durch warme Bäder und Waschungen mit stark verdünnter Lauge am besten erreicht wird. Die Urinsecretion wird nach meinen bisherigen Beobachtungen durch kein Mittel so entschieden angeregt als durch das längst bekannte, auch als Volksmittel beliebte Roob Juniperi, wovon man täglich 1–2 Mal einen halben Kaffeelöffel reicht. Es hat dasselbe auch den Vortheil, dass es durchaus nicht ungünstig auf Appetit und Stuhl wirkt, und dass die Kinder es mit Honig oder Syrup vermischt lange Zeit nehmen können. Die übrigen Diuretica, wie die Scilla, die Digitalis, das essigsaure Kali etc. sind alle schlechter zu nehmen, und haben vielfach unangenehme Nebenwirkungen, weshalb sie weniger beachtbar erscheinen als dieses Roob Juniperi. In den höchsten Graden von Athemnoth leistet zuweilen ein Brechmittel aus Ipecacuanha und Tartarus stibiatus entscheidende Dienste.

6) Lungenblutung. Haemorrhagia pulmonum. Hämoptoe.

Bei Erwachsenen kennt man dreierlei Arten von Lungenblutungen. Es kommen entweder längere Zeit hindurch die Spata blutig gefärbt zum Vorschein, oder es ergiesst sich das Blut plötzlich stromweise aus Mund und Nase (Blutsturz) oder es sinkt ein Kranker bewusstlos zusammen und hustet, erst nachdem er wieder erwacht ist, Blut aus. Bei Kindern kommt meines Wissens nur die zweite Art vor und zwar als Complication zweier ganz verschiedener Zustände, des Keuchhustens und der Tuberculosis. In einzelnen Keuchhustenepidemien wird ziemlich häufig Blut in grosser Menge aus Mund und Nase ausgeführt, der überaus gutartige Verlauf, der Mangel der consecutiven, blutigen Spata und überhaupt aller anderen schlimmen Folgen lässt aber gegründete Zweifel entstehen, ob das Blut wirklich aus den Lungen kommt oder ob nicht vielmehr in Folge der heftigen Hustenparoxysmen im Pharynx oder Larynx einzelne Gefässerreissungen sich ereignen. Mir scheint aus den eben genannten Gründen das letztere in der That wahrscheinlicher.

Die Lungenblutungen tuberculöser Kinder sind ausserordentlich selten. Man kann Hunderte derselben an Phthisis pulmon, zu Grunde gehen sehen, ohne nur ein einziges Mal Hämoptoe zu beobachten, und wo sie vorkommen, sind sie nicht am Anfange des tuberculösen Processes zu bemerken, sondern als Schlussakt, einige Tage vor dem Tode. Bei kleinen Kindern habe ich sie noch niemals gesehen und erst einmal bei einem 10jährigen Mädchen.

Die Behandlung der Hämoptoe in Folge von Keuchhusten findet sich in dem hieron handelnden Abschnitte, die bei tuberculösen Kindern ist nur eine symptomatische und besteht lediglich in Darreichung kleiner Dosen Narcotica zur Minderung des Hustens und zum Zwecke der Euthanasie.

7) Der hämoptoische Lungeninfarkt.

Diese von Laennec zuerst genau beschriebene Veränderung der Lunge findet sich nicht gar zu selten bei Sectionen von Kindern, die an Purpura oder Lungentuberculose zu Grunde gegangen sind, kommt aber auch schon bei Neugeborenen vor und ist hier meist mit Pyämie und Keilbildung in den Lungen complicirt.

Pathologische Anatomie.

In einer, zuweilen auch in beiden Lungen finden sich schwarz-rothe Stellen von der Grösse einer Erbse bis zu der einer Wallnuß, die sich scharf vom übrigen Lungengewebe abgrenzen und eine bedeutend grössere Resistenz bieten. Der Durchschnitt ist trocken und nicht glatt, sondern etwas körnig, und die so veränderten Stellen der Lunge lassen sich brechen fast wie Leberparenchym. Der Grund dieser dunkleren Färbung und vermehrten Resistenz liegt in einem Bluterguss, der eine grössere Anzahl von Alveolen ausgefüllt und die Interstitien comprimirt hat. Der dichtkörnige Durchschnitt erklärt sich ebenfalls daraus, indem das geronnene Blut genaue Abgüsse der trichterförmig geordneten Alveolen darstellt. Streift man mit den Scalpirsticken etwas hart über einen solchen Durchschnitt, so bekommt man eine blutig gefärbte, mit feinkörnigen Blutcoagula gemischte Flüssigkeit.

Verwechslung mit kruppöser Pneumonie wäre möglich. Berücksichtigt man aber die unregelmässige Form des hämoptoischen Infarkts, seine dunkelrothe Farbe, die scharfe Abgrenzung und den dunkelrothen, krümeligen Bruch, den man von der Schnittfläche abschälen kann, so wird nicht leicht ein Zweifel über die Diagnose bestehen können. Wenn diese Infarkte zwischen dunkelrothem, hypostatischem Gewebe, z. B. hinten und unten, sich entwickelt haben, so fällt der Unterschied der Farbe weg, doch bieten die grössere Dichtigkeit und Bruchigkeit, sowie der Mangel der Luftblasen immer noch Anhaltspunkte genug. Die hämoptoischen Infarkte sind häufiger central als peripherisch und schlimmer im letzteren Falle durch die Pleuradorn. Die zu ihnen führenden Bronchien sind bis zu einer gewissen Höhe mit Coagulis gefüllt, das Blut erstreckt sich aber gewöhnlich nicht weit nach aufwärts und es werden deshalb auch keine blutigen Sputa ausgeworfen.

Nach Rokitsansky trifft dieser Zustand häufig mit aktiver Erweiterung des rechten Herzens zusammen und er kann sich bei höheren Graden mit Zerreissung der Lungensubstanz compliciren, wo man den grösseren Höhlen mit Blut und losen Lungengewebe gefüllt sieht. Nach demselben Autor ist auch eine Rückbildung möglich, indem entweder der Infarkt sich verflüssigt, wobei er eine schwärzlich-bräunliche, weiche und weicheisenähnliche Färbung annimmt und so theils resorbirt, theils durch die Bronchien ausgeworfen wird, oder indem das geronnene Blut schrumpft und zu einem fibrösen oder braunen Gewebe coalescirt. In schlimmen Fällen kann der Infarkt auch brandig werden und dem das Bild einer kompletten Lungengangrän bieten.

Symptome.

Der hämoptoische Infarkt ist niemals idiopathisch, sondern complicirt sich mit Purpura, Tuberculose, Pneumonie und Herzfehler.

allen Fällen steigert sich durch seine Entstehung die Athemnoth und das Fieber. Wir sind weder durch physikalische Diagnostik, noch anderweitige Symptome im Stande, ihn von lobulärer Pneumonie zu unterscheiden. Die physikalischen Zeichen sind schon deshalb meistens ohne Belang, weil der Infarkt gewöhnlich gegen die Lungenwurzel und nicht an der Peripherie vorkommt. Von einer speciellen Therapie kann bei so mangelhaften diagnostischen Anhaltspunkten natürlich nicht die Rede sein.

8) Der Lungenbrand. Gangraena s. Mortificatio pulmonum.

Der Lungenbrand ist bei Kindern eine ausserordentlich seltene Krankheit. Er kommt vor nach traumatischer Pneumonie, veranlasst durch fremde Körper, die während einer heftigen Inspiration in die Lungen gelangt sind, bei heftigem Verlauf acuter Exantheme, der Noma oder des Abdominaltyphus, bei Pyämie und endlich als schlimmer Ausgang des hämoptoischen Infarktes.

Pathologische Anatomie.

Seit Laennec unterscheidet man einen diffusen und einen umschriebenen Lungenbrand.

Die Charaktere des diffusen sind: Verbreitung über grössere Parthieen der Lunge, über einen Lappen oder einen ganzen Flügel, schmutzig grünliche oder bräunliche Färbung des moerschen oder ganz zerfliessenden, brandig stinkenden Gewebes, welches mit einer flockigen, schwammigen, ebenfalls brandig riechenden Jauche infiltrirt ist. Diese Art von Brand ist nirgends scharf begrenzt, sondern geht allmählig durch ein ödematöses in gesundes Gewebe über. Sie ist fast niemals für sich allein zu beobachten, sondern gesellt sich gewöhnlich zum circumscripten Brande.

Der umschriebene Brand kommt häufiger vor als der erstere. Es wird hierbei an irgend einer Stelle das Gewebe zu einem schwarzgrünen, feuchten, nicht leicht zerreislichen Schorf verwandelt, der überall scharf begrenzt ist. Die Grösse dieser Mortificationen erreicht im kindlichen Alter nicht leicht die einer Wallnuss. Nach einiger Zeit löst sich aus dieser brandige Pfropf von seiner normalen Umgebung ab und liegt in einer Ausbuchtung des brandigen Lungenparenchyms, ringsum von brandiger Jauche umspült, oder er zerfällt alsbald zu einem jauchigen Breie, der von einer zottigen Brandexcavation umgeben ist. Er sitzt häufiger an der Peripherie und im unteren Lappen als im Centrum der Lunge und fällt, wenn die Pleura mit gangränescirt und nicht fest mit der Costalpleura verwachsen ist, nach seiner Lösung in den Pleurasack, worauf jauchige Pleuritis und Pneumothorax sich entwickelt.

Das den brandigen Pfropf umgebende Lungengewebe ist entweder nur ödematös oder erkrankt in verschiedener Ausdehnung pneumonisch, in beiden Fällen ist grosse Neigung zum diffusen Brande vorhanden, so dass man, wenn die Kinder die grossartige Zerstörung lange genug aushalten, einen ganzen Lungenlappen in breiige Jauche verwandelt finden kann. Wenn die in den erkrankten Stellen verlaufenden Ar-

terien nicht allseitig thrombosirt sind, so entstehen beträchtliche Blutungen, die sich durch die Bronchien nach aussen ergiessen können, jedenfalls aber durch das sich in der gangränösen Höhle sammelnde Blut das brandige Material vergrössern. Mit Ausnahme der traumatischen Gangrän ist wohl noch niemals eine Heilung beobachtet worden.

Symptome.

Die Symptome sind je nach der Ursache der Gangrän verschieden. Bei Typhus, Noma und bösartigen Masern ist die Allgemeinerkrankung so bedeutend und die Schmerzempfindung dabei so vermindert, dass gar keine subjectiven und nur unbedeutende objectiv Symptome sich einstellen, während der traumatische Brand mit dem Symptomen der Pneumonie beginnt. Ich beobachtete einmal einen solchen Fall, in welchem ein 14jähriger Knabe eine Grasnähre im Mund hatte und dem plötzlich das Geflüster in den Larynx brach. Er war hierauf noch ein paar Tage ziemlich wohl, so dass man glaubte, er habe sich ganz und die Aehre geschluckt, bis sich plötzlich sämtliche Symptome einer Pneumonie einstellen, die aber nicht regelmässig verlief. Es wurden die Sputa nämlich gangränös und unter heftigen Hämopto-parexysmen expectorirte der Kranke einzelne Theile der Aehre mit grosse Mengen brandiger Fetzen, die die Luft des Zimmers in untrüglicher Weise verpesteten. Dieser Auswurf dauerte mehrere Wochen fort und hörte erst nach vielen Monaten gänzlich auf. Der zum Grösse abgemagerte Knabe behielt eine grosse Caverne, die sich nie und nach verkleinerte und nach sechs Jahren kaum mehr nachweisbar war. Er gewann erst nach Jahren sein früheres gesundes Aussehen wieder. Dass ist zu gleicher Zeit der einzige Fall von Gangrän pulmonum, den ich glücklich endigen sah.

Bei den übrigen nicht traumatischen Fällen von Lungenbrand geschieht der Eintritt desselben durch eine plötzliche Verschlimmerung des Allgemeinbefindens zu erkennen, wobei besonders das Gesicht schnell verändert, ein bleifarbiges entstelltes, hippokratisches Aussehen annimmt und der Puls ausserordentlich klein und frequent wird. Die Hauttemperatur ist dabei nicht erhöht, das charakteristischste Kennzeichen aber löst immer ein aschauer Geruch aus dem Munde, der sich durch Veränderungen der Mundhöhle nicht erklären lässt. Die physikalische Untersuchung kann möglicherweise resultatlos bleiben, von der Process central ist, oder es finden sich schwache circumscripte Dämpfung, Knisterrasseln, Bronchialathmen und Rasselgeräusche und bei Perforation der Lunge die Zeichen des Pneumothorax. Gewöhnlich sind die Sputa blutig, der Husten ist quälend krampfhaft. Bald gesellen sich colliquative Schweisse, hektisches Fieber und Delirien dem, worauf fast regelmässig der Tod erfolgt.

Behandlung.

Wo fast regelmässig der Tod erfolgt, erscheint eine rationelle Behandlung ziemlich misslich. Die bisher beobachteten Genesungen sind unter einer Behandlung mit China, Mineraläuren, castoreum, Elix, Chlor und dessen Präparaten und endlich mit Kreosot erfolgt.

9) Tuberculosis der Lungen und Bronchialdrüsen.

Da in einem späteren Abschnitte die Dyskrasien als Gesamtkrankheiten einer ausführlichen Erörterung unterworfen werden sollen, so wird es genügen, wenn der Vollständigkeit halber hier die pathologische Anatomie und Symptomatologie der chronischen Lungentuberculose ihre Stelle findet, während die Aetiologie und die Betrachtung der Allgemeinerkrankung passender bei den Dyskrasien folgen wird.

Pathologische Anatomie.

Im ersten Anfange der Lungentuberculose zeigen sich auf der Schnittfläche zahlreiche, weisse, derbe Knötchen, welche, wie Rindfleisch besonders klar bewiesen und abgebildet hat, Ziemssen's Handbuch der speciellen Pathologie Bd. V, immer an den Uebergangsstellen der kleinsten Bronchien in die Lungenacini ihren Sitz haben. Sie stellen ein zelliges, blutleeres Infiltrat des Lungoparenchyms dar und gelangen niemals zu weiterer Organisation, sondern verfallen stets der rückgängigen Metamorphose, der Verkäsung und Erweichung. Verkäsung wird im kindlichen Alter viel seltener beobachtet als bei Erwachsenen. Die kleinen Tuberkelkörnerchen vermehren sich rasch und vergrössern sich endlich zu umfangreicheren Herden, in welchen sich meistens kleine Bronchien im Quer- oder Längsschnitte finden.

Die Zellen der zuerst ergriffenen Partien verschwinden abtödt und das ganze Lungengewebe wird zu einem moleculären, diffusen Infiltrate umgewandelt, während sich an der Peripherie desselben immer neue Alveolen mit grossen, epithelartigen Zellen füllen, Buhl's Desquamativpneumonie. Die Verkäsung kann so schnell zu Stande kommen, dass die einzelnen Tuberkelknötchen sich noch nicht vereinigt haben und also käsige Lobularherde entstehen. Bei Kindern aber kommt es gewöhnlich rasch zu grösseren Infiltrationen, käsigen Lobärpneumonien, welche sich keineswegs mit Vorliebe der Lungenspitzen hemisphärisch, sondern auch vielfach an den unteren Lappen vorfinden. An diesen grösseren tuberculösen Infiltrationen kann man den Process des Erweichens und Zerfallens am besten beobachten. Die endlich zerfliessende Tuberkelmasse entleert sich durch einen Bruch und es bleibt eine zum Theil noch gefüllte oder vollkommen leere Höhle zurück, in deren Wandung wieder neue Tuberkeln sich absetzen und dann durch ihre Erweichung die Caverne von Neuem vergrössern. So entstehen endlich bucktige unregelmässige, mit verschiedenen Vorsprüngen versehene Höhlen, die mit einem schmutzigen, bräunlichen, gelben oder grauen Eiter angefüllt sind. Bald finden sich mehrere kleinere, bald nur eine einzige, die einen ganzen Lappen einnehmen kann, wobei zu bemerken ist, dass fast niemals eine Caverne auf den nächstgelegenen Lappen übergreift, sondern die zwischen den einzelnen Lappen bestehenden Adhäsionen unverehrt lässt. Grössere Cavernen communiciren immer mit einzelnen Bronchien, deren Lumen wie scharf abgegränzt an der Höhlenwandung klafft. Zuweilen laufen obliterirte Gefässe oder Parenchymreste strang- oder brückenartig quer durch eine Höhle. Diese Gefässe scheinen aber regelmässig obliterirt zu sein, indem Lungenblutungen bei Kindern ausserordentlich selten und namhafte gar nie beobachtet werden. Auch der Durchbruch einer Ca-

verste in den Pleuraraum und somit Pneumopyothorax kommt meines Wissens bei tuberculösen Kindern nicht vor. Das eine Caverna umgebende Lungenparenchym ist niemals vollkommen normal, sondern narbig verdichtet oder im Zustande grauer, rother oder schon wenigstens tuberculisirter Hepatisation. Häufig findet man auch Oedem, besonders in den unteren Lappen, während ein vicariirendes Emphysem gewöhnlich den oberen Lappen einnimmt. Die Bronchien, welche mit den Cavernen communiciren, enthalten einen gelben, bröcklichen Cavernenexsudat, während die übrigen eine injicirte und geschwollene Schleimhaut zeigen. Nach Hassel obliteriren die zu den tuberculösen Höhlen und Ablagerungen führenden Äeste der Pulmonalarterie, zu gleichem Verhältnisse aber kommen in diesen Lungenparthien, die das Hauptgefäßnetz eingebüsst haben, neue Gefässe zur Geltung, welche zum Gebiete theils der Bronchialarterien, theils der Art. intercostalis gehören und ihr Blut in die Bronchialvenen und in die Vena azygos abgeben; eine Kreislaufstörung, mit welcher auch die partielle Erweiterung und ungewöhnliche Entwicklung der subcutanen Venen in Verbindung stehen mag.

Cavernen können bekanntlich heilen durch Verödung oder durch Narbenbildung. Zu beiden Arten von Heilbestrebungen ist jedenfalls eine Reihe von Jahren erforderlich und es ist desshalb nicht leicht bei der Section eines kindlichen Leiche dergleichen zu finden. Verödung kommt bei Kindern niemals vor, hingegen sieht man zuweilen schon noch bestehenden Cavernen verdichtete, strahlig eingenogene Stellen, welche höchst wahrscheinlich als die Reste kleiner Cavernen zu betrachten sind.

Die tuberculöse Kinderlunge zeichnet sich schließlich von der der Erwachsenen durch den Mangel der Pigmentirung aus.

Die Bronchialdrüsen sind viel häufiger der Sitz der Tuberculose als die Lunge, sie sind regelmässig tuberculös entartet, wenn sich die Erkrankung in den Lungen findet, aber oft findet sie sich in den Bronchialdrüsen allein, ohne auf die Lungen übergreifen zu haben. Es kommt hier hauptsächlich der grosse gelbe Tuberkel vor, während die aggregirten Haufen kleiner Tuberkel seltener sind und Miltuberkel fast gar nicht beobachtet werden.

Gewöhnlich entartet die ganze Drüse zu einem grossen gelben Tuberkel und erreicht die Grösse einer Hasel- und selbst einer Walnuss. Die Tuberculose erstreckt sich meist über mehrere Drüsen, so dass die Bifurcation der Bronchien von einem grossen Tuberkelknäuel eingeschlossen ist. Nur die ausserhalb der Lungen liegenden Drüsen erreichen eine so erhebliche Grösse, die die Bronchien innerhalb der Lungen begleitenden Drüsen werden kaum grösser als eine kleine Mandel oder lagern sich als halbmondförmige Rinnen um die ersten. Das Drüsenparenchym ist in der Regel ganz verschwunden und es bleibt nichts mehr übrig als eine Hülle, die ehemalige Drüsenmembran, an welcher allseitig eine gelbe Tuberkelmasse adhärirt. Dieselbe scheint wenig Neigung zur Erweichung zu haben, man findet wenigstens auffallend selten schmelzende Tuberkel in den Drüsen, wenn sie aber statt hat, so kann sie ebenso gut an der Peripherie wie im Centrum beginnen. Bei älteren Kindern kommt wohl hier und da auch eine partielle Verkalkung zu Stande. Die Wirkung der tuberculösen

Bronchialdrüsen auf die Nachbarorgane ist eine zweifache, wie Billiet und Barthès sehr gründlich entwickeln. Aus den Angaben dieser Autoren sind folgende Thatsachen zu entnehmen: Die Drüsen wirken entweder 1) durch Compression oder 2) durch feste Verwachsung mit den Nachbarorganen und nachträgliche Perforation.

ad 1) Die Anatomen scheiden die ausserhalb der Lungen liegenden Drüsen a) in Trachealdrüsen, zur Seite der Trachea bis zur Theilung derselben; b) in Bronchialdrüsen zwischen der Bifurcation; c) in Herzdrüsen auf dem Herzbeutel und den grossen Gefässen; und d) in Oesophagusdrüsen, im Mediastinum posticum in der Nähe des Oesophagus. Alle diese Drüsen können eine tuberculöse Entartung und Vergrösserung erfahren und dann auf die zunächst liegenden Organe drücken.

Was die Compression von Gefässen betrifft, so sind derselben unterworfen: die Vena cava superior, die Lungenarterie, die Lungenvenen und die Vena azygos. Es sind Beispiele von vollständiger Obliteration der genannten Venen in der Literatur aufgezeichnet, ich selbst habe dergleichen noch nie beobachtet, sondern erinnere mich nur einmal in einer Lungenvene bei gleichzeitiger Bronchialdrüsentuberculose eine Verengung gesehen zu haben. Die Compression der Gefässe kann Hämorrhagien und Oedeme verursachen. So veranlasste z. B. die der oberen Hohlvenen nach den genannten Autoren eine Blutung in den Arachnoidealsack und Oedem des Gesichtes. Bei Druck auf die Lungenvenen liegt die Möglichkeit eines Lungenödems sehr nahe.

An der Trachea und der Bifurcation findet man zuweilen Eindrücke und Abflachungen, die ebenfalls von tuberculösen Drüsen herrühren, aber keine deutliche Verengung des Lumens zu erzeugen im Stande sind. Wichtiger ist die Compression der Nerven, namentlich der Nn. vagi. Die Drüsen wachsen zuweilen so innig um dieselben herum, dass es dem anatomischen Messer geradezu unmöglich wird, sie in denselben zu präpariren. Die Leitung scheint nichts desto weniger nicht unterbrochen zu sein, sonst müssten beträchtlichere Störungen in Circulation und Respiration viel häufiger bei Drüsentuberculose beobachtet werden, als dies in Wirklichkeit der Fall ist. Compression des Oesophagus scheint sehr selten vorzukommen, zuweilen wird eine einfache, seitliche Verschiebung derselben wahrgenommen.

ad 2) Die Bronchialdrüsen können in- und ausserhalb der Lunge mit den Bronchien innig verwachsen und bei nun eintretendem Schmelzungsprocess die Bronchialwand perforiren. Nach Billiet und Barthès sollen auch nicht schmelzende, harte Tuberkelknoten die Knorpelringe der Bronchien umstürzen und so Perforation veranlassen können, ein Zustand, der von den pathologischen Anatomen bisher wenig beobachtet worden ist. In den Lungen selbst ist es schwer, eine Caverne von einer in einen Bronchus durchgebrochenen, vereiternden Bronchialdrüse zu unterscheiden. Diese Pseudocavernen sitzen stets in der Nähe der Lungenwurzel und ihre Höhlung hängt auch aussen mit den übrigen Tuberkelmassen der entarteten Bronchialdrüsen zusammen.

Die genannten Autoren sprechen auch von einer tuberculösen Perforation der Pulmonararterie und des Oesophagus, woeüber ich keine eigene Erfahrung besitze.

Symptome.

Was zuerst die physikalische Untersuchung betrifft, so muss hier nochmals eingeschärft werden, dass die Percussion sehr leise und in langsamer Aufeinanderfolge der Schläge vorzunehmen ist, weil sonst die leichteren Dämpfungen regelmässig übersehen werden. Bei Miliartuberculose, wo die beiden Lungen gleichmässig mit sandkorngroben Tuberkeln durchsetzt sind, gibt die Percussion natürlich keine Aufklärung, der Percussionsschall ist im Allgemeinen etwas tympanitisch, eine Ungleichheit zwischen den beiden Brusthälfen lässt sich aber nicht entdecken. Das gleiche gilt von der Tuberculose der Bronchialdrüsen, die von den Lungen und grossen Gefässstämmen bedeckt sind und so der physikalischen Diagnose gänzlich entgehen. Hingegen lassen sich grössere tuberculöse Infiltrationen durch leises aufmerksames Percutiren sehr wohl finden, nur sind, wie schon bei der pathologischen Anatomie erwähnt wurde, die Lungenspitzen nicht so ausnahmslos der Sitz derselben. Man findet häufig weiter unten oder seitwärts eine ausserordentlich Dämpfung, die ebenfalls auf Tuberculose zu beziehen ist und bei Erwachsenen in dieser Weise fast niemals vorkommt. Wenn einmal Cavernen sich gebildet und ihren Inhalt durch einen Bronchus entleert haben, so wird der matte Percussionsschall wieder etwas mehr ausnehmend tympanitischen Beiklang, was durchaus keine Besserung noch Verkleinerung der Tuberkelinfiltration anzeigt.

Durch Auscultation entdeckt man bei Miliartuberculose nichts Charakteristisches; der hierbei immer bestehende Bronchialcatarrh verursacht weit verbreitete gross- und kleinhörnige Rasselgeräusche, die sich von denen eines einfachen Bronchialcatarrhes durch nichts unterscheiden. Bei grösseren tuberculösen Verdichtungen des Lungengewebes hört man Bronchialathmen, starke Consonanz der Stimme und des Hustens und abnorme deutliche Fortleitung der Herzstöße in vom Herzen entfernten Lungenspartien. Am Rande der Dämpfung wird an einzelnen Stellen Knisterrasseln oder einfach verschärftes Athmen vernommen. Der Herzstoss ist bei allen tuberculösen Kindern auffallend stark. Schmilzt nun eine solche Tuberkelinfiltration und entstehen Cavernen, so ändern sich auch die auscultatorischen Symptome ebenso, wie dies schon bei der Percussion erörtert wurde; es stellt sich ein cavernöses Gurgeln und Rasseln ein und das Athmungsgeräusch wird cavernös, doch sind die Cavernen der kleineren Kinder in der Regel nicht von solchem Umfange, dass diese Symptome immer regelmässig und gehörig charakteristisch zum Vorschein kämen.

Was nun die functionellen Symptome betrifft, so sind dieselben mannigfacher Art. Die Respirationsbewegungen sind fast immer beschleunigt, am schnellsten bei febrichter acuter Tuberculose, wo die beiden Faktoren, 1) Fieber und 2) mechanisches Hinderniss der Luftwege, sich vereinigen. Sie steigern sich dann zu einer Höhe von 60–80 in der Minute. Bei chronischer Tuberculose ist die Beschleunigung kaum merklich und gar keine Dyspnoe zugegen. In der nach sich entwickelnden und fortschreitenden Fällen aber kann gerade Athemnoth, selbst Orthopnoe und Nasenflügelathmen sich einstellen, was mehr auf Rechnung gleichzeitiger Pleuritis und partieller tuberculöser Pneumonie als auf Rechnung der Raumbengung in Folge der Tuberkel kommt. Im Allgemeinen kann angenommen werden, je acuter und

verbreiteter der Process in den Lungen, um so beschleunigter und erschwerter sind die Respirationsbewegungen.

Der Husten ist unter allen Symptomen der constanteste; denn gänzlich fehlt er niemals; am schwächsten und am wenigsten bemerkbar ist derselbe bei acuter Miliartuberculose, wo derselbe Process in anderen Organen, vor allem im Gehirn, die Reizbarkeit des Nervensystems in einer solchen Weise herabsetzt, dass diese hydrocephalischen Kinder oft Tage lang nicht ein einziges Mal husten, obwohl bei der bald darauf stattfindenden Section beide Lungen mit miliaren Tuberkeln durchsetzt und die Bronchialdrüsen in eine käsige Masse verwandelt gefunden werden.

Der Husten ist nicht nur das constanteste, sondern auch das frühzeitigste aller Symptome, er hört während des ganzen Verlaufes niemals vollständig auf, wenn auch zuweilen kurze, zur Stellung einer günstigeren Prognose verführende Remissionen eintreten. Anfangs ist er trocken und kurz, aber doch schon häufig wiederkehrend, später, wenn grössere Partheiten der Lunge sich betheiligen, wird er feucht und wohl auch von convulsivischen Anfällen begleitet. Diese Anfälle haben grosse Aehnlichkeit mit denen des Keuchhustens, nur fehlt hierbei die charakteristische, laute, langgezogene Inspiration am Ende des Hustens, auch kommt es im Verlaufe einiger Wochen nicht zum Auswurf des massenhaften glasigen Schleimes. Dieser krampfartige Husten hat in der Regel seinen Grund in den tuberculösen vergrösserten Trachealdrüsen, welche einen sich fortwährend steigenden Druck und Reiz auf die Trachea und consensual auf den Larynx ausüben, kann übrigens auch durch profuse Secretion allein bedingt werden, wie diese bei erwachsenen Kranken, die an einfacher Bronchialblennorrhöe leiden, oft genug beobachtet wird. Wenn die letztere Ursache besteht, so hört der Anfall auf, sobald der Schleim den Larynx passiert hat, was bei Kindern nicht so leicht zu beurtheilen ist, da sie ihn alsbald wieder verschlucken. Bei Bronchialdrüsentuberculose hingegen können die Anfälle unbestimmte Zeit und ohne alle Expectoration fortbestehen und hören in der Regel erst auf, wenn die Erschöpfung einen hohen Grad erreicht hat.

Die Expectoration, welche bei erwachsenen Tuberculösen einen vortrefflichen Anhaltspunkt gibt, kann bei Kindern bis zum fünften oder sechsten Lebensjahre gar nicht verworfen werden, indem diese ihr aus dem Larynx ausgestoßten Maassen sogleich wieder schlucken. Nur bei heftigen Hustenanfällen sieht man zuweilen auch bei ganz kleinen Kindern einen weisslichen, feinbläsigen Schaum auf der Zunge, und selbst zwischen die Lippen treten, der aber durchaus nur als einfaches Secret der catarrhalischen Bronchien zu betrachten und keineswegs für Tuberculose charakteristisch ist. Ueber sieben Jahre alte Kinder, bei welchen übrigens bis zum Eintritt der Pubertät die Phthisis der Lungen sehr selten ist, expectoriren wie die Erwachsenen, und der aus den Cavernen entleerte Eiter ist ebenso zerfliessend und arm an Luftblasen wie bei jenen. Das seltene Eintreten der Hämoptöe tuberculöser Kinder wurde schon p. 261 bei Gelegenheit der Lungenblutungen überhaupt erwähnt.

Sind die Kinder schon gross genug, um den Ort ihrer Schmerzen anzugeben, so bezeichnen sie fast immer die Herzgrube oder das Ster-

nun und nur äusserst selten eine seitliche Parthie des Thorax als Sitz derselben. Die Erforschung des mehr oder minder heftigen Schmerzes ist prognostisch nicht ohne Bedeutung, denn je heftiger derselbe und je grösser die dadurch bedingte Unruhe, um so rascher gehen die Kinder dem sicheren Untergang entgegen. Da die Tuberculose selten auf eine Lunge beschränkt ist, so bemerkt man auch an der Lagerung solcher Kinder keine constanten Veränderungen; sie liegen meist auf dem Rücken und wählen nur selten eine Seitenlage. Auffallend ist, dass sie sich trotz der schrecklichen Abmagerung, der langen Dauer der Krankheit und dem anhaltenden Fieber nur wenig und sehr oft aufliegen. Am Habitus des Thorax ist stets eine mit den übrigen Körperverhältnissen nicht übereinstimmende grössere Abmagerung und eine für Tuberculose ziemlich charakteristische Entwicklung der subcutanen Venen zu bemerken. Es erreichen diese Venen besonders in der Nähe des Sternums von der ersten bis dritten Rippe eine gewaltige Ausdehnung und können bis zur Breite einer Linie schwellen.

An den Fingerspitzen bemerkt man bei allen chronischen Krankheiten, in welchen die Blutcirculation der Lungen gehemmt ist, also namentlich bei ausgedehnter Tuberculose und bei Herzfehlern, eine eigenthümliche, kolbige Anschwellung, wobei die Nägel sich krallenartig nach vorne krümmen. In den höchsten Graden dieser Wölbung bekommen die Finger das Aussehen eines Trommelschlägels. Wir besitzen hierin ein sehr werthvolles Zeichen, weil dieses Dickerwerden der Fingerspitzen niemals angeboren und nie bei gesunden Kindern vorkommt, sondern immer einen höheren Grad von Stase im rechten Herzen, der in der Regel seinen Grund in den Lungen hat, zu erkennen lässt.

Bedeutend vergrösserte Bronchialdrüsen machen, wie schon bei der pathologischen Anatomie bemerkt wurde, zuweilen ein Oedem des Gesichtes. Dasselbe muss auf locale Circulationsstörung zurückgeführt werden, weil bei dem in Folge der Dyskrasie entstehenden Hydrops bekanntlich zuerst die Füsse schwellen und erst nach längerer Zeit ein Oedem der oberen Extremitäten und des Gesichtes nachfolgt, während in diesem Falle das des Gesichtes allein besteht. Man findet alsdann auch eine beträchtliche Erweiterung der subcutanen Halvonen und eine leichte Cyanose an den Lippen und Augenlidern. Billard und Barthès haben durch mehrere Sectionsbefunde in solchen Fällen nachgewiesen, dass wirklich ein Druck vergrösserter Drüsen auf die V. cava descendens stattgefunden hat.

Die Tuberculose der Lungen verläuft entweder als acute Miltuberculose, wobei dann derselbe Process auch in anderen Organen, namentlich oft im Gehirn und auf dem Peritonäum, sich etabliert und durch mannigfache von anderen Organen ausgehende Symptome in der Lungen in den Hintergrund treten lässt, oder sie verläuft chronisch wie bei Erwachsenen unter den Zeichen der Phthisis pulmonum. Die erste Form wird bei der Besprechung der Dyskrasie nochmals erwähnt werden, die zweite hat eine Dauer von zwei Monaten bis zwei Jahren und kann auch wieder vollständig zum Stillstande gebracht werden. Ich kenne Kinder von nachweisbar tuberculösen Eltern, die in den ersten Jahren ihres Lebens ganz entschiedene Zeichen der entwickelten Lungentuberculose, deutliche Dämpfung an einer oder der andern

Stelle der Lungen, Bronchialathmen, Knisterrasseln, heftige lang anhaltende Bronchitis, Abmagerung, Fieber etc. erkennen liessen und dennoch wieder vollkommen genesen, d. h. nur scheinbar, die Ernährung kam in Gang, das Aussehen wurde blühend, das Fieber und der Husten nahm langsam ab, die Dämpfung aber blieb, und bei der geringsten Störung des Allgemeinzustandes tritt immer wieder neue, hartnäckige Bronchitis auf. Zweifeln verallgemeinert sich zum Schlusse der Process noch und es gehen dann auch die phthisischen Kinder unter den Symptomen der Miliartuberculose zu Grunde.

Bezüglich der Therapie muss auf die Vorschriften verwiesen werden, welche bei der Tuberculose als Dyskrasie gegeben werden sollen.

10) Krebs der Lungen und des Mediastinum anticum.

Krebs ist im Allgemeinen bei Kindern schon ausserordentlich selten und der der Lungen ist erst einige Male beschrieben worden. Man fand in den Leichen neben Krebsknoten anderer Organe auch Carcinoma medullare der Lunge in Form weisser oder grauröthlicher Knoten der verschiedensten Grösse. Sie sitzen sowohl in der Tiefe als an der Peripherie, flachen sich ab, wenn sie an der Pleura angelangt sind, und bekennen ebenso wie die Leberkrebs eine nabelförmige Vertiefung in ihrer Mitte. Die bei Lebeweilen bemerkbaren Symptome reduciren sich auf Bronchitis und Athemnoth und werden gewöhnlich von denen der Krebs in anderen Organen verdrängt.

Krebs im Mediastinum anticum beobachtete ich schon drei Mal bei 5—10jährigen Knaben. Da in diesen Fällen das ganze Mediastinum anticum mit demselben erfüllt und die Pleuren, die Lungen und der Herzbeutel damit verwachsen waren, so wird eine Beschreibung derselben an diesem Platze nicht ungeeignet erscheinen.

Die Entwicklung dieses Krebses scheint eine ziemlich rapide zu sein, wenigstens gaben die Kinder erst wenige Wochen vorher die ersten Zeichen eines Respirationsleidens zu erkennen und doch war bei der alsbald vorgenommenen Percussion schon eine beträchtliche Dämpfung unter dem Sternum, die sich nach beiden Seiten über dasselbe hinaus erstreckte, bemerkbar. Das Hauptkriterium ist also die besagte Dämpfung, welche sich im Verlaufe nicht bloss durch Wachsen des Krebses, sondern auch durch hydropische Ergüsse in die Pleurasacke gewaltig vergrössert. Dass das die Dämpfung veranlassende Exsudat nicht flüssiger Natur ist, lässt sich leicht nachweisen. Man hört nämlich über demselben die Herztöne fast so laut, als wenn man das Herz selbst auscultirte, auch die in den catarrhischen Bronchien entstehenden Rasselgeräusche sind über der Krebsgeschwulst ausserordentlich deutlich vernnehmbar. Die functionellen Störungen richten sich hauptsächlich nach der Richtung, in welcher der Krebs am schnellsten wächst. Die grossen Venenstämme müssen in zweien meiner Fälle comprimirt gewesen sein; denn es waren Oedem des Gesichtes und der Hände zugegen und die Halsvenen beträchtlich ausgedehnt. Wegen der höchst peniblen Compression der vorderen Lungenpartien haben die Kinder fortwährend Orthopnoë und athmen am höchsten, wenn sie den Rücken krümmen und den Kopf nach vorwärts beugen, welche Stellung

auch im Schlafe beibehalten wird. Die Rückenfliche des Thorax gibt einen sener tympanitischen Percussionsschall, und da diese Parthien für die vorderen comprimierten vicariären müssen, so ist das Athmungsgeräusch in denselben ausserordentlich verschärft und häufig durch Rasselgeräusche verdeckt. Das Herz ist nach aussen und unten gedrängt und liess in dem einen Falle ein blasendes systolisches Geräusch hören, ohne dass bei der Section materielle Veränderungen am Herzen oder den Klappen dasselbe hätten erklären können. Der Puls ist sehr beschleunigt, der Appetit nicht vollkommen geschwunden, weshalb auch die Abmagerung keinen so hohen Grad wie bei Tuberculose erreicht. Endlich wird zum Glücke für die Kranken und ihre Umgebung das Gehirn in Mitleidenschaft gezogen, es tritt Sopor oder Irreceden ein und die Kranken gehen alsdann rasch zu Grunde.

Bei der Section fand ich in dem einen Falle einen Mediastinkrebs, der das ganze Mediastinum anticum einnahm und sich auf die vordere Parthieen der rechten Lunge erstreckte, ohne in derselben noch in irgend anderen Organen secundäre Knoten veranlasst zu haben, in dem anderen Falle ein Cystosarkom, das Lungen und Herz einstück drängte, nicht aber infiltrierte, von der Grösse einer starken Maissfrucht. In beiden Fällen beträchtlicher Hydrothorax, aber nur unbedeutende Ascites. Der dritte Fall konnte nicht secirt werden.

Die höchst traurig anzunehmende Athemnoth dieser Kinder kommt durch grössere Dosen Morphium 0,005—0,03 pro die in ganz überraschender Weise temporär beschwichtigt werden.

11) Keuchhusten. *Tussis convulsiva. Pertussis.*

Der Keuchhusten ist ein epidemischer, contagiöser Bronchialcatarrh mit eigenthümlichen, convulsivischen Hustenanfällen. Hippokraties hat ihn an keiner Stelle deutlich beschrieben, die Schilderungen der Epidemien aus früheren Jahrhunderten passen nicht vollständig auf den Symptomencomplex, wie er jetzt beobachtet wird, und erst seit dem 18. Jahrhundert finden sich aus den verschiedensten Ländern exaktere Angaben hierüber. Er hat ausser den oben aufgeführten noch eine Menge anderer Bezeichnungen erhalten, als coqueluche (in Frankreich); chin-cough (England); affection pneumogastro-pituitous; bronche céphalite; catarrhe convulsif, pertussis, tussis suffocativa, spasmodica, strangulans, clingosa, ferma, Mauer Husten; Schafknoten; Eiekhusten. Wir haben es hier mit keiner einfachen pathologisch-anatomischen Veränderung, sondern mit einer reinen kosmischen Krankheit und zwar aus der Klasse der sogenannten atmosphärischen Seuchen zu thun.

Symptoma.

Man kann im Verlaufe des Keuchhustens mit ziemlicher Exactheit drei Stadien unterscheiden: 1) ein Stad. catarrhale, 2) ein Stad. convulsivum und 3) ein Stad. decrementi.

1. Stadium. Die Erscheinungen des Stad. catarrhale oder prodromorum oder invasionis sind die des einfachen Bronchialcatarrhes, zweiten mit gastrischen Symptomen complicirt. Etwas Heiserkeit, Kitzel im Halse, trockner Husten, Niesen, reichlicher Schleimfluss an

der Naos, Thränen und Röthung der Augen werden zusammen oder vereinzelt fast bei jedem Kinde mit beginnendem Keuchhusten beobachtet. Gewissen sah, was häufig vorkommt, hiesu noch Fiebersymptome, heisse Haut, frequenter Puls, Abgeschlagenheit, allgemeines Unbehagen und Appetitmangel, so hat man ganz das Bild des Incubationsstadiums der Masern, worauf, wenn Keuchhusten und Masern zugleich an einem Orte herrschen, prognostisch wohl zu achten ist. Der Husten nimmt schon gleich zu Anfang einen eigenthümlich höhlen, metallischen Klang an, tritt bald paroxysmusartig auf und ist, wenn kein früher bestehendes Lungenleiden zugegen ist, stets vollkommen trocken. Dieses Stadium dauert zwischen einer halben und 3 Wochen und wird, mehr oder minder ausgeprägt, bei jedem Keuchhusten beobachtet.

2. Stadium. Das Stad. convulsivum oder nervosum zeichnet sich durch den in heftigen Paroxysmen sich wiederholenden Husten aus, der so eigenthümlich ist, dass man ihn nie wieder vergisst, wenn man ihn nur einmal gehört hat. Etwas grössere Kinder haben gewöhnlich eine Vorempfindung des Anfalles. Sie bekommen Kitzel im Halse, Drücken auf der Brust oder Ueblichkeit, sie athmen ängstlich und hastig, richten sich im Bette in die Höhe, oder laufen, wenn sie wach sind, nach einem Stuhle oder irgend einer andern Stütze, um so den Anfällen kräftigen Widerstand leisten zu können. Der Anfall selbst besteht in einer grösseren Reihe kurzer, rasch aufeinander folgender, nicht ganz gleichmässiger Hustenblässe, welche von einem länger gedehnten, pfeifenden, schlürfenden Inspirationsversuche unterbrochen werden. Die Franzosen bezeichnen diese pfeifenden Inspirationen mit „reprise“. Unmittelbar nach der ersten Reprise beginnen die convulsivischen, expiratorischen Hustenblässe von Neuem, dauern 10—15 Sekunden an, worauf dann wieder eine Reprise folgt, und so wiederholen sich diese beiden Akte gewöhnlich mehrmals in der Weise, dass ein ganzer Anfall von Beginn bis zum Wiedereintritt der normalen Respiration 1—15 Minuten dauert. Die Hustenerschütterungen zu Anfang des Paroxysmus folgen ausserordentlich schnell und ohne alle Intervalle auf einander, so dass man die Kinder dem Erstickungstode nahe glaubt. Es dringt auch in der That während des Hustens bis zur Reprise gar keine Luft in die Lungen ein, wovon man sich durch Auscultation der Rückenfläche des Thorax überzeugen kann. Bei der Reprise ist offenbar die Stimmritze in einem Zustand momentaner Verengung, entweder in Folge von Krampf oder von Paralyse, wie dies schon bei der Lehre vom Krup ausführlicher auseinandergesetzt wurde, und alle respiratorischen Hilfsmuskeln des Halses und Abdomens kommen hierbei in Thätigkeit. Bei den würgenden Hustenbewegungen entstehen gewaltige Störungen des Kreislaufes, das Blut staut sich in der Pulmonalarterie und bedingt abdam eine Erweiterung des rechten Herzens und des ganzen peripherischen Venensystems, was namentlich an den grossen Halsvenen deutlich zu sehen ist. Uebrigens werden die Kinder am ganzen Kopfe bläuroth, wober auch die Bezeichnung des „Blauhustens“ entstanden ist. Die Augen injiciren sich und treten etwas vor. Das Gesicht schwillt an und bedeckt sich mit einem kalten Schweisse, die Herzbewegungen, und davon entsprechend der Puls, werden schwach und ungleich; oft werden Harn und Koth durch die

heftigen Contractionen der Bauchmuskeln unwillkürlich angetrieben, zuweilen entstehen hiedurch auch Hernien und Mastdarmanfälle. Die rechte Seite gibt häufig Veranlassung zu Blutungen; die gewöhnlichsten sind die aus Mund und Nase. Ob das hier in grosser Menge ausgehustete und erbrochene Blut aus den Lungen kommt, wie einige glauben, ist sehr zu bezweifeln, weil darauf sehr häufig gar keine consecutive Veränderung der Lungen und keine Verschlimmerung des Allgemeinbefindens sich einstellt und bei einem nach einigen Minuten wiederkehrenden Hustenanfalle ein vollkommen farbloser Schleim ausgeworfen wird. Wir wissen aber, dass nach einer Hämoptie, z. B. von Tuberculosen, die Sputa noch mehrere Tage blutig gefärbt bleiben. Häufig treten auch Extravasate auf der Conjunctiva bulbi, oder im lockeren Zellgewebe der Augenlider ein, wo dann das extravasirte Blut dieselben Farbenveränderungen eingeleitet, die wir bei äusseren Verletzungen beobachten können. Bouchut erzählt einen Fall, wo ein Kind in Wirklichkeit blutige Thränen weinte und gibt auch an, dass die Hämorrhagien bei Keuchhusten bis zur Lebensgefahr profus werden, was ich noch nicht erfahren konnte. Auch die Blutungen an den Ohren, deren in den meisten Handbüchern Erwähnung geschieht, konnte ich noch niemals beobachten, bezweifle sie jedoch nicht, hauptsächlich wenn Otorrhöen und Ulcerationen im äusseren Gehörgang vorhanden sind. P. Frank berichtet von einer merkwürdigen Krankheit, die bei jedem Anfalle 100 Mal und darüber niesen musste. Reizbar Kinder endlich können in allgemeine Convulsionen verfallen.

Den Schluss des Anfalles bildet gewöhnlich Erbrechen, wodurch zu Anfang dieses zweiten Stadiums nur wenig Schleim aber viel Speichel und Magensaft entleert wird. Je länger der Keuchhusten besteht, je näher er dem dritten Stadium kommt, um so profuser wird die Secretion der Bronchien, und endlich wird bei jedem Hustenanfalle halb durch Husten-, halb durch Brochbewegung eine grosse Menge farblosen, süßen Schleimes expectorirt.

Sind die Anfälle von sehr langer Dauer, bis zu 10 und 15 Minuten, so fühlen sich die Kinder hierauf erschöpft, klagen über Schmerzen in der Brust, atmen noch einige Zeit ängstlich und frequently sinken abhald in einen Schlaf. Gewöhnlich aber, bei mässig starken Paroxysmen, vergessen sie unmittelbar nach dem Aufhören desselben ihr ganzes Leid und setzen zum grossen Erstaunen der unersahenen Umgebung ihre Spiele oder sogar ihre Mahlzeiten sogleich wieder fort. Der einfache Keuchhusten ist fieberlos, der Eintritt von Fieber und Appetitmangel zeigt immer eine Complication an.

Die Anzahl der Paroxysmen binnen 24 Stunden variiert zwischen 4—60, gewöhnlich aber treten nicht mehr als 18—24 in diesem Zeitraum ein, wobei jedoch niemals eine wirkliche Regelmässigkeit in der Aufeinanderfolge oder Gleichheit der Intervalle beobachtet wird. Am stärksten und häufigsten sind sie des Abends, wo gewöhnlich verschiedene äussere Gelegenheitsursachen, Erhitzung, geistige Aufregung, Essen und Trinken zusammenwirken. Die Anfälle stellen sich entweder ganz spontan bei ganz ruhig sich verhaltenden Kindern ein, oder so werden durch Schreien, Gemüthsbewegungen aller Art, Lachen, Schlucken besonders von trocknen kratzenden Bissen, kalte oder verunreinigte Luft etc. veranlasst. Sind mehrere Keuchhustenkranke Kinder so-

sammen und eines beginnt zu husten, so steckt dieser Anblick meistens an und alsbald stimmt der ganze Chor in dieses höchst jämmerlich ansehende Concert ein.

Dieses Stadium dauert bei gesunden Kindern und unter günstigen äußeren Verhältnissen vier Wochen, kann aber im entgegengesetzten Falle acht Wochen und darüber währen. Nachlass der Heftigkeit und Häufigkeit der Paroxysmen verbunden mit zunehmender Bronchialsecretion deutet den baldigen Uebergang in das dritte Stadium an.

3. Stadium. In diesem Stadium criticum & decrementi haben die Hustenanfälle ihre Heftigkeit verloren. Die Paroxysmen sind nicht mehr so lang und rapid, die Reize hören ganz auf, Bronchialbewegungen sind wohl noch vorhanden, es wird durch dieselben aber kein Sputum, sondern nur eine ansehnliche Menge von Bronchialschleim zu Tage gefördert. Dieser Schleim ist meistens gelblich oder grünlich gefärbt und mit jedem Hustenanfall wird nahezu ein Esslöffel voll desselben expectorirt. Bei den meisten Kindern stellen sich zu dieser Zeit nächtliche Schweiße ein, zuweilen brechen auch Exzeme aus. Auscultirt man die Lungen, so hört man allseitig grobschlägige Rasselgeräusche. Der Husten, einmal in diesem Stadium angelangt, hört bei gesunden Kindern in 2—3 Wochen vollständig auf, bei tuberculösen und scrophulösen Kindern hingegen dauert er noch viele Monate fort. Oft kommen auch noch kleine Recidive vor, wobei ein Rückschritt in das zweite Stadium bemerkbar wird, gewöhnlich aber bald wieder Besserung eintritt.

Die Complicationen dieser Krankheit sind zahlreich und meisten Theils gefährlicher Natur.

Die häufigste und am nächsten liegende Complication ist die Erkrankung des Lungoparenchyms, welche sich sehr leicht durch Senkung und Zersetzung des massenhaften Bronchialschleimes entwickeln kann. Gewöhnlich charakterisirt sie sich als lobuläre Pneumonie, nur ausnahmsweise als lobäre, und ist um so mehr zu fürchten, je jünger die Kinder sind. Kinder unter einem Jahre, welche viel auf dem Rücken liegen und noch nicht so entwickelte Muskulatur haben, dass die Schleimmassen gehörig expectorirt werden können, bekommen außerordentlich häufig während des Keuchhustens die Symptome der lobulären Pneumonie, heisse Haut und frequente, schmerzliche Respiration mit lauten Geräusche beim Ausathmen und mit Heben der Nasenflügel. Die Paroxysmen verlieren dabei ihren Charakter, indem ein trockner aber häufiger, mit schmerzhafter Verzerrung der Gesichtszüge verbundener Husten sich einstellt. Die meisten Kinder gehen hierauf nach einigen Tagen unter Convulsionen und merklicher Cyanose zu Grunde, und nur bei einzelnen wenigen schwinden die Symptome der lobulären Pneumonie wieder ab, worauf dann der frühere Keuchhusten abermals zum Vorschein kommt, jedoch immer noch die große Gefahr von Recidiven besteht.

Andero Kinder erkranken an der gastrischen Complication. Sie bekommen belegte Zunge, Appetitmangel, Fieber, allgemeine Abgeschlagenheit und faulig riechende Faeces. Eigenthümlich ist das in Deutschland längst bekannte, zum Theil wieder in Vergessenheit gerathene Geschwür am Zungenbändchen, worauf in neuerer Zeit Gambarini in Mailand aufmerksam macht. Das Geschwür zeigt fast

immer eine die Längsachse des Zungenhöndchens querdurchschneidende Richtung und findet sich sehr häufig bei 1—2jährigen Keuchhustenkindern, niemals bei ganz kleinen und sehr selten bei älteren Kindern. Es scheint auf mechanische Weise erklärt werden zu müssen, indem nämlich bei den forcirten Hustenbewegungen die Zunge stark vorgestreckt und das Zungenhöndchen von den scharfen unteren Schneidezähnen gleichsam abgesägt wird. Es kommt desshalb niemals bei noch zahnlosen Kindern und bei grossen Kindern aus dem Grunde selbst vor, weil die letzteren schon mehr abgestumpfte Schneidezähne haben und ausserdem bei den Anfällen die Zunge nicht so weit vorzustrecken pflegen. Es fehlt übrigens in einer grossen Zahl von heftigen Keuchhustenerkrankungen und wird auch bei andern Kindern mit einfacher Bronchitis, sowie auch ohne allen Husten als aphthöses Geschwür, besonders während des Zahnens, beobachtet. Dieses Geschwür heilt trotz aller Behandlung nicht, so lange das convulsivische Stadium währt, sobald aber die Intensität des Hustens nachlässt, heilt es spontan.

Wieder bei andern Kindern stellen sich in Folge der venösen Stase bedenkliche Gehirnsymptome ein, was jedoch im Allgemeinen schon seltener beobachtet wird. Die Kinder werden schlafstichtig, greifen oft nach dem Kopfe, klagen über heftige Kopfschmerzen und der Keuchhusten tritt hierbei allmählich in den Hintergrund. Endlich kommt es sogar zu Zuckerschauern, hydrocephalischem Erbrechen, Convulsionen und abwechselndem Sopor, der Tod erfolgt jedoch zu ausserst selten und man findet dann eine mit dem Keuchhusten nicht direkt zusammenhängende Gehirnkrankung, Hydrocephalus acutus oder eitrige Meningitis.

Als weitere seltene Complicationen sind noch zu erwähnen Peritonitis, Pericarditis und Pemphigus. Jadelot sah in mehreren Epidemien Pemphigusblasen entstehen, worauf in allen Fällen der Tod erfolgte.

Unter den Nachkrankheiten sind als die häufigsten zu erwähnen: chronischer Bronchialcatarrh, Kropf, Hernien, Vorfälle, Hydrops, Tuberculose und Aneurysmen.

Der Tod direkt in Folge eines Anfalles ist ausserordentlich selten, so dass ich mich trotz mehrfacher, ausgedehnter Epidemien kaum einzigen Falles zu erinnern weiss. Hingegen stirbt die Mehrzahl der von lobulärer Pneumonie ergriffenen Kranken, und die Kinder sterben einem Jahre können auch ohne Fieber so atrophisch werden, dass sie sich nicht mehr erholen.

Strenge Anschlüssen zwischen Keuchhusten und andern epidemischen Krankheiten existiren nicht. Die Keuchhustenenkranken können alle möglichen Krankheiten, die acuten Exantheme, Wechselieber, Typhus, Cholera etc. acquiriren, nur die chronischen Hustenbeschläge gehen seltener auffallend zurück, so lange der Keuchhusten währt.

Die Diagnose des Keuchhustens ist sehr leicht zu stellen. Der cyclische Verlauf, der eigenthümliche Husten mit den langgezogenen lauten Inspirationen, das Erbrechen am Schluss der Anfälle und hauptsächlich das epidemische Auftreten sowie die oft nachweisbare Contagiosität sind so constante Symptome, dass ihr Complex mit Sicherheit zur Diagnose führt. Uebrigens kann man bei einem jeden Keuchhustenanfall gleich einen Anfall hervorrufen (was für klinische Zwecke vortheilhaft

erscheint), wenn man mit dem Finger auf die Zungenwurzel drückt. Der hiedurch verursachte Würgbewegung folgt fast regelmässig ein heftiger Paroxysmus, der bei mangelhafter Beschreibung und Beaufsichtigung von Seite der Angehörigen die Diagnose sichert.

Pathologische Anatomie.

Stirbt ein vorher gesundes Keuchhustenkind in Folge eines Trauma's oder irgend einer acuten Krankheit, so findet man im convulsiven Stadium die Luftwege zuweilen injicirt und hyperämisch, zuweilen aber auch ganz normal, im letzten Stadium hingegen die Trachea und die grossen Bronchien mit jenem Schleime erfüllt, der bei Lebzeiten in so grosser Menge expectorirt wird. An der Stimmritze ist nicht die mindeste Veränderung wahrzunehmen.

Die Bronchialdrüsen sind zuweilen, aber durchaus nicht regelmässig geschwellt. Da man schon seit langer Zeit eine Neurose im Spiele glaubte, so wurden das Gehirn und Rückenmark sowie auch die Nn. vagi schon oftmals einer gründlichen Untersuchung unterworfen; dieselbe blieb in der Mehrzahl der Fälle gänzlich resultatlos, nur einzelne Forscher sprechen von einer Röthung der Nn. vagi, die höchst wahrscheinlich als Leicheninhibition zu betrachten ist, keineswegs aber bei der Seltenheit des Befundes des Keuchhusten bedingen kann.

Als Folgezustände findet man am häufigsten lobuläre und lobäre Pneumonie, cylindrische Erweiterung der Bronchien, partielles Lungenemphysem, Pleuritis, Pericarditis, Meningitis oder Tuberculose der Lungen und Bronchialdrüsen.

Aetiologie.

Der Keuchhusten ist contagios und befallt ein jedes Individuum nur einmal. Die Contagiosität einer Krankheit ist erwiesen, wenn sich eine grössere Anzahl von Fällen erweisen lässt, die entschieden durch Ansteckung entstanden sind. Dieses ist nun zur Genüge für den Keuchhusten geschehen und es ist deshalb ganz verkehrt, was einzelnen Fällen, in welchen keine Berührung mit Keuchhustenkranke vorgekommen ist, eine spontane Entstehung desselben abweisen zu wollen. Wissen wir ja doch noch gar nicht, ob nicht das Contagium so intensiv ist, dass es durch dritte Personen, z. B. Erwachsene, die selbst ganz gesund bleiben, übertragen werden kann. Uebrigens begünstigt die Fieberlosigkeit und lange Dauer des Processes, in Folge deren die kranken Kinder vielfach auf die Strassen und öffentlichen Plätze kommen, die Berührung mit denselben viel mehr, als diess bei irgend einer anderen contagiosen Krankheit der Fall ist. Die meisten erfahrenen und beschäftigten Aerzte sprechen sich mit Bestimmtheit dahin aus, dass der echte Keuchhusten die Kinder nur einmal befallt. Die Angaben weniger Anderer, die ihn zweimal bei ein und demselben Individuum beobachtet haben wollen, beruhen wahrscheinlich auf dem Umstande, dass manche Tuberculose dem Keuchhusten ähnliche Paroxysmen bekommen, oder dass ein schon in völliger Abnahme begriffener Keuchhusten von Neuem recidivirt.

Diese Ansteckungsfähigkeit und die hierauf eintretende Immunität bewirken nun, dass der Keuchhusten fast ausschliesslich eine Kinderkrankheit ist und dass nur selten Erwachsene, hauptsächlich aus sehr

vornehmen, hochadeligen Familien, wo die Kinder immer streng separirt worden sind, daran erkranken. Die Eltern und Kindermägler der Keuchhustenkranken leiden jedoch häufig an einer leichteren Art spasmodischen Hustens, der ebenfalls durch das Zusammensein mit den Kranken bedingt scheint, indem die Leute oft gar nicht zum Husten disponirt sind und ihn wieder verlieren, sobald sie aus der infectösen Atmosphäre auf längere Zeit herauskommen. Kleine Kinder vor Beginn der ersten Dentition sind weniger empfänglich als die, welche über die ersten Monate hinaus sind, jedoch kommt ausnahmsweise auch bei ersteren ein completter Keuchhusten vor, der sich gewöhnlich mit lobulärer Pneumonie complicirt und dann tödtlich endigt.

Welcher Art das contagiose Princip ist, lässt sich nicht mit Bestimmtheit angeben. Es ist höchst wahrscheinlich an die expectorirten Schleimmassen gebunden und verbreitet sich bei deren Verdampfung in die nächste Umgebung, wofür auch die Erfahrung spricht, dass Kinder im letzten Stadium am leichtesten anstecken. In neuester Zeit beschrieb Lätzerich einen Pilz, der constant im Auswurfe der Keuchhustenkranken und bei Sectionen auch massenhaft auf der Bronchialschleimhaut vorkommen soll. Auf Semmelstückchen, mit Milch durchtränkt, konnte der Pilz cultivirt werden und diese künstlich erzeugten Pilze, bei Kaninchen in eine kleine Trachealwunde gebracht, verursachten dann echte Hustenanfälle, klingend oder keuchend. Die Anfälle traten manchmal so heftig auf, dass ein ungemein zäher Schleim aus den Naseröhren herausgestreht wurde. Bei den Sectionen der Thiere fanden sich die Pilze reichlich in den Lungen. Seitdem wir diese Arbeit zu Gesicht gekommen, hatte ich noch keine Gelegenheit, eine Keuchhustenepidemie zu beobachten, werde aber nicht versäumen, bald möglichst diese wichtigen Untersuchungen anzuschließen. Im Rathsel bleibt freilich vor der Hand, warum im Falle der Bestätigung dieser Angaben die oben erwähnte Durchseuchung stattfindet, welche bei anderen, noxischen Pilzkrankheiten, wie Soor, Diphtherie, *Pharyngitis vericor* etc., bekanntlich nicht beobachtet wird.

Das Incubationsstadium dauert nur kurze Zeit, kaum je länger als 3—4 Tage. Das Geschlecht, die Constitution, die Lebensweise und die Jahreszeit ist ohne deutlichen Einfluss auf die Entstehung oder Verhinderung der Krankheit.

Durch die Contagiosität ist nun die epidemische Verbreitung des Keuchhustens bedingt, so dass im Verlaufe eines Viertel-, längstens eines halben Jahres die ganze jugendliche Bevölkerung oder wenigstens ein grosser Theil derselben durchseucht ist. Als die Herde der Verbreitung sind die Schulen, Kinderbewahranstalten und Kinderspitale zu betrachten. In den letzteren namentlich herrscht derselbe oft Jahre lang noch fort, nachdem er längst in der Stadt erloschen ist, indem immer wieder neue Kinder wegen chirurgischer oder anderer innerer Krankheiten dahin gebracht werden und dann den Husten *de novo* acquiriren.

Behandlung.

Die Prophylaxis besteht lediglich in Entfernung der Kinder aus dem Orte, in welchem der Keuchhusten eben herrscht, indem eine Absperrung nur sehr schwer durchzuführen ist und niemals die Ge-

rationen eines wirklichen Ortswechsels bietet. Schon Jenner bemerkte, dass vor Kurzem geimpfte Kinder von dem Keuchhusten bewahrt blieben und dass die Vaccination auf nicht geimpfte Keuchhustenkranke einen günstigen, abkürzenden Einfluss ausübte. Da bei uns zu Lande die Impfung gewöhnlich schon in den ersten Lebensmonaten vorgenommen wird, und kleine Kinder seltener daran erkranken als die nach vollendetem ersten Lebensjahre, so ist das Contingent, auf welches diese Prophylaxe anwendbar sein kann, ein ziemlich beschränktes. Ich impfte erst zweimal kleine Keuchhusterpacienten, wovon der eine vor zwei, der andere vor drei Wochen erkrankt war, bei beiden war der Verlauf ein regelmäßiger, die wirklichen Paroxysmen dauerten bei dem ersten Kinde noch zehn, bei dem zweiten sieben Tage lang fort, so dass, wenn man für den vollen Verlauf eine Dauer von sechs Wochen rechnet, allerdings eine mässige Abkürzung des Processes eingetreten ist. Die innoculöse Darreichung von Belladonna und das Umhängen von Säckchen mit verschiedenen stark riechenden Substanzen, Moschus, Kampher etc. hat sich in prophylactischer Beziehung längst als wirkungslos herausgestellt.

Die rationelle Behandlung der ausgesprochenen Krankheit zerfällt in Anordnung eines geeigneten Regimes, in Behandlung des einzelnen Paroxysmus und in Versuchen, auf medicamentösem Wege eine Abkürzung des ganzen Processes zu erzielen.

Was die Lebensweise betrifft, so richtet sich dieselbe nach der Jahreszeit; im Winter und bei scharfen rauhen Winden ist das Ausgehenlassen Keuchhustenkranker immer bedenklich und veranlasst häufig entzündliche Complicationen, im Sommer hingegen befinden sich die Kinder am allerbesten den ganzen Tag über im Freien. Es verläuft deshalb der Keuchhusten im Winter, wo die Kinder mehrere Wochen lang in das Zimmer gesperrt bleiben müssen und höchstens in einer warmen Mittagstunde einmal heraus dürfen, immer langsamer und hinterlässt häufiger Nachkrankheiten als im Sommer.

Bezüglich der Diät ist, so lange der Process einfach febriles verläuft, nichts zu ändern, nur muss man trocken Brod, trocknen Kuchen und überhaupt alle trocknen, etwas kratzenden Nahrungsmittel meiden, weil durch deren Verbeizeln am Kehlkopf unfähbar ein Anfall erzeugt wird. Bei eintretender febrilhafter Complication versteht sich eine antiplogistische Diät von selbst. Einen wohlthätigen Einfluss üben die Milchspeisen und der reichliche Genuss kuhwarmer Milch, während der so vielfach empfohlene Eibisch, Flieder- und Wollblumenthee gewöhnlich von den Kindern verschmäht wird.

Was die so sehr beliebte Luftveränderung betrifft, so hat ein Landaufenthalt bei weitem nicht den abkürzenden Einfluss, der ihm gewöhnlich zugeschrieben wird, wohl aber wirkt er zuweilen sehr überraschend, wenn Kinder im letzten Stadium des Keuchhustens, also in der vierten oder fünften Woche auf das Land gebracht werden. Durch die grosse Freude über den Ortswechsel, die veränderte Kost und Lebensweise sind die Reste des Keuchhustens gleichsam abgeschnitten, und man hört die Kinder kein einziges Mal mehr husten.

Schickt man aber Kinder, welche eben erst den Keuchhusten acquirirt haben, auf das Land hinaus, so ist durchaus keine Veränderung noch Abkürzung zu bemerken, sie stecken die Bauernkinder des ganzen

bisher verschonten Dorfes an und es kommt, wenn das eine oder andere Kind des Dorfes dann an lobulärer Pneumonie stirbt, zu böse mangenommenen Auftritten. In England und Frankreich wurde in neuester Zeit der Aufenthalt in Gasfabriken als auffallend heilsam empfunden, und es kann in der That auch nicht gelugnet werden, dass manche Kinder, allerdings nur nach der vierten Woche des Keuchhustens, denselben hiedurch rasch verlieren. Dieses Verfahren ist jedoch nur für eine geringe Zahl von Kranken anwendbar, da die Anstalten unmöglich eine grosse Zahl von Kindern mit ihren Müttern und Wärterinnen bergen können, der Betrieb der Fabrik belästigt wird, und in rauher Jahreszeit der Gang zu den meist entlegenen Anstalten unaufläufig ist. Meine auf dieser Erfahrung fusenden Versuche, die Kinder in eine Benzinstmosphäre zu bringen, indem man ihre Kleider und Betten damit besprengte, liessen keine deutliche Abkürzung noch Milderung des Hustens erkennen.

Bezüglich des Anfalles sind alle Gelegenheitsursachen sorgfältig zu vermeiden. Die Kinder müssen angehalten werden, langsam und still zu essen, so dürfen nicht laufen noch sich schütten, auch sollen ihnen, so lange es irgend geht, Gemüthsalterationen erspart werden. Da der Anblick Keuchhustenkranker, die eben einen Anfall haben, bei anderen gleichfalls einen solchen veranlasst, so ist es zweckmässig auch die kranken Kinder so viel als möglich von einander zu separiren.

Im Paroxysmus selbst befinden sich die Kinder am besten mit vorg gebeugtem Kopfe, die Arme an irgend einer Stütze anklammend. Wenn der Kopf zu weit nach vor- und abwärts sich neigt, so unterstützt man die Stirne passend mit der flachen Hand. Sehr heftig und langdauernde Anfälle kann man zweilen abkürzen, indem man ihnen den Finger weit in den Mund steckt und dadurch vorzeitige Erbrechen erzielt, worauf der Paroxysmus sogleich nachlässt. Überkill rüth, zu Beginn des Anfalles 20 Aether oder Chloroform in der hohlen Hand vor dem Gesichte des Kindes verdunstet zu lassen. Ich habe dies ein einziges Mal versucht, das Kind wehrte sich aber entschieden gegen diese Dämpfe, und das Zimmer noch den ganzen Tag stark nach Chloroform, so dass seine Bewohner Kopfweh bekamen und gegen eine fernere Application Verwahrung einlegten. Tritt nach Beendigung des Anfalles leichter Schwindel und Betäubung ein, so müssen die Kinder einige Zeit in liegender Stellung zubringen und der Kopf muss mit kalten Compressen bedeckt werden.

Die Mittel, welche gegen den Keuchhusten in Gebrauch gezogen worden sind, alle aufzuzählen, würde zu weit führen und doch wenig Nutzen bringen, da es sich jetzt zur Evidenz herausgestellt hat, die solche, die in einer Epidemie entschieden günstig wirkten, in einer anderen vollkommen ohne Erfolg blieben.

Unbegreiflicher Weise war und ist zum Theil noch eine belästigende Behandlung die mit Brechmitteln. Man reichte diese Emetica alle Tage oder wenigstens alle anderen Tage 1—2 Wochen lang fort und glaubte eine Minderung und Milderung der Anfälle zu erreichen. Die Franzosen gaben bei kleinen Kindern ihren Symp. Ipecacuanhae, bei grösseren Kindern das Vin. stibiat. Ich konnte mich an so wenig entschliessen, diese Therapie nachzuexperimentiren, als ihre Verwerfung jetzt im Allgemeinen sehr abgenommen haben, und bei einer Krank-

heit, zu deren Wesen so schon ein mehrmals sich wiederholendes Erbrechen gehört, eine künstliche Erzeugung des Brochaktos zum mindesten überflüssig erscheint.

Unter den Narcotica kam die Belladonna vorzugsweise in Gebrauch und gerade bei diesem Mittel wurde es am entschiedensten und öftesten beobachtet, dass ihre Wirksamkeit in verschiedenen Epidemien verschieden deutlich war. So hatte z. B. J. Frank in einer Epidemie günstige, in sechs anderen gar keine Resultate. Ich selbst habe gegen die Belladonna nur ausgesetzt die Ungleichheit der einzelnen Präparate, wodurch man zu einer äusserst vorsichtigen Steigerung der Dosen genöthigt wird. Sobald Erweiterung der Pupillen und Kratzen im Halse eintritt, mässigen sich die Paroxysmen allerdings sehr merklich; es sind diese Intoxicationssymptome an und für sich schon unangenehm, erschrecken die Angehörigen und steigern sich bei einzelnen Kindern, auch wenn mit dem Mittel ausgesetzt wird, zu fast vollkommener Blindheit, zu Schwindel und bedenklichen Delirien.

So lange aber die Pupille sich nicht erweitert, habe ich noch niemals einen Nachlass in den Paroxysmen antreffen können. Die mittlere Gabe ist 0,008 Rad. Belladonnae in Pulverform täglich zweimal. Da viele Kinder nicht gerne Pulver nehmen, so gibt man auch das Extr. Belladonn. 0,1–0,2 in 15,0 Bittermandelwasser gelöst, wovon täglich 2–3 Mal 20 Tropfen genommen werden sollen. Der Vorwurf der Ungleichheit in der Wirkung je nach dem Alter und der Art der Aufbewahrung trifft das Belladonna-Extract noch mehr als das Pulver. Eine Abkürzung des Keuchlaustens in seinem ganzen Verlaufe kann man durch die Belladonna nicht erreichen, und eine Schwächung des einzelnen Anfalles nur durch eine von unangenehmen Nebenwirkungen begleitete Intoxication.

Das Opium wurde auch schon vielfach empfohlen. Es gilt von demselben das gegen die Belladonna Vorgebrachte in noch erhöhtem Masse. Länger fortgesetzt bewirkt es schwer zu hebende Verstopfung und Gehirncongestion. Doch ist es auf der Höhe der Krankheit, wenn die Kinder schon mehrere Nächte fast schlaflos zugebracht haben und in grosse Aufregung gerathen sind, ein sehr werthvolles Mittel. Es bewirken dann 1–5 Tropfen Opientinktur, je nach dem Alter des Kindes von 1–10 Jahren, einen tiefen mehrstündigen Schlaf, worauf dann freilich die Paroxysmen in ihrer früheren Heftigkeit wieder beginnen. Vom Chloralhydrat (0,3–1,0 pro die) sah ich einige Male guten Erfolg.

Ausserdem werden von Einzelnen gerühmt das Extr. Conii, — Hyoscyami — Lactucac virosae — Pulsatillae — Nicotianae und die Aq. amygdal. amar. und von vielen Anderen wieder verworfen. In den Keuchlaustens-epidemien, die ich bisher zu beobachten Gelegenheit hatte, machte ich vielfach die Erfahrung, dass ein mehrere Tage fortgesetzter Gebrauch der Narcotica nur Schaden bringt, während auf der Höhe der Krankheit eine ein- oder auch mehrmals erzeugte leichte Intoxication mit Opium, Belladonna oder Chloralhydrat einen wohlthätigen Einfluss auf die erschöpften und doch aufgeregten Kinder ausübt.

Von den Gegnern dieser Narcotica wurden vorzugsweise die metallischen Antiepileptica eingeführt. Ihre Lobredner sagen sehr triv., dass mit denselben weniger eine rasche Beschwichtigung des hef-

tigen Hustens, als eine allmähliche Tilgung des krampfhaften Charakters und endlich erst Heilung bewirkt werde; d. h. mit anderen Worten: der Keuchhusten lässt sich in seinem regelmäßigen Verlaufe hindurch nicht viel heirren. Das beliebteste Mittel dieser Classe ist das Zinkoxyd 0,5—1,0 pro *ss*, dazu das kohlensaure Eisen 1,5—3,0 pro *ss*, das essigsaure Blei, das salpetersaure Wismuth, das schwefelsaure Kupfer und endlich der Höllenstein.

Von den pflanzlichen und thierischen Nervinis gilt nur mit Vorbehalt den Moschus, das Castoreum, die *Assa foetida*, das kohlensaure Ammoniak und den Kaffee.

Tonische und adstringirende Mittel sind im letzten Stadium des Keuchhustens von merkwürdigem Erfolge, und hier steht die pulverisirte Chinawurde oben an. Ich gebe sehr vielen schwächlichen Kindern in diesem Stadium täglich 2—3 Messerspitzen des reinen Chinapulvers ohne weiteren Zusatz und finde, dass sie es ohne Widerstreben nehmen, weshalb es dem Chinadekto mit dem gar zu bitteren Chinin vorzuziehen ist. Auch Tannin für sich allein oder zu gleichen Theilen mit Benzoeblumen, täglich bis zu 0,3 gereicht, wird vielfach gerühmt. Störend ist nur der ebenfalls sehr schlechte Geschmack und namentlich auch die überaus stopfende Wirkung der Gerbsäure.

Ein rein empirisches, unter den Praktikern Englands ziemlich verbreitetes Mittel ist die Cochenille, welche nach vollkommen zuverlässigen Berichten in einzelnen Epidemien eine auffallende Wirkung gezeigt haben soll. Man gibt sie wegen leichter Zersetzbarkeit am besten in Pulverform mit Zucker gemischt. 0,1—0,4 pro *ss*. Meine damit angestellten Versuche lieferten in zwei Epidemien ganz negative Resultate, und ich stand, zumal das Mittel auch ziemlich kostspielig ist, wieder davon ab. Hingegen habe ich in den letzten zwei Jahren vielfach von einem Mittel Gebrauch gemacht, das so ziemlich in Verrücktheit gekommen war, vom Calomel. Ich gebe dasselbe den Keuchhustenkranken unter einem Jahre, täglich 0,01 2—3 Wochen lang fort, bis die Heftigkeit der Paroxysmen abnimmt, und habe sodann viel weniger lobuläre Pneumonien, welche sonst einen beträchtlichen Theil der kleinen Kinder hinwegraffen, beobachtet. Nachtheilige Folgen, weder unmittelbare noch spätere, treten auf die Behandlung nicht ein.

Von anderen empirischen internen Mitteln sind noch zu erwähnen der Schwefel, die Lobelia inflata, *Vincum quercinum*, die Salzsäure und endlich gar der Arsenik, der Phosphor und die Cantharidenrinne.

Die cutanäische Behandlung mit Ung. tartar. stillic. hat nun als grausam und dennoch wirkungslos jetzt vollkommen aufgegeben. Hingegen wäre die Methode von Lachmünd einer weiteren Prüfung werth. Derselbe behauptet, dass durch Vaccination der Keuchhusten im ersten Stadium unterdrückt werden könne und bringt bei schon geimpften Kindern gepulverte Vaccinekrusten auf Vesicatorwarzen, so er sie mit Heftpflaster befestigt und mehrere Tage liegen lässt. In so behandelten Wunden sollen zuweilen lebhaftere Schmerzen verursacht und klauen sogar brandig werden. Auch innerlich versuche ich zu Pulver, er gab eine Impfböcke mit Milchzucker abgerieben und wiederholte diese Dosis nach vier Tagen, worauf ebenfalls eine rasche Heilung eingetreten sein soll.

Schliesslich sind nach Watson's oft wiederholte, ziemlich mühsame Aetzungen der Rachen- und Kehlkopf Schleimhaut mit Höllensteinlösung zu erwähnen, worauf nach 8—10 Tagen die Krankheit beseitigt sein soll. Sie haben sich bei uns nicht von dieser entschiedenen Wirksamkeit gezeigt und keine allgemeine Anerkennung gefunden. Bei der schönen Vereinfachung unserer jetzigen Inhalationsapparate ist das Inhaliren verdünnter Aetzmittel der gewaltsamen Application mittelst Schwämmchen entschieden vorzuziehen. Rohn liess einigen grösseren über vier Jahre alten Kindern täglich eine halbe Unze einer verdünnten Höllensteinlösung (1 : 1000) inhaliren und beobachtete nach 8—10maliger Inhalation eine deutliche Abnahme sämtlicher Keuchhustensymptome, indem nur ein einfacher Bronchialcatarrh zurückblieb.

Wenn ich nun resumierend über meine Ansicht eine Erklärung abgeben soll, so geht sie dahin, dass es höchst wahrscheinlich keine Mittel gibt noch jemals geben wird, wodurch der Keuchhusten coarpiert werden kann, so wenig wie wir diess bei den acuten Exanthemen, bei Typhus oder Pneumonie zu thun im Stande sind. Man soll desshalb möglichst expectativ verfahren, zu heftige Anfälle durch Narcotica mildern, bei kleinen Kindern durch Calomel die lokale Pneumonie zu verhüten suchen, schwächliche Kinder roborend behandeln und im Uebrigen die Kinder nur möglichst unter günstige hygienische Verhältnisse bringen.

12) Periodischer Nachthusten.

Der periodische Nachthusten ist eine höchst eigenthümliche und seltene Krankheit. Er wird bei ganz gesunden Kindern, häufiger aber bei solchen mit hereditärer Tuberculose beobachtet und befällt hauptsächlich Kinder von 2—10 Jahren.

Das Kind befindet sich den Tag über vollkommen wohl und hustet kein einziges Mal, schläft Abends ruhig ein und erwacht in der Regel erst nach Mitternacht, heftig schreiend und hustend. Der Husten ist gewöhnlich anhaltend und trocken, nicht so paroxysmenartig, dass die Kinder 2—3 Stunden lang nicht mehr schlafen können. Auswurf kommt dabei nicht vor und der Charakter des Hustens ist noch am meisten dem der hysterischen Mädchen, welche auch zuweilen an rein spasmodischen Hustenanfällen leiden, zu vergleichen. Dieser Husten stellt sich jede Nacht, nicht genau, aber ungefähr um dieselbe Stunde ein, jeder Paroxysmus dauert auch immer eine gleich lange Zeit, bis endlich die Kinder ganz erschöpft und schnell respirirend wieder einschlafen, um dann bis zum Morgen nicht mehr zu erwachen. So geht es nur Wochen, selbst Monate fort, die Anfälle werden schliesslich kürzer und schwächer und hören endlich von selbst auf. Oft bildet der Durchbruch eines Zahnes der ersten oder zweiten Dentition den Schlussakt dieser räthselhaften Krankheit. Ich habe dieselbe erst dreimal beobachtet, ein Kind war vor- und nachher vollkommen gesund, die zwei anderen aber stammten von tuberculösen Eltern und liessen später deutliche Zeichen der fortschreitenden Tuberculose erkennen. Obwohl der Husten unter Tags vollkommen sistirt und auch durchaus keine Rasselgeräusche am Thorax gehört werden können, so sind die Kinder

doch während der ganzen Zeit traurig, mährisch und von blasser Gesichtsfarbe. Sie haben nicht den gehörigen Appetit und leiden meistens an kalten Füssen.

Behandlung.

Es liegt sehr nahe, bei den deutlichen Intermissionen, mit welchen dieses Uebel verläuft, eine Behandlung mit Chinin einzuleiten. Es hat sich dieselbe aber trotz dieses Umstandes als wenig wirksam erwiesen, indem der Husten meistens wiederkehrt, wenn auch grössere Gaben von 0,3—0,4 auf einmal gereicht wurden. Ebenso ungenügend sind kleinere Dosen der Narcotica. Opium und Morphinum bis zur tiefen Narcose gereicht, veranlassen allerdings für eine Nacht einen Stillstand des Uebels, die Nebenwirkungen grösserer Gaben aber, als Kopfschmerz, Appetitmangel und hartnäckige Obstipation, sind so unangenehm, dass ich immer von fortgesetzter Darreichung dieses Mittels absehen muss, bevor Genesung eingetreten ist. Die Unwirksamkeit des Chinins und Morphinums sprechen mit ziemlicher Bestimmtheit dafür, dass hier eine materielle Veränderung, die vielleicht in einer Schwellung oder Tuberculose der Bronchialdrüsen zu suchen sein dürfte, zu Grunde liegt. Man beschränkt sich am besten auf eine diätetische, robocirende Behandlung, gute nahrhafte Kost, frische Luft und gleichmässige Temperatur, wobei nach den bisherigen Erfahrungen das Uebel, wenn auch nach langer Zeit, immer günstig verlaufen ist.

F. Pleura.

1) Pleuritis, Rippenfellentzündung.

Es können die Kinder schon im Mutterleibe an Pleuritis erkranken, sterben dann in der Regel ab oder überleben die Geburt kurze Zeit. Bei Neugeborenen ist ausserdem die Phlebitis umbilicalis eine häufige Ursache der Jaucheresorption und damit der secundären Pleuritis.

Empyeme kommen im ersten Kindesalter so selten vor, dass die beschäftigten Pädiatruken nur ganz vereinzelte Fälle anzuführen in Stande sind. Hingegen findet man sehr häufig bei kleinen Kindern die zu Leiden an Lungenerkrankungen, namentlich an Lungentuberculose gelitten haben, allseitige pleuritische Verwachsungen. Bei grösseren Kindern kommen Empyeme nicht selten vor, werden, wenn keine Complicationen zugegen sind, ziemlich schnell resorbirt und lassen keine auffallenden Deformitäten des Thorax. Im Ganzen ist die Pleuritis im ersten Kindesalter als eine äusserst seltene, nach Beginn der zweiten Dentition immer noch als eine ziemlich seltene Krankheit zu betrachten.

Pathologische Anatomie.

Nach F. Weber in Kiel, dem wir die meiste Aufklärung über diese Zustände verdanken, ist von der wirklichen Pleuritis todgeborener Kinder wohl zu scheiden die oft ziemlich profuse Durchsickerung von Blutserum in die serösen Säcke, also auch in die Pleurahöhle. In dieser einfachen cadaverischen Durchsickerung kommen niemals Fibrin-

Stückchen vor, auch hat die Mutter keine darauf zu beziehenden Symptome während der Schwangerschaft geboten. Weber nimmt bei diesen toten Früchten eine rein entzündliche und eine dyskrasische Pleuritis an.

Bei der rein entzündlichen Pleuritis der Kinder vor der Geburt ist meistens auch die entsprechende Lunge pneumonisch erkrankt. Die Pleuritis ist einfach oder doppelt und gibt sich zu erkennen als eine dickere oder dünnere, fibrinöse, weisslich durchscheinende Schwarte, die bald schwer, bald leicht abzuschieben ist. Der seröse Erguss ist hierbei immer sehr unbedeutend, gelb und klar, er rückt zum Unterschied von der dyskrasischen Pleuritis niemals faulig und ist nie stark blutig tingirt.

Bei der dyskrasischen Pleuritis sind immer beide Pleurasäcke und ausserdem gewöhnlich auch der Herzbeutel und das Bauchfell in gleicher Weise erkrankt. Die Exsudate sind in grösserer Menge vorhanden als in der ersteren Form und haben ein schmutzig trübes Aussehen und einen fauligen Geruch. Sie finden sich nur in Gebärmatern und auf der Höhe einer Puerperalfieberepidemie. Denselben Charakter hat auch die in Folge von Umbilicalphlebitis auftretende pyämische Pleuritis.

Bei grösseren Kindern finden sich häufig pleuritische Adhäsionen und Schwarten, sehr selten aber grosse flüssige Exsudate. Primär und isolirt kommen diese entzündlichen Affektionen der Pleura nur äusserst selten vor, sondern sind gewöhnlich mit Lungenerkrankungen, mit Tuberculose complicirt. Die anatomische Beschaffenheit der Schwarten, die Verdrängung der Brusteingeweide und des Zwerchfelles sind dieselben wie bei Erwachsenen.

Symptome.

Eine jede Pleuritis beginnt mit erhöhter Hauttemperatur, mit Fieber. Die Kinder werden unruhig, schlaflos, verlieren den Appetit und trinken viel. Das deutlichste Zeichen des Fiebers ist immer die Erhöhung der Hauttemperatur, während die Frequenz des Pulses besonders bei kleinen Kindern wegen ihrer grossen physiologischen Schwankungen geringere Beachtung verdient. Grössere Kinder bekommen auch einen Schüttelfrost.

Den Schmerz kann man bei kleinen Kindern nicht anders erörtern, als indem man auf verschiedene Stellen des Thorax einen abwechselnden Druck ausübt oder percutirt. Druck oder Schlag auf eine von frischer Pleuritis befallene Stelle wird immer die Kinder zu einem schmerzlichen Geschrei oder Wimmern veranlassen. Etwas grössere Kinder von 2—3 Jahren zeigen, wenn man sie nach dem Sitze des Schmerzes fragt, gewöhnlich auf die Herzgrube, ohne dass deshalb hier die Entzündung sich wirklich etablirt hätte. Erst vom fünften bis sechsten Jahre kann man auf die Angabe des Schmerzes einigen Werth legen. Derselbe tritt gewöhnlich zugleich mit dem Fieber ein, ist aber fast nie lange anhaltend, sondern zeigt meist deutliche Remissionen und verschwindet oft nach 4—6 Tagen gänzlich, ohne dass Medicamente dagegen in Anwendung gebracht wurden.

Im Allgemeinen lässt sich zwar sagen, dass Fieber und Schmerz ziemlich gleichen Schritt halten, doch kommen auch sehr häufige Aus-

nahmen von dieser Regel vor. Besondere Berücksichtigung verdienen die plötzliche Einmünderung eines schon mehrere Tage ausgebliebenen Schmerzes, zumal wenn sie mit Fieber verbunden ist; sie zeigt an, dass die Pleuritis keine einfache, sondern eine complicirte ist; als die häufigste Complication oder eigentliche Veranlassung dieses so sich gestaltenden Processes muss die Lungentuberculose bezeichnet werden. Der Schmerz ist auch von grossem Einfluss auf den Grad der Dyspnoe, welche zu Anfang viel bedeutender durch ihn als durch das mechanische Hinderniss, das Exsudat gesteigert wird. Sobald die Dämpfung beträchtlich wird, das Exsudat also eine grössere Ausdehnung erreicht hat, hört in den meisten Fällen der Schmerz vollständig auf, daher stellen sich nun die durch die Compression der Lunge bedingten mechanischen Beschwerden ein. Warum der Schmerz trotz grosser Ausdehnung der Pleuritis oft nur ein ganz unschriebener ist, lässt sich schwer erklären. Am wahrscheinlichsten scheint mir noch, dass die Entzündung an einzelnen Stellen auf das Nervilem der Intercostalnerven übergreift und dadurch den fixen, unschriebenen, auf Druck gewaltig zunehmenden Schmerz bedingt.

Die Lagerung hat bei kleinen Kindern, welche sich überhaupt immer in der Rückenlage befinden, natürlich keine Bedeutung, grössere Kinder liegen zu Anfang der Pleuritis, so lange die Schmerzen währen, in der Regel auf einer Seite, jedoch nicht immer auf der der Entzündung entsprechenden, sondern zuweilen auch auf der entgegen gesetzten, je nachdem eben der Schmerz mehr durch Druck oder mehr durch die Respirationsbewegung gesteigert wird. Im ersten Falle liegen sie auf der gesunden, im zweiten auf der kranken Seite, indem durch diese letztere Lagerung die Respirationsbewegungen ohne besondere Bemühungen des Kranken auf rein mechanische Weise klein werden.

Die Art und Anzahl der Respirationsbewegungen ist je nach dem Fieber und dem Schmerze verschieden. Je intensiver diese beiden Symptome sind, um so schneller und oberflächlicher respiriren die Kinder. Hingegen ist nach Sistirung des acuten Processes das flüchtige Exsudat selten so massenhaft, dass die Respiration hierdurch ansehnlich beschleunigt würde. Die Form des beschleunigten Athmens ist & expiratorische, d. h. der Accent liegt auf dem Expirationsgeräusch. Eigenthlicher Luftkugler ist hierbei nicht vorhanden, sondern die Respirationen sind nur frequent und oberflächlich, damit die tiefen und beträchtlich schmerzhaften vermieden werden können. Aus demselben Grunde sind auch die Nasenflügel weniger deutlich in Bewegung, als bei einer Parenchymkrankung der Lungen, z. B. bei Pneumonie oder vorgeschrittener Tuberculose.

Durch die Inspection kann man nicht erkennen, auf welcher Seite der Sitz der Pleuritis ist, so lange nur eine pleuritische Schwart und kein massenhaftes flüssiges Exsudat vorhanden ist. Hat der letztere sich gebildet, so verstreichen die Intercostalräume, wölben sich wohl auch nach anwärts, und es bewegen sich alle die Rippen mit mehr, welche durch ein flüssiges Exsudat von ihren entsprechenden Lungenpartieen getrennt sind. Dann ergiebt auch die Mensuration beider Thoraxhälften einen grösseren Umfang der erkrankten Seite. Bei ungeren Kindern sieht man bei rechtsseitigem Exsudat ein

Tiefstand der Leber und bei linksseitigem eine Verdrängung des Herzens nach rechts gegen den Schwertfortsatz und selbst über denselben hinaus.

Durch Palpation des Vocalfremitus können pleuritische Ergüsse sehr leicht und genau bestimmt werden, was bei Kindern um so grösseren Werth hat, als diese Untersuchungsmethode auch bei unruhigen, schreienden Kranken angewendet werden kann. So weit nämlich das flüssige Exsudat reicht, ebensoweit ist kein oder nur ein schwacher Fremitus der Stimme zu fühlen, an den übrigen Thoraxstellen ist derselbe dafür um so stärker. Reibungsgeräusche sind bei Kindern zu Anfang der Pleuritis ausserordentlich selten, etwas häufiger kommen sie vor bei einem in Resorption begriffenen Empyem und zwar gewöhnlich an der Uebergangsstelle vom gedämpften Percussionsschall zum sonoren. Man ist zwar auch im Stande, so durch Palpation allein zu bestimmen, kann aber durch das Gefühl sehr ähnlich auftretender Rasselgeräusche leicht getäuscht werden. Bei ruhigen vernünftigen Kindern kann diese physikalische Untersuchungsmethode leicht durch die Auscultation completirt werden. Man hört zu Anfang einer Pleuritis entweder Reibungsgeräusch oder normales vesiculäres Athmen, vorausgesetzt, dass die Lunge nicht vorher erkrankt ist. Sobald eine flüssige Exsudatschichte die Lungen von den Rippen trennt, ist in den meisten Fällen gar nichts mehr zu hören, zuweilen aber hört man wider alles Erwarten und ohne dass bis jetzt eine physikalische Erklärung gelungen wäre, exquisites Bronchialathmen, das aber doch nur wenige Tage währt und dann gänzlich verschwindet. Wird das Exsudat aber so massenhaft, dass die Lunge der erkrankten Seite gänzlich comprimirt und als ein compacter Klumpen nach hinten gedrängt wird, so vernimmt man auf der Rückenfläche des Thorax, so weit diese infiltrierte Lunge anliegt, kein pueriles, sondern rein bronchiales Athmen. Bei der Aufsaugung des Empyems dehnt sich diese Lunge wieder mehr und mehr aus, das bronchiale Athmen verschwindet, häufig stellen sich Rasselgeräusche ein oder es wird wieder normales Vesicularathmen vernommen.

Die Percussion liefert positive Resultate nur bei grösseren, flüssigen Exsudaten; compacte pleuritische Schwarten und noch mehr die einfachen pleuritischen Adhäsionen bringen gar keine Veränderung im Percussionsschall hervor. Ist aber einmal ein flüssiges Exsudat gesetzt, so haben wir eine viel exquisitere Dämpfung als bei den Verdichtungen des Lungengewebes, wir bekommen den zogen. Schenkel- oder Mauerton. An der Grenze der Dämpfung bemerkt man regelmässig einen tympanitischen Beiklang, der sich noch eine Strecke in den sonoren Schall hinein erstreckt.

War eine grössere Menge eitriger Flüssigkeit einmal in einem Pleurascake angesammelt und wird dieselbe später wieder resorbirt, ein Zustand, der sich fast nur bei mehrjährigen Kindern findet, so entsteht bei denselben ebenso der Habitus des resorbirenden Empyems, wie dies bei Erwachsenen in so augenfälliger Weise beobachtet wird. Auf der erkrankten Seite steht die Schulter niedriger, der Hinterbacken etwas höher, die ganze Brusthälfte ist abgeflacht und eingezogen, am stärksten zwischen der fünften und sechsten Rippe, und die Wirbelsäule erfährt eine seitliche Krümmung, deren Concavität nach

der kranken, deren Convexität nach der gesunden Seite hin gerichtet ist. Es ist selbstverständlich eine Compensationskrümmung der Lendenwirbel vorhanden. Bei zunehmender Genesung und Erstärkung der Kinder gleichen sich diese Verkrümmungen nach einigen Jahren fast vollkommen wieder aus, wobei eine entsprechende Gymnastik sehr förderlich wirkt.

Die spontane Eröffnung der Empyeme nach aussen kommt bei Kindern häufiger vor als bei Erwachsenen. Unter Fieber und stechendem Schmerz entwickelt sich an irgend einer Stelle des Thorax, am häufigsten nach vorne unter der Brustwarze, eine erysipelatöse Bule, der entsprechende Intercostalraum wölbt sich mehr und mehr, das Fluctuationsgefühl wird immer deutlicher und es bildet sich endlich eine umschriebene, eirunde Geschwulst, welche sich spontan öffnet oder mit einer Lancette ohne Gefahr eröffnet werden kann. Anfangs entleeren sich grosse Quantitäten Eiter, die Abscessöffnung zieht sich aber bald zurück und wird zu einem schiefen, meist winkelförmigen Fistelgang, welcher sich häufig schliesst, nach einiger Zeit aber wieder von neuem in Eiterbildung geräth und aufricht. Je nach der Beschaffenheit und Ausdehnungsfähigkeit der entsprechenden Lunge bleibt ein solcher Fistelkanal Monate und selbst Jahre lang offen und schliesst sich endlich mit einer strahlenförmig eingesogenen, tiefen grubigen Narbe. Rippercaries tritt trotz der langen Dauer fast niemals hierbei ein.

Die Complicationen der Pleuritis sind sehr mannigfach. Zuerst sind verschiedene Allgemeinerkrankungen, in deren Verlauf Pleuritis sich entwickeln kann, zu nennen. So kommt dieselbe vor bei Scharlach, Masern, Blattern, bei Typhus, Pyämie und Scharbot. Die Häufigkeit dieser Complication ist verschieden je nach einzelnen Epidemien. Am ungünstigsten und gefährlichsten ist die Pleuritis, wenn sie frühzeitig, schon zu Anfang der Allgemeinerkrankung auftritt, während die in der Convalescenz auftretende verhältnissmässig einen glücklichen Verlauf nimmt. Die Pleuritis in Folge von Pyämie und Scharbot ist natürlich ohne Ausnahme tödtlich.

Sehr häufig ist die Pleuritis eine secundäre Erkrankung von Tuberculose und Pneumonie. Es gibt überhaupt gar keine periphere Veränderung des Lungenparenchyms, in welcher nicht die Lungenpleura Theil nahm. Wenn auch die gewöhnliche Form die der einfachen Adhäsionen oder höchstens der schmalen pleuritischen Schwarte ist, so können doch namentlich bei tuberculösen Kindern gar nicht selten grössere käsige Exsudate vor. Dieselben sind fast niemals eitrig, sondern metamorphosiren selbst wieder tuberculös. Die ganze das Exsudat umgebende Pleura wird zu einer graubraunen Tuberkelschwarte, und eine Resorption eines solchen Exsudates ist wohl noch niemals beobachtet worden. Die Perforation einer tuberculösen Lunge in den Pleurasack und in Folge dessen Pyothorax kommt bei dem mehr acuten Verlaufe der Tuberculose bei Kindern fast niemals vor.

Der Verlauf und die Ausgänge sind mannigfach. Die acute primäre Pleuritis, wie sie gesunde, grössere Kinder erweilen lässt, ist trotz des grossen Exsudates, das den ganzen Pleurasack bis kurz zur Lungenspitze ausfüllt, keine gefährliche Krankheit. Nach 1—2 Monaten beginnt die Resorption und ist, wenn anders das Kind gesund ist,

in $\frac{1}{4}$ Jahr vollendet. Selbst der zurückbleibende Habitus des resorbierten Empyems kann sich nach Jahren wieder ziemlich verwachsen. Ungleich gefährlicher ist die acute secundäre Pleuritis, wie sie im Verlaufe von acuten Exanthemen, von Typhus und Tuberculosis beobachtet wird, und geradezu tödtlich ist die pyämische Pleuritis der Neugeborenen, sowie der übrigens sehr seltene Propagemothorax nach Durchbruch einer tuberculösen Caverne.

Die chronischen Pleuritiden, wie sie jede Lungenerkrankung begleiten, dünne Schwarten oder einfache Adhäsionen, unterliegen gar keiner oder wenigstens einer äusserst langsamen Resorption. Die Veränderung der Lungen tritt hierbei so in den Vordergrund, dass die pleuritischen Erscheinungen fast niemals in Betracht kommen. Abgekockte Empyeme, welche bei Erwachsenen 10 und 20 Jahre lang bestehen können, kommen bei Kindern, bei denen die Resorption der rascheren Entwicklung gemäss ebenfalls rasch vor sich zu gehen pflegt, nicht vor.

Behandlung.

Ueber die Therapie der secundären, pyämischen Pleuritis der Neugeborenen sind nicht viele Worte zu verlieren, indem sie unter allen Verhältnissen tödtlich ist. Die primäre Pleuritis grösserer Kinder mit rascher Exsudatbildung ist zu Anfang mässig antipneumotisch zu behandeln. Es gibt kein Mittel, das in jedem beliebigen Momente die Zunahme eines flüssigen Exsudates zum Stillstande brächte, auch durch die grössten Blutentziehungen gelingt dies keineswegs. Dieselben sind deshalb auch durchaus nicht dringend indicirt, doch ist nicht zu leugnen, dass bei grössern über fünf Jahre alten Kindern die Heftigkeit der pleuritischen Schmerzen durch einige Blutegel sehr gemindert wird. Bei kleineren Kindern genügt zur Schmerzaufhebung der schon bei der Pneumonie beschriebene feuchte Gürtel, der den ganzen Thorax umgebend 4–6 Tage liegen bleiben kann.

Die interne Behandlung ist, so lange das Fieber und die Schmerzen sehr beträchtlich sind, am besten mit kleinen Dosen Calomel, dem ganz passend etwas Opium beigesetzt wird, einzuleiten. Einem Kinde von 3–6 Jahren gibt man täglich 0.015–0.03 Calomel und 0.005–0.01 Opium. Diarrhöe darf nicht anhaltend geduldet werden. Ist das pleuritische Exsudat einmal gesetzt und hat es aufgehört zu wachsen, so hört auch das Fieber und hiemit die Indication zu obigem Mittel auf, und es handelt sich nun darum, dasselbe möglichst rasch zum Schwinden zu bringen. Man macht zu diesem Zweck Einreibungen von grauer Salbe, von Jodsalbe, Einpinselungen mit Jodtinktur oder unterhält längere Zeit fliegende Vesicanten. Innerlich werden die verschiedensten Diuretica gerühmt.

Die salinischen Diuretica, das Kali nitricum oder acetikum passen wegen ihres schlechten Geschmacks und ihrer abführenden Wirkung nicht für Kinder. Hingegen vertragen dieselben kleine Dosen Digitalistinktur 0,5 pro die in 60,0–80,0 Veräkel sehr gut; man setzt dieselbe aus, sobald die Pulsverlangsamung eintritt und fährt wieder damit fort, wenn sie abnimmt. Am längsten und besten wird Roob Juniperi vertragen, wovon man Monate lang den Kindern täglich 1–2 Kaffeeöffel reichen kann. Man darf übrigens die Wirkung der Diuretica nicht überschätzen, indem schon oft genug beobachtet worden ist, dass unter

günstigen Verhältnissen solche einfache pleuritische Exsudate in wenigen Wochen gänzlich verschwunden sind, wenn auch gar keine interne Behandlung eingeleitet worden ist. Gute Nahrung und gute Luft sind die Hauptfaktoren für das Gelingen einer raschen Aufzuehung. Die Spitalluft wirkt ausserordentlich schädlich auf die Resorption eines Empyems ein, und es sind deshalb solche Kranke von den Kinderspitälern möglichst fern zu halten. Die Operation der Thoracostomie wurde bei grösseren Kindern schon öfters mit günstigem Erfolge von mir ausgeführt. Bisher reichte ich stets mit dem Explorativtrokan aus, durch welchen bis zu 350 CC Eiter auf einmal entleert werden. Die Kanäle mit diesem Instrumentalen bei verschobener Cutis sind ganz ungefährlich, können öfter repetirt werden und sind offenbar rationaler, als die grossen Schnitte und Wasserauspflügungen der Pleurahöhle, wodurch leicht Jarnschang entsteht. Das Bestreben, den mit Eiter gefüllten Pleurasack möglichst vollständig zu entleeren, hat natürlich keinen Erfolg, wenn die Lungenpleura mit Schwarten bedeckt ist, die der Lunge erst eine allmähliche Rückkehr zu ihrem normalen Volumen gestatten.

Zweimal sah ich bei kräftigen wohlgenährten Kindern unter der Mamma eine Geschwulst entstehen, welche einmal spontan sich öffnete, das andere Mal durch einen Einstich mit der Lancette eröffnet wurde. In beiden Fällen floss Anfangs eine grosse Menge Eiter ab, die Lungen dehnten sich entsprechend aus. Die zurückbleibende Fistel schloss sich aber erst nach Jahren und brach mehrmals wieder auf.

2) Hydrothorax.

Seröse Ergüsse in die Pleurasäcke kommen bei Säuglingen ausserordentlich selten, bei grösseren Kindern aber ziemlich häufig als Folgen gewisser krankhafter Zustände vor. Die ergossene Flüssigkeit ist rein serös, gelb, albuminhaltig, und ihre Salze zeigen denselben quantitativen Verhältnisse, wie sie sich im Blutserum ergeben. An der Pleura selbst sind keine pathologischen Veränderungen zu entdecken, wenn nicht Lungenverkrankungen mit consecutiver leichter Pleuritis vorausgegangen sind.

Aetiologie.

Die Annahme eines primären, essentiellen Hydrothorax, zu welcher Auctorität ihn noch aufführen, ist eine höchst problematische, indem einzelne vorausgehende Krankheiten in gewissen Fällen leicht zu übersehen sind. Unstreitig die häufigste Veranlassung gibt die Nephritis in Folge von Scharlach ab, dann folgt die Intermittoensche und endlich als die seltenste Ursache ein erworbener Herzfehler. Die übrigen Cachexien, wodurch bei Erwachsenen noch Hydrothorax erzeugt werden kann, als Lebercirrhosis, chronischer Moch Bright, Carcinom, Lähmungen etc. kommen bei Kindern so gut wie gar nicht vor.

Symptome.

Der Hydrothorax nach Scharlach bildet sich immer erst, nach dem schon einige Tage vorher Anasarca aufgetreten ist, ohne dass

sagen zu wollen, dass er nothwendiger Weise hierauf folgen müsste. Das Anasarca wird regelmässig durch deutliche Fiebererscheinungen eingeleitet, welche sich noch steigern, wenn die serösen Ergüsse der Pleura und des Peritoniums sich hinzugesellen. Die Diagnose wird in diesem Falle durch das regelmässig vorhandene Anasarca erleichtert.

Der Hydrothorax in Folge von Intermitteuscachexie tritt bald mit, bald ohne Fieber ein. Gewöhnlich ist aber hier auch Anasarca wenigstens an den unteren Extremitäten vorhanden. Die graugelbe Gesichtsfarbe, die ansernte Anämie der Schleimhäute und der constant bestehende Milzumor sind so auffällige Zeichen, dass die Intermitteuscachexie mit keiner andern verwechselt werden kann.

Der Hydrothorax in Folge von Herzfehler ist der seltenste, weil eben Endocarditis bei Kindern ausserordentlich selten auftritt und gewöhnlich bald tödtlich endet, und weil die angeborenen Herzfehler ebenfalls nur in wenigen Fällen ein Alter erreichen, in welchem hydrogische Ergüsse sich zu bilden pflegen.

Der Hydrothorax ist zum Unterschied von der Pleuritis viel häufiger auf beiden Seiten als nur auf einer, doch ist die Höhe des Exsudates selten auf beiden Seiten gleich, und dann fehlt bei ersterem regelmässig das im andern Falle so constante und lang andauernde Seitenstechen. Die Dämpfung ist bei etwas beträchtlicherem Hydrothorax eine complete und kann durch verschiedene Lagerungen, welche sich die Kinder jedoch nur ungern gefallen lassen, leicht verändert werden, indem das Exsudat so dünnflüssig und zugleich copios ist, dass es nach dem Gesetz der Schwere rasch seinen Platz verändert. Reibungsgeräusch wird hier niemals gefühlt noch gehört, und die innere Form des Thorax verändert sich ebenso auffallend, vielmehr noch auffallender als bei Empyem. Erweiterung und Verwölbung der Intercostalräume, Unbeweglichkeit der Thoraxpartien, an welchen das Serum anlegt, Verdrängung der Leber und des Herzens finden sich hier in der auffallendsten Weise.

Da der Hydrothorax in den meisten Fällen ein doppelseitiger ist, so nimmt die Athemnoth rasch zu, es stellt sich Orthopnoe, Cyanose und Lungenödem ein, worauf dann bald der Tod erfolgt. Die Harncretion ist in allen Fällen sehr vermindert, der Stuhl meist angehalten, wenn nicht, wie es gewöhnlich geschieht, der Darmkanal zu ein Versehen der Ableitung in Anspruch genommen wird.

Die Pulsfrequenz ist zu Anfang eine erhöhte, kann aber bei mässiger Athemnoth bald zu ihrem normalen Masse zurückkehren.

Die Prognose ist am günstigsten nach Scharlach, weniger günstig nach Intermitteus und entschieden ungünstig, ja lethal, nach Herzkrankheiten zu stellen.

Behandlung.

Eine schwächende antiphlogistische Behandlung ist hier niemals indirt, wenn auch in den ersten Tagen der Erkrankung deutliche Fiebererscheinungen sich eingestellt haben sollten. Die Kinder haben namentlich durch die vorangehenden Leiden so sehr an Kraft verloren, dass es dringend nothwendig erscheint, vor allem die Ernährung in's Auge zu fassen. Man gibt ihnen deshalb kräftige Suppen mit Eigelb oder gute Milch, so viel nur immer beizubringen ist, und versucht

durch leichte, die Verdauung nicht störende, keine Diarrhöen verursachende Diuretica die Harnsecretion zu vermehren. In dieser Beziehung eignen sich, wie schon öfter erwähnt, einige Tropfen Digitalisur und Roob Juniperi in grösserer Dosis am besten. Als Nachbehandlung sind China und Eisen am meisten zu empfehlen.

4. Capitel.

Krankheiten der Circulationsorgane.

A. Herz- und Gefässstämme.

1) Angeborene Anomalie.

Zu einem richtigen Verständniss der angeborenen Anomalien des Herzens muss aus der Entwicklungsgeschichte vorangeschickt werden, dass ganz zu Anfang der Entwicklung das Herz und die Gefässstämme nicht hohl sind, sondern aus locker zusammenliegenden Zellen ohne Lücke und ohne Höhlung bestehen. Das Herz hat zu dieser Zeit noch die Form eines gerade liegenden Cylinders, der unten und oben in zwei Schenkel ausläuft; die beiden unteren Schenkel sind die Stämme der Gefässe, welche in Zukunft sich in der Keimblase verzweigen und von ihr das Blut in das Herz führen, die Venae omphalo-mesentericae; die beiden oberen sind die beiden zukünftigen ersten Aortenbogen, welche das Blut aus dem Herzen in den Embryo führen. Erst einmalig wird nach Bischoff die äussere Oberfläche fester, indem sich die Zellen hier dichter aneinander lagern und so Wandungen bilden und damit entwickelt sich im Innern eine Höhle, in welcher sich Flüssigkeit und lose Zellen, die ersten Spuren des Blutes, ansammeln. Der Herzeylinder nimmt dann eine etwas S-förmig gebogene Gestalt an und beginnt in sehr langsamem Rhythmus sich zusammenzuziehen und auszudehnen, wodurch sein flüssiger Inhalt nach vorn und oben in den Aortenbogen getrieben wird, während andererseits der Venenstämme von hinten und unten beigezogen wird.

Nach und nach wird nun dieser Herzkanal unter verschiedenen Krümmungen, Erweiterungen und Abschnürungen einzelner Partien zum Herzen selbst, bestehend aus der Aortenausschwellung, aus einer Kammer und einer Vorkammer. Erst später kommt es zur Entwicklung von Scheidewänden, wodurch eine rechte und linke Kammer und Vorkammer gebildet werden. Die mangelhafte Entwicklung oder fehlerhafte Insertion dieser Scheidewände zum gibt die häufigste Veranlassung zu den Bildungsfehlern des Herzens.

Es werden jedoch auch Fälle beobachtet, welche einen entzündlichen Process des Herzmuskels und dessen Folgen Atrophie und Vernarbung der erkrankten Stellen, deutlich erkennen lassen.

Die besten Zusammenstellungen der angeborenen Herzanomalien finden sich in den Lehrbüchern von Rekitansky und Ramberger, welche auch die Grundlage zu der nun folgenden Uebersicht abgegeben haben:

1) Der Mangel des Herzens, *Acardia*, kommt nur bei Monstren vor, wo zugleich die obere Hälfte des Rumpfes mangelt und deshalb auch das Nervensystem nur höchst rudimentär vorhanden ist. Dem entgegengesetzt ist die Duplicität des Herzens bei Doppelmissbildungen, besonders bei Duplicität der oberen Körperhälfte. Zwei vollständig getrennte Herzen in zwei gesonderten Herzbeuteln oder in einem gemeinschaftlichen.

2) Abnorme Lage des Herzens. Hierher gehört ein Beibehalten der fötalen Lage in der Mitte der Brusthöhle, dann die Transposition des Herzens, wobei der Herzschlag rechts vom Sternum zu fühlen ist und meistens auch Verlagerung anderer Eingeweide, namentlich der Leber und des Magens, stattgefunden hat, und endlich die Ektopie des Herzens. Es fehlt hierbei das Sternum, die Haut ist bald normal, bald fehlt auch diese. In dem letzteren Falle liegt das Herz ganz frei oder nur vom Herzbeutel bedeckt zu Tage und es wird hiedurch absolute Lebensunfähigkeit bedingt. Wenn ein grösserer Theil der Brustwand und der Bauchdecken fehlt, so liegen noch andere Eingeweide ausserhalb der Höhlen, was man *Eventration* genannt hat. In ganz seltenen Fällen ereignet sich auch ein Defekt oder eine Spaltung des Zwerchfelles, und das Herz dringt dann durch diese Spalte in die Bauchhöhle.

3) Abnorme Gestalt und Grösse. Die Gestaltvariationen des Herzens sind häufig ohne Belang. Ein breites, ein cylindrisches, ein an der Spitze gespaltenes, ein spitzes und ein rundes Herz kann vollkommen normal functioniren, hingegen sind mit abnormer Grösse und Kleinheit des ganzen Herzens oder einzelner Theile desselben meist Functionstörungen complicirt. Am häufigsten findet sich der rechte Ventrikel vergrössert in Folge von Offenbleiben des fötalen Kreislaufes.

4) Abnorme Beschaffenheit einzelner Theile des Herzens. Wir begegnen hier Abnormitäten a) des Septums, b) der Gefässstämme und c) der Oestien und Klappen.

a) Wenn die Bildung der Septa ganz unterblieben ist, so haben wir nur einen Vorhof und eine Kammer. Gewöhnlich aber sind die Septa durch vorspringende Leisten angedeutet und in dem einen oder andern Hohlraum auch vollständig entwickelt, so dass wir zwei vollkommen getrennte Vorhöfe und nur Eine Kammer, oder umgekehrt, nur zwei haben können. Da auch im physiologischen Zustand anfangs als *Foramen ovale* eine kleine Communication der beiden Vorhöfe stattfindet, so finden sich hier auch die häufigsten Defekte. Auch kommt es vor, dass der linke Vorhof durch einen schief verlaufenden Verbindungsgang mit dem rechten Ventrikel, oder umgekehrt, communicirt. Letzteres sind mit grösseren Fehlern der Septa auch fehlerhafte Urränge der grossen Gefässstämme verbunden, die auch dadurch bedingt sein können, dass die Insertion der Septa die Mittellinie verlässt. Es wird hiedurch möglich, dass die untere Hohlvene in den linken Vorhof statt in den rechten einmündet, oder dass die Aorta aus dem rechten Herzen entspringt.

b) Wie schon erwähnt, hängen die Abweichungen der Gefäßstämme größten Theils von mangelhafter Entwicklung oder fehlerhafter Insertion der Septa ab. Die häufigsten Abweichungen sind:

1) Die Lungenarterie fehlt entweder gänzlich oder sie ist in ihrem Ursprunge sehr verengt und erweitert sich erst vom Duct. aort. Botalli an, der ihr aus der Aorta Blut zuführt. Wenn nur eine Kammer vorhanden, so versieht die Aorta ganz die Stelle der Pulmonalarterie.

2) Das von der Lungenarterie Gesagte kann auch mit der Aorta geschehen, auch diese kann verkömmernt oder vollkommen verschlossen sein, sie erhält dann ihr Blut aus dem oben bleibenden Ductus Botalli.

3) Der fötale Typus der Blutvertheilung wird ganz lebensfähig, indem die Aorta die obere Körperhälfte, die Pulmonalarterie durch den Botalli'schen Gang die untere Körperhälfte mit Blut versieht.

4) Es findet eine Transposition der grossen Gefäße statt, so daß die Aorta aus dem rechten, die Lungenarterie aus dem linken Ventrikel entspringt.

5) Beide Gefäße entspringen aus Einer Kammer.

6) Die Aorta hat zwei gleiche oder ungleiche Wurzeln, so denen die eine aus dem linken, die andere aus dem rechten Ventrikel entspringt.

7) Der Bulbus der Aorta vergrößert sich beträchtlich und wird einen dritten Ventrikel dar.

8) Der Ductus Botalli bleibt häufig durchgängig, oder er bleibt gänzlich geschlossen, oder sich zu einem Meißenden Gefäßstamm entwickelt.

Eine eingehendere Besprechung verdient die Obliteration der Aorta jenseits der Mündung des Botalli'schen Ganges, eine Anomalie, welche wesentlich von Rokitsansky genauer untersucht wurde. Es findet sich an dieser Stelle eine starke Einschnürung der Aorta, welche jedoch nur einige Linien lang ist, und dann wieder in die Aorta descendens von ganz normalem Caliber endet. Diese Anomalie beruht darauf, dass sich im Fetus die Arteria pulmonalis unter Bildung eines Bogens in die absteigende Aorta fortsetzt, während das Blut in die Aorta nur in die Arterien der Arme und des Kopfes, also in die Arteria, Carotis und Subclavia sinistra gelangt. Das Blut der Pulmonalarterie strömt durch den weiten Ductus Botalli in die Aorta descendens. Als Fortsetzung der Aorta tritt ein enges Gefäßstück zum Bogen der Pulmonalarterie, das mit dem Namen Isthmus aortae bezeichnet wird. Nach der Geburt wird durch die Erweiterung der Lungen die Blutbahn vom Ductus Botalli abgelenkt, welcher sich verengt und undurchgängig wird, und zu gleicher Zeit erweitert sich jenes ursprünglich enge Gefäßstück, der Isthmus aortae, zu dem Durchmesser der normalen Aorta. Kommt nun nach der Geburt die Erweiterung des Isthmus aortae nicht zu Stande und verengt sich der Botalli'sche Gang, so entsteht eine bleibende Einschnürung des Isthmus aortae.

Es stellt sich nun für das Blut des linken Herzens, dem der Weg zur unteren Körperhälfte verschlossen ist, ein Collateralkreislauf ein, wodurch die unterhalb der Einschnürung liegende Aorta dennoch mit Blut gefüllt wird. Es erweitern sich zu diesem Zwecke die Arteria subclavia und nehmen einen geschlingelten Verlauf an. Die wichtigsten Aeste für die neu herzustellende Verbindung sind: Die Arteria

mammaria interna, deren Rami intercostales anteriores das Blut in die mit ihnen anastomosirenden Rami intercostales posteriores führen, welche aus der Aorta descendens entspringen, oder richtiger gesagt für diesen Fall, in sie einmünden. Ferner sind zu erwähnen die Anastomosen zwischen Mammaria interna, Epigastrica superior und den Lumbalarterien, dann die A. intercostalis suprema mit den Intercostalisten der Mammaria, und endlich die A. dorsalis scapulae mit den Dorsalisten der Zwischenrippenarterien.

Die Aorta descendens wird auf diese Weise gänzlich gefüllt, doch erreicht sie nicht das normale Lumen, während der Bogen der Aorta bis zur Stelle der Einschnürung sich erweitert zeigt. Diese Individuen sind vollkommen lebensfähig.

9) Die Veneneinmündungen in die Vorhöfe können ebenso transportirt sein, wie diese von den Arterien und den Kammern entwickelt wurde, oder es münden die Hohlvenen und die Lungenvenen nur in einen Vorhof etc.

10) Die angeborenen Abnormitäten der Klappen und Ostien sind im Allgemeinen verhältnissmässig seltener und lassen sich leichter auf fötale Entzündungsprocesses, fötale Myocarditis, als auf wirkliche Bildungsstörungen zurückführen. Das häufigste Vorkommniss ist:

1) Stenose des Ovals der Lungenarterie oder der Aorta, wobei sich das den Ovals bildende Muskelfleisch zu einer weissen, schwierigen Masse umgewandelt hat. An der Lungenarterie findet sich diese Stenose häufiger als an der Aorta und ist nach Bamberger eine der häufigsten Ursachen der angeborenen Cyanose. Regelmässig bleibt das Foramen ovale offen oder es kommt nicht einmal zu einer völligen Entwicklung des Septum der Ventrikel.

2) Die Klappen können knorpelig verhärtet sein, an den Atrioventrikularklappen kommen verdickte und überzählige Papillarmuskeln und falsch inserirte Sehnenfäden vor, oder es sind im Gegentheile die Klappen durchscheinend, sehr verdünnt, durchlöcheret. Bei rudimentärer Bildung der grossen Arterien oder unrichtiger Insertion der Septa können die Zipfelklappen oder die Semilunaren noch vollständig fehlen.

3) Die Klappe des Foramen ovale kann gänzlich fehlen oder vorzeitig sich verschliessen, auch an der Aortenklappe wird mangelhafte Entwicklung beobachtet.

Symptome.

Anatomische Betrachtungen über angeborene Bildungsfehler des Circulationsapparates finden sich mannigfaltig in Dissertationen und grösseren Monographien, hingegen sind die dabei beobachteten Symptome nur selten ausführlich geschildert, und wo dies geschieht, gewöhnlich nicht harmonisirend bei ein und demselben anatomischen Befunde. Wir können mit Bamberger alle Bildungsfehler bezüglich ihrer Symptome in drei Gruppen bringen.

1) In die erste Gruppe kommen die Bildungsfehler, welche absolute Lebensunfähigkeit bedingen. Hierher gehören die Monstrositäten, Ektopie des Herzens mit Hautdefekt und vollkommen einkammerige Herzen, Transposition der grossen Gefässe.

2) Zur zweiten Gruppe sind jene zu rechnen, mit welchen die Kinder wohl am Leben reifen und sich die ersten Jahre hindurch

nothdürftig oder selbst normal entwickeln, jedoch mit jedem Jahr eine Zunahme ihrer Kreislaufstörung erfahren, so dass während der ersten, spätestens im Verlaufe der zweiten Dentition sicher der Tod eintritt. Hierher gehören die angeborenen Verengerungen am Coem der Pulmonalarterie oder der Aorta, grössere Communicationen der Ventrikel oder der Vorhöfe, oder eines Ventrikels mit dem gegenüberstehenden Vorhofe, das Entspringen der Aorta aus beiden Ventrikeln, Offenbleiben des Ductus Botalli.

3) Es gibt eine Reihe von kleinen Anomalien, wodurch der Kreislauf keineswegs gestört und also auch gar kein Hinderniss für die Entwicklung des Kindes geboten wird. Hierher gehören besonders die äusseren Formveränderungen des Herzens, die Spaltung der Herzspitze und die konische oder die walzenförmige, die breite oder runde Form. Auch die Transposition des Herzens auf die rechte Seite, gewöhnlich complicirt mit Transposition der Leber und des Magens, ist ohne allen Einfluss auf die Fortdauer des Lebens. Das Offenbleiben des Foramen ovale ist ebenfalls höchst irrelevant, wie schon durch vielfache Sectionsbefunde dargethan worden, namentlich wird dieselbe kaum jemals als Ursache der Cyanose, auf welche wir später nochmals zurückkommen müssen, zu betrachten sein.

Was nun die Zeit des Eintrittes der Symptome betrifft, so ist dieselbe sehr verschieden. Es ist allerdings richtig, dass die durch angeborene Herzfehler verursachten Circulationsstörungen anfangs unbedeutend sein können, und erst von Monat zu Monat zunehmen, nicht unwahrscheinlich aber klingen die Angaben einzelner Autoren, nach welchen erst nach mehreren Jahren oder gar erst mit Eintritt der Pubertät ein angeborener Herzfehler anfangen soll, Symptome zu verursachen. Es liegen hier wahrscheinlich Täuschungen zu Grunde und sind acute Herzkrankheiten übersehen worden. Genug Kinder haben übrigens schon gleich nach der Geburt die deutlichsten Zeichen bedeutender Kreislaufstörungen. Sie kommen asphyktisch zur Welt und gehen an Atelektase der Lungen alsbald zu Grunde. Sie schreien gar leise und nicht zusammenhängend, sind immer kühl, etwas cyanotisch, schlafen viel und haben convulsivische Hustenanfälle, wobei die Cyanose schnell zunimmt und namentlich die vorgestreckte Zunge eine dunkel blaurothe Farbe annimmt.

Das constanteste und zuverlässigste Symptom ist immer die Cyanose, über deren Entstehung aber theilweise unrichtige Anschauungen bestehen. Früher nahm man an, dass Cyanose bei angebornen Herzfehlern entsteht, wenn arterielles und venöses Blut sich mischt, wenn also dunkler rothes Blut, als im Normalzustand, in das arterielle Gefässsystem dringt. Dass diese Anschauung unrichtig ist, geht schon aus den vielen Cyanosen hervor, bei welchen die anatomischen Verhältnisse des Herzens vollkommen normal sind, bei Lungenemphysem, Cholera oder bei Vergiftungen mit Kohlenoxydgas. Es sind hier bekanntlich die Cyanosen ziemlich hochgradig und doch findet man bei der Section keine Spur von Veränderungen am Herzen. Wegen derselben irrigen Ansicht hat man auch dem Foramen ovale eine allzugrosse Aufmerksamkeit geschenkt und gab sich zufrieden, wenn man mit einer Sonde von einem Vorhof zum andern gelangen konnte, gleichviel ob die Klappe sufficient war oder nicht.

Der einzige stichhaltige Grund der Cyanose liegt in einer mangelhaften Oxydation des Blutes in den Lungen, verbunden mit einer Stase im peripherischen Venensystem. Dieser Process aber kann durch verschiedene Zustände bedingt sein; es findet sich entweder ein Hinderniss im linken Herzen und damit Staung des Blutes in den Lungenvenen, oder es ist durch eine Stenose im rechten Herzen die Zufuhr von Blut zu den Lungen vermindert, und wird desshalb weniger Blut oxydirt, oder es stellen sich in den Lungen in Folge von Gewebskrankheiten dem Kreislaufe Hindernisse entgegen, oder endlich es ist die eingeathmete Luft sauerstoffarm und oxydirt dann ebenfalls nur unvollständig. Auch die Consistenz des Blutes kann sich so ändern, dass die Strömung dadurch verlangsamt wird, was namentlich für die Endiokung des Blutes in der Cholera gilt. So sehen wir nun, dass die Bedingungen der Cyanose ziemlich mannigfache sind und keineswegs nur in mechanischen Veränderungen des Herzens gesucht werden dürfen.

Die Grade der Cyanose sind sehr verschieden und schwanken zwischen einer leichten, bläulichen Färbung der Lippen und Wangen, und einer bläurothen des ganzen Körpers, auch veranlassen die oben auftretenden Congestionen eine Steigerung der bestehenden Cyanose. Zu hohe und zu niedere Temperatur, Aufregung, Schreien, Lachen, körperliche Anstrengung sind also die häufigsten Ursachen dieser Zunahme.

Ueberleben Kinder mit angeborenen Herzfehlern die ersten Lebensjahre, so stellen sich noch verschiedene andere Symptome der Kreislaufstörung ein. Sie leiden fast alle an schlecht entwickelten Brustmuskeln und Hühnerbrust. Die Extremitäten sind immer kalt und feucht, wie die Haut des Frosches, die Fingerspitzen schwellen zu Kolben an, über welche der Nagel krallenartig gekrümmt hervorsticht, die Hautvenen sind übermässig stark, die Kinder können sich in keiner Weise anstrengen, weder laufen noch steigen, noch anhaltend schreien, indem ihnen all diess einen heftigen Schmerz in der Herzgegend, Dyspnoë und Palpitationen verursacht. In seltenen Fällen wird bei grösseren Kindern auch Hämoptoe beobachtet, Nasenbluten hingegen ist ein sehr häufig auftretendes Symptom, das in der Regel einige momentane Erleichterung verschafft. Endlich macht allgemeiner Hydrops des Zellgewebes und der serösen Säcke, dem sich noch Albuminurie hinzugesellt, dem traurigen Leben dieser Kinder ein Ende.

Die physikalische Untersuchung der angeborenen Herzfehler bietet ausserordentliche Schwierigkeiten. Hypertrophie des Herzens lässt sich fast ohne Ausnahme nachweisen und rührt gewöhnlich von einer beträchtlichen Vergrösserung des rechten Herzens her. Der Herzschlag ist dabei ausgedehnt und verstärkt zu fühlen. Durch die Auscultation lassen sich selten reine Herztöne ermitteln, sondern es sind meist Geräusche statt des einen oder andern Tones oder gar statt beider Töne zu hören. Anhaltende starke Geräusche lassen eine beträchtliche abnorme Communication der Herzhälften, eine Perforation des Septums vermuthen, ein starkes systolisches Geräusch, das über der Pulmonalarterie am deutlichsten gehört wird, zeigt eine Verengung der Pulmonalarterie, einen der gewöhnlichen Bildungsfehler an. Zuweilen jedoch passt der auscultatorische Befund weder auf das eine noch das andere Uebel, und es kann dann

die Diagnose nicht getrennt als auf angeborenen Herzfehler überhaupt gestellt werden. Nach statistischen Zusammenstellungen von Friedberg und Auerle sind besonders die Perioden der ersten und zweiten Zahnung für die Kinder mit angeborenen Herzfehlern gefährlich. Von 159 Fällen starben 53 im ersten Jahre, 51 von 2—11. Jahre, 2 zwischen dem 11—25. Jahre und nur fünf wurden über 45 Jahre alt.

Behandlung.

Von einer direkten Behandlung kann natürlich nicht die Rede sein, man muss sich vielmehr darauf beschränken, Schädlichkeiten möglichst abzuhalten und ein passendes diätetisches Verfahren einleiten. Die notwendige Ruhe ist bei solchen Kindern leicht aufrecht zu erhalten, da sie selbst durch die Erkrankung bald belehrt werden, wie schädlich und qualvoll eine stärkere Wallung des Herzens für sie ist. Bezüglich der Nahrung hat man keine besonderen Vorschriften zu beachten, nur müssen erhitze, alkoholische Getränke streng gemieden werden. Warme Kleidung ist in diesen Fällen außerordentlich zuträglich, und es sind deshalb besonders Leinwand und Flanell zu empfehlen. Eine strenge antiphlogistische Behandlung (Blutegel, Calomel, Laxantien etc.) sind unter allen Umständen zu meiden, indem der Hydrops und das lethale Ende dadurch nicht beschleunigt wird. Stürke Congestivzustände, wie sie sich ausserordentlich häufig einstellen, müssen durch äussere Anwendung des Kälte, durch sarsliche Getränke und strenge Diät beseitigt werden.

Kann man die Kinder asphyktisch zur Welt, so müssen sie bei der Asphyxie schon angegebenen Behandlungsversuche angestellt werden, welche aber in diesen Fällen gewöhnlich fruchtlos bleiben.

2) Endocarditis, Pericarditis und Rheumatismus acutus.

Wir bringen hier drei Krankheiten in einen Rahmen zusammen, welche pathologisch-anatomisch gar keine Aehnlichkeit unter einander haben, klinisch aber sich kaum trennen lassen, wenn man nicht in aparter Beschreibung der einzelnen Veränderungen sich vielfache Wiederholungen aussetzen will. Zudem sind diese Zustände bei Kindern ausserordentlich selten, so dass es kaum notwendig erscheint, sie ausführlicher Besprechung zu geben.

Symptome.

Wir beginnen mit den Symptomen des Rheumatismus acutus, lassen dann als häufigste Complicationen die Endo- und Pericarditis folgen.

Rheumatismus acutus.

Der acute Rheumatismus der Kinder unterscheidet sich wenig von dem der Erwachsenen, nur ist sein Verlauf kürzer und die Erkrankung in der Regel weniger intensiv. Das jüngste Kind, das ich an ausgesprochenem Rheumatismus acutus mit nachfolgender, tödtlicher Endocarditis zu behandeln hatte, war 1¹/₄ Jahr alt, und erlag nach 1/2-jähriger Krankheit dem Herzfehler. Es ist das ein sehr seltener Fall, indem in den Lehrbüchern die Krankheit meistens

Kindern von sechs Jahren und darüber zugeschrieben wird. Viele Erkrankungen, welche von den Laien mit dem vagen Namen Wachsieber bezeichnet werden, gehören hieher.

Anfangs ist immer heftiges Fieber zugegen, die Haut wird leuchtend heiss, der Durst gross, der Puls enorm beschleunigt; es tritt grosse Unruhe und Schlaflosigkeit ein. Dieses heftige Fieber dauert höchstens 8—10 Tage, verliert sich aber dann allmählig, und nur wenn bösartige Complicationen, namentlich Erkrankungen des Herzens eingetreten sind, besteht dasselbe auf unbestimmt lange Zeit und ohne Unterbrechungen fort. Die Kinder sind meist sehr blass und collabirt, haben einen auffallend wehmüthigen, schmerzhaften Ausdruck des Gesichtes und einen matten Blick, sie beobachten an den ergriffenen Gelenken die grösstmögliche Ruhe, während die freien Extremitäten wegen der grossen Fieberhitze in fortwährender Unruhe sich befinden.

Das Wesentliche der Krankheit besteht nun in einer eigenthümlichen Anschwellung an verschiedenen Gelenken, vorherrschend der unteren Extremitäten, welche sich gerade so wie bei Erwachsenen verhalten. Die Berührung und noch mehr die Bewegung der erkrankten Glieder ist ausserordentlich schmerzhaft, so dass die Kinder mit dem Ausdruck der grössten Angst jede Annäherung an die schmerzhaften Gelenke überwatchen und abwehren. Die Anschwellungen sind anfangs immer etwas geröthet, die Röthe nimmt aber früher ab als die Geschwulst. Am häufigsten sind die Kniegelenke ergriffen, dann folgen die Fussgelenke, dann die der oberen Extremitäten und die Wirbelsäule.

Diese Gelenkschwellungen gehen bei Kindern nur niemals in Eiterung über, sondern schwellen spurlos wieder ab und hinterlassen höchstens einige Schwäche und Schmerzhaftigkeit bei Gebrauch der Extremität. Charakteristisch aber ist die Wanderung oder das Ueberspringen der Affection von einem Gelenk zum anderen. Nur ausserordentlich selten ist der Process mit dem gleichzeitigen Ergriffenwerden einiger Gelenke besetzt, sondern gewöhnlich erkranken nach einigen Tagen, wenn die zuerst befallenen Gelenke wieder abschwellen, andere neue mit derselben Heftigkeit und demselben Verlaufe, was sich in einem dritten und selbst vierten Nachschub wiederholen kann.

Die allgemeinen Symptome sind der Heftigkeit des Fiebers entsprechend. Der Appetit ist sehr vermindert oder vollständig verschwunden, der Stuhl angehalten, der Urin dunkel pigmentirt, reich an Hämaturie, wird nur in geringer Menge gelassen. Die Kinder schwitzen sehr viel und werden mit Miliarien besetzt.

Die Diagnose des Rheumatismus acutus ist sehr leicht, zumal er fast ausschliesslich ältere Kinder, die ihre Klagen schon vernünftig vorbringen können, befällt. Im Beginne könnte er nur verwechselt werden mit einem noch nicht ausgebrochenen acuten Exantheme oder mit einem Typhus, wo auch zuweilen sehr heftige Schmerzen in den Knie- und Fussgelenken vorkommen. Die letzteren lassen sich aber leicht dadurch erkennen, dass keine Anschwellung hierbei zu Stande kommt und dass durch leisen Druck oder langsame passive Bewegung der Schmerz nicht besonders vermehrt wird, was bei Rheumatismus acutus jedesmal der Fall ist. Die Verwechslung mit serofälliger Arthrocace, mit Tumor albus könnte höchstens einige Tage bei Beginn derselben bestehen, da hier durchaus keine Wanderung von einem

Gelenk auf das andere beobachtet wird, und der Verlauf ein ganz anderer chronischer ist.

Der einfache Rheumatismus acutus hat ohne Complicationen eine Dauer von höchstens 3—4 Wochen. Ist er aber mit Herzaffectationen complicirt, was mindestens bei $\frac{1}{2}$ der Erkrankungen der Fall ist, so ist die Dauer eine unbestimmt lange, und es kann nach Jahre langem Siechthum noch das lethale Ende eintreten. Unter den Complicationen verdienen eine specielle Betrachtung a) die Endocarditis und b) die Pericarditis.

a) Endocarditis.

Pathologische Anatomie.

Die vortheilhaften Untersuchungen von Luschka haben ergeben, dass das Endocardium aus denselben Schichten besteht wie die Gefässe. Die Oberfläche wird durch eine dünne Schichte Epithel gebildet, das als unmittelbare Fortsetzung von jenem der Gefässe zu betrachten ist. Dann folgt eine Schichte gestreckter Längsfasern, dann eine von sehr feinen, sich vielfach kreuzenden elastischen Fasern, welche der contractilen Haut der Gefässe analog ist, und endlich verbindet eine Schicht von Bindegewebe diese elastische Haut mit dem Herzmuskel. Die Gefässe und Nerven finden sich fast nur in diesem Bindegewebe und berühren nur wenig die elastischen Fasern, weshalb auch nur in dem ersteren eine wirkliche Exsudation zu Stande kommen kann. Das Exsudat drängt aber bald die überliegenden Schichten bei Seite und kommt in der Herzhöhle frei zu Tage, anderer Seits ergreift es auch die zunächst gelegenen Schichten des Herzmuskels, so dass immer eine kleine Myocarditis die Endocarditis begleitet. Zuerst bemerkt man nach Luschka rötliche Flecke im Endocardium, wobei die Oberfläche noch vollkommen glatt ist; bald aber schwindet diese Glätte, die Oberfläche wird rauh und es zeigt man diese Exsudation unter dem Mikroskope ganze und zertrümmerte Epithelien, Exsudatkörper und Faserimente. Der vorbeifliessende Blutstrom lässt an diesen rauhen Stellen abdam einzelne Fibrinfäden hängen, wodurch dieselben ein flockiges Aussehen bekommen. Diese endocarditischen Exsudate können nach Bamberger folgende Metamorphosen eingehen:

1) Das Exsudat kann vollständig resorbirt werden, was jedoch nur bei ganz geringen Schüben, welche das Epithel noch nicht durchbrochen haben, möglich erscheint.

2) In den meisten Fällen verschwindet es nicht mehr ganz, sondern verursacht bleibende Veränderungen auf der Innenfläche des Herzens. Die gewöhnlichsten derselben sind weisse, verdichtete Stellen, welche immer eine Neigung zum Schwunde, zur nachhigen Contraction haben und nun, wenn sie an den Klappen oder in deren Nähe vorkommen, dieselben zum Schliessen oder zu veränderten Stellungen und Intentionen veranlassen. Die Endocarditis ist somit die Hauptursache späterer Herzfehler. In anderen Fällen hat das endocarditische Exsudat die Neigung, zu polypösen Wucherungen anzuwachen, welche viel Ähnlichkeit mit spitzen Condylomen haben und deshalb fälschlich auch für eine wirkliche Acusserung der Syphilis gehalten worden sind.

3) Hauptächlich durch Virchow's unermüdliche Forschungen ist dargethan worden, dass auch einzelne schon geringere Theile

wieder abgerissen und fortgeschwemmt werden können, wodurch dann in verschiedenen Körpertheilen Thrombosen entstehen. Der häufigste Sitz dieser Thrombosen sind die Milz, dann die Nieren und das Gehirn. Fast regelmässig erfolgt der Tod nach einer solchen Fortschwemmung.

Symptome.

Wenn das endocarditische Exsudat so gelagert ist, dass es auf keine Klappe deutlich influenciren kann, so lässt es sich physikalisch gar nicht ermitteln, die functionellen Erscheinungen aber sind so verschieden und werden auch von grösseren Kindern so undeutlich beschrieben, dass die Diagnose fast unmöglich erscheint. Gewöhnlich jedoch kommen Wucherungen an den Klappen vor, und dann treten deutliche physikalische Veränderungen ein.

Das linke Herz erkrankt viel häufiger als das rechte und zwar am häufigsten die Mitralis. Nicht nur Auflagerung auf der Klappe selbst, sondern auch jene in der Nähe der Papillarmuskeln und der Sehnenfäden können eine Schiefstellung, eine Verzerrung oder einen Schwund der Klappe und hiemit Insufficienz derselben veranlassen. Wir haben deshalb als gewöhnlichstes physikalisches Zeichen statt des ersten Tones ein systolisches Blasen, am deutlichsten an der Herzspitze, wenig an der Aorta und gar nicht an den Carotiden vernehmbar. Das rechte Herz erweitert sich bald consecutiv, so dass die Dämpfung in der Herzgegend eine ausgedehntere und dem entsprechend der Herzhock in grösserem Umfange und verstärkt gefühlt wird. Wenn die Wucherungen am Ostium venosum des linken Ventrikels sehr massenhaft werden, so kann allerdings auch eine Stenose an diesem Ostium und hiemit auch ein diastolisches Geräusch entstehen, was jedoch unverhältnissmässig selten zu sein scheint.

Die Semilunaren der Aorta können ebenfalls in den Bereich der Endocarditis gezogen und durch Schrumpfung oder Durchlöcherung insuffizient werden. Die gewöhnlichere Erscheinung an diesen Klappen ist aber, dass sie mit Vegetationen sich bedecken und somit eine Stenose am Ostium arteriosum bedingen. Man hört in diesem Falle ebenfalls ein systolisches Geräusch, das aber am stärksten an der Aorta ist und deutlich in die Carotiden sich fortpflanzt.

Das rechte Herz wird viel seltener von Endocarditis ergriffen als das linke, die dort auftretenden Geräusche müssen ebenso gedeutet werden, wie diese für den linken Ventrikel geschehen ist, nur sind dort die venösen Stauungen an den Halsvenen viel ausgesprochener, als diese bei Klappenfehlern des linken Ventrikels der Fall ist.

Die functionellen Symptome der Endocarditis sind sehr verschieden. Der Schmerz ist dabei selten von Bedeutung, constanter ist schon die Angst, die fortwährende Unruhe, soweit der Rheumatismus acutus sie gestattet, und Beklemmung der Brust. Doch sind alle diese Symptome bei Pericarditis ausgesprochener als bei Endocarditis. Herzklopfen ist immer zugegen und nimmt zu durch Anstrengung, als Geschrei oder Körperbewegung, und zu gleicher Zeit stellt sich regelmässig eine eigene Art nervöser Dyspnoe, eine Kurzatmigkeit ein, die anfangs keine nachweisbaren mechanischen Ursachen entdecken lässt, später aber durch die Stauung im linken Vorhof genügend erklärt wird.

Die an Endocarditis leidenden Kinder fiebern immer und heken, wenn sie das den Rheumatismus acutus begleitende Fieber schon verloren haben, wieder neue heftige febrile Symptome. Dieselben dauern unbestimmt lange Zeit, oft viele Wochen lang fort, und von ihrer Intensität, nicht von dem beginnenden Herzfehler hängt am grossen Theil die enorme Abmagerung ab, in welche die Kinder verfallen. Zuweilen stellen sich anhaltende stürbende Delirien ein, und wenn hierbei die Milz noch vergrössert ist, was hauptsächlich bei Keilbildung deutlich beobachtet wird, so kann möglicher Weise dieser Symptomencomplex für Typhus gehalten werden. Uebrigens sind die secundären Symptome durch Fortschleppung bei Kindern ausserordentlich selten. Ein einziges Mal erst fand ich bei einem an Endocarditis verstorbenen sechsjährigen Knaben Keilbildung in Milz und Nieren.

Die Diagnose der Endocarditis ist fast immer mit grossen Schwierigkeiten verbunden, und es ist hier vor allem zu behaupten, dass nicht ein jedes blasendes Geräusch am Herzen Endocarditis anzeigt, indem die Kinder in fieberhaften Krankheiten sehr häufig und nach anämischen Geräuschen bekommen, welche bei beginnender Reconvalescenz von selbst verschwinden. Es wird dieses namentlich nach Blutentziehungen, schon nach örtlichen, beobachtet, und da dieselben auch gegen die rheumatischen Schmerzen häufig in Anwendung kommen, so werden auch sekundäre Geräusche in Folge von Rheumatismus acutus sich einstellen müssen.

Zur Diagnose der Endocarditis gehört ausser einem blasenden Geräusche noch ein ausgedehnter Stau, eine Vergrösserung des Herzens, nachweisbar durch grössere Dämpfung, Beschleunigung des Pulses und Athemnoth. Die Ausgänge der Endocarditis sind Heilung, Tod oder Nachkrankheiten. Die vollständige Heilung einer gehörig entwickelten Endocarditis dürfte wohl zu den Seltenheiten zählen, weil die Reiz des Exsudates gewöhnlich Veränderungen an den Klappen and hietit Herzfehler bedingen. Der Tod tritt selten auf der Höhe der Krankheit durch Erschöpfung oder Keilbildung ein, meier atrophiren die Kinder unter fortwährendem Fieber, accidentellen Diarrhöen und Bronchitiden und gehen an lobulärer Pneumonie zu Grunde. Das aus dieser Krankheit entstehenden Herzfehler entwickeln sich oft erst nach Monaten durch Schrumpfung des Exsudates und üben mehr und mehr Einfluss auf die Circulation aus, bis endlich der Herzfehler als solcher sich geltend macht und nach kurzer oder längerer Dauer den Tod herbeiführt.

19 Pericarditis.

Die Pericarditis ist erst seit der Entdeckung des pericarditischen Reibungsgeräusches durch Collin (1824) sicher diagnosticirbar. Die Diagnose ist aber auch noch jetzt höchst schwierig und mangelhaft, wie man aus Folgendem erschen wird.

Pathologische Anatomie.

Je nach der Ausdehnung spricht man von einer allgemeinen und einer umschriebenen Pericarditis. Die Neigung sich auszubreiten ist der Pericarditis in hohem Grade eigen, und man findet deshalb häufiger die allgemeine als die begrenzte. Die Veränderung kann sowohl an

parietalen als visceralen Blatt begannen, und es stellt sich alsdann eine Injection und sofort eine plastische Exsudation an der Oberfläche ein.

Nach der Beschaffenheit des Exsudates unterscheidet man verschiedene Formen:

1) Das faserstoffige Exsudat. Man findet hierbei sowohl Herz als Herzbeutel dicht mit einer zottigen, gelbweissen Membran bedeckt und im ganzen Umfang oder partiell mit einander verwachsen. Dieses Exsudat ist sehr organisationsfähig und es entwickeln sich bald in ihm Capillargefässe, welche häufig zu kleinen Extravasaten Gelegenheit geben. Neben dieser organisirten Membran besteht immer noch eine kleinere oder grössere Menge flüssigen Exsudates, welche von den sich ablösenden Zotten und oberflächlichen Gerinnseln gelblich, trüb und flockig erscheint. Dieser flüssige Theil des Exsudates wird später gewöhnlich resorbirt, worauf sich die festen Entzündungsmembranen allseitig berühren und nun entweder mit einander fest verwachsen oder, wenn die Plasticitas eine nur geringe ist, sich gegen einander abschließen und endlich fast ganz verschwinden. Von Verkalkungen des Exsudates, wie dies zuweilen bei Sectionen Erwachsener gefunden wird, ist meines Wissens in der Pädiatrik nichts bekannt.

2) Das eitrige jauchige Exsudat. Wenn neben den Faserstoffmembranen das flüssige Exsudat in grösserer Menge vorhanden ist und eine eiterähnliche Consistenz hat, so pflegt man eine solche Pericarditis eine eitrige zu nennen. Eine strenge Grenze zwischen der vorigen und dieser Form existirt natürlich nicht, indem bei beiden sowohl Membranen als flüssiges Exsudat zusammen vorkommen. Es kann sehr wohl geschehen, dass eine Pericarditis, die zu Anfang als eitrige bezeichnet worden ist, nach kurzer Zeit, wenn der flüssige Theil des Exsudates resorbirt worden ist, eine faserstoffige wird. Hingegen kommt fast ausschliesslich bei Neugeborenen die jauchige, pyämische Pericarditis vor, deren schon bei der pyämischen Pleuritis gedacht wurde. Sie kommt nie isolirt, sondern immer gemeinsam mit Pleuritis oder Peritonitis vor, und zeichnet sich dadurch aus, dass das ziemlich dünnflüssige Exsudat von braunrother Farbe und jauchigem Geruche ist und dass auch die darin suspendirten Flocken von graubrauner, nicht von weissgelber Farbe sind. Wie schon früher bemerkt, findet man hierbei gewöhnlich Nabelvenenphlebitis und Verjauchung des Nabels.

3) Das tuberculöse Exsudat. Tuberculöse Pericarditis ist trotzdem, dass so viele Kinder an Tuberculose zu Grunde gehen, immerhin ein seltener Befund. Die Tuberkeln auf dem Herzbeutel sind meistens grösser als die Miliartuberkeln in den Lungen und stehen bald einzeln, bald so dicht, dass sie eine höckerige Membran bilden, der man auf den ersten Anblick ihren tuberculösen Charakter gar nicht ansieht. Makroskopisch lassen sie sich jedoch durch die Brüchigkeit und leichtere Zerreiblichkeit der verklebten Membranen, mikroskopisch durch den tuberculösen Detritus erkennen.

Symptome.

Das Krankheitsbild, welches die Lehrbücher von der Pericarditis zu geben pflegen, trifft bei Kindern nur selten zu, sondern die Erscheinungen sind so variabel, dass man genau genommen eigentlich ganz verzichteten muss auf eine Schilderung überall zutreffender Sym-

ptome. Oft sind dieselben sehr gering und werden namentlich durch die gleichzeitigen Krankheiten, Rheumatismus acutus, Pyämie, Melen, Beiglatz und Tuberculose, völlig maskirt, oft sind sie wieder sehr augenfällig und manifestiren sich in grosser Beklemmung und heftigen Schmerzen, in Athemnoth, schnellem unrythmischem Puls, Oelmaden, Delirien und Cyanose. Die wichtigsten Anhaltspunkte bietet immer die physikalische Untersuchung.

Bei der Besichtigung der entblössten Brust sieht man zu Anfang der Pericarditis das Herz in grösserer Ausdehnung anschlagen, und zuweilen ist schon eine geringe Ungleichmässigkeit des Rhythmus zu bemerken. Später, wenn das Exsudat an Masse zunimmt und namentlich, wenn der flüssige Theil desselben überwiegend gross ist, wird das Herz nach links und oben verdrängt und schlägt dem entsprechend mehr nach links und etwas weiter oben an die Brustwand. Wäre aber das Exsudat noch mehr, so tritt das charakteristische Zeichen auf, dass der Herzschock gar nicht mehr zu sehen, noch zu fühlen ist. Wenn das pericarditische Reibungsgeräusch sehr deutlich und laut zu hören ist, so kann es zuweilen auch durch das Gefühl entdeckt werden.

Durch die Percussion ist bei kleinen Exsudaten gar nichts Anormales zu entdecken, wenn aber das Exsudat massenhaft und flüssig ist, so bekommt man eine ausgedehntere Dämpfung und zwar in Form einer abgestumpften Pyramide, deren Spitze nach oben gerichtet ist. Die Dämpfung nach oben, welche bis zum dritten und selbst zweiten Rippenknorpel reichen kann, ist besonders charakteristisch und erleichtert wesentlich die Diagnose. Es darf nicht vergessen werden, dass ganz bedeutende Herzbeutelentzündungen, bei denen das Exsudat sich vorherrschend membranös gestaltet, durch Percussion nicht ermittelt werden können.

Die Auscultation lässt anfangs ganz normale, etwas vertiehte Herztöne unterscheiden, an denen nur manchmal kleine Abweichungen vom normalen Rhythmus vorkommen. Bald aber wird an einer oder der anderen Stelle der Dämpfung ein Reibungsgeräusch vernommen, das zuerst ausserordentlich schwer von einem leichten endocarditischen Hauche unterschieden werden kann, später jedoch sich deutlich als Reibungsgeräusch manifestirt. Es erscheint je nach seiner Intensität als ein leichtes Anstreifen, Schaben, Knittern oder Kratzen und weicht sich namentlich dadurch aus, dass es gewöhnlich weder systolisch noch diastolisch, sondern zwischen den beiden Herztönen gehört wird. Oft ist es sehr schwer von endocarditischem Geräusche zu unterscheiden, und es ist dann immer erforderlich, dass man die Kinder im Schlafe untersucht, wobei man die Vorsicht gebraucht, sie mit einer Bekleidung einschläfern zu lassen, die vorne leicht aufgeht und den Thorax unbedeckt gestattet. Die Hauptunterschiede bleiben immer, dass das pericarditische Reibungsgeräusch ausserordentlich eng begrenzt ist und sich niemals so weit fortpflanzt als die endocarditischen Geräusche, dass es weder systolisch noch diastolisch ist und dass es oft plötzlich aufhört, um an einer benachbarten Stelle wiederzukehren oder ganzlich zu verschwinden. Zuweilen entstehen hierdurch in Consilien verschiedene Meinungen, nicht nur über die Krankheit, sondern auch über die diagnostischen Fähigkeiten der consultirenden Aerzte.

Der Puls ist zu Anfang der Krankheit gross, schnell und schwer zu unterdrücken, im Verlaufe wird er meist klein, unrythmisch und ist dann leicht wegzudrücken. An den Jugularvenen bemerkt man bei grösseren pericarditischen Exsudaten deutlich undulirende Bewegungen, und zwar findet eine Anschwellung der Venen während der Systole, eine Abkwellung während der Diastole statt. Bei Beginn der Systole schliesst sich nämlich die dreizepfelige Klappe und erweitert sich der rechte Vorhof; da nun aber wegen des vorhandenen Exsudates diese Erweiterung nicht gehörig geschehen kann, so staut sich das Blut in den zuführenden Gefässen und bedingt demnach eine sichtbare Erweiterung der Jugularvenen. Ausserdem findet man fast regelmässig Catarrh und wohl auch partielle Compression der linken Lunge.

Die functionellen und allgemeinen Störungen sind, wie schon eingangs dieser Schilderung bemerkt worden, höchst variabel und richten sich viel mehr nach den Complicationen der Endocarditis als nach dieser selbst. Die Ausgänge derselben sind nun entweder Genesung, wohl nur in seltenen Fällen, unter plötzlichem Verschwinden des Reibungsgeräusches, oder der Tod, welcher oft unerwartet schnell eintritt, oder endlich Nachkrankheiten, allseitige Verwachsung des Herzens mit dem Herzbeutel, Dilatation einzelner Herzabschnitte, Erkrankung des Herzmuskels und in Folge dieser Processen mannigfache Circulationsstörungen.

Behandlung.

Der Rheumatismus acutus kann nicht coupirt, vielleicht nicht einmal abgekürzt werden, weder Calomel, noch Brechweinstein, noch Veratrin, noch Bleientziehungen, noch Kaltwasserbehandlung aussern eine deutlich günstige Wirkung. Unter solchen Umständen bleibt nichts übrig als eine symptomatische Behandlung, wobei das Morphinum die grösste Rolle spielt. Durch einen Morphinum haltigen Saft kann man den Kindern die nöthige Ruhe und einige Stunden Schlaf verschaffen, wobei der Process durchaus nicht modificirt wird. Die ergriffenen Gelenke werden am besten mit Oel gerieben und mit Watte dick umgeben, um jede unsanfte äussere Berührung zu verhüten.

Die Endocarditis und Pericarditis, welche den Rheumatismus acutus compliciren, behandle ich niemals streng antiphlogistisch, höchstens dürften bei wohlgenährten Kindern einige Dosen Calomel günstig antifebril wirken. Leichte Hautreize, wie Senfteige, trockene Schröpfköpfe etc. sind hier zu empfehlen. Die pyämische Pericarditis der Neugeborenen geht natürlich immer lethäl aus und bedarf deshalb keiner spec. Behandlung. Die nachfolgenden Herzfehler verlangen ein sehr vorsichtiges strenges Regime, wie diess schon ausführlicher bei der Behandlung der angeborenen Herzfehler im vorausgehenden Abschnitte geschildert worden ist.

3) Hydropericardium. Herzbeutelwassersucht.

Für sich allein kommt die Herzbeutelwassersucht nur bei Herzfehlern vor, wo dann die Circulationsstörung sich früher am Herzbeutel als an der Pleura und dem Bauchfell offenbaren kann. In den meisten Fällen aber ist sie mit serösem Ergüssen in den oben genannten Säcken complicirt und tritt als Schlussakt des Hydrops mit gewöhnlich bald

folgendem letalem Ende auf. Nephritis nach Scharlach ist bei Kindern fast die einzige Ursache der reinen Hydropsen.

Pathologische Anatomie.

Man findet im Herzbeutel einen hellgelben, klaren Erguss von 30 bis 120 Cct., der die chemischen Eigenschaften der übrigen serösen Ergüsse, d. h. die eines verdünnten Bluteserums hat. Zum Unterschied von eitriger Pericarditis ist das Pericardium bis auf eine leichte seröse Infiltration völlig intakt, weder mit Pseudomembranen bedeckt, noch an irgend einer Stelle abnorm verwachsen. Der Herzmuskel selbst ist, wie bei allen Hydropsen, mehr gelb als roth gefärbt.

Symptome.

Kleine Ergüsse lassen sich nicht diagnosticiren und machen auch wahrscheinlich gar keine Symptome, indem ja selbst im physiologischen Zustande Flüssigkeit im Herzbeutel sich findet und die Quantität dieser Flüssigkeit nicht unbedeutenden Schwankungen unterworfen ist. Bei grossen Ergüssen sind die Symptome der eben geschilderten Pericarditis deutlich zu beobachten. Es stellt sich grosse Beklemmung und selbst Orthopöe ein, die Jugularvenen schwellen bei jeder Systole an, bei jeder Diastole wieder ab. Die Haut wird an den bekannten Stellen etwas cyanotisch und ihre Temperatur vermindert. Da hier immer noch anderweitige Hydropsen vorausgegangen sind und gleichzeitig fortdauern, so wird das Krankheitsbild des reinen Hydropericardiums mannigfach getrübt und verwechselt, was namentlich für die Respirationstörungen gelten mag. Die physikalischen Zeichen sind dieselben wie bei der Pericarditis, nur noch viel ausgesprochener und leichter zu constatiren, indem diese Kranken in ihrem Allgemeinzustande weniger tief ergriffen und deshalb ruhiger sind, als die an Pericarditis Leidenden. Die Präcordialgegend ist etwas vorgewölbt, der Herztoss schwach oder gar nicht zu fühlen, der Puls klein, die Dämpfung sehr oben sehr exquisit. Nur ein Zeichen der Pericarditis kommt hier einmal vor, das Reibungsgeräusch, da die Bedingungen desselben, nämlich mit Membranen besetzte Wandungen, hier nicht gegeben sind. Die Ausgänge des Hydropericardiums sind je nach der Ursache verschieden. Immer letal endigen die zu Herzfehlern hinzutretenden Ergüsse, während die nach Scharlach sich einstellenden bei passender Behandlung sehr wohl resorptionsfähig sind.

Behandlung.

Wie bei allen Hydropsen, so ist auch hier die diuretische Behandlung noch am meisten indicirt und unter den Diuretica wird das reine Boob Juniperi ohne allen Zusatz am besten und längsten vertragen. Die Ableitungen auf den Darm dürfen bei kranken Kindern dieser Art nicht versucht werden, weil hierdurch immer die Verdauung leidet und nur bei gehörigem Stoffmangel die Heilung einer Hydropsen denkbar ist. Auch die Ableitung auf die Haut durch wiederholte Vaccinations dürfte wegen des dabei entstehenden Schmerzes nicht geeignet erscheinen und bei Kindern mit Nephritis um so weniger, als durch die Canthariden stets ein starker Reiz der Nieren gesetzt wird. Die Paracentese des Herzbeutels wird zwar in manchen Lebelbüchern als

Vollständigkeit halber als letztes Mittel anempfehlen, wird aber meines Wissens in der Praxis fast gar nie ausgeführt.

B. Arterien und Venen.

Krankheiten der Arterien kommen bei Kindern niemals vor, und nach atheromatöser Arterienkrankung, die fast bei keiner Section älterer Individuen vermisst wird, sucht man hier vergeblich. Das einzige, worauf hier aufmerksam gemacht werden muss, ist ein anomaler Verlauf der Radialarterien, der in manchen Fällen von schwerkranken oder anämischen Kindern zu argen prognostischen Trugschlüssen Veranlassung geben kann. Es ist deshalb bei auffallender Kleinheit oder vollkommenem Fehlen des Radialpulses immer notwendig, sich auch von der Beschaffenheit anderer Arterien, der Carotiden und der Aa. temporales zu überzeugen, bevor man einen Schluss auf die Fülle oder Leere des Gefäßsystems wagen darf. Als Uebergang zu den Erkrankungen der Venen mögen hier die erektilen Geschwülste Platz finden.

1) Erektils Geschwulst, Naevus vasculosus, arterielle Teleangiectasie.

Symptome.

Unter erektiler Geschwulst versteht man eine Erweiterung einer grösseren Partie von Capillaren, ein Zustand, der hauptsächlich am Gesicht, an den Augenlidern, den Lippen und am Hals vorkommt. Diese Krankheit der Capillargefässe trifft bald die der Cutis, bald die des Unterhautzellgewebes, bald beide zugleich in grösserer oder geringerer Ausdehnung. Im ersteren Falle haben wir eine rothe Erhabenheit der Haut von Farbe und oft auch von Gestalt einer Himbeere, im letzteren eine etwas teigige Geschwulst vor uns, über welche die Hautdecke entweder von normaler Beschaffenheit oder ebenfalls von erweiterten Gefässen durchzogen ist. Diese Gefässerweiterungen sind gewöhnlich angeboren, ihr Wachsthum steht aber nicht im geraden Verhältnisse zur Entwicklung des Gesamtorganismus, sondern übertrifft dieselbe bedeutend, so dass eine kleine Teleangiectasie bei der Geburt von der Grösse eines Stecknadelskopfes nach einem Jahre schon die Grösse einer Erbse oder einer Haselnuss erreicht haben kann. Diese Thatsache ist allgemein bekannt, hingegen kennen die meisten Aerzte nicht gehörig den spontanen Verlauf dieser erektilen Geschwülste und Gefässmäler. Es besteht nämlich die Ansicht, dass dieselben, wenn keine operative Hilfe entgegentritt, fort und fort wachsen, und man hat sich noch nicht gehörig klar gemacht, warum sie so sehr selten bei Erwachsenen und verhältnissmässig so häufig bei Kindern vorkommen. Der Grund dieses Verhältnisses ist der, dass eben die meisten von selbst kleiner werden und endlich total verschwinden, wenn auch gar nichts dagegen unternommen wird. Dieses spontane Atrophiren nach Art der kindlichen Hautwarzen unterscheidet den Naevus vasculosus hinlänglich von einem bösartigen Neoplasma.

Die erektilen Geschwülste, deren Hautdecken nahezu normal sind, lassen sich dadurch leicht diagnostizieren, dass sie unter dem Finger-

drucke schwinden, beim Schreien und Pressen größer und gespannt werden, zweifeln leicht pulsiren und durch Auscultation ein schwirrendes Geräusch erkennen lassen.

Pathologische Anatomie.

Schneidet man an der Leiche eine solche Geschwulst durch, so collabirt sie sehr und entleert eine ziemliche Menge rothen Serums. Bei genauerer Untersuchung ergibt sich, dass sie aus locker erweiterten ausgebüchteten Capillaren besteht, welche mannigfach untereinander communiciren und somit ein schwammiges Gewebe darstellen. Hierin liegt auch der Grund, dass sich die erektilen Geschwülste durch den Fingerdruck entschlossen comprimiren lassen. Untersucht man nun weiter mikroskopisch, so findet man Längs- und Querschnitte von Capillaren, und zuweilen hat es den Anschein, als existirten an denselben kleine beutelförmige Ausbuchtungen oder als endeten einzelne Capillaren mit einer kolbigen Anschwellung. Zwischen den Gefäßen liegt vollkommen ausgebildetes Bindegewebe.

Behandlung.

Bei Hautnävus ist die Behandlung eine andere als bei erektilen Geschwülsten des Unterhautzellgewebes. Die himbeerfarbigen Hautstellen auf der Stirn, den Augenlidern etc. werden am besten und einfachsten durch die Vaccination entfernt. Man sticht zu diesem Zweck mit einer in Impfstoff getauchten Nadel den Nævus 10 bis 20 Mal an, worauf immer einige Tropfen Blut sich entleeren und wenn nichts weiter geschieht, gewöhnlich durch Herausschwimmen des Impfstoffs das Resultat negativ ausfällt. Lässt man aber diese Einstiche ruhig ausbleiben, reinigt dann die Stelle mit kaltem Wasser und bestreicht die Einstiche nochmals mit einer Lage von Vaccinsymphie, so schagen alle oder fast alle Stiche an. Es erhebt sich am fünften Tage der Nævus in rothe blaurothe Pusteln, welche alsbald confluiren, heftige Fiebererscheinungen verursachen, am achten bis neunten Tage vertrocknen und nach Abfall der Krusten eine anfangs blaurothe, später aber erbleichende Narbe zurücklassen. Hat man bei schon geimpften Kindern einen Nævus zu behandeln, so ist natürlich dieses Verfahren ohne Erfolg, in diesen Fällen kann man durch eine Plastermasse, bestehend aus einem Theil Tartarus stibatus und drei Theilen Wachspflaster, welche man auf Leinwand gestrichen 4—6 Tage lang liegen lässt, tiefgehende Pusteln erzeugen, nach deren Verschorfung der Nævus auch verschwinden oder wenigstens in einzelne kleinere getheilt werden kann. Kleinere Rückstände können ohne allen Nachtheil zu wiederholten Malen mit dem Plaster belegt werden. Flache grosse Nävi können auch durch Tinte wiewen weniger auffallend gemacht werden. Man sticht durch eine Korkplatte 10—12 Nadeln und punktirt nun mit diesem Instrumente den Nævus an allen Stellen, worauf Magnesia usta oder Zinkoxyd in die frischen Stichwunden eingerieben wird. Es entsteht durch diese Mischung von Roth und Weiss eine rosa Farbe, welche von der Hautfarbe nur wenig absteht.

Vorher man zu intensiveren Aetzungen mit Wiener Aetzpaste, Chloezink, concentrirte Schwefelsäure etc., wodurch zuweilen große Brandherde und entstellende Narben entstehen können, oder zu einer

operativen Eingriff schreitet, möge man immer bedenken, dass tiefe Navi mit der Zeit von selbst verschwinden und höchstens eine etwas rötliche Hautstelle zurücklassen, welche oft weniger entstellt als grosse strahlig contrahierte Operationsnarben. Ich habe mir zum Grundsatz gemacht, alle Hautnavi, welche nicht durch zwei gebogene Schnitte leicht umgangen und durch die blutige Naht genau vereinigt werden können, nicht chirurgisch zu behandeln.

Anders verhält sich die Sache mit den subcutanen erektilen Geschwülsten, welche übrigens bei weitem seltener sind, als die Teleangiectasen der Cutis. Dieselben können durch spontanes Aufstehen oder leichte Verletzungen zu grossen lebensgefährlichen Blutungen Veranlassung geben und es ist deshalb ihre Behandlung nicht zu verschieben. In einzelnen Fällen ist es allerdings gelungen, durch consequente Compression eine solche Geschwulst zum Schwinden zu bringen, es gehört hiezu immer grosse Geduld und Ausdauer, und ausserdem muss notwendiger Weise eine feste, knöcherne Unterlage vorhanden sein. Sind diese Vorbedingungen nicht gegeben, so ist der Versuch der Compression ein vergeblicher. Zur Beseitigung dieser substantiellen Capillärwucherungen hat man früher hauptsächlich das Abbinden unternommen, indem an der Basis der Geschwulst eine lange Nadel mit doppeltem Faden oder noch besser Bändchen durchgestochen und von der Geschwulst nach zwei Seiten hin abgebanden wird, in neuerer Zeit hat die Galvanocaustik hier vortreffliche Dienste geleistet. Man führt zu diesem Zwecke mehrere Platindrähte in einer gegenseitigen Entfernung von 2—3 Linien durch die Basis der Geschwulst und bringt sie dann mittel der Batterie zum Weissglühen, worauf Brandstiche, grosse Coagula, Eiterung und schliesslich Heilung eintreten.

2) Thrombosen in den Sinus der Dura mater.

Seitdem Virchow die Lehre von der Thrombusbildung weiter ausgebildet und cultivirt hat, wird mannigfach hierauf untersucht und der anatomische Befund für die Deutung des Krankheitsverlaufes verworthen. So fand auch Gerhardt unter 96 Sectionen von Kindern unter einem Jahre sieben Mal Thrombose der Hirnsinus, und alle diese sieben Kinder waren nach vorausgegangenen, profusen Durchfällen unter Eintritt von Cyanose, Sopor und Convulsionen gestorben.

Das missliche bei diesen Thromben ist die Taxirung ihres Alters. Ob ein Thrombus mehrere Tage vor dem Tode, in Agone oder erst nach dem Tode entstanden ist, lässt sich nicht immer leicht entscheiden. Die Hauptanhaltspunkte sind die Schichtung der Thromben, ihre centrale Erweichung und ihre Anheftung an die Venenwand; auf die Färbung, ob gelb oder roth, darf kein so grosses Gewicht gelegt werden. Sie scheinen jedoch nicht charakteristisch für die Atrophie der Kinder zu sein, indem ich sie schon oft vermiste und in andern Fällen rothe frische Thromben fand, die gewiss erst nach dem Tode entstanden waren. Es hat deshalb dieser Befund nur geringe klinische Bedeutung.

5. Capitel.

Krankheiten des Nervensystems.

A. Gehirn.

1) Hydrocephalus acutus internus. Der hitzige Wasserkopf.

Synonyma. Meningealtuberculose, Morbus cerebri Whym, Hydrophlogosis ventriculorum cerebri (Lobstein), Febris hydrocephalica. Entero-Cephalopyria!! (Eisenmann).

Das Wesen des Hydrocephalus acutus besteht in Miliartuberculose der Arachnoidea, namentlich an der Basis des Gehirns, in einer essentzen Vermehrung des normalen flüssigen Inhaltes der Hirnventrikel und in einer Erweichung der die Gehirnhöhlen bildenden Hirnparthien. Man führt gewöhnlich die Tuberculose als eine Gelegenheitsursache an und spricht auch von einem nicht tuberculösen Hydrocephalus acutus internus. Diese letztere Art von acutem Wasserkopf ist mir noch nicht vorgekommen, von der ersteren hingegen habe ich selbst schon über 50 Fälle secirt und grössten Theils auch bei Lebzeiten beobachtet.

Pathologische Anatomie.

Bei diesen Sectionen ist die Eröffnung der Schädelhöhle mit grösster Vorsicht vorzunehmen. Ist die grosse Fontanelle noch nicht geschlossen, so wird eine enorme Wölbung derselben beobachtet und häufig ist deutliche Fluctuation nachzuweisen. Man säge langsam und mache namentlich am Ende sehr leise Sägezüge, damit nicht das sehr weiche Gehirn verletzt werde und vor gewisser Bezeichnung der Inhalt der Ventrikel abfliehe. Wenn die Dura mater noch an den Knochen stellenweise adhärirt, so gelingt es sehr schwer, das Schädeldach nebst der harten Hirnhaut hinwegzunehmen, ohne dass man das Gehirn hierbei verletzt. Es ist für diese seltenen Fälle rathsam, nach völlig durchsägen des Knochens die Dura mater nicht allein zu durchschneiden, sondern mit einem grossen, Papiermesser ähnlichen Gehirnmesser das Schädeldach, die Dura mater und alle Gehirnhäute, so oberhalb des Knochenschnittes liegen, zusammen wegzunehmen. Man trifft hierbei zwar die Ventrikel und entleert deren wässerigen Inhalt, hat aber den Vortheil, das überaus weiche, zerreibliche Gehirn im Uebrigen zu schonen und dessen Basis genauer untersuchen zu können.

Hat man nun das Schädeldach und die harte Hirnhaut entfernt, so quillt das Gehirn gewissermassen aus der Schädelhöhle heraus, es sind die weichen Hirnhäute sehr gespannt, die Arachnoidea auf dem convexen Theile des Gehirns trocken, die Gyri sind verstrichen und man sieht deutlich, dass die Gehirnsubstanz von innen nach aussen an den Knochen fest angedrückt worden ist. Dass die Injection der Gehirnhäute in der Leiche keinen Zusammenhang hat mit der Congestion derselben bei Lebzeiten, ist jetzt hinreichend constatirt, und es ist deshalb auch nicht auffallend, dass man bei Hydrocephalus acutus die Meningen bald dunkelroth und bald wieder ganz anämisch findet. Will

man, was sehr wünschenswerth ist, eine chemische Untersuchung der hydrocephalischen Flüssigkeit vornehmen lassen, so punktirt man die Ventrikel mit einem Troikart vorsichtig und lässt nur die so entleerte Flüssigkeit chemisch untersuchen, denn wenn man die ganze Wassermenge, welche sich beim Einschneiden in die Ventrikel entleert, in einer Schale auffängt, so bekommt man immer ein Gemisch von Blut und Hirnhöhlenwasser, das sich zu einer chemischen Bestimmung durchaus nicht eignet.

Die chemische Analyse einer reinen Hydrocephalflüssigkeit liefert höchst eigenthümliche Resultate, worauf C. Schmidt in Dorpat zuerst aufmerksam gemacht hat. Die Reaction ist immer deutlich alkalisch, die Flüssigkeit ist fast wasserhell und enthält nur geringe Spuren von Eiweis, indem sie durch Ansäuern und Kochen nur um wenig mehr sich trübt, aber durchaus keine grösseren, dichteren Eiweisfloeken absetzt. Sehr eigenthümlich ist das Verhältniss der Salze. Während das peripherisch gesammelte Transsudat der Hirnhäute, Pia mater und Arachnoidea, die Salze vollkommen in demselben Verhältniss enthält, wie die Ausscheidungen anderer seröser Membranen, nämlich im Verhältniss des Blutsarums, sind in dem Transsudat der Choroidalplexus mehr Kaliumverbindungen und Phosphate enthalten, so dass die Proportion des Kaliums zum Natrium und die der Phosphate zu den Chloriden sich mehr der der Salze, wie sie in den Blutkörperchen vorkommen, nähert. Während nach C. Schmidt in den Salzen des peripherischen Hirnhauttranssudates nur 2,8 % Kalium 40,0 % Natrium kommen, sind in den Salzen der Flüssigkeit von Hydrocephalus internus neben 17,8 % Kalium nur 27,2 % Natrium. Wir haben also in diesem Falle kein reines Filtrat des Blutsarums, sondern ein eigenthümliches Secret, an dessen Bildung die Salze der Blutkörperchen sich zu theiligen scheinen.

Die Ventrikelwandungen sind mehr oder weniger erweicht, ihr Ependym ist zerstört. Die Ausdehnung der Seitenventrikel ist oft eine so bedeutende, dass das Septum ventriculorum zerreissst und die Ventrikel unmittelbar mit einander communiciren. Im höchsten Grade finden sich diese Erweichungen an den Schlägeln, dann am Corpus callosum und am Corpus striatum, deren Oberfläche zuweilen erodirt, fenzig, flockig aussieht. Die Plexus choroidei sind blutleer, ganz blass, mehr von Blut strotzend, wie unbegreiflicher Weise in den neueren französischen Compendien gelehrt wird. Es ist diese Blassheit auch sehr natürlich, indem die enorme Anhäufung von Flüssigkeit der Füllung dieses Adergeflechtes sehr im Wege stehen muss. Die Blutleere der Plexus ist neben der allgemeinen Erweichung der Ventrikel das beste Kriterium für die Ausdehnung des Hydrocephalus, wenn durch Unvorsichtigkeit bei Eröffnung des Schädels das Wasser sich vorzeitig entleert hat.

Sind diese Untersuchungen nun beendet, so wendet man sich der Basis des Gehirnes zu. Man findet hier ein weissgelbes oder gelbgrünlisches Exsudat von eigenthümlich sütziger, gallertartiger Beschaffenheit, welches in und zwischen die Pia mater und Arachnoidea gesetzt worden ist. Es werden hierdurch die Gehirnfurchen ziemlich fest verklebt und die Vertiefungen an der Basis des Gehirnes namentlich die des Türkensattel entsprechenden eben ausgefüllt. Am massenhaftesten ist das Ex-

endet innerhalb des beiderseitigen Hilus cerebri vom Chiasma opticum bis zum Pons und über diesen an die Medulla oblongata hin angehängt und verbreitet sich nach aufwärts namentlich in die Fossae Sylvii und die Längspalte des Grosshirns. Hier in den Fossae Sylvii ist längs der Arterie und Vene der tuberculöse Charakter dieses Exsudates am deutlichsten zu erkennen, indem sich namentlich hier eine über grosse Menge feiner weisser Körnchen findet, welche sich bei mikroskopischer Untersuchung als Miliartuberkeln zu erkennen geben. Sie bestehen nämlich lediglich aus amorpher Körnchenmasse, aus einem Detritus, und die sich hier und da zeigenden Bindegewebsfasern gehören nicht dem Miliartuberkel, sondern der Pia mater an, in welche der Tuberkel eingelagert ist. Ausser in der Fossa Sylvii finden sich noch mannigfache Miliartuberkel an der Basis des Gehirns längs der Gefässe abgelagert.

Was die anderen Organe betrifft, so wird hier constant beobachtet, dass sich irgendwo im Körper ein alter, grosser, gelber Tuberkel findet und zwar am häufigsten in den Bronchialdrüsen, dann in den Lungen, im Gehirn selbst oder zuweilen auch in einem Knochen. Dem in den Lehrbüchern hier und da erwähnte Zusammenhang zwischen Hydrocephalus acutus und Magenverweichung besteht in Wirklichkeit natürlich nicht, wie dies schon bei der Demonstration der Magenverweichung pag. 154 hinlänglich erörtert worden ist.

Symptome.

Die Krankheit befallt am häufigsten die Kinder von 2—7 Jahren. Das jüngste Kind, an welchem Meningeal tuberculose beobachtet wurde, hatte ein Alter von 3 Monaten, bei älteren Kindern und Erwachsenen localisirt sich die Miliartuberculose viel häufiger auf den Lungen als den Meningen.

Zur leichteren Verständigung sind schon verschiedene Stadieneintheilungen vorgeschlagen worden. Man hat 1) ein Stadium der Congestion, 2) der Entzündung und 3) der Transsudation angenommen; Bouchard spricht von einem Stadium prodromorum, invasivis und convulsivis, streng genommen aber lässt sich pathologisch anatomisch gar keine, symptomatisch nur eine Stadieneintheilung aufstellen, nämlich 1) das Stadium der Reizung und 2) das der Lähmung. Im ersten Stadium können dann noch die Vorboten und die Symptome des wirklich eingetretenen Hydrocephalus unterschieden werden.

Die Vorboten sind höchst eigenthümlicher und mannigfacher Art. Wenn allerdings nicht gelungnet werden darf, dass die Lehre von denselben sich etwas zu weit ausgedehnt und manches Ungehörige aufgenommen hat, so ist doch deren Existenz nicht zu verkennen. Man muss vor Allem unterscheiden, ob sich der Hydrocephalus entwickelt bei einem Kinde, das schon lange Zeit vorher deutliche Zeichen von Tuberculose, gewöhnlich von Lungentuberculose, gehabt hat, oder ob diese Zeichen bisher gefehlt haben und die Krankheit bei einem scheinbar ganz gesunden Kinde sich entwickelt. Dass die Vorboten vollkommen fehlen und mit einem Male sich die Symptome des entwickelten, heftigen Wasserkopfes einstellen können, wird zwar von einzelnen Spitalärzten angegeben, in der Privatpraxis aber niemals beobachtet. Man sieht hier immer mehrere Tage, gewöhnlich 20—

Wochen lang, einzelne ziemlich constante Vorboten, die sich nur langsam steigern, bis wir endlich die Krankheit selbst in ihrer ganzen Gefährlichkeit vor uns ausgebildet sehen.

Dieses Stadium prodomorum dauert gewöhnlich 2–3 Wochen, doch kommen auch Fälle vor, wo die Kinder diese Zeichen mehrere Monate hindurch erkennen lassen. Das constanteste unter diesen Symptomen ist eine langsam sich einstellende Abmagerung, welche merkwürdiger Weise das Gesicht fast ganz verschont, so dass die Kinder, wenn sie angekleidet sind, keinerlei Veränderung erkennen lassen. Aufmerksamen Müttern und Kinderfrauen fällt dieselbe jedoch regelmäßig auf, und namentlich macht das Sichtbarwerden der Rippen sie besorgt. Hierauf gesellt sich bald eine leichte Blässe im Gesicht und ein eigenthümlicher Glanz der Augen. Die Kinder verlieren die allen gesunden innwohnende Fröhlichkeit und Lebhaftigkeit. Sie schlafen mehr als gewöhnlich, ziehen sich bald von sonst beliebten Spielen zurück, sie werden mürrisch und schüchtern gegen ihre Umgebung und weinen bei der geringsten Veranlassung. Sehr eigenthümlich ist auch, dass sie ihre früheren kleinen Wagnisse, z. B. das Klettern auf einen Stuhl, das Öffnen schwer erreichbarer Thürschnallen, selbst das Hinansetzen durch ein vergittertes Fenster nicht mehr versuchen, und klein aufgefordert, entschlossen es verweigern. Knaben, welche sich von ihren Kameraden früher nichts gefallen ließen, raufen und sich wehrten, so lange es ihre Kräfte erlaubten, schleichen sich nun vor dergleichen Angriffen feige und weinend davon. Andere Kinder werden wieder auffallend zärtlich, umarmen ihre Eltern fortwährend und können sich lange nicht trösten, wenn dieselben sie verlassen.

Bei älteren Kindern, welche schon etwas gelernt haben, bemerken die Lehrer eine ungewöhnliche Zerstreuung und Gleichgültigkeit, das Auswendiglernen geht schwerer als sonst und das endlich Erlernte wird seltener vorgebracht. Bei Tag schlafen die Kinder ungewöhnlich viel und oft, hingegen ist die Nachtruhe weniger tief und wird durch schwere Träume, Herumwälzen im Bett und häufiges, ängstliches Aufschreien unterbrochen. Der Appetit ist vermindert, oft stellen sich Gelüste nach etwas reizenden Nahrungsmitteln ein, von denen jedoch auch nur sehr wenig genossen wird. Der Durst ist nicht vermehrt, die Urinsecretion etwas vermindert, der Urin häufig so reich an harnsauren Salzen, dass sie ziemlich bald als sog. Ziegelmehlbüderschlag herausfallen. Der Stuhl ist gewöhnlich angehalten, besonders bei grösseren Kindern, jedoch darf eine bestehende Diarrhöe durchaus nicht so gedeutet werden, als ob hierdurch die Vermuthung eines ausbrechenden Hydrocephalus acutus mangelhaft geworden wäre. Namentlich kommt es bei kleinen Kindern, die noch in der ersten Zahnung begriffen sind, vor, dass die gewöhnliche Destitutionsdiarrhöe wie im Normalzustande fortbesteht und doch ein Hydrocephalus acutus sich vorbereitet. Kopfschmerz wird selbst von älteren Kindern fast niemals angegeben, häufiger wird Schwindel und unsicherer Gang beobachtet. Es wurde vor einiger Zeit ein 4-jähriger Knabe zu mir geführt, der mehrere Vorläufersymptome von Hydrocephalus erkennen liess und beim Gehen auf ebenem Boden die Beine immer so hoch aufhob, als wenn er eine Stufe hinaufsteigen wollte. Nach einigen Tagen entwickelte sich das Leiden entschiedener und die Section lehrte die

Richtigkeit dieser Diagnose. Ziemlich häufig klagen die Kinder über Leibschmerz, der auf Druck deutlich zunimmt. Fieber ist gewöhnlich nicht zugegen, doch gilt auch hier, was von der Diarrhöe gesagt worden ist, die Gegenwart des Fiebers ist durchaus kein Grund, die Möglichkeit eines beginnenden Hydrocephalus auszuschliessen.

Die oben geschilderten Symptome nehmen nun, alle zusammen oder vereinzelt, mehr und mehr zu, die Kinder legen sich hin und es entwickeln sich hierauf die Zeichen der beginnenden Exaltation als die des Gehirnexcesses.

Anders gestalten sich die Verhältnisse, wenn Kinder mit verschiedener Lungentuberculose schliesslich Meningealtuberculose und Hydrocephalus bekommen. Hier treten natürlich die Symptome der länger bestehenden Lungentuberculose, hektisches Fieber, gross Schwäche, starke Bronchitis etc. so in den Vordergrund, dass die oben geschilderten Verläufer kaum bemerkt werden können. Die Krankheit beginnt in diesem Falle sogleich mit den Symptomen der beginnenden Exaltation und des dadurch gesetzten Reizes.

Die prägnantesten Symptome des Stadiums der Reizung sind: Erbrechen, Verstopfung, langsamer Puls, unregelmässige Respiration, erhöhte Hauttemperatur, eingezogenes Athmen, Kopfschmerz, grössere Aufregung abwechselnd mit tiefer Somnolenz, beginnende Abnahme der Intelligenz und Motilitätsstörungen aller Art.

Die vorwiegenden Symptome des Stadiums der Lähmung sind: starr beschleunigter Puls, tiefes Coma und Lähmung der ihr Willkür unterworfenen Muskeln. Um die Schilderung der einzelnen Symptome nicht immer abzubrechen, und da der Uebergang des einen Stadiums in das andere durchaus nicht so genau bestimmt werden kann wie manche Lehrbücher angeben, so wird in der folgenden Schilderung von dieser Stadieneinteilung ganz abgesehen und jedes Symptom gleich bis zum letalen Ausgang geschildert werden.

Was recent die Störungen in der Digestion betrifft, so nimmt das Erbrechen hier die erste Stelle ein. Es ist ein ausserordentlich constantes Symptom und tritt gewöhnlich so frühzeitig auf, dass man dadurch zuerst die Diagnose bestimmen stellen kann. Die Dauer des Erbrechens aber ist sehr verschieden. Einzelne Kinder brechen nur einen oder einige Tage und da nicht einmal alles Genossene, andere hingegen brechen vom Beginn der Krankheit fast bis zum Tode ununterbrochen fort, und es lässt sich durchaus kein Aliment finden, das nicht nach kurzer Zeit wieder auch oben entleert würde. Eigenthümlich ist ferner, dass es keine Remissionen macht, sondern nicht mehr eintritt, wenn es einmal 24 Stunden sistirt hat. Höchst wichtig für die Diagnose ist die Art des Erbrechens. Während nämlich ein Kind, das an einer Indigestion leidet, längere Zeit vor dem wirklichen Erbrechen Ueblichkeiten, Aufstossen, Würgen und Angstschweiss hat, erbrechen die hydrocephalischen Kinder ohne alle dergleichen Vorbereitungen, gerade so, als wenn sie eben den Mund voll Wasser genommen hätten und dasselbe einfach wieder ausspuckten. Begünstigt wird der Brechact, wenn man die Kinder aufrichtet oder auf die Seite legt. Es sistirt, so lange der Magen ganz leer bleibt, kommen Flüssigkeiten oder gar compacte Nahrungsmittel hinein, so werden sie abhals wieder entleert, ohne dass das Kind besondere Angst oder Besorgniss

davon hätte. Galle ist dem Erbrochenen nur sehr selten beigemischt, was sich auch aus den geringen antiperistaltischen Bewegungen leicht erklären lässt. Da der Arzt nur selten beim Brechakt selbst zugegen ist, so bleibt ihm nichts übrig als ein gründliches Examen: die Angehörigen müssen eben darauf aufmerksam gemacht werden, dass sie die Art des Erbrechens, ob leicht oder schwer, mit oder ohne Würgen, genau und richtig beobachten.

Ein zweites fast ebenso constantes Symptom ist die Verstopfung, an welcher wenigstens $\frac{1}{2}$ der hydrocephalischen Kinder leiden. Die Darmsecretion wird sehr vermindert, selbst stärkere Drastica bleiben ohne Wirkung, wenn auch als ungünstiger Umstand kommt, dass dieselben grösstentheils wieder erbrochen statt resorbirt werden. Das bei Obstipation der Kinder so beliebte Calomel bleibt hier meistens ohne Erfolg. Diese Obstipation dauert nicht bis zum Tode fort, sondern später stellen sich einige harte Stühle ein, gleichviel ob Abführmittel gereicht worden sind oder nicht. Sogar profuse Diarrhöen in Folge von Darmtuberculose können bei beginnendem Hydrocephalus eintreten, die später jedoch erfolgenden Stühle sind wieder dünn und von dem bekannten aschhaften Geruche. Im allgemeinen kann als Regel gelten, dass die Obstipation weniger constant beobachtet wird als das Erbrechen, indem nicht gar zu selten Fälle vorkommen, in welchen von Anfang bis zu Ende täglich Stuhl erfolgt. Dass die Quantität desselben bedeutend abnimmt, erklärt sich ganz natürlich aus der sehr verminderten Zufuhr von Nahrungsmitteln. Der Appetit ist verschwunden und das mühsam Beigebrachte wird wieder erbrochen; so ist es einleuchtend, dass eine mehrtägige Verstopfung entsteht, bei welcher der Leib dennoch mehr und mehr einsinkt und nirgends Kothmassen durchgeföhlt werden können.

Die übrigen Veränderungen auf Seite des Digestionsapparates sind weniger charakteristisch. Der Durst wird nie so heftig, wie bei andern heissen fieberhaften Zuständen, z. B. Typhus oder acuten Exanthemen, und dem entsprechend ist die Urinsecretion immer sehr vermindert. Es hängt dieses geringe Verlangen nach Flüssigkeit wohl mit der wenig erhöhten Hauttemperatur, dem nur Anfangs und in unbedeutendem Masse beschleunigten Pulse und mit der gestörten Innervation des Magens zusammen. Der Urin ist sehr concentrirt, reich an Harnstoff, Harnsäure, Farbstoff und Salzen, und setzt deshalb schon in der Blase, oder bald nachdem er klar gelassen, ein dickes Sediment ab. Gegen das Ende der Krankheit lassen die Kinder oft 24 Stunden und noch länger keinen Urin, ohne dass die Blase eine besondere Ausdehnung zeigte, was auf eine Paralyse der diese Secretion vermittelnden Nerven deutet. Der endlich entleerte oder durch den Catheter abgenommene Urin ist trübe, hat einen stechenden Geruch und ammoniakalische Reaction. Eiweiss kommt meines Wissens hier nicht vor.

Auch der Appetit ist selten so gänzlich verschwunden als bei den ebenerwähnten Krankheiten; es besteht zwar kein Verlangen nach Nahrung, doch gelingt es meist ohne Schwierigkeit, den Kindern Milch oder Fleischbrühe beizubringen, was um so mehr zu verwundern ist, als regelmässig darauf Erbrechen eintritt.

Die Zunge ist in diesem Stadium immer feucht, mehr oder

weniger weiss schlegt und bietet nichts Charakteristisches. Die Zunge bleibt fast bei allen Kinderkrankheiten feucht, was davon herrührt, dass die Schleimsecretion der Mundhöhle in diesem Alter eine sehr profuse ist, und dass die Kinder die gute Gewohnheit haben, mit geschlossenem Munde zu schlafen. Ebenso ist das Zahnfleisch beständig feucht, nur findet sich auch hier der bei den meisten Krankheiten auftretende weisse Belag.

Die Fiebererscheinungen sind in keinem Stadium des Hydrocephalus acutus von imponirender Heftigkeit. Bei einer Miliartuberculose, welche sich ganz local in der Pia mater entwickelt, kann es niemals zu wirklicher allgemeiner Fieberhitze, wenn hingegen die Miliartuberculose sich auch in verschiedenen anderen Organen, namentlich in den Lungen, auf dem Peritonäum und dem Herzbeutel etablirt, so tritt jene Fieberhitze der Haut ein, welche man sonst nur bei den Ausbrüchen acuter Exantheme zu fühlen gewohnt ist. Die Temperatur des Kopfes, namentlich der Stirne, ist in allen Fällen beträchtlich erhöht und bleibt es bis zum lethalen Ende, während die Füsse gross Neigung haben, kalt zu werden.

Die Temperatur der Haut steht im Allgemeinen im geraden Verhältnisse zur Schnelligkeit des Pulses, nur die Stirne bleibt immer heiss, wenn der Puls sich auch noch so sehr verlangsamt.

Auf den Puls hat man bei Hydrocephalus acutus von jeher ein grosses Gewicht gelegt, und es gibt auch in der That keine Krankheit, bei welcher er so genaue Beachtung verdiente, als bei der unsrigen. Seine Frequenz im Beginne des Leidens hängt mehr von der Miliartuberculose, die sich in den übrigen Organen entwickelt, als von der der Meninge ab. Ist die Miliartuberculose sehr ausgedehnt und in vielen Organen in der Ausbildung begriffen, so überwältigt die dabei entstehende Pulsbeschleunigung die durch das Gehirnleiden eigentlich bedingte Verlangsamung, und es kann viele Tage währen, bis endlich der langsame, hydrocephalische Puls sich einstellt. Wenn hingegen die Meningealtuberculose localisirt auftritt, so kommt derselbe sehr bald zur Geltung und lässt sich durch die verminderte Quantität und modificirte Qualität der Pulsschläge leicht erkennen. So viel steht jedenfalls fest, dass im Anfang des Hydrocephalus acutus der Puls häufig beschleunigt ist, dass er aber in anderen Fällen auch vom ersten Tage der Erkrankung an langsamer und immer langsamer wird. In der Mehrzahl der Fälle ist er anfangs etwas beschleunigt, am nach einigen Tagen sich zu verlangsamen. Im Verlaufe des zunehmenden Wasserengusses in die Hirnhöhlen sinkt die Zahl der Schläge auf 40–60 herab, bleibt jedoch gewöhnlich nicht auf einer bestimmten Ziffer stehen, sondern wechselt oft von Stunde zu Stunde, so dass man binnen 24 Stunden bald 40, bald 60, bald wieder 80 Schläge zählen kann. Wenn diese Pulzzählungen von verschiedenen Beobachtern angestellt werden, so ist es sehr genügt, diese grossen Unterschiede durch Beobachtungsfehler zu erklären; ich habe mich aber selbst zu wiederholten Malen von der Richtigkeit dieser Thatsache überzeugt. Ausserdem kommen meistens auch qualitative Veränderungen des Pulses vor, auf eine starke Pulsweite folgen wieder mehrere kleine, oder umgekehrt; auch finden ähnliche, jedoch nicht regelmässig sich wiederholende Intermissionen statt und zuweilen nimmt der Puls einen eigenthümlichen schwärzlichen

Charakter an, wie wenn man den Finger an eine vibrierende Saite hält. Dieser Charakter verliert sich, sobald man den Finger etwas fester auf die Arterie drückt, und es ist deshalb zu dieser Untersuchung eine leise, vorsichtige Betastung nöthwendig.

1–3 Tage vor dem Tode wird der Puls wieder schnell, und zwar so schnell, dass man kaum mehr im Stande ist, ihn zu zählen, wobei er bis zu 180 und 200 in der Minute sich steigern kann. Tritt auf die oben geschilderte Pulsverlangsamung mit ihrem begleitenden Qualitätsveränderungen diese continuirliche Zunahme der Frequenz ein, so kann man mit grösster Bestimmtheit ein heftiges Ende prognosticiren, indem diese enorme Beschleunigung als der Beginn einer Vaguslähmung zu deuten ist.

Von grosser Bedeutung sind auch die Veränderungen der Respiration. Im Beginn der Krankheit geht das Athmen normal von Statten, ausgenommen bei jenen Fällen, wo die Miliartuberculose in den Lungen grosse Fortschritte gemacht hat und das Fieber ein heftiges wird. Es ist dann natürlich die Respiration sehr beschleunigt, und diese Beschleunigung hat ihren Grund eben so sehr in den localen Störungen als in dem Fieber, dem Ergriffensein des Organismus durch die Allgemeinerkrankung. Sobald aber die Symptome der Exudation einmal mehr zur Geltung gekommen sind, so machen sie sich auch unfehlbar an der Respiration bemerkbar. Sie wird nämlich viel langsamer und vollkommen unrythmisch. In einer Minute respiriren die Kinder 15, in der andern 30, in einer andern wieder 20 Mal, bald sind die Athembzüge oberflächlich und geschehen mit kaum sichtbarer Erweiterung des Thorax und ohne alles Geräusch, bald sind sie wieder tiefe Seufzer, welche letztere so constant beobachtet werden, dass man sie kurzweg hydrocephalische Seufzer genannt hat. Diese verlangsamte und unrythmische Respiration stellt sich in allen Fällen ein, auch in denen, wo vorgeschrittene Lungentuberculose eine bedeutende Beschleunigung der Athembzüge bedingen müsste. Zuweilen wird das Athmen 10 Sekunden und noch länger vollständig unterbrochen, und der nächste Athembzug, welcher als tiefer Seufzer sich einstellt, mit Bangen erwartet, unmittelbar darauf folgen dann wieder einige ganz normale ruhige Inspirationen. Man hat in neuester Zeit dieser Art der Athembewegung, dem sogenannten Cheyne-Stokes'schen Athmen, besondere Aufmerksamkeit geschenkt und dasselbe auch bei einigen anderen Krankheiten, die mit Circulationsstörungen und Oedem des Gehirns einhergehen, beobachtet. Wenn kurz vor dem Tode der Puls jene ausserordentliche Beschleunigung angenommen hat, so werden auch die Athembzüge wieder frequenter, ungefähr so schnell wie im Normalzustand, aber durchaus nicht im geraden Verhältnisse zur enormen Pulsfrequenz.

Die physikalische Untersuchung der Lungen liefert entweder ganz negative Resultate, oder es ist in einzelnen Fällen Tuberculose mit Cavernenbildung, in der Kindheit merkwürdiger Weise viel häufiger zu den unteren Lappen als an der Lungenspitze, nachweisbar. Ich percutirte lange Zeit bei allen hydrocephalischen Kindern genau und wiederholt das Sternum, in der Vermuthung, es möchten die gewöhnlich zu grossen Paqueten angeschwollenen, tuberculösen Bronchialdrüsen eine besondere Dämpfung in jener Gegend veranlassen. Es hat sich

jedoch diese Untersuchung als nutzlos erwiesen, indem die Brustdrüsen, wenn sie auch noch so sehr vergrößert sind, niemals nach vorne gegen das Brustbein zu, sondern immer seitlich in die Lungen hinein, nach abwärts unter die Bifurcation und nach hinten gegen die Wirbelsäule hin sich vergrößern. Am Sternum wird deshalb niemals eine ausgedehntere Dämpfung beobachtet, obgleich man in der Leiche die tuberculösen Bezugsdrüsen zur Grösse von Tauben- und Hühner- eiern hypertrophirt findet.

Die Erscheinungen auf der Haut sind von untergeordnetem Belang. Am Anfange der Krankheit ist die Haut gewöhnlich feucht, auch werden starke Kopfschmerzen beobachtet, mit zunehmender Krankheit wird die Haut aber trocken, spröde, schuppt sich kleinartig ab und erst wenn die lethale Pulsbeschleunigung eintritt, stellt sich ein profuser Sch weiss, ein Todesschweiss, ein Sudamina sind dem ausgesprochen selten. Die Haut behält fast bis zum letzten Ende die Empfänglichkeit für Hautreize, die grausamen Salben mit Tartar. stibiat. oder Sublimat, sowie die Vesicatores wirken fast ebenso schnell als bei einem gesunden Kinde, auch die einfachen Einreibungen mit ganz Quecksilbersalbe machen bei Kindern mit zarter Epidermis den gewöhnlichen Bläschenauschlag.

In den französischen Compendien ist auf Troissan's Antrag viel die Rede von eigenthümlichen meningitischen Flecken (*taches meningitiques*): dieselben sollen entstehen, wenn man mit dem Fingergel leicht über die Brust oder den Leib streicht, und mehrere Minuten lang scharlachrothe Striemen zurücklassen, welche diffus in die übrige, roseirothe Hautfarbe übergehen. Ich habe diese „meningitischen Flecken“ oft zu machen versucht, bemerkte aber niemals etwas anderes als einen rothen Strich, wie er eben durch Kratzen auf jeder feineren Hautpartie gesunder Individuen fast augenblicklich erzeugt werden kann. Dass in Folge von localen Congestionen bald da, bald dort, namentlich im Gesichte rothe Hautstellen entstehen, ist eine des Hydrocephalus durchaus nicht speciell zukommende Erscheinung. Ihr häufigeres Vorkommen hier findet eine ganz natürliche Erklärung in dem ungleichen unrythmischen Pulse, in den dadurch bedingten Kreislaufstörungen und in der Rückwirkung des veränderten Centralnervensystems auf die vasomotorischen Nerven.

Der Kopfschmerz ist ebenfalls ein hervorragendes, niemals constantes Symptom. Er stellt sich jedoch nicht so frühzeitig ein, als man der Grundursache der ganzen Krankheit gemäss, die doch in den Meningen zu suchen ist, glauben sollte, und fehlt fast regelmäßig im Stadium der Vorboten, wie oben schon erwähnt worden. Er beginnt mit oder etwas vor dem Erbrechen und erreicht bald einen so hohen Grad, dass ältere Kinder fortwährend laut weinen und klagen, junge viel mit den Händchen auf den Kopf greifen, sich an den Ohren und Haaren zupfen und endlich den Kopf auf dem Kissen hin- und herwerfen. Diese Schmerzensäusserungen dauern fort, so lange die Kinder das Bewusstsein behalten, eine bestimmte Stelle am Schädel wird gewöhnlich nicht angegeben, doch deuten sie, darüber befragt, in der Mehrzahl der Fälle auf die Stirne. Bei kleineren Kindern kommt automatische Bewegungen vor, welche auch auf Kopfschmerz sich zu beziehen scheinen und meist darin bestehen, dass sie mit grosser

Schnelligkeit die Hand bald auf den Scheitel legen, bald wieder zurückziehen. Die Schmerzen intermittiren gewöhnlich nicht, sondern dauern unaufhörlich fort, bis endlich Coma eintritt.

Auffallend häufig, jedoch nicht regelmäßig, klagen grössere Kinder über Leibschmerzen, besonders in der Magengegend. Sie schreien auf Druck entschieden zu und klagen so heftig worden, dass die Kinder einen lauten Schmerzensschrei ausstossen, wenn man nur leise den Magen oder eine andere Stelle des Abdomens berührt. Uebrigens dauern sie nicht so lange als der Kopfschmerz, hören oft plötzlich auf, kehren wohl auch wieder, lassen sich aber nicht immer auf anatomische Veränderungen der Darmschleimhaut zurückführen. Ich habe schon bei mehreren Sectionen Hydrocephalischer, bei welchen diese Schmerzen sehr ausgesprochen waren, Magen und Darm genau untersucht, ohne jemals eine wesentliche Veränderung dabei nachweisen zu können.

Die Form des Unterleibes ist ausserordentlich charakteristisch. Am Anfange ist nichts besonderes zu bemerken, nachdem aber das Erbrechen, die Verstopfung und überhaupt die hydrocephalischen Symptome einige Zeit gedauert haben, wird der Unterleib täglich kleiner, faltiger und sinkt ein, bis er schliesslich kahnförmig wird und durch leichtes Andrücken die Abdominalaorta deutlich auf der Wirbelsäule zu fühlen ist. Man erklärt diesen kahnförmigen Leib gewöhnlich durch eine Lähmung der Bauchmuskeln, welche das contrahirte Darmrohr einfach überlagern sollen; es ist dies jedoch durchaus keine Lähmung, sondern eine ständige krampfartige Contraction des *Mus. transversus* und der *Mm. obliqui abdominis*; woran sich auch die *Darmomuscularis* betheiligt; denn das Darmrohr ist hierbei immer auffallend verengt. Eine gewisse Härte und Spannung bleibt stets der Bauchwand eigen, wenn sie auch noch so kahnförmig erscheint, und erst in den letzten Lebenstagen tritt zuweilen Lähmung ein, worauf jedoch die starke Einziehung schwindet, und man eine welke, nicht sehr eingesunkene Bauchwand vor sich hat. Anders verhält es sich mit der die Bauchwand bedeckenden Cutis; an dieser bemerkt man sehr frühzeitig Paralyse, so dass eine emporgehobene Hautfalte längere Zeit braucht, bis sie sich wieder ausgleicht.

Die Einziehung des Unterleibes fehlt bei keinem Hydrocephalus, die Bezeichnung kahnförmig ist ziemlich treffend, indem der Schambein, die Rippenknorpel und der Schwertfortsatz hohe Prominenzen bilden, zwischen welchen die contrahirten Bauchmuskeln eine tiefe Mulde darstellen. Schon Gölis hält dieses Symptom für besonders wichtig und glaubt, man könne durch dasselbe am sichersten den Wasserkopf vom Typhus unterscheiden.

Was die äusseren Veränderungen am Schädel betrifft, so sind solche nur bei nicht geschlossener Fontanelle zu bemerken. Dieselbe wölbt sich mit zunehmendem Ergüsse mehr und mehr und lässt eine deutliche Fluctuation erkennen. Bei schon geschlossener Fontanelle entwickelt sich zuweilen rasch ein peripherischer Collateralkreislauf in den Venen der Kopfschwarte, eine Folge des Druckes der ergossenen Flüssigkeit auf die Blutleiter der *Dura mater*.

Die psychischen Functionen erfahren sehr frühzeitig Störungen, wie solche schon bei dem Stadium prodromorum ausführlicher erörtert worden sind. Am meisten in die Augen fallend ist der wirre, starre Blick, das mürrische, feindselige Wesen oder in anderen Fällen

die vollkommene Gleichgültigkeit gegen sonst liebe Personen und Gegenstände. Später, wenn die übrigen Symptome die Diagnose schon über allen Zweifel erheben haben, stellen sich auch wirkliche Delirien ein, gewöhnlich jedoch ruhigerer Art, als bei der eitrigen Meningitis des convexen Theiles der Hirnhäute. Furiöse Delirien kommen bei Hydrocephalus ventris nur ausnahmsweise und sehr kurze Zeit hindurch vor, um bald einem stillen, murmelnden Irrenden Platz zu machen, auf welches dann ein beständiger Zustand tiefen Coma's folgt. Nach den Untersuchungen von Rilliet und Barthex, die ich mehrfach bei Sectionen bestätigen konnte, steht die Heftigkeit der Delirien und der nervösen Symptome überhaupt durchaus nicht im geraden Verhältnis zur Ausdehnung der Erkrankung der Gehirnhäute. Wo man bei heftigen Gehirnerscheinungen eine dicke Exsudatschichte und eine grosse Menge von Miliartuberkeln vermuthet, findet man bei der Section ein Andenken hiervon, und wo gar keine Delirien, sondern nur in den letzten Lebenstagen Coma zugegen, hat sich oft massenhaftes Transsudat und ausgedehnte Meningealtuberculose entwickelt.

Ein sehr gewöhnliches Symptom ist ein sich in längeren Absätzen wiederholender, lauter, kläglicher Schrei, welchen Coindet für charakteristisch hielt, dass er ihn geradezu als „hydrocephalisches Schrei“ bezeichnete. Oft wiederholen die Kinder auch ganze Nächte hindurch in ziemlich gleichen längeren Intervallen eintönige Wehklagen oder rufen ein klägliches „O weh“, das jedesmal von einem lauten Seufzer begleitet wird. Diese Symptome der Aufregung, welche für theilnehmende Angehörige ausserordentlich quälend und deprimirend sind, dauern zum Glück nicht länger als höchstens 6—8 Tage, worauf eine tiefe Betäubung folgt.

Sind die Kinder einmal in Coma verfallen, so erwachen sie in der Regel gar nicht mehr aus demselben bis zum Tode, nur zweimal wechseln Coma und Delirien mit einander ab, das erste ist aber immer die bei weitem vorwiegendere Erscheinung. In ganz seltenen Fällen, Rilliet und Barthex erzählen solche, soll das Bewusstsein noch einmal völlig zurückgekehrt sein, um jedoch nur zu bald der frühern Betäubung wieder Platz zu machen.

Die Störungen im Bewegungsapparat, in der Motilität, sind ausserordentlich mannigfaltig und fehlen absolut bei keinem Hydrocephalus, treten aber gewöhnlich so spät auf, dass sie bei Stellung der Diagnose wenig in Betracht kommen. Das Studium derselben ist für den Neuropathologen von grossem Interesse und gibt manche Aufklärung über die Innervation verschiedener Körperteile. Es kommen Convulsionen und Lähmungen vor, die ersteren gehen den letzteren voraus, und bei den Convulsionen muss man vor Allem die allgemeinen und theilichen unterscheiden.

Die allgemeinen Convulsionen treten paroxysmenweise auf. Die Intervalle zwischen den einzelnen Paroxysmen sind anfangs gross, und es vergehen oft 3—4 Tage von einem Anfalle zum andern. Gewöhnlich repetiren sie sich jedoch öfter und können in einzelnen Fällen viel Stunden lang permanent bleiben. Sie beginnen gewöhnlich an den Inspirationsmuskeln, so dass ein Stillstand der Respiration eintritt, welcher nur wenige Male in der Minute durch einen raschen, unwillkürlichen Athemzug unterbrochen wird. Alsbald werden die Extremitäten

durch rasch sich folgende, electricisch-tetrische Stöße erschüttert, welche mit starken Verdrehungen der Vorderarme und Opisthotonus abwechseln. Dabei entstehen natürlich starke venöse Stasen, das Gesicht röthet sich, die Augen werden injicirt, rollen nach verschiedenen Richtungen umher und fixiren sich meist nach oben, so dass man zwischen den halb geöffneten Lidspalten keine Pupille noch Iris, sondern lediglich die weisse Sklera durchblicken sieht. Nach einigen Minuten, zweilen erst nach 2—3 Stunden lassen diese allgemeinen Convulsionen nach, worauf die Kinder leichenblau in die tiefste Prostration verfallen und eine bedeutende Verschlämmerung des Allgemeinzustandes zeigen.

Die örtlichen Convulsionen ergreifen die verschiedensten Muskelpartien, am häufigsten die des Gesichtes. Hier kommen Verzerrungen der Oberlippe, ein krampfhaftes Lächeln und eigenthümliche zuckende Bewegungen vor, wobei die Kinder Stunden lang den Mund abwechselnd spitzen und wieder abdachen. An den Augen bemerkt man ziemlich spät Strabismus, bald schielen die Kinder nach aussen, bald nach innen. Der Strabismus ist oft nicht anhaltend, sondern es kann die theilweise Reizung oder antagonistische Lähmung der Reize nach verschiedenen Muskeln des Augapfels befallen und in den letzten Lebenstagen gänzlich wieder verschwinden. Es tritt, wie gesagt, dieses Symptom gewöhnlich spät auf, doch erinnere ich mich auch eines Falles, wo ein 3jähriges Kind lediglich wegen des täglich zunehmenden Schielens zu mir gebracht wurde, in den folgenden Tagen immer mehr hydrocephalische Symptome entwickelte und bei der Section dann einen haufmasagrossen Tuberkel in einem Sehnhg hatte.

Sehr eigenthümlich und von erfahrenen Wärterinnen wohl gekannt und gefürchtet ist das Zähneknirschen, welches eben auch auf spasmodischen Contractionen der Kaumuskeln beruht und bis zur vollkommenen allgemeinen Paralyse andauert. An den Armen kommen theils intensiver grössere Bewegungen, theils Contracturen, theils leises Zittern, theils Hüpfen an einzelnen Sehnen vor; viele Hydrocephalische bringen die Hände immer an die Genitalien und machen coarctische Bewegungen.

Die unteren Extremitäten werden weniger von partiellen Convulsionen befallen als die oberen, sie befinden sich meist halb gebeugt in einem paralytischen Zustand und, wenn es zu Krämpfen kommt, so gestalten sich dieselben zu kurzen tetanischen Stößen mit möglicher Ausspannung der Fusssohlen.

Die Nacken- und Rückenmuskeln sind stark contrahirt und die meisten Kinder biegen, auf die Seite gelegt oder aufgerichtet, den Kopf weit hinten über. Der tonische Krampf der Bauchmuskeln, wodurch der bekannte, kalbförmige Unterleib entsteht, wurde schon oben gedacht.

Nicht weniger auffallend sind die Störungen der Sensibilität und die Veränderungen, die an den Sinnesorganen vor sich gehen. Bei den meisten Kindern bemerkt man nämlich zu Anfang der Krankheit eine beträchtlich erhöhte Sensibilität der Haut, die sich durch eine grosse Empfindlichkeit gegen jede Berührung kund gibt. Man mag auch so sanft sie aufheben, ihre Lage verändern, einen leichten Druck auf den Kopf, das Abklopfen oder die Hände ausüben, immer wird ein

heftiges Wälzestreben mit deutlichen Schreierauslassungen erfolgt. Bei zunehmendem Ergüsse hingegen ändert sich rasch das Krankheitsbild, indem Paralyse der Gefühlsnerven eintritt. Man kann die Kinder nun knien und stechen, sie ohne Schonung hin- und herlegen, mit Pustelhalben und Vesicantien behandeln, so viel man will, sie werden sich nicht dagegen aufbäumen und höchstens den Rest ihrer Sensibilität durch ein Jucken, gleich wieder sistirendes Wimmern anzeigen. Der Mangel der Sensibilität kommt sehr auffällig an der Conjunctiva zum Vorschein, über welche man mit dem Finger streichen kann. Selbst eine Berührung des Bulbus verursacht die Lider nicht, sich zu schliessen.

An den Augen sind außer dem Strabismus, der schon bei den Motilitätsstörungen besprochen worden, und außer dem wahren oder ersäunten Blicke noch die Verhältnisse der Papille und die Vermehrung der Schleimsecretion bemerkenswerth. Das Stadium der Pupillenverengung ist sehr vorübergehend und durchaus nicht constant, gewöhnlich hat die Papille sehr bald eine Tendenz zur Erweiterung und diese Erweiterung nimmt von Tag zu Tag merklichen Gegen das Ende der Krankheit tritt zuweilen die merkwürdige Erscheinung ein, dass die Pupillen ungleich werden. So beobachtete ich bei einem 3jährigen Kind in den letzten Lebenstagen eine einseitige Erweiterung auf jener Seite, auf der das Kind gunde lag, und in gleicher Zeit eigenthümliche oscillatorische Bewegungen desselben Augapfels, während Pupille und Bulbus der nach oben gerichteten Körperhälfte ruhig blieben; durch Herumlegen auf die andere Seite gelang es nur einige Male, doch nicht immer, diese Veränderungen an dem zuerst ruhigen Bulbus zu erzeugen, während der andere das zuweilen aufhörte zu oscilliren.

Die Beobachtung von Bruchet, dass auf Lichteindruck die schon erweiterten Papillen sich auf kurze Zeit contrahiren, um nach 1–2 Minuten trotz fortwährender, intensiver Beleuchtung wieder weit zu werden, habe ich öfters constatiren können. In den letzten Lebenstagen jedoch macht auch die hellste Beleuchtung keinen Eindruck mehr. Die Secretion der Conjunctiva und der Meibomischen Drüsen nimmt während der Krankheit zu und man ist deshalb gezwungen, mehrmals des Tages ziemlich voluminöse Schleimklumpen aus dem inneren Augwinkel und von den Cilien zu entfernen.

Das Gehör scheint ziemlich lange fortzubestehen, indem die Kinder, bis sie nicht vollkommen komaös sind, auf Anrufen und selbst beim Ausrufen etwas reagiren. Auch der Geruch und Geschmack geht erst gegen das Ende verloren; denn die Kinder sträuben sich ganz entschieden gegen Einbringung schlechtstimmender und übelriechender Medicamente. —

Was nun schliesslich die Lähmungen betrifft, so wird eine allgemeine andauernde Lähmung, wie z. B. nach einer *Comotio cerebri* beobachtet, hingegen können in einzelnen Fällen Hemiplegien, welche bis zum Tode fortbestehen, vor. Man findet dann bei der Section außer der Miliäriberculose der Meningen gewöhnlich noch eine oder einige alte gelbe Tuberkel im Innern des Gehirns. Am häufigsten werden Paralysen des einen oberen Augenlides oder einer Gesichtshälfte mit Betheiligung der Zungenmuskeln beobachtet, auch kommt

Lähmungen einer oberen, selten einer unteren Extremität vor. Die Zurückhaltung des Harnes in den letzten Lebenstagen ist, wie schon erwähnt, nicht so fast einer Lähmung der Blase als einer Lähmung der secretorischen Nerven zuzuschreiben, indem die Blase sich gewöhnlich nicht über die Symphyse hinaus ausdehnt und der angelegte Catheter keine besonders grossen Mengen Urin entleert.

Der Tod tritt meistens nach befrügten, Stunden lang dauernden, allgemeinen Convulsionen ein, nur ausnahmsweise nehmen die paralytischen Symptome stetig zu und bewirken so ohne allen Todeskampf einen einfachen Stillstand der das Leben constituirenden Functionen.

Die Diagnose der Meningitis ist in der Mehrzahl der Fälle leicht zu stellen, ob sie aber tuberculöser oder einfach eitriger Natur sei, lässt sich gewöhnlich nur approximativ bestimmen. Die Gehirnsymptome sind in beiden Processen die nämlichen, nur treten sie bei der einfachen Meningitis viel rascher und stürmischer auf, verlaufen viel schneller und können möglicher Weise auch in Genesung endigen, während die tuberculöse Meningitis eine unbesiegt tödtliche Krankheit genannt werden muss. Das Nähere hierüber wird in dem folgenden, von oben dieser einfachen Meningitis handelnden Abschnitte besprochen werden. Die Verwechslung mit Typhus ist bei nur geringer diagnostischer Uebung nicht leicht möglich. Die Diarrhöe, der Meteorismus, der schnelle Puls und der Milztumor sind zu constante Zeichen des Typhus, der eingezogene Leib, die Verstopfung, die Art des Erbrechen, der langsame Puls und die unrythmische Respiration zu auffällende Symptome des Hydrocephalus, als dass hier ein Irrthum geschehen könnte. Eher noch wäre es denkbar, dass chronische Magencatarrhe, bei welchen auch grössere Kinder zuweilen sichtlich abmagern, und wenn sich auch einzelne Gehirnsymptome gesellen können, zu Verwechslung Anlass geben. Bei der Lehre von den Eingeweidewürmern wurde schon eines Falles erwähnt, wo ein Kind unter hydrocephalischen Symptomen zu Grunde gieng und in der Leiche nichts gefunden wurde als eine grosse Menge von Spulwürmern (pag. 190).

Wenn nun diese Fälle als unsererordentlich selten bezeichnet werden müssen, so ist doch erwiesen, dass einzelne Wurmkranke weisse Pupillen, häufiges Erbrechen und selbst eine Pulsverlangsamung bekommen, und man also recht wohl auf die Idee eines irregulär beginnenden Hydrocephalus gebracht werden kann.

Das bisher Gesagte bezieht sich nur auf den entwickelten, völlig ausgebildeten Process, nicht auf die Vorboten, welche durchaus keine diagnostische Präcision zulassen. Hier kommen allerdings vielfache Täuschungen und Verwechslungen mit beginnendem Typhus, mit einfachem Magencatarrh, mit Helminthen und unregelmässigem, erschweretem Zahnaprocess vor, und auf diesen falschen Diagnosen beruhen wohl auch die Fälle von geheilter Meningealtuberculose mit hydrocephalischem Erguss. Den wesentlichsten Anhaltspunkt für die Diagnose in zweifelhaften Fällen liefert immer die erbliche tuberculöse Anlage; wenn Vater oder Mutter oder eines der Geschwister schon an Tuberculosis zu Grunde gegangen, so wird die Wahrscheinlichkeit, dass zweifelhafte Vorbotensymptome dennoch dem Hydrocephalus angehören, viel grösser, als wenn durchaus keine Tuberculosis in der ganzen Familie nachweisbar ist.

Ausgang und Prognose.

Ganz aus dem Anfange meiner medicinischen Laufbahn erinnere ich mich eines Falles von ziemlich ausgesprochenem Hydrocephalus, in welchem Genesung eintrat und das Kind nach mehreren Wochen anscheinend vollkommen gesund entlassen werden konnte. Derselbe Knabe von 7—8 Jahren kam aber ein Jahr nach der ersten Erkrankung wieder in Behandlung und starb nun an Meningealtuberculose und grossem hydrocephalischem Erguss, wovon wir uns auch durch die Section überzeugten.

Bei allen meinen übrigen Kranken, deren ich wenigstens schon 40 bis 50 behandelt habe, trat, wenn die Symptome einmal einen entwickelten acuten Wasserkopf anzeigten, regelmässig der Tod nach 2—4 Wochen ein. Es soll jedoch mit dieser Zeitbestimmung nicht gesagt sein, dass die Krankheit immer in einem solchen Zeitraume verlaufen müsse: denn nirgends ist es schwerer, als gerade hier, den Anfang zu bestimmen. Man pflegt den Beginn der Krankheit von dem Tage, an welchem die Kinder sich legen, zu datiren, aufmerksam Mütter bemerken aber Wochen und selbst Monate vorher schon eine ganze Menge von Symptomen, die sie sich nicht erklären können und deshalb häufig Aerzte consultiren.

Wenn nun nach meinen Erfahrungen noch gar kein Kind genesen und nur ein einziges einen Anfall überstanden hat, um im nächsten Jahre doch noch an einem zweiten an Grando zu gehen, so erhält daraus, dass man von wissenschaftlichen Standpunkte aus die Prognose direkt letal stellen muss. Hingegen gebietet sowohl die Humanität als auch die Politik, dass den Angehörigen bis zum Tode ein Hoffnungsstrahl gelassen wird, indem durch Hoffnung auf Erfolg einer Seite die so mühsame Wart und Pflege sehr erleichtert wird und anderer Seite den Angehörigen nicht verargt werden kann, dass sie sich bei einem anderen Arzte um Hülfe umsehen, wenn sie ihnen von dem zuerst consultirten geradezu abgesprochen worden ist.

In der Literatur finden sich Fälle von Heilung aufgeführt und durch Namen von gutem Klange garantirt. Es bedarf wohl kaum einer Erwähnung, dass ich die dabei angegebene Behandlung zum Oeffnen mit gebührender Consequenz und Genauigkeit eingeleitet habe und dennoch immer denselben trostlosen Erfolg, als wenn irgend etwas Indifferentes gegeben worden wäre, erleben musste.

Behandlung.

Der einzige, wesentliche Nutzen, den der Arzt bei dieser schrecklichen Calamität stiften kann, ist der, dass er in tuberculösen Familien eine unsiditige, consequente Prophylaxis einführt. Es muss also strenge vermieden werden, was Congestionen zum Gehirn veranlassen könnte. Solche Kinder dürfen geistig durchaus nicht anhaltend angestrengt werden, sie dürfen nie lärmende, wilde Spiele spielen, nicht lange und rasch laufen, springen etc. und müssen am Kopfe stets kühl gehalten, vor der Einwirkung der direkten Sonnenstrahlen auf diesen Körpertheil bewahrt werden. Im übrigen müssen alle die bei der Tuberculose als Dyskrasie noch anzunehmendes Verhaltensmassregeln beobachtet werden. Da bekanntlich Stuhlverstopfung ein sehr häufiges und deutliches Moment zu Gehirncongestionem ist, so ist hierauf be-

sonders zu achten, niemals jedoch sollte durch Drastica oder Mittelsalz Stuhl erzielt werden, sondern immer nur durch Vermeidung der erfahrungsgemäss stopfenden und durch Darreichung Stuhl befördernder Nahrungsmittel. Da fast alle Kinder tuberculöser Eltern in ihren ersten Lebensjahren scrophulöse Affectionen, namentlich stark rissende Anschläge am Kopf und im Gesichte bekommen, so wurde schon seit der ältesten Zeit darüber gestritten, ob diese Hautanschläge einen Zusammenhang mit dem Hydrocephalus haben können oder nicht. Man war früher ganz darüber einig, dieselben nicht weiter, als es die Reinlichkeit eben fordert, zu behandeln, indem man beobachtete, dass sie nach einer gewissen Zeit, soviel freilich erst nach vielen Monaten, aufhörten, zu nässen, trockene Krusten bildeten und nach deren Abfall eine normale Cutis ohne sichtbare Narbenbildung zum Vorschein kommen lassen. Da unsere Verfahren in der Therapie unstreitig viel geschäftiger waren als unsere jüngere Generation und jedenfalls auch so gut wie wir wussten, dass man durch Hillenstein oder Sublimation, durch Bleiwasser oder Zinksalbe die Heilung einer Impetigo sehr beschleunigen kann, so mussten sie doch jedenfalls durch mangelhafte Erfahrungen dazu gekommen sein, diese entschieden wirksame Behandlung zu unterlassen. In der neueren Zeit erklärt man nun fast allgemein eine solche Ansicht kurzweg für ein Vorurtheil und beseitigt die scrophulösen Anschläge so schnell es eben geht, ein Verfahren, dem auch ich lange Zeit gehuldigt habe. Es ist mir aber nun schon zweimal begegnet, dass Kinder, denen grosse Kopfausschläge plötzlich abtrockneten, zu derselben Zeit Hydrocephalus bekamen, und ich stehe sohin von der austrocknenden Behandlung derselben ab. Hiemit soll durchaus nicht behauptet werden, dass ein wirklicher Zusammenhang zwischen Kopfausschlägen und Meningeal-tuberculose bestehe, denn wären die beiden bisher erzielten Fälle noch nicht ausreichend und können durch viele Hundert andere, bei welchen die Kopfausschläge ohne alle Consequenzen rasch abgetrocknet sind, widerlegt werden. Da aber durch eine ebenfalls hundertfache Erfahrung erwiesen ist, dass sie nach einiger Zeit ohne alles Darnithun von selbst heilen, so kann durch eine expectative Behandlung keinesfalls geschadet, möglicher Weise aber genützt werden.

Welche Therapie soll nun aber eingeschlagen werden, wenn wirklich die ersten Symptome des Hydrocephalus aufgetreten sind? Die Antwort kann leicht errathen werden, wenn man sich des bei der Prognose Gesagten erinnert. Bei keiner Krankheit kann so bestimmt die Wirkungslosigkeit aller Mittel behauptet werden, als bei dieser, und wenn in folgendem die bisher üblichen Behandlungsmethoden kurz angeführt werden, so geschieht es nicht, um zur Darnachachtung aufzufordern, sondern vielmehr deshalb, um den Therapeuten zu zeigen, wie viel gegen diesen traurigen Process schon vergeblich versucht worden ist.

In den ersten Tagen der Erkrankung sind besonders die Ableitungen auf die Haut beliebt; ein Harzseil in den Nacken, grosse Fontanelles auf die Arme, ein in Eiterung unterhaltenes Vesicans, Pustelschalen mit Tartarus stibiatus oder Sublimat, die Aetzung mit Kali causticum dienen alle dem nämlichen Zwecke, der Erzeugung eines starken Hautreizes mit möglichst profuser, nachfolgender Eiterung.

Dass die antiphlogistische Heilmethode in verschiedener Intensität und bei jedem Stadium applicirt worden, versteht sich wohl von selbst. Man setzt viele oder wenige Blutegel an die Schläfen, hinter die Ohren, in den Nacken, an den Ansatz zwischen die Schenkel, man macht kleine und grosse Aderlässe am Arm, am Fuss, an der Jugularis und hat sogar die Unterbindung der Carotiden vorgeschlagen, meines Wissens aber niemals ausgeführt.

Die Anwendung der Kalte wurde auf verschiedene Weise pract. Man macht die gewöhnlichen kalten Umschläge auf den geschwollenen oder rasirten Kopf, man legt die Eisblase auf, man wäscht oder begiesst den Kopf 2–3 Mal in der Stunde mit kaltem Wasser und man hat sogar Vorrichtungen zu einer ununterbrochenen Irrigation erfunden. Gegen die ersteren Methoden lässt sich nichts einwenden, die Irrigation jedoch ist eine etwas gar zu kühne Idee. „Man wickelt nach Becher den Hals des Kindes zu diesem Zwecke mässig fest in einen wasserdichten Stoff, der nach beiden Seiten mit einer Rinne in Verbindung steht, so dass das angewendete Wasser auf beiden Seiten des Bettes abfließen kann, und lässt nun aus einem über dem Kopf des Kindes aufgehängten Gefäss einen dünnen Wasserstrahl auf denselben herabträufeln.“ Ob hydrocephalische Kinder sich dieses Beträufeln auch gefallen lassen, findet sich nicht weiter angeführt, erscheint aber höchst unwahrscheinlich.

Als Mittel, welche das gestaute Transsudat zur Resorption bringen sollen, stehen oben an das Quecksilber und das Jod, in zweiter Reihe die Diuretika. Unter den Quecksilberpräparaten kommen am meisten in Gebrauch die graue Salbe, deren Resorption durch bald eintretende Stomatitis sich zu erkennen gibt, der Sublimat und das Calomel, welches in grösseren Dosen gereicht zugleich auf den Stuhl wirken soll. Als sogenanntes allgemein anstimmendes Mittel hat man sogar schon täglich mehrere Gran Tartarus stibiatus gereicht. Auch der Phosphor als ein integrierender Bestandtheil der Gehirnmasse ist versucht worden. Unter den Diureticis ist der Salpeter, die Digitalis, Squilla und Juniperus, unter den Antispasmodicis die Asa foetida, der Campher, Moschus und Castoreum in Gebrauch. Unruhigen, delirirenden Kindern hat man mit entschieden beruhigendem Erfolge Opium gegeben, die meisten Aerzte fürchten aber die lähmende Wirkung des Opiums und glauben nur zu gerne, die stetig zunehmende Verschlechterung der Kinder sei durch dieses Mittel theilweise bedingt. Wo aber schon eine grössere Reihe solcher Kinder ohne Narcotica hat zu Grunde gehen sehen, wird ohne Scheu und ohne sich je Gewissensbisse machen zu dürfen, bei grosser Unruhe und heftigen Kopfschmerzen Opium oder noch besser Morphinum reichen.

Das kurze aber höchst traurige Résumé der ganzen Behandlung ist nun, dass man die Kinder Anfangs wie an einfacher nicht tuberculöser Meningitis leicht antiphlogistisch mit kleinen Dosen Calomel, grauer Salbe und kalten Begiessungen des Kopfes behandelt, vielleicht auch nicht gar zu schmerzhaft Hautreize anwendet, dass man vorhersehende Aufregung durch Morphinum beschwichtigt und die Kräfte durch China aufrecht zu halten sucht. Gramsane, eingreifende Methoden sind ganz zu meiden, indem man schon zur Genüge von deren Erfolglosigkeit sich überzeugt hat, und solche Quälereien doch nur bei einer

Hoffnung auf Heilung gestattet sein sollten. Im Uebrigen müssen bei einer allgemein für tödlich gehaltenen Krankheit alle möglichen therapeutischen Experimente erlaubt sein.

2) Meningitis simplex, purulenta und Encephalitis. Die einfache oder eitrige Entzündung der Gehirnhäute und des Gehirnes.

Obwohl sich an den ersten Wasserkopf naturgemäss der chronische anschliesse, so mögen hier doch wegen der grossen Analogien vorerst einige Worte über die einfache Meningitis Platz finden.

Dieselbe ist in Deutschland eine viel seltener Krankheit als der Hydrocephalus acutus und kommt bei Kindern nicht öfter vor als bei Erwachsenen. Fast immer betheiligen sich hierbei die den Gehirnhäuten zunächst gelegenen Gehirnpartlien, und da vom klinischen Standpunkte Entzündung der Meningen und Congestion und Entzündung der Gehirnsabstanz selbst nicht unterschieden werden können, so werden diese verschiedenen anatomischen Processen am besten in eine klinische Schilderung zusammenfliessen.

Aetiologie.

Die Ursachen dieser Erkrankung lassen sich zuweilen mit grosser Bestimmtheit ermitteln. Die zunächst gelegenen sind immer die Traumen des Schädels, Gehirnerschütterung, welche bei der Lebendigkeit und Ungeschicklichkeit der Kinder allerdings häufig genug vorkommen; direkt auf die Gehirnsabstanz wirkende Schädlichkeit, grosse Hitze und Kälte, Insolation, übermässige geistige Anstrengung, durch Uebergreifen der Entzündung von Nachbarorganen aus; die häufigste Veranlassung ist in dieser Beziehung die Otorrhöe, viel seltener nimmt die Meningitis ihren Ausgang von einer Ozaena oder von den Augenhöhlen aus. Auch nach Erysipelen kommt Meningitis vor, in der Mehrzahl der hierbei gehörigen Fälle scheint der Rothlauf jedoch traumatischer Natur zu sein und eine Jancheresorption durch die Knochengefässe angenommen werden zu müssen. Am problematischesten sind die auf Metastasen, zurückgetretene Hautausschläge, unterdrücktes Nasenbluten etc. erfolgenden Meningitiden, obwohl auch hierfür sich in der Literatur einige zuverlässige Gewährsmänner finden. Zu gewissen Zeiten wird sogar ein epidemisches Auftreten dieser Krankheit beobachtet.

Pathologische Anatomie.

Die Dura mater theilhaftig sich nur in traumatischen Fällen an der Entzündung, welche hier immer circumscript bleibt und von einem flachen, faserstoffigen oder eitrigen Exsudat bedeckt wird. In chronischen Fällen, welche bei Kindern ausserordentlich selten vorkommen, verdickt sich die harte Hirnhaut beträchtlich, und es entsteht Thrombose in dem einen oder anderen ihrer Blutleiter. Das entzündliche Exsudat sitzt bei der einfachen Meningitis zwischen Arachnoidea und Pia mater, in deren Vertiefungen und Gyri es sich stellenweise weit einsenkt. Es findet sich, zum wesentlichen Unterschiede von der Meningealabscessen, nie so ausgedehnt an der Basis des Gehirns als auf der Oberfläche

der Hemisphären, erstreckt sich aber häufig auch auf das Rückenmark als Meningitis spinalis. Das Exsudat ist gelb, gelbgrün, faserförmig oder eitrig, und der Dickendurchmesser desselben übersteigt kaum eine Linie, es ist entweder von einer größeren Quantität trübem Serum umgeben, worin es sich verflüssigt und zu einem flockigen, grünlich schillernden Fluidum wird, oder es ist rein an Serum und reich an Faserstoff, so dass es zum Theil an der Arachnoidea, zum Theil am Gehirn hängen bleibt, wenn man versucht, die Arachnoidea abzulösen. Eigenthümlich ist ferner, dass sich mit der einfachen Meningitis ziemlich *semita* Hydrocephalus combiniert, während bei der tuberculösen Basalmeningitis derselbe regelmäßig sich einstellt, was eben seinen Grund darin haben wird, dass in dem ersteren Falle die direkte Fortsetzung der Pia mater in die Gehirnhöhlen frei ist, im letzteren hingegen gerade die Basis des Gehirns der Sitz der eitrigen Masse wird. Die Gehirnrinde kann hierbei im entzündeten oder erweichten Zustande oder auch ganz intact sein.

Diese einfache, höchst selten auftretende Meningitis endet zum meistentheile tödtlich, doch sind auch deutliche Spuren von Rückbildung gefunden worden. Das Exsudat gestaltet sich in diesem letzteren Falle zu einem fibrösen Gewebe um, die Pia mater wird eine milchige dicke Membran und verklebt mit der Gehirnrinde und der Arachnoidea.

Symptome.

Die einfache Meningitis befällt, wenn sie nicht traumatischer Natur ist oder von einer Ovarrhoe ausgeht, fast nur wohlgenährte, kräftige Kinder, welche keine Spur von Scrophulosis an sich tragen, ausserdem werden durch sie nicht selten Kretins getödtet und man findet dann bei der Section neben allen Verwicklungen der Gehirnhäute ein frisch geworrenes eitriges Exsudat, so dass die letzte tödtliche Krankheit als ein Nachschub früherer Meningitiden betrachtet werden muss. Der Beginn ist äusserst scharf und am zweiten oder dritten Tage ist immer schon die Höhe erreicht; alle die Vorboten, welche bei dem Hydrocephalus *semita* aufgeführt wurden, fehlen hier vollständig. Ein auf der Höhe stehender Hydrocephalus aber ist nicht mehr von einer Hemisphärenmeningitis zu unterscheiden, nur der Verlauf der beiden Krankheiten gibt einige Anhaltspunkte für die Differentialdiagnose.

Bei der einfachen Meningitis kommt, geradezu wie bei der tuberculösen, Erbrechen oder Würgen, Verstopfung, verlangsamter Puls, unregelmässige Respiration, heftiger Kopfschmerz, eingezogener Leib und die ganze Schaar von Nervenstörungen vor, worüber das Ausführlichere im vorübergehenden Abschnitte besprochen wurde. Folgende Unterschiede können allenfalls geltend gemacht werden: Der Verlauf der Meningitis simplex ist viel rapider, denn der Tod tritt gewöhnlich schon zwischen dem 3.—6. Tage der Krankheit ein und demgemäss ist die Temperatur der Haut namentlich am Kopf deutlich erhöht. Die Delirien sind hier gewöhnlich ausserordentlich laut, selbst furiös, das Gesicht hat einen wilden, verwirrten Ausdruck und die Convulsionen und Contracturen des Rumpfes sind von exquisiter Heftigkeit. Der Puls ist weniger verlangsamt als unrythmisch, das Erbrechen ist nicht so constant und kann sogar ganz fehlen.

Wenn die Kinder nicht in den ersten Tagen an ihrer Meningitis

zu Grunde geben, so mildern sich die Symptome ganz allmählig, doch bleibt immer noch die Diagnose zwischen unserer Krankheit und Hydrocephalus acutus schwankend. Es tritt eine enorme Abmagerung ein und bleibt leicht eine lebenslängliche Geisteschwäche zurück, wie ich in meiner Praxis schon zweimal erfahren habe. Die grosse Ähnlichkeit im Verlaufe der Meningitis und des Hydrocephalus macht die Behauptung, dass acuter Hydrocephalus zuweilen geheilt wurde, geradezu unzulässig; denn es wäre ja sogar möglich, wenn auch unwahrscheinlich, dass Kinder tuberculöser Eltern ausnahmsweise einmal eine einfache Meningitis acquiriren, von der sie ebenfalls noch genesen könnten.

Behandlung.

Hier ist eine Quacksilberbehandlung von entschiedenem Nutzen, und die beiden Kinder, welche ich genesen sah, wurden ausschliesslich mit Quacksilber äusserlich und innerlich behandelt. Man reibt zu diesem Zwecke täglich 4,0 grane Salbe auf den geschorenen Kopf und gibt stündlich 0,03 Calomel. Bei beiden Kindern, welche schon auf der Höhe der Krankheit standen, cerebrales Erbrechen, unrythmischen Puls, eingezogenen Leib und mannigfache Convulsionen hatten, trat gegen den dritten Tag starke Stomatocoe und alsbald allmählicher Nachlass aller schweren Symptome ein. Auf die Dolirien üben kalte Begiessungen des Kopfes, alle 2—3 Stunden wiederholt, einen sehr günstigen Einfluss. Sie werden am einfachsten so bewerkstelligt, dass man die Brust und die Arme des Kindes in ein grosses Tuch wickelt und den Kopf des Kindes über eine Schüssel hält, worauf man mit einer Kanne aus mässiger Höhe 1—2 Minuten lang eine Begiessung macht. Es ist in allen Fällen eine, wenn auch nur vorübergehende Minderung der Gehirnsymptome zu beobachten.

Fünf Kinder, die ich mit Blutegel behandelt, gingen sämtlich zu Grunde, nachdem nach plötzliches Erblässen der Lippen und schneller Collaps, die einzigen sichtbaren Folgen dieses Verfahrens, eingetreten waren. Jenen beiden genesenen Kindern hingegen waren keine Blutegel gesetzt worden, so dass ich nach meinen Erfahrungen die Behandlung ohne Blutegel für die richtigere halten muss.

Die in Folge des Quacksilbers eintretende Stomatocoe und Salivation, welche übrigens keineswegs als kritisch betrachtet werden darf, sondern auch bei Kindern, die den folgenden Tag schon verstorben, eintreten kann, heilt in allen Fällen auf Darreichung von chloressaurem Kali, wovon man täglich 4,0 in 100—150 Gramm Wasser gelöst nehmen lässt.

Ob man, wie Einige wollen, bei grosser Aufregung das Calomel mit Opium verbinden soll, kann ich nicht entscheiden, indem ich in dieser gefährlichen und so rasch durch Lähmung tödtenden Krankheit die Narcotica für contraindicirt halte und zudem in den kalten Begiessungen ein werthvolles Mittel gegen die Aufregung gefunden habe.

Die Digitalcompression der Carotiden, welche vor einiger Zeit in Frankreich warm empfohlen wurde, wird ausgeführt, indem man die Carotiden mit Daumen und Zeigefinger gegen die Seitenwände des Kehlkopfes oder nach hinten gegen die Wirbelsäule eine Minute lang andrückt und diese Procedur mehrmals im Tage wiederholt, bis die

Kopfsymptome sich bessern. Dass diese Compression, schwach ausgeführt, nur eine illusorische ist, kräftig ausgeführt hingegen noch viel sicherer die Jugularvenen comprimiren und am Ende gar auf die Nervenstämme reizend wirken muss, wurde von S. Lewis schon zur Genüge bewiesen. Es hat dieses Verfahren entschieden nur historisches Interesse.

Die auf eine Meningitis folgende, beträchtliche Abmagerung muss durch kräftige Kost und roborative Behandlung, Eisen, China etc. gehoben werden. Gegen die meist zurückbleibende Geisteschwäche gibt es meines Wissens kein anderes Mittel als grosse Schonung der Geistesthätigkeit und eine ruhige, psychische Behandlung.

3) Der Sonnenstich. Inolation.

An die eitrige Meningitis schliesst sich eng die Inolation an, obwohl die pathologische Anatomie keinen direkten Zusammenhang der beiden Krankheiten zeigt. Man findet nämlich bei letzterer kein eitriges Exsudat auf den Meningen, sondern bloss starke Injection, etwas Vermehrung des röthlichen Ventrikelinhaltes und Weichheit der Gehirnhautsubstanz.

Symptome.

Kinder, die mit blossen Köpfen mehrere Stunden sich den heissen Sonnenstrahlen ausgesetzt haben, kehren mit geröthetem Gesicht, Nacken und Armen in ihre Wohnung zurück und klagen zugleich über heftigen Kopfschmerz. Die rothe Färbung der genannten Hautpartien verschwindet nicht wie nach einfacher Erhitzung, sondern besteht Tage lang als kleinföckeriges Erythem fort. Nach wenigen Stunden entstehen Delirien, oft furiöser Art, mit Entwicklung ausserordentlicher Muskelkraft. Geröthete Augen, enge Pupillen, starke Pulsation der Carotiden, heisse Haut, heftiger Durst und trockene Zunge lassen eine heftige Meningitis vermuthen. Nur der Puls ist sehr beschleunigt und meistens rhythmisch, während er bei eitriger Meningitis bald unregelmässig wird und sich häufig verlangsamt. Auch das Erbrechen fehlt, wenn nicht grössere Mengen unverdauter Speisen sich noch im Magen befinden.

Der Verlauf der Inolation ist ein der Meningitis sehr entgegengesetzter, nach einem halben, einem ganzen oder längstens nach zwei Tagen verschwinden alle die genannten Symptome. Die Kinder verfallen in einen zuerst unruhigen, dann tiefen Schlaf und erwachen am demselben mit vollem Bewusstsein und Nachlass des Fiebers. Nach weiteren 2–3 Tagen ist die Gesundheit vollkommen wiedergekehrt. Es gibt Fälle, wo der Tod gleich bei Beginn der Inolation oder rasch sich steigendem Sopor, allgemeiner Unempfindlichkeit, Lähmung und Röcheln erfolgt, sie scheinen jedoch zu den Ausnahmen zu gehören und werden in unseren gemässigten Climates nur selten beobachtet.

Behandlung.

Venasectionen bringen einigen Nachlass der Symptome, doch sind sie bei furiöser Delirenden sehr schwer zu machen, das gleiche gilt von Application der Blutegel. Das beste und kürzeste bleibt inner-

die Haare mit einigen Scheerenschritten möglichst kurz zu schneiden und nun alle Stunden eine kalte Begießung in trockener Wärme vorzunehmen. Es folgt hierauf regelmässig eine bedeutende Ermässigung der stürmischsten Erscheinungen. Sobald die Kinder etwas ruhiger geworden, macht man Einschläge auf den Kopf, setzt Senfteige an die unteren Extremitäten, gibt Calomel und Jalappa und setzt reizende Clystiere. Fast alle Kinder genesen von diesem höchst bedrohlich ansehenden Zustande.

4) Hydrocephaloid und Irritatio cerebri.

Marshall Hall faßt einige Ähnlichkeit zwischen dem acuten Wasserkephal und den auf Blutarmuth beruhenden Symptomen atrophischer Kinder, weshalb er letzteren Zustand Hydrocephaloid disease nannte. Es ging diese neue Krankheit, obwohl pathologisch-anatomisch keineswegs begründet, in alle Lehrbücher über und soll auch hier eine kurze Erörterung finden. Wenn gleich keine eigene Krankheit, sondern vielmehr nur ein Ausgang einer solchen, so verdient der Name doch beibehalten zu werden, und wäre es auch nur der Bequemlichkeit wegen, um mit einem Worte einen ganzen Symptomencomplex bezeichnen zu können. Unter Irritatio cerebri, Gehirnreiz, versteht man in der Pädiatrik fast ausschließlich jene Gehirnsymptome, welche in Folge von unzureichender Ernährung, von Atrophie, sich einzustellen pflegen, so dass man recht wohl die Symptome des Hydrocephaloid und der Irritatio cerebri zusammen geben kann.

Symptome.

Nach verschiedenen erschöpfenden Krankheiten, am häufigsten nach Diarrhöen und Blutentziehungen, bekommen Kinder unter einem Jahre eine Reihe von Gehirnsymptomen, welche auf den ersten Anblick ohne Berücksichtigung der Anatomie allerdings den Gedanken an eine materielle Veränderung des Gehirns, an eine Exsudation rege machen können.

Unter den Gehirnsymptomen sind die auffälligsten: ein fortwährendes Hin- und Herreiben des Kopfes und ein Zurückbeugen in das Kopfkissen, wodurch die Haare am Hinterhaupt vollkommen verschwinden und häufig kleine Hautrupturen, Verlust der Epidermis und Furunculosis eintreten. Viele Kinder greifen auch auf den Kopf, zerren sich an den Haaren und Ohren und kratzen sich das Gesicht blutig. Sie hören auf, ihre Umgebung zu fixiren und rollen meist bei halbgeschlossenen Lidern die Bulbi nach aufwärts. Die oberen Extremitäten befinden sich in anhaltender starrer Beugung, die Hände halten sich mit eingeschlagenen Daumen so fest zu Fäusten, dass einige Gewalt dazu gehört, sie zu öffnen, und der Handteller seiner Epidermis beraubt wird. Das letztere wird namentlich bei Kindern beobachtet, welche die Hände oft an den gährenden Schweiß bringen. Die unteren Extremitäten sind ebenfalls starr, entweder ausgestreckt oder an den Leib angezogen und die Nackenmuskeln befinden sich in starker Contraction, so dass die Kinder, auf die Seite gelegt, sich weit nach hinten krümmen. Zuweilen, namentlich gegen das Ende, stellen sich auch tetanische Krämpfe ein.

Fast alle diese Kinder erbrechen und zwar bald, nachdem ihnen Speise oder Trank beigebracht worden ist, wodurch die Ähnlichkeit mit einer exsultativen Erkrankung des Gehirnes noch vermehrt wird. Dieses Erbrechen geschieht zwar auch ohne Würgen und Anstrengung, wie dies überhaupt bei kleinen Kindern gewöhnlich ist, hat aber einen Grund in einem Reizungsanstande der Magen- oder Darmmuskulatur.

Untersucht man den Schädel von Kindern, welche in Folge profuser Darmcatarrhe atrophisch geworden sind und diese Gehirnsymptome zeigen, so findet man eine erhöhte Temperatur, eingesunkene grosse Fontanelle und eine Uebereinanderschlebung der Schädelknochen, kann die Zeichen eines hochgradigen Gehirnschwundes, welcher mit grosser Bestimmtheit eine letzhale Prognose stellen lässt.

Der Stuhl ist öfter angehalten als diarrhoisch, niemals copios, der Appetit ist meist gänzlich verschwunden, zuweilen aber stellt sich ein wunderbarer grosser Ekel ein, die fast bis zum Tode währt.

Zum Unterschiede vom echten Hydrocephalus ist hier der Fall immer ausserordentlich schnell und die Respiration, wenn auch tachyrythmisch, doch meistens deutlich beschleunigt. Am Anfange schreien die Kinder anhaltend mehrere Tage und Nächte hindurch, gegen das Ende zu sind sie bloss noch im Stande ein leises Stöhnen und einzelne Schreie hervorzubringen.

In der Leiche findet man nun das Gehirn sehr weich und wässrig, die graue Substanz blass und allmählig ohne scharfe Abgrenzung in die weisse übergehend, die Meninges serös infiltrirt und in den Ventrikeln keine grössere Menge von Flüssigkeit als im Normalzustande. Es ist es vermuthen, dass die Quantität des Fettes im Gehirn bedeutend abgenommen hat und auf diese Weise die Gehirnsymptome erklärt werden müssen; chemische Untersuchungen, in dieser Richtung angestellt, sind mir nicht bekannt.

Behandlung.

Es gilt hier alles, was bei der Behandlung des Darmcatarrhes und der Enteritis folliculosa schon angeführt worden und voraufmerksam verwiesen werden muss. Gegen das anhaltende Schreien und die Schlaflosigkeit sind noch am meisten kalte Begiessungen des Kopfes mit Trockenhalten des Rumpfes zu empfehlen, es tritt nach einem solchen mehrere Minuten mit der hohlen Hand ausgeführten Abgiessen meistens eine Ruhe von einer oder einigen Stunden ein. Das einzige frappante Mittel, ohne so tief darniederliegende Ernährung rockend in die Höhe zu bringen, ist die Brust einer guten Amme. Nur muss man dabei die Vorsicht gebrauchen, das eigene Kind der Amme nicht eher abzunehmen, bis das kranke im Stande ist, ordentlich zu saugen, wofür oft mehrere Tage vergehen. Eine Erkrankung der Amme, Mastitis oder Anshleiben der Milch wäre die nothwendige Folge dieser Unvorsichtigkeit.

5) Hydrocephalus chronicus. Der chronische Wasserkopf.

Man unterscheidet theoretisch einen äusseren und einen inneren, einen angeborenen und einen erworbenen chronischen Wasserkopf, in Praxi aber lassen sich diese Arten gewöhnlich nicht trennen, indem

besonders was den letzteren Unterschied betrifft, nicht angegeben werden kann, ob ein Kind mit einem kleinen Ergüsse, der erst später deutlich zunimmt, auf die Welt gekommen ist, oder ob es wirklich anfangs normal gebildet erst später hydrocephalisch wird. Der äussere Wasserkopf ist fast immer angeboren und gewöhnlich mit Gehirnbruch complicirt, weshalb wir erst weiter unten darauf zurückkommen werden.

Pathologische Anatomie.

Die grössten Ergüsse in die Ventrikel kommen im Fötus vor, so dass die Geburt unmöglich wird und zur Perforation des Schädels geschritten werden muss. Die Menge des Wassers kann bei angeborenem Wasserkopf bis zu mehreren Pfunden, nach einigen Autoren bis zu zehn Pfund zunehmen. Die Ventrikel sind zu grossen Säcken ausgedehnt und ihre Wandungen nach oben so verdünnt, dass sie kaum mehr den Durchmesser einer Linie haben oder gar zu einem kaum präparirbaren Belage reducirt sind. Die Gyri des Grosshirnes sind nur angedeutet, die Oberfläche ist vollkommen glatt und die Hirnhäute sind ausserordentlich zart und dünn, die Missgestaltung des knöchernen Gehirns entspricht der Grösse der Wassermenge. Die Verknöcherung des Schädelknochens bleibt natürlich sehr zurück, die Nähte werden über fingerbreit, die grosse Fontanelle bekommt einen Querdurchmesser von mehreren Zollen. Kommt endlich, wenn das Leben Jahre lang besteht, dennoch eine Verknöcherung zu Stande, so geschieht dies dadurch, dass die Knochenränder lange strahlenförmige Zacken gegen einander senden, oder sich mittelst einer höchtigen Naht aneinanderlagern oder endlich indem sich in den Fontanelles und betonen Nähten Zwickelknochen entwickeln. Da diese Arten von Verwachsung niemals gleichmässig vor sich gehen, eine Naht sich früher auf der einen als auf der andern Seite schliesst, so entstehen beträchtliche Missbildungen des Schädels, wovon besonders Virchow sein Augenmerk gerichtet hat. Zu erwähnen sind als die häufigsten Abnormitäten: der übermässig lange, breite, hohe Schädel, der runde, der stumpfvierseitige, der nach dem Längs- oder Querdurchmesser schiefe Schädel.

Nicht minder auffallend als nach oben wirkt auch nach unten die ergossene Wassermenge. Die Streifen- und Schlägel sind abgeflacht, durch Erweiterung der dritten Hirnhöhle auseinandergedrängt, der Boden der letzteren verdünnt und durchsichtig. Aus demselben Grunde sind auch die Vierhügel abgeplattet, die Commissuren gezerrt und verdünnt, die Schenkel des Gewölbes auseinandergedrängt, das Septum der Ventrikel an mehreren Stellen durchbrochen. Das Kleinhirn, dessen Volumen in gar keinem Verhältnisse mehr steht zu dem des Grosshirnes, ist abgeplattet, ebenso die Brücke und die Schleimdrüse.

Weniger bedeutend sind die Veränderungen beim erworbenen Hydrocephalus chronicus, der sich bei Kindern entwickelt, welche längere Zeit, einige Monate bis mehrere Jahre, eine ganz physiologische Entwicklung des Schädels gezeigt haben. Die Menge des Serums hängt in diesem Falle von der Beschaffenheit der Schädelknochen ab, ab und welche Nähte noch nicht knöchern geschlossen sind und bei Eintritt der Wasserausammlung noch ein Auseinanderweichen gestatten. Die Quantität des Serums beträgt hier nicht leicht mehr als 150—200

Granna, und die Formveränderungen des Schädels und Gehirns werden natürlich nie mehr so beträchtlich, wie beim angeborenen Wasserkopf, welcher nach der Geburt rasch fortwächst. Die Beschreibung der acuten Schädelform wird besser bei der Symptomatologie folgen.

Unter den unmittelbaren Ursachen des Hydrocephalus sind Neoplasmen besonders zu erwähnen, durch welche ein Sistas hinweg gemacht und so die Ansammlung von Serum veranlaßt wird. Andere bestimmte Complicationen, welche in einem gewissen Zusammenhang mit dem Hydrocephalus gebracht werden könnten, existiren nicht, und namentlich ist noch hervorzuheben, dass zum Unterschied von der acuten Form hier Tuberculosis gewöhnlich nicht beobachtet wird.

Die chemischen Untersuchungen der ergossenen Flüssigkeit haben gelehrt, dass sie ganz ähnliche chemische Eigenschaften besitzt wie die des acuten Wasserkopfes. Auch hier ist die Reaction deutlich alkalisch, Eiweiss nur in Spuren und das Verhältniss des Kaliums zum Natrium ein anderes als im Blutsernm, worüber das Nähere pag. 311 nachzusehen.

Symptome.

Die Untersuchung des Schädels ergibt bedeutende Abweichungen von der normalen Form. Das Schädelgehäuse wird um so grösser, je früher der Hydrocephalus begonnen hat, am grössten im Mutterleib, am wenigsten ausgekehrt bei schon geschlossenen Nähten. Je früher die Exsudation oder, richtiger gesagt, die Vermehrung des physiologischen Hirnliquors eintritt, um so ausgesprochener wird die Kugelform, je später dies geschieht, um so abweichendere Formen entstehen. Sind einzelne Nähte knöchern geschlossen, während andere noch ausdehnungsfähig sind, so verlängert sich immer der Schädel nach der Richtung der geschlossenen Naht. Der Vollständigkeit halber kann man auch Messungen des vergrösserten Schädelchins anstellen, wobei man gewöhnlich den grössten Umfang, der über die Stirnhöcker geht, misst und das Maass von einem Ohr zum andern, und von der Promontoria occipitalis externa bis zur Nasenwand bestimmt. Praktisch haben diese Messungen wenig Werth, indem die Wölbung der Stirn und Auswärtstellung der Schläfenbeine hinlänglich die abnorme Vergrösserung erkennen lassen, belehrend jedoch kann sie für das Studium des Verlaufes werden; denn es stellt sich bald augenfällig heraus, dass die Ausdehnung des Schädels nicht gleichmässig und gradatim, sondern ruckweise nach längeren Intervallen geschieht.

Ist die grosse Fontanelle noch nicht geschlossen, wie dies in den meisten Fällen vorkommt, so dehnt sie sich zu einer grossen Wölbung von einem Durchmesser bis zu mehreren Zollen aus, fluktirt deutlich und fühlt sich prall an. Diese Wölbung und Gespanstheit besteht immer fort bis zum Tode, wenn auch der Körper im übrigen noch so sehr abgemagert ist. Die dem Arterienpuls synchronische Erhebung der Fontanelle ist sehr deutlich zu erkennen, während ihr Heben und Senken bei der In- und Expiration sich gänzlich verliert.

Man hat vor einiger Zeit auf die Auscultation der grossen Fontanelle mehrfach aufmerksam gemacht, und es hat sich in der That herausgestellt, dass man an verschiedenen Stellen des Schädels, nament-

lich an der grossen Fontanelle rheumatischer Kinder, ein leichtes kauschendes oder blasendes Geräusch vernimmt, das bei hydrocephalischen Kindern aber niemals gehört wird. Da diese Blasegeräusche höchst wahrscheinlich in den unebenen Blutleitern der harten Hirnhaut entstehen, so ist es leicht erklärlich, dass sie verschwinden, wenn letztere durch die zunehmende Wassermenge stark comprimirt werden.

Der beste Anhaltspunkt ist die Lagerung der Schläfenbeine. Während dieselben bei einem gesunden Kinde senkrecht nach aufwärts gehen, sind sie bei Hydrocephalus stark nach auswärts gewendet, so dass man in exquisiten Fällen, von oben betrachtet, nicht einmal die Ohrmuscheln zu sehen bekommt. Bei längerem Bestande verflacht sich durch den schaltenden Druck des Gehirnes die obere Wand der Orbita, in Folge dessen treten die Bulbi mehr nach vor- und abwärts, und man bekommt gewöhnlich die ganze Cornea und noch etwas von der nach oben gelegenen Sclera zu Gesicht, was den Kindern einen eigenthümlich stieren, glotzenden Blick verleiht.

Aus demselben Grunde, gesteigertem Druck im Innern der Schädelhöhle, entsteht zuweilen auch ein mächtiger Collateralkreislauf der Kopfschwarze und der Stirnhaut, welche letztere mit dicken, bläulichen Strängen nach verschiedenen Richtungen durchzogen ist und durch diese Färbung einen höchst sonderbaren Anblick gewährt.

Das Gesicht erscheint gegen die Dimensionen des Schädels ausserordentlich verkleinert, hat übrigens ganz seine normalen Proportionen. Bei kleinen Kindern mit angeborenem Hydrocephalus ist es meist mager, spitzig und grauhaft, während es bei grösseren Kindern bis zum Tode voll und rund bleiben kann.

Die functionellen Störungen sind sehr mannigfach und fast bei jedem Hydrocephalus verschieden. Beim erworbenen stellen sich diese Symptome entweder ganz allmählig ein oder werden mit Fader und einigen Erscheinungen, wie sie bei Hydrocephalus acutus vorkommen, als Aufschreien, Brechen, Kopfweh, Zähneknirschen und Delirien, eingeleitet.

Die geistigen Fähigkeiten bleiben zuweilen merkwürdig lang intakt, und es macht einen sonderbar traurigen Eindruck, wenn solche Kinder mit monströsen Köpfen und unwillkürlichen Entleerungen gelähmt oder contract im Bette liegen und doch noch ganz vernünftige Antworten geben, ja sogar noch humoristische Einfälle haben. In einzelnen Fällen tritt allerdings bald Stumpfheit und endlich Blödsinn ein.

Von den Sinnen schwindet zuerst und am häufigsten das Gesicht, wobei die Pupille häufig erweitert und starr wird und die Lichtempfindung so total verloren gegangen ist, dass die Kinder lange Zeit und mit Vorliebe in die Sonne sehen. Strabismus kommt hier seltener vor als beim acuten Hydrocephalus, häufiger wird ein Nystagmus der Augäpfel oder nur eines einzigen Bulbus beobachtet, und auch die Pupillen sind zuweilen ungleich contractirt oder erweitert. Die übrigen Sinne erhalten sich meist bis kurze Zeit vor dem Tode, was namentlich vom Gehör gilt, die Sensibilität der Haut verliert sich hauptsächlich in den von Lähmung befallenen Extremitäten.

Hemiplegien sind seltener als beidseitige Lähmungen, unter welchen die gewöhnlichste die der unteren Extremitäten ist. Auf dieselbe folgt allmählig eine Unempfindlichkeit, dann eine Lähmung der

Sphincteren der Blase und des Mastdarmes und erschwert die Pflege der fortan zusehends riechenden Kinder unsserordentlich. Der dann entstehende, unvermeidliche Decubitus beschleunigt übrigens sehr die letzhale Ende, auf welches einst oft Jahre lang vergeblich gewartet werden mus. Contracturen sind eine gewöhnliche Erscheinung. Convulsionen werden nicht gar häufig beobachtet, der Tod kann während desselben leicht eintreten.

Die übrigen den Hydrocephalus acutus so sehr charakterisirenden Erscheinungen seldom hier in der Regel. Die Respiration, im erstern Falle durch den Mangel des Rhythmus ausgezeichnet, geht ganz normal von Statten, ebenso ist eine Pulsationsamng hier gewöhnlich nicht vorhanden. Die Verdauung kann ganz normal liden, kein Erbrechen, keine Verstopfung tritt ein oder wird nur verübergend beobachtet, wodurch sich die Jahre lange Fortdauer eines guten Ernährungszustandes leicht erklären lässt.

Die Ernährung geht, wenn keine anderen Krankheiten, Tuberculose oder Darmcatarrh, eintreten, vortreflich vor sich, der Appetit wchst oft in eine wahre Gefräßigkeit aus und die Fettpolster nehmen dabei in krankhafter Weise zu.

Kopfschmerzen werden nur vorübergehend geklagt und Fieberbewegungen haben öfter ihren Grund in andern zufällig sich dem gesunden Erkrankten als im Hydrocephalus selbst. Acute Nachschübe können auf einige Tage ganz das Bild eines acuten Hydrocephalus erzeugen, doch geht die Verschlimmerung nicht wie bei diesem unauflöslich vorwärts, sondern es kommt gewöhnlich zu einem Stillstand und Wiederverschwinden der bedenklichsten Symptome.

Der Verlauf ist, wie sich schon aus der Bezeichnung des Uebels ergibt, immer ein chronischer. Am schnellsten sterben die angeborenen grossen Wasserköpfe, welche schon durch die Geburt selbst dem schädlichsten Drucke ausgesetzt sind und zur ausnahmsweise den Geburtsakt aushalten. Einzelne später erworbene, sehr mässige Ergüsse werden aber viele Jahre ertragen, so dass solche Menschen ein mittleres Lebensalter erreichen können und in der Literatur sogar von einem erst im 54. Jahre verstorbenen Wasserkopfe berichtet wird.

Der Tod kann eintreten als unmittelbare Folge der Gehirnveränderungen, unter Convulsionen oder fort und fort zunehmenden Coma und Collapse, wo man dann in der Leiche noch frische Meningitis oder Meningealblutung finden kann, oder der Decubitus und seine Consequenzen, Pyämie und Entkräftung, können die nächste Veranlassung abgeben. In der Mehrzahl der Fälle sterben aber die Kinder an andern intervallirenden, selbstständigen Krankheiten, vor allem an Darmcatarrh und Enteritis folliculosa während der Decubien, an Bronchitis, Pneumonie, Meningitis oder an acuten Exanthemen, welche Erkrankungen sämmtlich bei chronischen Wasserköpfen viel öfter tödlich verlaufen, als bei vorher gesunden Kindern.

Die Differentialdiagnose hat in ausgesprochenen Fällen natürlich keine Schwierigkeiten, ein diagnostischer Irrthum ist gar nicht denkbar. Kleine Wasseransammlungen hingegen bieten keineswegs schlingende Symptome und können recht wohl mit Schädelachse oder mit einfacher Hypertrophie des Gehirnes und der Knochen verwechselt werden.

Der Hauptunterschied zwischen Hydrocephalus chronicus und Schädelrhaehitis besteht darin, dass bei ersterem die Schläfenbeine immer nach auswärts sich richten, während sie bei letzterem gerade nach aufwärts stehen, mag die grosse Fontanelle auch noch so gross geworden sein. Uebrigens fehlen hier alle hydrocephalischen, functionellen Symptome, am Schädel selbst findet man die Verdünnung nicht allgemein verbreitet, sondern nur auf die hinteren Parthien beschränkt, während die Stirnbeine die gewöhnliche rhaehitische Verdickung zeigen, und die übrigen Theile des Skeletts, Thorax und Extremitäten, ebenfalls von der Rhaehitis ergriffen sind.

Die Hirnhypertrophie ist ebenfalls von gar keinen hydrocephalischen Symptomen begleitet, entsteht meist in Folge von Schädelrhaehitis und der Knochen verdickt sich hierbei beträchtlich. So lange übrigens nicht genaue Wägungen des Gehirns im Verhältnisse zum Körpergewicht angestellt und eine mittlere Normalzahl fixirt ist, hat man noch gar kein Recht, dem Mosen Augenmaasse nach von Hypertrophie des Gehirns zu sprechen.

Therapie.

Ich kenne wohl Kinder mit chronischem Hydrocephalus, bei denen seit mehreren Jahren keine Zunahme des serösen Ergusses stattgefunden hat, und welche in einem leidlichen Zustande ihrer körperlichen und geistigen Entwicklung sich befinden, eine wirkliche Heilung aber, so dass man Aussicht hätte, ein für die menschliche Gesellschaft brauchbares Mitglied zu schaffen, ist mir nicht bekannt. Das wesentlichste bei der Conservirung dieser Kinder scheint eine sorgsame Pflege und gute, genau regulirte Diät zu sein. Aus der Classe der Duretica, deren Wirkung auf die Resorption der hydrocephalischen Flüssigkeiten eine höchst problematische ist, dürfen nur solche gewählt werden, welche keinen allgemein schwächenden Einfluss üben, Rosch Juniperi, oder etwas Digitalis, Kali acetatum. Zu vermeiden sind Jodkalkum, Quecksilber, Brechweinstein, Drastica. Eine tonische, reboerirende Behandlung kann keinesfalls schaden, ausserlich dann nicht, wenn immer auf gehörigen Stuhlgang Rücksicht genommen wird.

Oertlich hat man die verschiedensten Salben und Balsamen an-gegeben, wogegen, so lange die Kinder nicht damit gequält werden, nichts einzuwenden ist. Die von Engelmann warm empfohlene Einwicklung mit Heftpflasterstreifen, welche Jahre lang unaufhörlich fortgesetzt worden soll, wie die von einigen operationslustigen Chirurgen versuchte Punction und Entleerung der Ventrikel bei noch nicht geschlossenen Fontanelen hat man aus verschiedenen Gründen, vornehmlich wegen gänzlich mangelnden Erfolges, wieder vollständig aufgegeben.

6) Encephalocele, der angeborene Gehirnbruch.

Der Gehirnbruch ist immer angeboren und durch eine übermässige Ausdehnung des Gehirns bedingt, in Folge deren die gehörige Entwicklung des Schädelknochens gehemmt wird. Man findet alsdann nach der Gegend an irgend einer Stelle des Schädels, am häufigsten an der Nasenwurzel und in der Gegend des Occiput eine Geschwulst, welche bei genauerem Zufühlen einen ringförmigen Defekt des Knochens

erkennen lässt. Die Grösse dieser Geschwulst schwankt zwischen der eines zweiten Kindskopfes und einer kleinen Nuss, was hauptsächlich von der Menge des Wassers herrührt, welches in allen Fällen das verfallene Stück Gehirn umgibt. Zuweilen findet sich in der Geschwulst gar kein Gehirn, sondern nur Meningealwasser, die von Spring ausführlich beschriebene Meningocele. Je enger die Knochenlücke, um so gestrichelter ist die Geschwulst, je weiter, um so flacher.

Ihre Hülle ist gebildet durch eine atrophische, haarlose Cutis, die mit dem Pericranium und den Gehirnhäuten verwachsen ist, und bei grossen Gehirnbrüchen kann die Haut so atrophisch sein, dass der Sack während der Geburt beim Durchgang des Schädels durch das Becken platzt, worauf natürlich bald der Tod eintritt.

Der Hirnbruch zeigt sich am häufigsten am Hinterhaupt, an der unterhalb der kleinen Fontanelle, ausserdem an der Nasenwurzel oder einem Augenwinkel oder an der grossen Fontanelle, am seltensten nämlich an den Schläfenbeinen. Wenn er an der Nasenwurzel heraustritt, so werden die Nasenbeine auseinandergedrängt und die Augen stehen weiter von einander ab.

Durch Compression kann man die Geschwulst zuweilen reponiren oder wenigstens beträchtlich verkleinern, erzeugt aber hiedurch beträchtliche Schmerzen und bei fortgesetztem Drucke auch Gehirninfälle, Convulsionen, Starkkrampf, Betäubung, Ohnmacht. Bei kleinen Geschwülsten und derer Hülle ist ein früher Tod durchaus keine notwendige Folge. Die Geschwulst wogelt aber im Verhältniss zu den übrigen Körpertheilen hin, die fast ununterbrochenen Quetschungen und Beschädigungen aller Art veranlassen bald chronische Meningitis, und so kommt es, dass ein Erwachsener oder selbst nur ein grösseres Kind mit einem Hirnbruch zu der grössten Seltenheit gezählt werden muss. Wenn das Leben auch einige Jahre durch sorgsame Aufsicht erhalten werden kann, so bleibt die geistige Entwicklung doch sehr zurück, und Elend um sich ziehend.

Behandlung.

Bei ganz kleinen, vollständig reponiblen Hirnbrüchen, ausserhalb Meningoceleen, soll schon Radicalheilung gelingen sein, indem durch continuirliche Zurückhaltung des Sackes Kalkablagerungen sich in der Lücke gebildet haben, und so ein knöcherner Verschluss zu Stande gekommen ist. Gelingt, wie dies in der Regel der Fall ist, die Reposition nicht vollständig, oder entstehen durch dieselbe schwere Hirnsymptome, so bleibt nichts anderes übrig, als durch eine hohle Blasplatte oder ein geeignet geformtes Leder die gefährliche Stelle vor äusseren Unbilden möglichst zu schützen. Es kann auf diese Weise ein ziemlich hohes Alter erreicht werden, und in der Münchener anatomischen Sammlung wird der Schädel eines Erwachsenen aufbewahrt, an dessen Hinterhaupt eine geschengrösse, überall abgerundete Oefnung sich findet, aus welcher bei Lebnzeiten ein Hirnbruch hervorragt hat.

Die Abtragung oder Abbindeung soll nach Bouchut immer tödtliche Meningitis veranlassen und ist deshalb gänzlich aufgegeben. Anders verhält es sich mit den Punctionen. Wenn man mit einer Explorativtroikart, oder noch besser, durch einfache, oft wiederholte Nadelstiche den flüssigen Inhalt des Bruches entleert, so gelingt es, 60

Geschwulst bedeutend zu verkleinern, und es kann ein schützender Verband angelegt werden, was ohne diese Behandlung fast unmöglich gewesen wäre. Allerdings sammelt sich auch den ersten Punctionen das Secret wieder an, nach mehrmaliger Wiederholung aber kommt eine bleibende Verkleinerung und somit eine beträchtliche Besserung des ganzen Leidens zu Stande.

7) Sclerose des Gehirnes.

Verhärtung des Gehirnes findet sich bei Kindern ausserordentlich selten, nur Billiet und Barthox, dann F. Weber haben einzelne Fälle bekannt gemacht. Die Sclerose nimmt, wie bei Erwachsenen, entweder das ganze Gehirn ein, oder nur einzelne kleinere Theile, totale oder partielle Verhärtung. Die Vermehrung der Consistenz schwankt zwischen einer leichten, unmerklichen Härte und einer knorpelhaften Resistenz, und ist in letzterem Falle immer mit Atrophie, mit Schwund und Texturveränderung verbunden. Am häufigsten kommen noch vor die höchsten Grade totaler Verhärtung, die man bei Scharlach und Typhusleichen zuweilen findet, während die Seltenheit der partiellen sich daraus leicht erklären lässt, dass Gehirnapoplexien im Kindesalter ausserordentlich selten sind und die Rückbildung derselben die Hauptveranlassung zu diesem Befunde abgibt.

Bei einer gelässen Meningealblutung oder einer eitrigen Meningitis theilnehmen sich gewöhnlich die nächstgelegenen Gehirnparttheen, und den Schluss dieser Veränderungen bildet dann die Sclerose. In diesen Fällen charakterisirt sie sich durch eine fast knorpelige Härte und eine schmutzig grangelfarbene Farbe, welche zwar hauptsächlich die graue Substanz ersetzt, aber auch die weisse nicht unberührt lässt. Mit der Infiltration des Gehirnes darf nicht verwechselt werden der Krebs, dessen Eigenschaften im folgenden Abschnitt erörtert werden sollen.

Es hat diese Hirnsclerose fast nur pathologisch-anatomisches Interesse, indem die dadurch erzeugten Symptome keineswegs charakteristisch sind und also am Krankenbett die Diagnose nicht möglich ist. Die dadurch bedingten Erscheinungen können sein: Epilepsie, Convulsionen, Lähmungen, Idiotismus und Neuralgien der verschiedensten Art, ohne dass man bei solchen Vorkommnissen deshalb zur Annahme einer Gehirverhärtung genöthigt wäre.

Die Behandlung muss natürlich eine symptomatische sein, denn eine Heilung der verhärteten Stellen gelingt meines Wissens niemals. Narcotica, Nertina und Roborantia werden je nach Umständen die Mittel sein, welche möglicher Weise noch einigen Nutzen schaffen könnten.

8) Neoplasmen des Gehirns.

Aufbildungen sind im Kinderlärne keineswegs eine seltene Erscheinung, was namentlich für den Tuberkel gilt. Ihre Folgen sind um so betrüfflicher, je grösser sie sind und je schneller sie wachsen. Durch den auf diese Weise entstehenden Druck auf die umgebenden Gehirnparttheen werden im Allgemeinen Volumszunahme der erkrankten Hemisphäre und Kreislaufstörungen, welche endlich zu Gehirnödemen oder Wassereffus in die Ventrikel führen, örtlich aber Erweichung

oder kleine Apoplexien der nächsten Umgebung veranlasst. Die verschiedenen Neoplasmen des Gehirnes sind nun ihrer Häufigkeit nach:

a) Der Tuberkel.

Die Zahl der grossen Tuberkel im Gehirn ist eine sehr beschränkte, indem deren gewöhnlich nur 2 oder 3, selten mehr als 5 oder 6 vorkommen. Je nach ihrer Zahl ist die Grösse verschieden, sie schwankt gewöhnlich zwischen einer Hasel- und einer Wallnuss. Wenn eine grössere Anzahl von Tuberkeln sich ausnahmsweise findet, so überwiegen sie die Grösse einer Erbsen nicht mehr. Die Gestalt nähert sich immer der runden oder ovalen, eine Lappung und Auszackung wird nur selten beobachtet, woraus hervorgeht, dass der Tuberkel wahrscheinlich schon im Entstehen einen gewissen Rann einnimmt und sich nachträglich nicht mehr vergrössert.

Man hat schon an allen Stellen des Gehirnes Tuberkel gefunden, doch ist nicht zu verkennen, dass er häufiger in der grauen Substanz sitzt als in der weissen, also entweder ganz an der Peripherie oder tief im Centrum, wo in den Streifen- und Sehhügeln viel graue Substanz vorhanden ist. Am seltensten kommt er vor in der Medulla oblongata, in der Scheidewand und in den Gehirnhörnern. Der periphere Tuberkel kann so oberflächlich gelagert sein, dass er die Gehirnhäute berührt und mit der Dura mater verwächst, wodurch eine Verwechslung mit Tuberculosis der Gehirnhäute, welche aber in dieser Weise gar nie vorkommt, möglich wird.

Untersucht man nun den Tuberkel selbst genauer, so zeigt er keine Verschiedenheit von den grossen käsigen Tuberkeln in den Bronchien oder auch in den Lungen. Auch hier besteht er wieder aus einer gelben, speckig-käsigen, zerbröckeligen Masse, die unter dem Mikroskop durchaus keine Zellenbildung, sondern nur amorphe Körnchen und Klümpchen, kurz lauter Detritus, erkennen lässt. Die nächste Umgebung ist stärker vascularisirt, die Verwachsung zwischen Tuberkel und Gehirnmasse ist keine innige, und man kann ohne besondere Geschicklichkeit und Mühe den ersteren vollkommen auslösen.

Die Art der Entstehung ist keineswegs klar, da man immer nur den fertigen gelben Gehirntuberkel findet und niemals graue, crude, halbdurchscheinende Granulationen, wie diese fast an jeder tuberculösen Lunge demonstrirt werden kann.

Rokitansky hat zwar hie und da einzelne Portionen des Tuberkels in diesem cruden, gallertartigen Zustand gefunden, glaubt aber, dass die Umwandlung jedenfalls sehr rasch vor sich gehen muss.

Gewöhnlich bildet der ganze Tuberkel eine homogene Masse ohne allen Unterschied in Consistenz und Farbe, doch kann man manchmal den Anfang einer Erweichung erkennen, wobei das Centrum verflüssigt oder selbst der ganze Knoten eine abgekapselte Caverne mit breiigen, eiterähnlichem Inhalt darstellt. Die hier vorkommende eitrige Masse unterscheidet sich mikroskopisch von wirklichem Eiter durch das Fehlen aller zellähnlichen Gebilde und die Gegenwart von einfachem Detritus. Da zur Verkreidung grösserer Tuberkelmassen stets ein Zeitraum von vielen Jahren gehört, so findet sich bei Kindern natürlich niemals ein verkreideter Tuberkel. Die gewöhnlichste Complication und zugleich

nächste Todesursache ist acute, miliare Tuberculose der Meningen mit acutem Hydrocephalus, welche durch eine directe Resorption vom ursprünglichen Tuberkel aus zu entstehen scheint. In zweiter Reihe sind Tuberculose der Bronchialdrüsen und Lungen zu erwähnen. Der Grund, warum bei Kindern grosse gelbe Gehirntuberkel öfter vorkommen als bei Erwachsenen, liegt darin, dass die höchst wahrscheinlich angeborenen oder bald nach der Geburt erworbenen Neubildungen wohl einige Zeit, selbst einige Jahre, ohne ausgesprochene Symptome verbergen bleiben können, dass aber der Tod eben doch gewöhnlich in den Kinderjahren noch erfolgt und also nur ganz ausnahmsweise bei einem Erwachsenen dieser anatomische Befund vorkommt. Die Gehirntuberkeln machen entweder gar keine oder doch keine anderen Symptome als die übrigen Neoplasmen des Gehirns, und es sollen, um Wiederholungen zu vermeiden, die sämtlichen hier vorkommenden Symptome am Schlusse dieser pathologisch-anatomischen Darstellung gegeben werden.

b) Krebs.

Gehirnkrebs ist, wie Krebs überhaupt, bei Kindern schon sehr selten; ich selbst habe erst in zwei Kinderleichen denselben gefunden. Nach Angabe aller Autoren ist die medulläre, zellige Form, der Markschwamm, vorherrschend, und der harte Pasterkreb kommt so gut wie gar nicht vor. Die Gehirnkrebse infiltriren entweder das Gehirn und gehen allmählig in die normale Gehirnmasse über, oder sie sind scharf abgegrenzt, von runder oder ovaler Form und lassen sich in diesem Falle vollkommen ausschälen. Gewöhnlich ist es eine Masse von ziemlichem Umfange und nur in einer Hemisphäre, doch werden auch Beispiele erzählt, wo verstreute Knoten im ganzen Gehirn vorgekommen sind. Eine Vorläufer für die graue Substanz, wie beim Tuberkel, existirt hier nicht. Diese Krebse, sowie auch die Sarkome, wachsen gewöhnlich sehr schnell, platten sich, am Schädeldache angelangt, etwas ab, können aber selbst den Knochen zum Schwund bringen und an der Kopfschwarte zum Vorschein kommen, oder sie wachsen längs der Sehnerven in die Orbits und ergreifen den Bulbus. Sie sind häufig im Gehirn primär und bleiben in denselben isolirt, ohne gleichzeitig in anderen Organen vorzukommen.

c) Echinococcus.

In der Literatur finden sich einige vereinzelte Beispiele von Blasenwürmern im Gehirn der Kinder. So wurde schon Echinococcus in Gestalt von kleinen und grösseren Blasen in der Hirnsubstanz gefunden, etwas häufiger kommt Cysticercus cellulosus vor, der meist auch zugleich in den Muskeln massenhaft vorhanden ist. Der Cysticercus findet sich nach Rokitsansky fast ausschliesslich in der grauen Substanz, und zwar vorzüglich in deren peripherischen Lagen, wo die Blasen dann über das Gehirnniveau vorragen und zum Theil die Meningen emporheben. Die Thiere können absterben und die Blasen verkalken, worauf man ein Krebselement in einem Balge eingeschlossen findet, das nur schwer von einem verkalkten Tuberkel unterschieden werden kann.

Symptome.

Es ist eine der unerklärlichsten Erscheinungen in der ganzen Pathologie, dass die Symptome dieser Gehirneoplasmen durchaus nicht constant sind, ja noch mehr, dass in einer grossen Zahl der Fälle gar keine Symptome beobachtet wurden. Sehr häufig erkranken scheinbar ganz normale Kinder an einem Hydrocephalus acutus der gewöhnlichen Art, erliegen demselben in 2–3 Wochen und man findet nun im Gehirn eine oder mehrere grosse, gelbe Tuberkel, die sogar in Erweichung begriffen sein können und jedenfalls viele Monate, vielleicht Jahre bestanden haben mögen. Kein einziges, auch nicht das leiseste Zeichen dieser grossen Veränderungen braucht bemerkt worden zu sein. In anderen Fällen freilich dauert ein deutlich ausgesprochenes Vorstadium wassererfüllt lange und es stellen sich überhaupt die Zeichen eines chronischen Gehirndruckes ein. Die Kinder verlieren den Appetit, erbrechen und bekommen halbseitige und doppelseitige Lähmungen. Die Sinnesorgane schwinden, es tritt Amaurosis oder Taubheit ein, heftige Kopfschmerzen, Krämpfe und Contracturen, die Symptome einer Meningitis machen gewöhnlich dem Leben ein Ende.

Bei den verschiedenen Carcinomen stellt sich meist starkes Kopfweh, dann Unruhe, Stottern, Schwächung der Sinnesorgane, vorwiegend abnorme Bewegungen, Ouanie, Krämpfe, Schlafsucht, Lähmungen und Erschöpfung ein. Bei den Blasenwürmern werden namentlich oft Epilepsie, Chorea und ausserdem die eben geschilderten Symptome beobachtet. Mit Bestimmtheit kann bei veränderten Gehirnsymptomen die Diagnose auf Cysticercus gestellt werden, wenn sich zugleich im übrigen Körper, in den Muskeln, im Auge, solche Blasen finden.

Die Neoplasmen des Gehirns liegen ausser dem Bereiche der Therapie und können höchstens eine momentane, symptomatische Behandlung erheischen.

9) Angeborene Bildungsfehler.

Ausser dem angeborenen Wasserkopfe und dem Gehirnsack, welche schon abgehandelt sind, kommen noch einige andere Hemmungsbildungen vor, welche jedoch, fast außer Menstruitäten, nur für den Anatomen und Embryologen Interesse haben.

Bei gänzlichem Mangel des Gehirnes haben wir die Acephalie, worunter man ein kopfloses Monstrum, meist mit Spina bifida, Ectopia des Herzens, Defekt der Lungen, Mangel einzelner Baucheingeweide und verkürzten Extremitäten versteht.

Hieran reiht sich der partielle Mangel des Gehirnes, welches entweder im Längen- oder Querdurchschnitt defekt sein kann. Hemicephalie. Es gibt verschiedene Grade dieses Zustandes. Es kann nur das ganze Gehirn fehlen und nur an der Schädelbasis ein kleines Rudiment sich finden, von welchem aus die Kopfnerven entspringen, oder es sind einzelne Gehirnthelle vollständig entwickelt, die Hemisphären fehlen aber gänzlich, dabei sind die Kopfknochen defekt oder höchst rudimentär gebildet und die Hirnhäute, ursprünglich zu einer wasserhaltigen Blase ausgedehnt, welche jedoch frühzeitig geplatzt ist, hängen als atrophische Fetzen über den unförmlichen Hirnmassen. Oder es fehlen nur kleinere Gehirnparttheien, z. B. die vorderen Lappen und die

Riechkolben, die Schlägel mit den Sehnerven, der Balken etc., mit einer entsprechenden Kleinheit oder Missbildung jener Gesichtstheile, welche zur Aufnahme der Sinneseindrücke gehören. Die Schädelknochen können in diesen Fällen, natürlich verhältnissmässig klein, vorhanden sein.

Von den Defekten im Längsdurchschnitte ist der bedeutendste die Einfachheit des Grosshirnes, verbunden mit Cyclopie, mit mangelhaftem Gesichte oder totalem Mangel desselben. Ferner kommt eine Verschmelzung der beiderseitigen Seh- und Streifenhügel und dem entgegengesetzt ein Mangel der Commissuren und die daraus hervorgehende Spaltung des Gehirnes vor. Die Bildung des knöchernen Gehäuses kann in diesen Fällen normal von Statten gegangen sein, es entsteht jedoch immer Idiotismus und mangelhafte Körperentwicklung.

Außer dem Fehlen einzelner Gehirnthelle kommt noch eine Kleinheit des gesammten, übrigens normal gebildeten Hirnes vor. *Microcephalia*. Das Schädeldach ist sehr niedrig, die Stirne flach und der Kopf spitz. Diese Kinder sind lebens- und entwicklungsfähig und bleiben, was sehr auffallend ist, auch in ihrer geistigen Entwicklung nicht besonders zurück.

Bildungsexcesse sind im Gehirne äusserst selten, und die mehrfache Spaltung der Lappen, welche hin und da vorkommt, ist auch vielmehr als *Formanomalie*, denn als Bildungsexcess zu betrachten.

B. Rückenmark.

1) Entzündung des Rückenmarkes und seiner Hülle. *Meningitis spinalis und Myelitis (ro arkhe, das Mark).*

Die Krankheiten des Rückenmarkes sind ein sehr dunkles Gebiet und das positive derselben, wenn man sich nur an die deutlich nachweisbaren pathologisch-anatomischen Veränderungen hält, in wenigen Zeilen wiederzugeben. Vor allem müssen bezüglich der viel missbrauchten Hyperämie alle jene Sectionsbefunde als ungültig ausgeschlossen werden, bei welchen die Leichen nicht bald nach dem Tode auf das Gesicht gelegt worden sind und die Section später als 24 Stunden nach dem Tode angestellt worden ist. Im entgegengesetzten Falle findet man nämlich bei jedem, auch dem normalsten Kinde, ausgebreitete Leichenhypostase, Imbibition von Blutfärbstoff und Fäulnisserweichung, wodurch eine Constatirung wirklicher Rückenmarkskrankheiten gewissernsmassen unmöglich gemacht wird.

Pathologische Anatomie.

Obgleich der pathologisch-anatomische Befund ein verschiedener ist, kann doch die Entzündung des Rückenmarkes und seiner Hülle in einen Symptomencomplex zusammengefasst werden, indem die Erscheinungen bei beiden Processen nahezu identisch sind und vom klinischen Standpunkte aus eine Differentialdiagnose demnach höchst schwierig und problematisch wird.

Der von der harten Hirnhaut gebildete Sack füllt den Kanal der Wirbelsäule nicht vollständig aus, sondern wird durch Fett, das sich

nach gegen die Wirbelbogen anhäuft, nach vorne gegen die Wirbelkörper durch lockeres Zellgewebe und rings herum durch Venengeflechte in dem Wirbelkanale fixirt. An der Innenseite dieses Sackes der Dura mater ist das äussere Blatt der Arachnoidea fest angewachsen, während deren inneres Blatt locker mit der Pia mater zusammenhängt. Zwischen diesem äusseren und inneren Blatt befindet sich nun die Cerebrospinalflüssigkeit, welche mit der der Gehirnhäute und Gehirnentrikel communicirt und bei kleinen Kindern schon gegen 4 Unzen betragen mag. Die Pia mater ist gefässreicher als die der Dura mater und lässt sich bei Neugeborenen leicht abziehen.

Nach dieser Recapitulation des normalen Verhaltens der Hirnhäute soll uns die Untersuchung der Hyperämien und Blutungen folgen. Die weichen Gehirnhäute, sowie die Venen an der Innenseite des Wirbelkanals sind bei kleinen Kindern immer strotzend von Blut, wenn man auch die Vorsicht gebraucht hat, sie bald nach dem Tode auf den Bauch zu legen, und es kommen auch gar nicht selten Extravasate vor, über deren genaueres Verhalten wir Weber in Kiel die meiste Aufklärung verdanken.

Es ist nicht immer leicht zu unterscheiden, ob ausserhalb der Dura mater befindliches Blut bei Lebzeiten extravasirt sei, oder ob es erst bei Hineingebung der Wirbelbogen aus durchgeschnittenen Venen sich auf die Dura mater ergossen habe. Vor Täuschung kann man sich dadurch am besten hüten, dass man keine langen Strecken der Wirbelbogen von oben bis unten auf einmal wegnimmt, sondern erst an verschiedenen Stellen des Rückgrates kleine Partien abnimmt, und dass man einen sanften Wasserstrahl auf die blutgelegte Dura mater wirken lässt. Das aus den Venen nach dem Tode ergossene Blut lässt sich ganz leicht weggeschwemmen, während das bei Lebzeiten extravasirte immer etwas geronnen ist und eingeklemmt an der Dura adhärirt. Diese Blutungen finden sich am häufigsten am Hals und in der Lendengegend, erstrecken sich bald auf kurze Strecken, bald sind sie so mächtig, dass der ganze Wirbelkanal von oben bis unten und rings herum mit einer Schichte geronnenen Blutes bedeckt ist. Kleinere Extravasate sieht man zuweilen deutlicher an den abgeklopften Wirbelbogen als auf der Dura mater, weshalb immer auch die Innenseite der ersten genau untersucht werden muss.

Ähnliche Blutungen, wie ausserhalb der Dura mater, kommt auch innerhalb dieses Sackes, zwischen Dura mater und Arachnoidea oder zwischen letzterer und Pia mater vor. Auch hier schwankt die Grösse des Extravasates zwischen der eines Stecknadelkopfes und einer solchen Masse, dass das ganze Rückenmark von Blut umgeben ist. Da die Dura mater keine grossen Venen hat, so ist auch hier der Irrthum einer erst bei der Section entstandenen Blutfärbung weniger leicht möglich.

Ausser diesen Blutungen, die, als höchste Grade der Hyperämie, gleich bei der Betrachtung der Entzündung eingeschaltet werden müssen, kommen auch wirkliche Exsudationen auf und unter den Hirnhäuten vor.

Zwischen Dura mater und kolchernem Wirbelkanal findet sich schon im Normalzustand in dem lockeren Zellgewebe etwas Serum, dasselbe kann aber pathologisch beträchtlich zunehmen und als sahpige Masse grosse Strecken der harten Hirnhaut bedecken, sowie auch an

der Innenfläche der abgenommenen Wirbelbogen adhären, bei größeren Kindern findet sich nach Traumen oder bei Spondylitis auch eine sichtliche Trübung und Verdickung dieser Haut und Auflagerung eines plastischen, fibrinösen Exsudates.

Nach Eröffnung der harten Hirnhaut findet sich bei allen Kindern eine ziemliche Menge von Cerebrospinalflüssigkeit, welche normal von hellgelber Farbe und vollkommener Klarheit ist, bei Erkrankung der weichen Häute aber trüb, flockig oder blutig wird. Eine blutige Färbung findet sich namentlich bei Kindern, welche während einer Puerperalfebrers epidemie an Pyämie zu Grunde gegangen sind. Diese flüssigen Exsudate folgen natürlich immer dem Gesetze der Schwere und finden sich an der am tiefsten gelagerten Stelle, wie bei geschlossenenem Sack der Dura mater durch Auf- und Abwärtsheben der Leiche demonstrirt werden kann. In seltenen Fällen kommt auch hier neben flockiger Cerebrospinalflüssigkeit eine fibrinöse Ablagerung auf der Pia mater vor, welche entsprechend der eitrigen Meningitis auch eitrig zerfallen kann. —

Das Rückenmark selbst ist bei diesen Veränderungen seiner Hülle gewöhnlich erweicht oder erodirt. Uebrigens ist es sehr schwierig, das Rückenmark eines Kindes zu untersuchen und je nach dem Wasserstande, welcher der Messerklinge begegnet, eine Erweichung oder Sclerose zu diagnosticiren, indem das Rückenmark überhaupt so weich und dünn ist, dass nur ein Minimum von Kraft dazu gehört, es zu zerschneiden. Wo die oben beschriebenen Veränderungen der Rückenmarkshäute zu Stande gekommen sind, da wird in der That an einzelnen Stellen des Markes selbst die rothe Erweichung beobachtet. Die auffälligste Veränderung des Markes findet man bei einem gekrümmten Pottischen Buckel, wo in Folge der Zerstörung mehrerer Wirbelkörper eine Wirbelkriechung des Wirbelkanals und Rückenmarkes selbst sich ereignet hat. An der gekrümmten Stelle ist das Mark abgeflacht, dach und in der Regel etwas gelber oder rüthlicher gefärbt als die übrige Substanz, selbst völlige Unterbrechungen desselben sind schon beobachtet worden.

Symptome.

Die Blutungen und Entzündungen im Innern des Wirbelkanales bieten bei Neugeborenen keine charakteristischen Symptome, indem die tonischen und klonischen Krämpfe, welche hierbei beobachtet werden, auch viel häufiger ohne alle nachweisbaren Veränderungen des Rückenmarkes vorkommen. Am deutlichsten kann man die hierher gehörigen Symptome bei Kindern mit Spina bifida, deren Sack geplatzt oder brandig ist, beobachten. Solche Kinder bekommen intermittirende Krämpfe der Rückenmuskeln, welche bald vorübergehend sind und in leichter Steifheit der Muskeln bestehen, bald zu dem heftigsten, anhaltenden Opisthotonus ausarten. Dabei ist die Berührung der Wirbelsäule immer schmerzhaft und erzeugt neue Krämpfe, weshalb man gut thut, solche Kranke stets auf die Seite zu legen. Auch die Berührung bei noch nicht gelähmten unteren Extremitäten verursacht Schmerzen, welche auf Bewegungen noch zunehmen. Endlich tritt Lähmung der unteren, dann auch der oberen Extremitäten ein, die zuweilen auch mit convulsivischen Erschütterungen abwechseln, und nach einigen Tagen erfolgt unter Trismus und Tetanus der Tod.

Bei älteren Kindern sieht man deutlich ausgesprochene Spälsymptome nach Caries der Wirbelsäule mit ihren consecutiven Krämpfen und nach Scharlach oder Typhus, auf welche Krankheiten zweifel complete Lähmungen der unteren Extremitäten zurückzuführen. Die Kinder beschreiben ganz deutlich zuerst eine Veräubung und verminderte Empfindlichkeit, klagen übrigens zu gleicher Zeit über häufige Schmerzen bei stärkerer Berührung oder Bewegung, worauf sich zwei convulsivische Zuckungen, bald aber totale Lähmung der Beine zeigen. Zu Anfang verläuft der Process fieberhaft mit frequentem Puls und Temperaturerhöhung, die besonders am Rücken deutlich bemerkbar ist. Das Fieber lässt gewöhnlich bald nach, die Lähmung besteht aber viele Monate, ja das ganze Leben hindurch fort. Seltener Erscheinungen hierbei sind: Störungen der Hautsensibilität, Schlingenschwierigkeiten, Herzklopfen, Anfälle von Dyspnoe, Singultus, Priapismus etc.

Wir handeln hier von den Krämpfen und Lähmungen abstrahirend, weil diese Symptome ohne alle nachweisbaren Veränderungen im Rückenmark noch viel häufiger sind und bei ihrer praktischen Wichtigkeit noch in einigen Abschnitten besprochen werden sollen.

Das Vorkommen der Rückenmarksentzündung ist fast lediglich sporadisch, doch kamen auch West auch Epidemien vor. West spricht namentlich von solchen in einzelnen Gegenden Frankreichs während der Jahre 1842 bis 1844 und in neuerer Zeit in den Spinnern und Arbeitshäusern Irlands. In den letzten Jahren trat sie in Süddeutschland ziemlich häufig auf und wurde unter dem Namen Meningitis cerebrospinalis oder Genickkrampf vielfach beschrieben. Obwohl sich in dem Leichen bedeutender seröser Ergüsse zwischen der Rückenmarkshäuten fand, so war das Rückenmark selbst doch sehr und nur wenig verändert. Die Krankheit verlief sehr acut und tödtete in 1—4 Tagen.

Bezüglich der Differentialdiagnose zwischen Entzündung des Rückenmarks und der einer Hämie hat man geltend gemacht, dass die erste chronisch, fieberlos und mit vorwiegender Lähmung verlaufe, während die letztere mit stürmischen Symptomen, heftigem Fieber und allgemeinen Convulsionen beginne, worauf dann erst später Lähmung eintrete. Wie schon oben bemerkt, verlaufen fast regelmäßig beide Erkrankungen, mehr oder weniger ausgebildet, neben einander, und es ist deshalb unmöglich und wohl auch nutzlos, differentielle Zeichen aufzusuchen.

Therapie.

Eine antiphlogistische, schulgerechte Behandlung dürfte nur in den seltensten Fällen anwendbar sein. Entweder sind die Kinder zu klein, indem gerade Neugeborene an Myelomachitis leiden, oder sie sind, wenn auch an Jahren vergerticket, durch die vorausgegangenen, die Rückenmarkskrankheit bedingenden Prozesse, als Spondylarthritis, Scharlach oder Typhus, in einem Ernährungsstadium, der ebenfalls eine Antiphlogose nicht nützt. Fieber und Convulsionen wollen zu Anfang der Krankheit am besten mit kleinen Dosen Calomel behandelt. Sind die ersten stürmischen Symptome beseitigt, so gilt es häufig ein Inf. flor. Arnicæ, ohne dass jedoch eine deutliche Wirkung davon gerühmt werden könnte; die gewöhnlich zurückbleibenden Läh-

ungen bieten keine sehr ungünstige Prognose, indem bei zunehmenden Körperkräften wenigstens Besserung, wenn auch nicht vollkommene Heilung eintritt. Ein wichtiges Adjuvans ist die kalte Douche auf den Rücken und die vorsichtige Darreichung von Strychnin, nitric; mit welchem Mittel man auch bei grösseren Kindern nie über 0,006, höchstens 0,010 pro die steigen soll, indem sonst plötzlich ernstliche Vergiftungssymptome, tetanische Zuckungen und Delirien eintreten können. Die Urinsekretion muss stets genau überwacht werden, und der Catheter in Anwendung kommen, wenn länger als 12 Stunden kein Urin entleert worden ist.

2) Spina bifida. Hydrorrhachis. Hiatus spinalis congenitus.

Unter Hydrorrhachis versteht man eine angeborene Geschwulst, welche sich an der Wirbelsäule und zwar meistens an deren Sacraltheil zeigt und von einer Ausstülpung der Rückenmarkshäute durch eine Knochenlücke des Wirbelkanals herrührt.

Pathologische Anatomie.

Man kann mehrere Grade dieses Bildungsfehlers unterscheiden, welche sich am Knochen folgendermassen charakterisiren:

Es ist entweder die ganze Wirbelsäule gespalten oder es findet sich der Bildungsfehler nur an einem oder einigen Abschnitten derselben. Eine totale Spaltung der Wirbelsäule kommt nur bei Monstrositäten, Hemicephalen u. dgl. vor und gehört deshalb nicht in das Gebiet klinischer Untersuchung, die mangelhafte Beschaffenheit einzelner Wirbel jedoch bedingt keine absolute Lebensunfähigkeit und muss deshalb näher erörtert werden. Auch hier sind wieder gewisse Abstufungen der Knochendefecte zu bemerken. Bei dem geringsten Grade des Uebels sind die Bogenhälften des Rückgrates vollkommen entwickelt und nehmen auch eine fast normale Stellung ein, nur sind die Processus spinosi nicht vereinigt und lassen eine enge Spalte zwischen sich. In einem höheren Grade sind die Bogenhälften unvollkommen, indem einige Dornfortsätze ganz fehlen und so eine breite Spaltung bedingen. In einem noch höheren Grade sind auch die Wirbelkörper getrennt und es findet sich dann eine durch die ganze Dicke der Wirbelsäule durchgehende Spalte. Im höchsten Grade endlich haben wir neben einer durchgehenden Spalte einen Defekt einiger Wirbelhälften, so dass von einzelnen Wirbeln nur Rudimente vorhanden sind.

Untersucht man nun die Geschwulst selbst, so findet man den Sack gebildet entweder aus Dura mater und Arachnoidea, oder es ist die erstere Haut nur durchlöcheren, und es stülpt sich die letztere als ein Sack aus dieser so entstandenen Oeffnung der harten Haut heraus. Die darüber liegende Cutis ist entweder von normaler Beschaffenheit, oder sie ist atrophisch, halb durchscheinend, oder sie fehlt gänzlich, wobei natürlich die dünne Arachnoidea schon im Uterus oder während der Geburt platzt und in losen, schwarzen Fetzen an der Peripherie der Spalte hängt. Die Geschwulst ist bei erhaltenen Hüllen im Leben ziemlich prall und fluctuirt, in der Leiche collapsirt sie und der Sack wird schlaff. Ihr Inhalt ist reiner Liquor cerebrospinalis. Die Grösse

und Form der Geschwulst ist sehr verschieden, bald ist sie so klein, dass sie nur dem Gefühle, nicht dem Gesichte erkennbar ist, bald erreicht sie die Grösse eines Hühnerkies. Die gewöhnlichste Stelle für die Spina bifida ist die Lendengegend, doch hat man schon an jedem Wirbel Spaltung beobachtet. Das Rückenmark ist dabei entweder ganz intact, oder es kann auch, wenn die Geschwulst tief unter an dem Lendenwirbel sitzt, sich bläschenförmig in den Wandungen des Sackes verbreiten.

Symptome.

Mit der Schilderung des pathologisch-anatomischen Befundes sind auch die Symptome schon ziemlich erschöpft. Die Gestalt der Geschwulst ist ei- oder birnförmig, zuweilen kann man einen dünnen Stiel unterscheiden. Die Haut darüber ist meist missfarbig, rötlich violet, auch findet man deutliche, sternförmige Narben in Mitten der Geschwulst, wobei dieselbe mehr abgeflacht ist. Diese Narben rühren höchst wahrscheinlich von einer Zerreissung des Sackes während des Fötallebens her. Das flüssige Medium, in welchem sich der Fötus befindet, ermöglicht nach Abnahme der Spannung eine Wiederverwachsung der geborstenen Stelle und daher die vorbige Einziehung.

Drückt man mit dem Fingern auf die Geschwulst, so wird sie etwas kleiner, wenn noch ein zweiter Sack an der Wirbelsäule oder ein gleichzeitiger Hydrocephalus congenitus externus besteht, so bemerkt man dafür ein Prallwerden an diesem Theile. Uebrigens ist jeder Druck, sogar schon die Berührung der Geschwulst schmerzhaft und veranlasst sehr gewöhnlich tetanische Zuckungen. An grossen Geschwulsten mit atrophischer Hautdecke ist zuweilen auch die Respiration sichtbar, die Geschwulst nimmt bei der Expiration zu und bei der Inspiration wieder ab. Untersucht man die Ränder der Geschwulst mit dem Finger genauer, so findet man deutlich die Spaltung der Wirbel, den oberen und unteren Winkel der Spalte und die myrthenblattförmige Erweiterung gegen ihre Mitte.

Was die übrigen körperlichen Verhältnisse betrifft, so werden diese Kinder meist lebend geboren, bleiben aber nur in ganz seltenen Fällen länger als einige Tage am Leben. Die Geschwulst platzt oft schon während der Geburt, zuweilen wird sie ohne geplättet zu sein heudig und nur ganz ausnahmsweise bleibt die über ihr befindliche Haut normal und verdickt sich auch und nach. Kommt Luft in die Geschwulst, also namentlich wenn der Sack platzt oder heudig wird, so tritt eiterig jauchige Meningitis und in kurzer Zeit der Tod ein. Wenn die Haut normal bleibt und die Geschwulst ursprünglich nicht sehr voluminös war, so können die Kinder möglicher Weise geheilt, doch treten auch hier noch später Lähmungen der Beine, des Mastdarms oder der Blase und in Folge davon ein frühzeitiger Tod ein. Einzelne Fälle werden in der Literatur erzählt, wo solche Individuen mit verhältnissmässigem Wohlbefinden 20–30 Jahre gelebt haben. Bei den höheren Graden besteht übrigens dieser Bildungsfehler so selten isolirt, gewöhnlich sind damit andere bedeutende Fehler, als Hydrocephalus congenitus, Ectopie der Blase, des Herzens, Klumpfüsse etc. verbunden.

Was die Häufigkeit betrifft, so hat sich herausgestellt, dass nach

einer statistischen Zusammenstellung von Chaussier in der Pariser Maternité auf 1000 Kinder eines mit Spina bifida kommt.

Verwechslungen mit anderen ähnlichen Geschwülsten sind nicht leicht möglich, weil man die nicht geschlossenen Wirbelbögen bei jeder wahren Spina bifida leicht durchfühlen kann. Als einzelne Karikaturen werden in der Literatur Fälle von angeborener Hernia dorsalis, von Cysten, Fett- und Honiggeschwülsten, welche auf der Wirbelsäule aufsaßen und allenfalls zur Annahme einer Hydrorrachis verleiten konnten, erzählt. Die überaus seltene Latratofatie, foetus in foetu, wo am Kreuzbein eine unförmliche grosse Geschwulst mit einzelnen Knochen und grossen Gefässen sitzt, hat natürlich mit unserem Zustande gar keine Ähnlichkeit.

Therapie.

Die Chirurgen haben schon die verschiedensten Methoden versucht, die Geschwulst zu verkleinern und den Wirbelkanal zum Verschluss zu bringen. Das fast regelmässige Misslingen dieser sämtlichen chirurgischen Eingriffe hat seinen Grund darin, dass eben die Innenwand des zu operirenden Sackes die Arachnoidea spinalis ist und dass alle Reizungen derselben eine Meningitis veranlassen, deren Localisation auf den Sack durch kein Mittel erzielt werden kann.

Man hat die Geschwulst mit dem Explorativtroikart und mit vieler Nähnadelstichen unter Verschiebung der Cutis punktiert. Gaupp stellte erst vor Kurzem einen 7jährigen Knaben vor, dessen kindskopf-grosse Hydrorrachis er in den ersten Lebenswochen durch 5maliges Punkturen geheilt hat. Nach der ersten Punktion war die Spaltung der Wirbelsäule deutlich zu fühlen; dasselbe schloss sich jedoch sehr rasch, so dass nach 10 Wochen ein vollständiger Verschluss eingetreten war. Alle den Wirbel constituirenden Theile sind bei dem Knaben nun vorhanden, nur sind die Darmfortsätze an den betreffenden Wirbeln etwas platter. Man hat die Excision mit darauffolgender umwickelungsmässiger Naht gemacht und auch die seitliche Compression durch eine Foderkiste oder hölzerne Stäbchen versucht. Chassaignac hat die Hydrorrachis mit Punktion und darauffolgender Jodinjektion nach Art der Hydrocele behandelt und bei gestiehrter Geschwulst hat man auch schon die Abbindung unternommen. Endlich hat man einen anhaltenden Druck auf die Geschwulst mittels eines Haarklebens ausgeübt, wodurch wohl heftige Schmerzen und convulsivische Zuckungen ausstiegen, aber keineswegs Heilung erzielt wird.

Sämtliche Experimentatoren gestehen, dass alle ihre Bestrebungen mit ganz wenigen Ausnahmen erfolglos blieben, ja noch mehr, dass unmittelbar nach dem chirurgischen Eingriff die meningitischen Symptome eintreten, die alsbald den Tod zur Folge hatten. Allerdings ist die Prognose bei Hydrorrachis sehr ungünstig und es sterben auch die meisten Kinder, die keine chirurgische Behandlung erfahren, doch führen noch statistische Zusammenstellungen hinüber, was bei der Seltenheit des Uebels leicht erklärlich ist.

Mir scheint eine mögliche Schonung der den Sack bildenden Otis das rationellste zu sein und es ist in dieser Beziehung am gerathensten, den Sack mit einer gepolsterten, nur mit den Rändern anliegenden Hohlkugel vor äusseren Verletzungen zu schützen und diesen

Schild mittelst weicher Cautschukbinden zu fixiren. Ist die Hydrocränelle mit Hydrocephalus congenitus combinirt, was dies eben häufig vorkommt, so darf gar kein anderes Verfahren, als das letzt beschriebene eingeschlagen werden, indem durch jede Verkleinerung und Compression am Rücken eine grössere Spannung im Innern des Kopfes erzeugt würde.

C. Störungen der Nervenleitung.

Es kommt hier eine Reihe von Nervenkrankheiten in Betracht, welche höchst wahrscheinlich ebenfalls nur Symptome gewisser Veränderungen des Gehirnes und Rückenmarkes sind, wie aus der Analogie der einzelnen Erscheinungen ziemlich bestimmt hervorgeht. Die entsprechenden morphologischen oder chemischen Veränderungen der Centralorgane konnten aber bisher noch nicht nachgewiesen werden, was auch dadurch erschwert ist, dass die meisten dieser Nervenkrankheiten durchaus nicht tödtlich endigen, sondern nur hin und da einmal unfällig eine Section ermöglicht wird.

Da der Nachweis der centralen Prozesse noch nicht gelungen ist, so bleibt nichts anderes übrig als Gehirn und Rückenmark vorerst als normal anzunehmen und die einzelnen Nervenerscheinungen mit ihnen hergebrachten Beziehungen symptomatisch zu schildern.

1) *Eclampsia infantum*. Die Fraisen.

Die Fraisen spielen in der Pädiatrik von jeher eine grosse Rolle und sind auch den Laien sehr bekannt, wober es auch kommt, dass sie mit einer Menge Namen bedacht worden sind. Die Kopffraisen, die stille Frau, der stille Jammer, das Gefräsich, die Krämpfe, die Schauerchen, die Gichter, sind lauter populäre Bezeichnungen für ein und dasselbe Uebel, nämlich für allgemeine oder partielle, elektrische Muskelzuckungen, welche entweder nur einmal oder öfter nach einander auftreten und fast immer durch eine andere, fieberhafte Krankheit bedingt sind oder eine solche einleiten. Das Bewusstsein ist vollständig oder nahezu verschwunden, besonders wenn die Convulsionen allgemein sind. Der einzelne Anfall kann von einem epileptischen nicht unterschieden werden, nur der chronische Verlauf und die unerwartet, fieberlose Wiederkehr charakterisirt die Epilepsie. Von der Chorea unterscheidet sich die Eclampsie dadurch, dass bei der letzteren die Muskelcontractionen den ganzen Tag durch unangesezt währen, das immer mehrere Wochen vergehen, bis dieses Uebel gehoben wird und das Allgemeinbefinden dabei nicht getrübt ist.

Was den Zeitraum betrifft, in welchem die Fraisen am häufigsten auftreten, so ist die erste Kindheit bis zur Vollendung der ersten Dentition das gewöhnlichste Alter hierfür, doch bekommen auch noch ältere Kinder, welche schon in dieser Zeit an Eclampsie gelitten haben, bei dem Beginn eines akuten Exanthemes, selbst einer Angina oder gar einer einfachen Magenüberladung heftige Convulsionen. Die heftigsten partiellen Zuckungen sind meist mehrere Tage anhaltend und kommen besonders bei ganz kleinen Kindern in Folge von Verdauungsstörungen vor, die allgemeinen Convulsionen, für welche allein eigentlich der

Nam: Eclampsie gebraucht werden sollte, sind natürlich nicht anhaltend, sondern die ganze Affection ist entweder mit einem einzigen Anfalle beschlossen, oder es ist zwischen den einzelnen Paroxysmen doch stets ein längeres Intervall.

Die leichtere Form, wie sie hauptsächlich bei Kindern unter einem Jahre beobachtet wird, ist durch folgende Symptome charakterisirt: das Kind schläft mit halb geschlossenen Augenlidern und nach oben gerollten Augäpfeln, so dass man zwischen der Lidspalte lediglich die weisse Sclera vorbeifahren sieht. Die Gesichtsmuskeln contrahiren sich im Schlafe mannigfaltig, wodurch es den Anschein haben kann, als ob die Kinder lächeln (*risus sardonicus*), oder wie einige heilsuchende Wüchserinnen auch sagen: „Das Kind spielt mit den Engeln“. Das Athmen geschieht schnell und regelmässig, bald oberflächlich, bald wieder in tiefen Seufzern, die Glieder machen leichte Zuckungen, die Händchen sind zu Fäusten mit eingeschlagenen Daumen geballt und die Beine mit gespreizten Zehen an den Leib gezogen.

Aus einem der Art unruhigen Schlafe wachen die Kinder zum erschreckt mit Geschrei oder Wimmern auf und suchen aufgeweckt durch Stampfen mit den Beinen, Krümmen und Winden des ganzen Körpers ihr Unbehagen zu erkennen zu geben.

Nach Abgang von Blähungen, grösserer Menge grünen, schleimigen, übelriechenden Stuhles, oder nach Erbrechen tritt in der Regel Ruhe und allgemeiner Schweiss ein, die Nachtrahe aber kehrt in vielen Fällen für diese Nacht nicht wieder.

Dieser Zustand kann mehrere Tage dauern und sich täglich mehrmals nach kurzen Pausen wiederholen, wobei die Kinder meist febern und zum Theil in Folge mangelhafter Ernährung, zum Theil auch wegen des anhaltenden Muskelzuckens im Gesichte sichtlich abmagern, scharfe Gesichtszüge und eine spitze Nase bekommen.

Die schwerere Form, die wirkliche Eclampsia infantum, gibt sich folgendermassen zu erkennen.

Nicht leicht stoßen sich die schweren Symptome gleich in ihrer ganzen Heftigkeit ein, sondern in den meisten Fällen geht ihrem Ausbruche das oben beschriebene Krankheitsbild voraus, welches sich nach dem vorgerückteren Alter der Kinder etwas modificirt. Sonst gesunde, freundliche Kinder werden eigensinnig, mürrisch, jähzornig, sie bekommen leichte Zuckungen im Schlafe, knirschen auch mit den Zähnen und werden erschreckt mit angstlichem Geschrei auf. Die Augen werden dabei nach oben gerollt, die Augenlider sind nicht vollkommen geschlossen, die Mundwinkel zu einem unheimlichen *risus sardonicus* verzogen und das Allgemeinbefinden ist immer etwas gestört. Plötzlich werden die Kinder ebenso im Schlafe als im wachen Zustande von einem Paroxysmus befallen, der für sich allein betrachtet in keiner Weise von einem epileptischen zu unterscheiden ist.

Sie verlieren mit einem Male das Bewusstsein gänzlich, der Blick wird starr, ausweilen stellt sich Schielen ein oder die Bulbi rollen umher. Die Gesichtsmuskeln gerathen in die mannigfachsten Zuckungen, wodurch bald eine lächelnde, bald eine grölende Miene entsteht, die durch Entblosung der Zähne selbst etwas übernatürliches annehmen kann. An den Kiefern kommen kräufelnde, schnappende Bewegungen vor, von Zähneknirschen begleitet. Auf eingegossene Flüssigkeiten

folgen nur höchst unvollständige Schlingbewegungen und das Kind wird wieder zum Munde herausgeschoben. Die Convulsionen laßen sich fast sämtlicher Muskeln des ganzen Körpers bemächtigt. Die Rückenmuskeln sind tonisch contractirt oder befinden sich in tetanischen Zuckungen, an den Extremitäten kommen schlagende, stossende, drehende Bewegungen vor, die Respiration aber wird sehr unregelmässig und kann durch Krampf der Stimmritze auch vollständig sistiren. Es tritt dann auf einige pfeifende Inspirationen plötzlich Stillstand der Athembewegungen, beträchtliche Cyanose und, wenn der Krampf sich nicht in wenigen Minuten löst, der Tod ein. Durch die behinderte Circulation entstehen auch Schleimbildungen aus Mund und Nase, der blutige Schaum jedoch, der sich gewöhnlich vor den Lippen findet, rührt öfter von mechanischen Verletzungen der Zäpe oder Mundschleimhaut her, zu welchen bei den schnappen, heissen den Kieferbewegungen und den mannichfachen Versuchen der Umgehung, dieselben zu behindern, Gelegenheit genug gegeben ist. Der Herzmuskel contractirt sich sehr schnell, jedoch unrhythmisch. Stuhl und Urin gehen häufig unwillkürlich ab. Die Hauttemperatur ist am Rumpfe normal, an den Extremitäten eher vermindert, gegen Ende des Anfalles bricht gewöhnlich ein Schweiss aus. Die Sensibilität der Haut ist so vollkommen verloren gegangen, dass man auf keine, auch nicht die schmerzhafteste Weise, die Kinder zu Bewusstsein bringen kann und sie sich durch ihre convulsivischen Bewegungen oft verletzen, ohne es zu empfinden.

Es ist hier eine Beschreibung von Symptomen angegeben, die kaum jemals alle bei einem einzigen Anfalle beobachtet werden, sondern von denen immer einige ausbleiben können, ohne dass deshalb der Anfall ein leichter oder unvollständiger genannt werden müsste.

Die Dauer eines solchen eclamptischen Anfalles währt nur einige Secunden, höchstens Minuten, Anfälle, die diese Zeit um vieles übersteigen, beruhen auf materiellen, grösseren Veränderungen des Gehirns und sind von der Eclampsie zu trennen. Nach Beendigung der Krämpfe tritt durchaus wieder ein Zustand ein, wie nach einem epileptischen Anfalle. Die Kinder bleiben halb comatös, erschlaßt, das Fieber nimmt zu, die Augen werden injicirt, Gehirnsymptome treten auf, der Appetit ist verschwunden und Säuglinge nehmen nicht einmal die ihnen gebotene Brust.

Früher, wo man mit der antiphlogistischen Behandlung bei Kindern noch beträchtlich freigebiger war, unterschied man aus theoretischen Gründen eine Eclampsia cum Hyperaemia und cum Anæmia, bei der ersteren liess man zu Ader und setzte noch reichlich Blutegel, bei der letzteren nicht. Jetzt wo die Blutentziehungen viel weniger in Anwendung kommen, hat diese Unterscheidung nur noch insofern Werth, als wir daraus lernen, dass ebenso gut blass anämische, wie rothbackige blutreiche Kinder von diesen Convulsionen befallen werden können.

Theoretisch unterscheidet man ferner 1) idiopathische, d. h. direct vom Gehirn ausgehende und 2) dæteropathische, oder sympathische, d. h. von einem anderen erkrankten Organ auf das Gehirn reflectirte Eclampsien. Praktisch ist diese Unterscheidung oft unmöglich und man löst selbst nach längerer Beobachtung in

Unklaren, mit welcher Art von Eclampsie man es zu thun hatte. Die Section allein kann dieses Dunkel lichten.

Aetiologie.

1) Die idiopathische Eclampsie kann bedingt sein durch mechanische Compression des Kopfes während der Geburt, durch anatomisch nachweisbare Veränderungen im Gehirn, namentlich Tuberculosis, oder durch direct auf das Gehirn wirkende Nahrungsmittel und Medicamente, Spirituosa und Narcotica, auch durch Samenstich. Kinder mit wölkem Hinterkopf, dessen genauere Beschreibung bei der Rachitis folgen wird, sind mehr als andere zu Frällen geneigt, welche auch auf einen directen Gehirnreiz durch Druck von aussen entstehen können. Geistige Ueberanstrengung wird auch unter den Ursachen angeführt, gehört aber jedenfalls zu den allergeringsten, eher dürfte nach heftiger Schrecken, grosse Angst und Anstreiche von Jähren erwähnt werden.

2) Die dysteropathische oder sympathische Eclampsie ist bei weitem die häufigere Form, und zwar ist der Darmkanal dasjenige Organ, von welchem aus ein häufigster Reflexkrampf ausströmt. Die enorme Reizbarkeit desselben bietet in allen Lebensaltern hierzu reichlich Gelegenheit. Schon gleich zu den ersten Tagen nach der Geburt kann Zurückhaltung des Meconiums sie veranlassen, wobei jedoch immer auch an mechanische Beleidigungen des Kopfes während des Geburtsaktes gedacht werden muss.

Eine eigenthümliche, chemisch noch nicht erklärte Veranlassung ist ferner die Milch einer Amme, welche kurz vorher einer heftigen Gemüthsbewegung ausgesetzt gewesen ist. Es sind Fälle constatirt, dass vorher ganz gesunde Kinder nach Genuss einer solchen Milch einige kurze aber heftige Zuckungen bekamen, plötzlich starben und bei der Section durchaus keine anderen Ursachen entdecken liessen. Im Verhältnis zu den ausserordentlich vielen Ausleichen von Zorn und anderen Gemüthsbewegungen, die grössten Theils in der ungewohnten socialen Stellung der Amme ihren Grund haben, sind diese Fälle jedoch so selten, dass man sie nicht mit Unrecht ganz bezweifelt hat. Nicht zu bezweifeln hingegen sind die durch die künstliche Ernährung gegebenen Schädlichkeiten, wodurch alldah Darmcatarrhe und in deren Gefolge leichtere und schwerere Hirnreize eintreten müssen. Am intimsten werden dieselben zur Zeit des Entwählens beobachtet. Solche Kinder leiden zuerst an Flatulenz und Colik, bekommen dann übelriechende Diarrhöe von grüner Farbe, erbrechen, werden sehr unruhig, fiebern, und nach und nach stellen sich Convulsionen ein. In anderen Fällen geht gar keine Diarrhöe, sondern im Gegentheil Verstopfung und Appetitmangel voraus. Bei älteren Kindern sind namentlich Indigestionen und Wurmerreuz auszuführen.

Eine weitere, wohl zu bewahrende Ursache findet sich im Durchbruch der Zähne. Allerdings ist dieser Process in der Regel mit Verdauungsstörungen complicirt und können auch diese als nächstes Moment für die Convulsionen angegeben werden. Allein es gibt auch Fälle, wo die Verdauung ganz normal bleibt und durch die Entzündung der Mundschleimhaut allein die Reflexkrämpfe erklärt werden müssen. Zur Constatirung dieser Form müssen die Kinder in einer der fünf

Zahnperioden sich befinden, die Mundhöhle ist dabei roth und leise, die Schleimsecretion ist oft geringer als bei der normalen Zahnung, die eine oder andere Wange ist dunkel geröthet, die Kinder sind sehr unruhig und heissen auf alles, was sie in den Mund bekommen, auch in die Brustwarzen der Ammt. Es gehören die durch Zahnen entstandenen Eclampsien zu den schweren Formen, welche oft partielle Lähmungen oder Bösleim zurücklassen.

Eine dritte Hauptveranlassung der Convulsionen findet sich im Ausbruch einer acuten, fieberhaften Krankheit, namentlich eines acuten Exanthemes, wobei die Krämpfe der Kinder als ein Analogon des Fieberfrostes Erwachsener erscheinen. Diese Eclampsien sind mit der geringsten Gefahr verbunden, von kurzer Dauer und kann niemals von schädlichen Consequenzen. Man kann diese Ursachen mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit vermuthen, wenn Ausschlagskrankheiten, welche das betreffende Kind noch nicht durchgemacht hat, eben epidemisch herrschen und die Vorboten eines solchen Exanthemes sich eingestellt haben. Es gehören hieher für die Masern: Husten, Niesen, Thränen der Augen, für Scharlach: Angina mit Schlingbeschwerden, für die Blattern: vorherrschender Kreuz- und Kopfschmerz und heftiges Fieber. Häufig aber sind gar keine Vorboten vorhanden, und man kann erst durch den Verlauf erkennen, wodurch die Eclampsie bedingt worden ist. Ausser dem acuten Exanthemen sind noch unter den acuten Krankheiten zu erwähnen die Pneumonie, das Wechselfieber, die Fieber in Folge von Verwundungen und Operationen und die einfachen Anginen. Ich behandelte einen Knaben, dessen Mutter von schwächlicher Constitution ist und viel an Cephalalgien leidet, jährlich 2–3 Mal an heftiger Angina, wobei sich regelmässig am ersten Tag der Eckrankung ein von Epilepsie nicht zu unterscheidender, eclamptischer Anfall einstellte. Ich extirpirte endlich beide Mandeln und die Eclampsie, oder nach der Meinung der tief bekümmerten Eltern die Epilepsie, ist nun seit zwei Jahren niemals wiedergekehrt.

Endlich sind in der Literatur, namentlich der älteren, auch Fälle verzeichnet, wo nach rascher Heilung stark nässender Ausschläge Eclampsie entstanden sein soll. Bei der Behandlung des Hydrocephalus acutus wurde schon auf den Zusammenhang zwischen dieser Krankheit und nässenden Kopfausschlägen aufmerksam gemacht, und es ist nicht zu ängsten, dass bei schnell heilenden äusseren Eiterungen die inneren Organe, somit auch das Gehirn, in die Gefahr einer Entzündung kommen. Andererseits muss aber freilich auch anerkannt werden, dass viele Hunderte von Impetigo theils sponta, theils durch austrocknende Mittel schnell abklingen und die Kinder nach wie vor vollkommen gesund bleiben.

Die Erbllichkeit spielt eine gewisse Rolle bei der Aetiologie dieser Krankheit. In der Regel haben auch die Eltern schon an Convulsionen gelitten und die Mütter namentlich sind meist hysterisch und leiden an mannigfachen Hyperästhesien. Bouchut erzählt von einer Familie von zehn Personen, welche sämmtlich in ihrer Jugend an Convulsionen gelitten hatten. Ein Mädchen dieser Familie heirathete, gebar zehn Kinder und neun dieser Kinder wurden ebenfalls von Eclampsie befallen.

Verlauf, Ausgänge und Prognose.

Die partiellen Muskelcontraktionen, die ichten sog. Fraisen, können viele Tage lang während einer acuten Krankheit fortbestehen, ohne dass deshalb die Gefahr des Uebels an sich besonders vermehrt wurde. Die wirklichen Eclampsien aber sind meist mit einem einzigen Anfall beendet. Dieser einzige Anfall kann schon tödtlich sein, oder es entwickelt sich am folgenden Tage der ihn veranlassende Krankheitsprocess weiter und hiermit ist die Gelegenheit zu wiederholten sympathischen Eclampsien abgeschnitten. Die durch gastrische Reize bedingten werden durch Erbrechen, durch Abgang von Blähungen oder diarrhöischen Stühlen gehoben, die auf Blutintoxication beruhenden kehren niemals wieder, sobald die acuten Exantheme, Scharlach, Blattern, Masern, einmal zum Ausbruch gekommen sind.

Wie schon früher bemerkt, sind diese Arten von sympathischen Convulsionen selten tödtlich, lassen aber immer vermuthen, dass die darauffolgende Krankheit stark entwickelt und mit stürmischen Symptomen verlaufen werde. Im Allgemeinen kann der Satz gelten: Je jünger das Kind, um so bedenklicher die Prognose.

Nach meinen Erfahrungen bieten, mit Ausschluss der auf wirklichen Gehirnkrankheiten beruhenden Convulsionen, welche fast immer zum Tode führen, die Convulsionen bedingt durch Zahnung und gleichzeitiges Darmleiden die schlimmste Prognose. Solche Kinder sterben entweder an einem der Anfälle oder sie bekommen die Symptome von Hydrocephaloid und gehen auf diese Weise zu Grunde oder es bleiben endlich bedeutende Residuen davon im Nervensystem zurück. Fast alle sehenden Kinder, bei denen der Strabismus nicht auf sichtbare Fehler der Cornea und der Linse zurückgeführt werden kann, haben in den ersten Lebensjahren an Eclampsie gelitten. Ausserdem können Verlust der Sinnesorgane, Amaurose oder Taubheit, Blödsinn in verschiedenem Grade, Hydrocephalus chronicus und allgemeine oder partielle Muskellähmung die Folge dieser traurigen Krankheit werden.

Therapie.

Man hat hier vor allem zwischen den partiellen Muskelzuckungen (den eigentlichen Fraisen) und den allgemeinen, epileptischen Convulsionen (der wahren Eclampsia infantum) zu unterscheiden. Ausserdem modificirt sich die Behandlung namentlich nach dem Alter und dem Kraftzustand der Kinder, und es ist hier dringend indicirt, durch ein genaues Examen den wahren Ursachen auf die Spur zu kommen. Man darf sich dabei nicht lediglich auf die Angaben der Umgebung verlassen, sondern muss selbst die ganze Körperoberfläche der Kinder untersuchen. Ein Splitter in der Fusssohle, zwischen den Zehen, ein fremder Körper in der Nasenhöhle, im äusseren Gehörgang können auch die Veranlassung sein und durch deren Entfernung kann eine wunderbar schnelle Heilung bewirkt werden.

Beim Anfalle selbst kann der Arzt nur in den seltensten Fällen direkt thätig sein, indem bis zu seiner Ankunft fast regelmässig schon alle Convulsionen beendet sind, er muss sich deshalb darauf beschränken, der Umgebung fassliche Instruktionen für den Wiederholungsfall zu geben. Das erste ist immer, dass man die Kinder so schnell als möglich entkleidet, damit durch einschränkende Bänder und Rückchen

nicht auch noch die Respiration und Circulation beeinträchtigt werde. Dann legt man die Kinder mit etwas erhöhtem Kopfe auf ein grosses Bett, oder, wenn die Convulsionen so heftig sind, dass man Beschädigung der Extremitäten durch die Bettlade und Herabfallen der Kinder befürchten muss, auf den Boden. Dass solche Kinder keinen Augenblick allein gelassen werden dürfen, versteht sich von selbst. Durch Bespritzen des Gesichtes und der entblößten Brust mit kaltem Wasser gelingt es häufig, tiefe, krampfhaft inspiratorische zu bewirken, wodurch wenigstens die Gefahr der Erstickung gemindert wird; eine andere auffallend abkürzende Wirkung erreicht man durch Bespritzungen oder Begiessungen mit kaltem Wasser gewöhnlich nicht.

Eine Venäsection, welche von einzelnen Therapeuten vorgeschlagen worden ist, lässt sich abgesehen von allen übrigen dagegen sprechenden Gründen, schon deshalb während des Anfalles nicht machen, weil durch die Zuckungen des Armes der Einstich sehr unsicher würde und nach gelungener Eröffnung der Vene durch eben dasselben jedenfalls sogleich Verschiebung der Hautwunde und somit Stillstand der Blutung eintreten müsste. Zu erwähnen ist noch die von Grantham vorgeschlagene gleichmässige Einschnürung des Schädels bei Kindern, deren Fontanelle noch nicht geschlossen ist. Ich habe dieses Bandagiren des behaarten Schädels schon zweimal, in beiden Fällen ohne Erfolg, versucht und bei längerem Gebrauch der Binde, welcher auch von diesem Autor als Prophylacticum empfohlen wird, eine solche Unruhe entstehen sehen, dass die Binde nach wenigen Tagen entfernt werden musste.

Was nun nach überstandenen Anfällen die ärztliche Wirksamkeit betrifft, so ergreift sich dieselbe zumeist in ableitenden Mitteln. Man legt Senfteige oder bei ganz kleinen Kindern Sauerteige auf die Waden oder reibt diese Theile mit Sassafras, wodurch fast momentan eine tiefe Röthung der genannten Stellen erzielt wird. Wenn irgend ein Verdacht auf gastrische Reizung vorhanden, so muss auch eine Ableitung auf den Darmkanal veranstaltet werden. Dieselbe ist nur zu unterlassen bei Kindern, welche schon vor und während des Anfalles Diarrhöe und Abgang von Blähungen hatten. Grösseren Kindern, die noch kurz vor dem Anfalle beträchtliche Mengen von Nahrungsmittel zu sich genommen, gibt man am besten ein gehöriges Brechmittel aus 0.05 Tartar. stibiatus gelöst in einem starken Ipecacuanhaufus, wodurch alsbald sämtlicher Mageninhalt entleert wird. Wo aber keine bedeutende Magenüberfüllung und Indigestion zu ermitteln ist, da ist das Calomel das Brechmittel vorzuziehen. Man gibt den Kindern stündlich 0.03–0.05 Calomel so lange fort, bis einige Ausleerungen erfolgt sind. Ist Obstruction die mutmassliche Ursache der Eclampsie, so kann man schon während des Anfalles ein Clystier mit Salzwasser setzen. Zum Erbrechen war ich noch nie zu grüssen gezwungen.

Unter den Antispasmodica ist das Zinkoxyd das leichteste, gewöhnlichste Mittel und zur länger fortgesetzten Darreichung von 0.15 bis 0.10 pro die geeignet; über den Nutzen solcher Prophylactica lässt sich schwer ein Gutachten abgeben, indem eben überhaupt in den meisten Fällen nur ein eclamptischer Anfall erfolgt. Die Narcotica sind hier nicht indicirt, weil sie, während des Anfalles gesiecht, nicht schnell genug zur Wirkung kommen und nach den Anfällen dadurch Gehirncongestionem verursacht werden.

Als Nachcur können, hauptsächlich nach Eclampsien in Folge von gastrischem und Zahncriss, Tonica, Eisen, China, Wein, Bier indicirt sein.

2) Lähmung, Paralysis.

Nachdem schon bei den Krankheiten des Gehirnes und Rückenmarkes mehrfach der hiedurch veranlaßten centralen Lähmungen gedacht wurde, erübrigt hier nur mehr, die sog. essentielle Lähmung einer oder einiger Extremitäten bei vollkommener Integrität der Nervencentra, und die ebenfalls periphere Lähmung des Nervus facialis zu besprechen.

a) Facialislähmung.

Was die Facialislähmung betrifft, so kommt dieselbe zuweilen unmittelbar nach der Geburt zur Beobachtung, ist aber bei der Unbeweglichkeit der Gesichtsmuskel der Neugeborenen hier schwerer zu erkennen als bei Erwachsenen. Auffallend wird die Veränderung nur, wenn das Kind weint zu schreien, wodurch der Mundwinkel der gesunden Seite nach aussen gezogen und überhaupt die ganze gesunde Gesichtshälfte faltig wird, während die Unbeweglichkeit der gelähmten Hälfte vor wie nach dieselbe bleibt. Ist der Grund der Lähmung ein centraler, so wird man auch die Uvula schief stehend finden, da die Veranlassung aber gewöhnlich im Verlaufe des N. facialis liegt, so ist auch meistens keine Veränderung am Gaumensegel und Zäpfchen wahrzunehmen. Für die Lähmungen des Neugeborenen liegt die häufigste Ursache in der Geburtszange; dann kommt auch noch eine angeborene Kleinheit und Verkrümmung des Felsenbeines vor. Später sind Caries eines Knochens, Drüsenanschwellungen oder zerrende Narben in der Nähe der Facialis die gewöhnlichsten Veranlassungen.

Die Therapie der Facialislähmung richtet sich nach deren Ursache und hat nur dann Erfolg, wenn die Entfernung derselben möglich ist. Entfernen kann man zerrende Narben, die meist von scrophulösen Geschwüren herrühren, und Drüsenanschwellungen, hingegen ist die Lähmung in Folge von Caries des Felsenbeines in der Regel eine für das ganze Leben bleibende.

b) Essentielle Lähmung. Spinale Kinderlähmung.

Die sog. essentielle Lähmung wurde zuerst von Underwood in London beschrieben und ist im Laufe der letzten Jahrzehnte, namentlich unter dem Einflusse der Electrotherapie, ein Lieblingsleiden der Nervenpathologen geworden.

Man versteht hierunter eine Lähmung, welche gewöhnlich keinen ausgesprochen centralen Charakter hat, und weder auf das Gehirn als Hemiplegie, noch auf das Rückenmark als Paraplegie bezogen werden kann, indem meist nur eine Extremität oder gar nur einzelne Muskelgruppen derselben befallen werden. Durch die Bezeichnung „essentiell“ soll das Fehlen des Nachweises eines centralen Leidens angedeutet werden.

Da die Krankheit niemals direkt tödtlich ist, so sind auch die Sectionsbefunde sehr vereinzelt. Nach A. Eulenburg haben einige Autoren in den Centralorganen des Nervensystems gar nichts Patho-

logisches gefanden, andere sprechen wohl von Verdickung der Gehirnhaute, Sclerose oder Tuberculose des Rückenmarkes, jedenfalls aber sind keine einheitlichen charakteristischen anatomischen Zeichen bis jetzt erwiesen. Dass die anatomischen Processe, wenn solche überhaupt vorhanden, sehr wandelbar und rückbildungsfähig sein müssen, geht schon aus der häufig beobachteten raschen Genesung im Verlaufe weniger Tage hervor.

Symptome.

Fast ausschließlich befällt diese Lähmung Kinder, welche sich im Dentitionsalter von $\frac{1}{2}$ —2 $\frac{1}{2}$ Jahren befinden. Häufig gehen einige Tage Fieber und Convulsionen voraus, doch sind mir auch Beispiele bekannt, wo Kinder sich Abends gesund und munter hinlegten, Nachts unruhiger als gewöhnlich schliefen und am andern Morgen schon die vollständig entwickelte Lähmung hatten. Ein Arm oder ein Bein hängt entweder vollständig schlaff herunter, oder es sind nur einzelne Muskelgruppen, meistens die Schultermuskeln oder die des Unterschenkels, oft allein die *Mm. peronei* gelähmt und sodann nur einzelne Bewegungen gehemmt. Manchmal erstreckt sich die Lähmung in den ersten Tagen auf die Gesamtmuskulatur aller Extremitäten, verschwindet aber bald an den meisten Partien und bleibt nur für einzelne Gruppen Zeit Lebens stationär. Am häufigsten werden ergriffen: die Muskeln des Unterschenkels und unter diesen wieder die von *M. peroneus* versorgten, am Arme der Deltamuskul und die Extensoren der Hand. Der Arm hängt dann schlaff herab und fällt, emporgehoben, sofort wieder nieder. Sind nur die Oberarmmuskeln gelähmt, so sind die Kinder wohl noch im Stande, mit der Hand etwas zu fassen, aber nicht es zum Munde zu führen. Grössere Kinder geben sich viele Mühe, das Glied dennoch zu gebrauchen und helfen mit dem gesunden Arme dem kranken nach. Die einzige Formveränderung, die schon gleich zu Anfang bemerkbar wird, ist eine Abflachung der äusseren Contur der Schulter, welche durch die Lähmung des Deltamuskels und die eigene Schwere des herabhängenden Armes bedingt wird.

Die essentielle Lähmung einer unteren Extremität erstreckt sich selten über alle Muskeln des Fusses, trifft oft nur die des Unterschenkels und von diesen nicht immer alle, wodurch der Fuss vorherrschend nach ein- oder zuwerts sich stellt. Die Erkennung dieses Uebels ist ausserordentlich leicht: kleine Kinder, welche noch nicht stehen können, lassen beim Schreien das gelähmte Bein flach liegen, während sie das andere an den Leib aufrichten; wenn sie sitzen und die Unterschenkel über den Stuhl herabhängen lassen, so hängen der gelähmte willenlos herunter; konnten sie aber schon gehen, so machen sie gar keine Gehversuche mehr, oder schleifen nur bei partieller Lähmung einzelner Muskeln den Fuss nach und versuchen wohl auch, auf dem gesunden Fusse allein zu hüpfen.

Sind beide Füsse befallen, so bleiben sie unbeweglich im Bette liegen, lernen jedoch bald sitzen und die wieder erwachende Functionsfähigkeit geht von oben nach unten, so dass zuerst der Oberschenkel, dann der Unterschenkel und endlich der Fuss bewegt werden können. Eigenthümlich ist, dass niemals die Blase noch der Mastdarm gelähmt

werden, was bei anatomischen Gewebsveränderungen des Rückenmarkes doch sonst gewöhnlich der Fall ist.

Muskeln, welche nicht in wenigen Tagen, längstens 3—4 Wochen, ihre Thätigkeit wieder erlangt haben, bleiben für immer gelähmt. Die Lähmung der Arme geht häufiger und rascher in Genesung über als die der Beine, in deren Muskulatur sich bald bedeutende Ernährungsstörungen, Verfettung und Schwund, geltend machen.

Charakteristisch für die Kinderlähmung ist, dass die Sensibilität der entsprechenden Haut niemals gestört ist, und dass auch die Reflex-erregbarkeit unverändert bleibt. Gegen Elektrizität verhalten sich die ergriffenen Muskeln anfangs ganz unverändert, mit dem Beginne der Muskelatrophie aber nimmt natürlich die electro-muskuläre Contractilität für den Inductionstrom mehr und mehr ab. Nach wenigen Monaten ist dieselbe meist vollständig verschwunden, während die galvanische Contractilität, wenn auch nur mehr träge, noch erregt werden kann. Nach längstens einem Jahre ist die Erregbarkeit für beide Stromarten total und auf Lebensdauer erloschen. Die trophischen Störungen nehmen sichtlich überhand, die Fettpolster des betroffenen Gliedes schwinden und die Temperatur sinkt. Durch den Schwund der Fettpolster und der Muskulatur, verbunden mit dem Zuge, welchen die Glieder durch ihre eigene Schwere auf die Gelenkkapseln ausüben, treten die Verwüsthungen der Knochen und Gelenke mehr und mehr hervor und liefern schliesslich das Bild der sog. atonischen Luxation. Selbst die Knochen bleiben in ihrem Längswachsthum etwas zurück, doch erreicht diese Verkürzung niemals einen hohen Grad, so dass endlich bei dem Erwachsenen der Unterschied zwischen der gelähmten und normalen Extremität kaum 1—2 Ctm. beträgt.

Die Deformitäten, welche die essentielle Lähmung im Gefolge hat, sind natürlich sehr mannigfaltig. Die gewöhnlichsten sind: *Pes varus* oder *varo-equinus*, seltener *valgus* und *calcaneo-valgus*, an den oberen Extremitäten permanente Contractur der Hand und Finger, am Rumpfe Verkrümmungen der Wirbelsäule, Abweichen der *Scapula* und *Caput obliquum*.

Aetilogie.

Der Anschauung von Billiet und Barthez, welche zuerst die Bezeichnung „essentiell“ gebraucht haben, wurde von Heine die spinale Kinderlähmung entgegengestellt. Heine nimmt eine anatomische Grundlage und zwar einen entzündlichen Process im Rückenmark und seinen Häuten an, welcher allerdings bis auf den heutigen Tag noch nicht erwiesen ist. Vogt und Duchenne schlossen sich dieser Anschauung an. Wenn nun auch nicht gelungen ist, zu beweisen, dass der häufige Beginn des Leidens mit allgemeinen Symptomen und Convulsionen, das plötzliche Auftreten derselben, ihre anfängliche Ausdehnung und spätere Beschränkung auf einzelne Muskelgruppen eine centrale Entstehung sehr wahrscheinlich machen, so ist jedenfalls die Bezeichnung „spinal“ nicht gerechtfertigt, indem die vorausgehenden Convulsionen und Coma ebenso gut auf das Gehirn als auf das Rückenmark bezogen werden können. Sieht man ja häufig genug bei Herderkrankungen des Gehirns, z. B. Neoplasmen und Sclerosen, lange Zeit nichts als partielle Paresen einzelner Muskelgruppen.

Die essentielle Lähmung ist eine Krankheit des ersten Kindesalters und hängt entschieden mit dem Zahndurchbruche zusammen. Nach vollendeter erster Dentition tritt das Uebel nur ausserst selten mehr auf. Nach meinen Erfahrungen erkranken mehr Knaben als Mädchen daran, was jedoch auch Zufall sein kann, indem die meisten Autoren dieses Missverhältniss nicht betonen.

Die Constitution scheint ohne Einfluss zu sein, denn die meisten davon ergriffenen Kinder sind bisher kräftig gediehen, und vom scrophulösen von der Krankheit nicht verschont worden, so geht bei der Häufigkeit dieser Dyskrasie daraus noch lange nicht hervor, dass dieselbe eine besondere Disposition abgibt. Die einzigen ziemlich constanten Vorboten sind Gehirncongestion und Verstopfung während des Zahnens. Unter den Gelegenheitsursachen wird mit besonderer Vorliebe stets der Erkältung gedacht, übrigens immer nur ein und derselbe Fall citirt, nämlich der eines Kindes, welches auf einem kalten Stein gesessen und hierauf Lähmung eines Fusses bekommen habe. Viele tausend andere Kinder, welche ohne nachfolgende Lähmung auch auf kalten Steinen gesessen hatten, müssen bei dieser Gelegenheitsursache natürlich mit Stillschweigen übergangen werden.

Prognose.

In den ersten Tagen ist es unmöglich, sich bestimmter auszusprechen, indem einerseits ausgedehnte Lähmungen mit schweren Anfangssymptomen rasch heilen, andererseits circumscripte Lähmungen Zeit Lebens bestehen können. Erst nach 1—2 Wochen entscheidet es sich, ob die Lähmung den gutartigen, transitorischen oder den bösartigen, permanenten Charakter annimmt. Reagiren die Muskeln auf faradische und galvanische Reizung nicht mehr, und beginnt ihre Ernährung zu leiden, so kann mit Bestimmtheit die Lähmung für unheilbar erklärt werden.

Was die Beschwerden des einzelnen Kranken betrifft, so richtet sich die Prognose sehr nach dem Sitze der Lähmung. Die Deformität der Glieder wird durch Lähmung einzelner Muskelgruppen und den dadurch aufgehobenen Antagonismus oft grösser als durch Lähmung ganzer Extremitäten. Am Arme gestattet die Lähmung der Schultermuskeln noch einen ergiebigen Gebrauch der Hand, während die Paralyse der Vorderarmbeuger und Daumenmuskeln die ganze Extremität unbrauchbar macht.

Therapie.

Man hat, wie fast bei allen krankhaften Veränderungen, auch gegen die Lähmung die Antiphlogese, lebhafte Blutentziehungen und ganze Salbe versucht, ohne dass hidurch eine schnellere Besserung als durch expectative Behandlung erzielt worden wäre. Ebenso verhielt es sich mit den Pergnismitteln und überhaupt mit allen anderen hier empfohlenen Medicamenten. Viele dieser Mittel haben begeisterte Lobredner, weil eben die meisten essentialen Lähmungen überhaupt in einer oder einigen Wochen verschwinden, gleichviel ob und welche Mittel gebraucht wurden. Da aber einzelne essentielle Paralyse, über deren Diagnose kein Zweifel besteht, jeder Behandlungsweise, auch der mit Elektrizität widerstehen, so kann natürlich von einer spezifischen Wirkung der empfohlenen Mittel nie die Rede sein.

Das rationellste und einfachste scheinen für die ersten Wochen der Lähmung die tägliche Application einer kalten Douche, dann Warmbäder des gelähmten Gliedes, häufige passive Bewegungen und spirituelle Eireibungen zu sein. Mit dieser Behandlung allein heilen schon viele essentiellen Paralysen. Stellt sich nach längstens vier Wochen keine Beweglichkeit ein, so ist es an der Zeit, durch inducirte Electricität, welche täglich einmal 5–10 Minuten lang angewendet wird, der consequenten Atrophie der Muskeln vorzubeugen.

Wenn wieder nach einigen Wochen keine Besserung erreicht werden ist, so geht man über zum innerlichen Gebrauche des schwefelsauren Strychnins 0,003–0,01 pro die, welches der Tinct. nucis vomicae wegen deren wechselnden Strychningehaltes vorzuziehen ist. Man muss mit dem Strychnin sehr vorsichtig zu Werke gehen, die Angehörigen belehren über seine Giftigkeit, und ihnen Verhaltensregeln geben, wenn plötzlich heftige, tetanische Anfälle sich einstellen sollten. Das Beste ist in dieser Beziehung eine rasche kalte Begiessung und die Darreichung von schwarzem, starkem Kaffee.

Verkrümmten Extremitäten muss ihre normale Form durch orthopädische Behandlung wieder verschafft werden, und gegen die unheilbaren Paralysen kann ebenfalls die mechanische Orthopädie mit ihren mannigfach ausreichenden Apparaten in Anwendung kommen.

3) Chorea minor. Der kleine oder englische Veitstanz, Muskelzucke, unwillkürliche Muskelbewegung, Ballismus, Scelotyrbe. (χorea, Tanzen, Hüpfen.)

Die beste Beschreibung des kleinen Veitstanzes gibt Huxley in seinen Krankheiten des Nervensystems (Virchow's Pathologie und Therapie), welche bei der nun folgenden Charakteristik auch mehrfach benutzt wurde.

Unter Chorea minor versteht man fortwährende unwillkürliche Bewegungen fast aller annäher Muskeln, welche durch die vom Willen intendirten Bewegungen an Heftigkeit zunehmen, und nur bei aufgehobenem Bewusstsein, im Schlafe aufhören. Sie unterscheidet sich gemäß dieser Definition hinlänglich von anderen früher damit zusammengeworfenen Zuständen, dem grossen Veitstanz, der Tanzwuth, den imitatorischen Volkskrankheiten und der Tarantelkrankheit.

Symptome.

Die anhaltenden unwillkürlichen Bewegungen zeigen sich entweder in allen skeinischen Muskeln des ganzen Körpers oder nur an einzelnen Körpertheilen, an der oberen Körperhälfte oder halbseitig auf einem Arm und das entsprechende Bein beschränkt, wodurch tanzähnliche Bewegungen zu Stande kommen, oder es sind in ganz seltenen Fällen der eine Arm und das entgegengesetzte Bein von der Muskelzucke ergriffen. Auch erkranken nicht immer alle Extremitäten gleichmässig stark; während der eine Arm keine Secunde zur Ruhe kommt und fortwährend grosse Zuckungen macht, kann der andere sehr wohl Minuten lang ruhig gehalten und nur durch kleine, kaum sichtbare Muskelcontractionen geplagt werden. Dieselbe Ungleichheit der Erkrankung wird auch an den unteren Extremitäten beobachtet. Die

Muskeln des Gesichtes können möglicher Weise auch gänzlich verschont bleiben, während die Extremitäten in fortwährender Unruhe sich befinden.

Was nun die einzelnen Zuckungen betrifft, so sind in der Regel am augenfälligsten die der oberen Extremitäten. An den Armen bemerkt man die sonderbarsten Verdrrehungen und Zuckungen, die Schultern werden zuckend in die Höhe geschoben, als wenn die Kinder sich daran jucken wollten, die Finger werden bald geschlossen, bald auseinandergepresst oder zupfen fortwährend an den Kleidungsstücken. Die Füße können keine Secunde ruhig bleiben, denn durch die verschiedenen unwillkürlichen Contractionen entsteht ein anhaltendes Getrippel. Wenn die Kinder liegen, so spreizen sie wohl auch die Zehen auseinander und bekommen Contractionen im Kniegelenke. Der Gang wird unsicher, stotpernd, in den höchsten Graden selbst ganz unmöglich; wenn das eine Glied stärker befallen ist als das andere, auch nachschleppend. Am Kopfe kommen die eigenthümlichsten Bewegungen zu Stande. Er wird gedreht, geschüttelt, bald auf die eine, bald auf die andere Seite krampfhaft hingezogen. Die Contractionen der Gesichtsmuskeln veranlassen das sonderbarste Mienenspiel, welches zu Fratzenhaften Verzerrungen ausarten kann. Die Augen glänzen oder es stellt sich vorübergehender Strabismus ein. Die Augenlider blinzeln gewöhnlich.

Auch die Kau- und Schlüingmuskeln werden von der Unruhe ergriffen, die Kinder heissen sich während des Kauens auf die Zunge oder in die Wangenschleimhaut; wenn der Mund leer ist, kommt es sogar zum Zähneknirschen. Das Schlucken geht nicht immer nach Wunsch von Statten und auch die Zunge entzieht sich dem freien Willen, weshalb die Kinder oft stammeln, mitten in der Rede stocken bleiben, und sich so oft auf die Zunge beißen. Der Rumpf wird nach allen Seiten hin gedreht und gewendet. Die Respirationsmuskeln theilnehmen sich nicht auffallend an der Unruhe, wenigstens gehen die Inspirationen nicht unregelmässig von Statten.

Es entstehen hiedurch natürlich mannigfache Störungen der willkürlich vorzunehmenden Bewegungen, zumal die letzteren eine ständige Steigerung der unwillkürlichen veranlassen. Die Kinder können nicht mehr ordentlich essen, sie bekommen, während sie den Löffel zum Munde führen wollen, eine Zuckung und beschütten sich, oder stecken sich, wenn man ihnen unvorsichtiger Weise eine Gabel gestattet, wohl gar in das Gesicht. Beim Schreiben machen sie plötzlich lange Haken auf das Papier oder stossen die Feder so gewaltsam auf, dass sie mehrere Blätter des Schreibstoffes durchstechen. Wenn sie ihre Kleider anziehen wollen, so entstehen in Folge der hohen nothwendigen grösseren willkürlichen Bewegungen so heftige Zuckungen, dass die Kleider zerrissen werden. Sobald man die Kinder ermahnt, doch etwas ruhig zu stehen, so wird das Getrippel bei den aufrichtigsten Bemühungen, dieser Ermahnung Folge zu leisten, nur noch viel stärker. Auf das Geheiss, die Zunge ruhig herauszustrecken, wird dieselbe unter eigenthümlichen queren Bewegungen herausgerollt und kann in keinem Falle längere Zeit ruhig vorgestreckt bleiben.

Noch mehr als durch eigenmächtig unternommene, willkürliche Bewegungen wird die Unruhe gesteigert, wenn man die erkrankten

Theile festzuhalten versucht. Es kann hiedurch selbst eine anhaltende Verschämmerung des ganzen Zustandes verursacht werden.

Die Sensibilität der Haut ist bei der Chorea nicht vermindert, und auf Hautreize, wie Stechen, Kneipen, Brennen etc. stellen sich die gewöhnlichen Reflexbewegungen ein. Auch Husten, Niesen und Gähnen geht ungestört von Statten und auf die Entleerung des Stuhles und Urines bleibt die Krankheit gleichfalls ohne Einfluss. Sehr eigenthümlich ist, dass die Kinder auch in den heftigsten Fällen, wo sie den ganzen Tag über in grösster Unruhe sich befinden, niemals über Ermüdung klagen, und dass die Contractionen desshalb auch am Abend durchaus nicht schwächer, oft sogar stärker werden. Constante Zeichen einer Erkrankung der Centralorgane sind nicht zu entdecken, auch das von Stiebel angegebene Zeichen, dass fast immer die eine oder andere Stelle der Wirbelsäule auf Druck schmerzhaft sein sollte, hat sich keineswegs bestätigt.

Oft ändert sich bei Choreaerkranken die Gemüthsstimmung, sie werden weinerlich, jähzornig, und früher freundliche, gutmüthige Kinder bekommen besafts, schadenfrohe Launen. Bei längerer Dauer nimmt sich das Gedächtniss etwas ab. So mannigfach auch und sehr bemerkbar diese Symptome im wachen Zustande sein mögen, im Schlafe sind sie insgesamt wie abgeschaltet. Wenn die Kinder Abends schläfrig werden und sich legen, nehmen die Zuckungen mehr und mehr ab und hören vollständig auf, sobald das Bewusstsein verschwunden ist. Der Schlaf ist gewöhnlich weniger ruhig als bei gesunden Kindern, bei schweren Träumen werden sogar einzelne leichte Choreaabewegungen gemacht, mit dem Erwachen aber stellen sich sofort die sämtlichen Symptome in ihrer früheren Stärke wieder ein.

Die Chorea ist eine durchaus fieberlose Krankheit und verläuft ohne sichtliche Störung des Allgemeindeutens, man hat im Gegentheile bemerkt, dass durch eine intercurrende neue Krankheit, z. B. ein acutes Exanthem, die Anfälle entschieden schwächer wurden und alsbald heilende Besserung und rasch vollkommene Heilung eintrat. Der Puls ist bei der einfachen Chorea weder beschleunigt noch unregelmässig, die dem widersprechenden Angaben einzelner Autoren heissen wahrscheinlich auf der Schwierigkeit, den Radialpuls während des anhaltenden Sehneshüpfens zu fixiren. Auscultirt man aber fleissig das Herz, so wird man sich stets überzeugen, dass Rhythmus und Frequenz der Herzcontractionen normal bleiben.

Bei längerer Dauer bleichet sie und da die Ernährung etwas, die Kinder werden blass und mager, und es machen sich namentlich bei älteren Mädchen mährische Herzgeräusche und überhaupt chlorotische Symptome geltend.

Der Verlauf ist immer ein chronischer, und kaum jemals heilt eine gehörig ausgebildete Chorea vor 2—3 Monaten, andere dauern ein halbes, selbst ein ganzes Jahr und Romberg erzählt sogar von einer 70jähr. Frau, die seit ihrem sechsten Jahre, also gerade 70 Jahre lang, an Chorea litt und wohl mit in's Grab genommen haben wird. Man spricht auch hier von Stadien: 1) Stadium der Vorläufer, 2) der Zunahme, 3) der Höhe und 4) der Abnahme. Doch haben dergleichen Stadieneintheilungen in Krankheiten, bei denen die Uebergänge so allmählig und nicht unter bestimmten Symptomen sich einstellen, nur unbedeutenden Werth. Der Anfang ist in allen Fällen allmählig. Die

Kinder werden auffallend ungeschickt, lassen viel fallen, zerbrechen fast alles, was man ihnen in die Hand gibt, stolpern häufig und wanken durch die harte Behandlung, die sie deshalb erfahren müssen, sehr angstvoll und eingeschüchtert. Gewöhnlich nach einer Gemüthsbewegung, Schreck, Zorn, Furcht etc. stellen sich die ersten unwillkürlichen Bewegungen zuerst nur an einzelnen kleineren Muskelgruppen ein, verallgemeinern sich aber ziemlich rasch, so dass nach 2–3 Wochen die Höhe der Krankheit erreicht ist. Auf dieser Höhe bleiben die Symptome mindestens 4–6 Wochen stehen, ohne im geringsten zu noch abzunehmen, worauf endlich eine ganz unmerkliche, schleichende Besserung eintritt. Recidive sind häufig. Sée zählte unter 158 Fällen deren 37. Schließlich aber tritt doch fast immer vollständige Genesung ein, nur sehr ausnahmsweise bleiben Jahre lang oder das ganze Leben hindurch Zuckungen einzelner Muskelgruppen, namentlich des Gesichts zurück. Wicke und Landolt beschreiben auch einzelne Todesfälle. Die Krankheit steigerte sich rasch zu den höchsten Graden, worauf dann ab und zu, unwillkürlicher Abgang von Stuhl und Urin, Collapse, unregelmässige Respiration, kleiner Puls, tiefe Bewusstlosigkeit und der Tod eintrat.

Aetiologie.

Die Chorea ist fast ausschließlich eine Kinderkrankheit, und wenn Erwachsene an derselben leiden, so haben sie dieselbe doch immer in der Jugend schon acquirirt. Sie befällt die Kinder am häufigsten zwischen dem 6.–15. Jahre, weshalb man ihren Ursprung bald in der zweiten Zahnung, bald in der bevorstehenden Pubertät gesucht hat. Wenn diese Prozesse auch eine Disposition dazu abgeben mögen, so ist doch ihr Zusammenhang mit Chorea kein sehr enger, indem dieselbe sehr häufig wieder aufhört, ohne dass ein neuer Ausbruch durchgebrochen oder die Menstruation eingetreten ist.

Die Chorea ist eine von den wenigen Krankheiten, welche die beiden Geschlechter numerisch entschieden ungleich befallen. Nach einer Zusammenstellung von Dufoix gehörten von 290 Kranken 71 dem männlichen und 171 dem weiblichen Geschlechte an und Sée hält das Erkrankungsverhältniss des Knaben zu den Mädchen ebenfalls wie $\frac{1}{4}$ zu $\frac{3}{4}$. In München scheint dieses Verhältniss ein noch schärferes zu sein, indem unter den zehn Choreaerkranken, die in meinem Tagebuch aufgezchnet sind, ein einziger Knabe sich befindet.

Eine besondere Erblichkeit existirt nicht, und es kommt nur ganz ausnahmsweise einmal vor, dass das Kind einer in der Jugend choreaerkrankten Mutter wieder hiervon befallen wird. Hingegen ist nicht zu verkennen, dass meistens die Mütter solcher Kinder ein reizbares Nervensystem haben und an den verschiedensten Formen von Hysteria leiden. Vorausgegangene febrile Krankheiten disponiren ebenfalls zur Muskelzucke.

Ein deutlicher Einfluss der Jahreszeiten ist bei uns nicht wahrzunehmen, obwohl in den Tropen die Krankheit fast gar nie vorkommt, in den nördlichen Gegenden hingegen häufiger sein soll. Ob sie auch epidemisch sein könnte, wie von den medicinischen Geschichtsforschern behauptet wird, ist immer noch nicht gehörig constatirt, wahrscheinlich sind diese sog. Epidemien auf einfache Initiation zurückzuführen. Dass in Mädchenschulen durch Nachahmung Chorea

entstehen könne, wird von vielen glaubwürdigen Beobachtern versichert und sind in neuerer Zeit Beispiele in einem Dorfe Tyrols und in einem Pensioat in Eisenach vorgekommen.

Eine Analogie hierfür haben wir in der Entstehung hysterischer Krämpfe allein durch den Anblick einer in solchen Krämpfen liegenden Person, wie dies in den weiblichen Abtheilungen grösserer Spitäler oft genug beobachtet wird.

Unter den psychischen Ursachen wird namentlich oft der Schreck erwähnt. Es mag allerdings bei einem an beginnender Chorea leidenden Kinde dem Ausbruch des Uebels beschleunigen, da es aber doch sehr viele furchtsame Kinder gibt, welche durch jede Kleinigkeit in den grössten Schrecken versetzt werden, so müsste die Chorea viel häufiger vorkommen, wenn der Schrecken sie wirklich bei einem sonst gesunden Kinde veranlassen könnte.

Séca legt grosses Gewicht auf den von ihm entdeckten Zusammenhang des Rheumatismus mit der Chorea. Es scheint jedoch dieser Zusammenhang sehr lose zu sein; denn, wenn auch zugestanden werden muss, dass auf Rheumatismus acutus Chorea folgen kann, so ist die Häufigkeit dieses Zusammentreffens doch sehr übertrieben worden. In Städten, wo viel rheumatische Erkrankungen vorkommen, müsste auch die Chorea häufiger auftreten und umgekehrt, dem ist aber nicht so; in Genf z.B. gibt es nach Rilliet's Angaben viel Rheumatismen und fast gar keinen Veitstanz. Auch müssten, wenn hier wirklicher Connex bestünde, die Mädchen viel öfter an Rheumatismus leiden, als die Knaben, da sie doch notorisch an der Chorea überwiegen. Gerade das umgekehrte Verhältnis aber findet für den Rheumatismus statt, an welchem bekanntlich mehr Knaben als Mädchen erkranken.

Die pathologische Anatomie liefert in dieser Krankheit durchaus negative Resultate, was zum Theil auch von der grossen Seltenheit der Todesfälle, welche immer nur als zufällige eintreten, herrühren mag. Froriep's in fünf Fällen beobachtete Anschwellung des Zahnfortsatzes des Epistropheus, welche er als einfache Hypertrophie der Knochenmasse beschreibt, steht viel zu vereinzelt da, als dass daraus weitere Schlüsse gezogen werden dürften. Die wahre Ursache der Chorea ist eben bis jetzt noch nicht ergründet trotz der mannigfachsten Hypothesen, die in dieser Beziehung aufgestellt worden sind, und auch der Zusammenhang mit Wurmkrankheiten, auf welchen man früher grosses Gewicht gelegt hat, existirt in Wirklichkeit nicht, indem sonst die Chorea in Wurmgegenden viel häufiger sein müsste und durch Warmmittel beseitigt werden könnte, was aber nicht der Fall ist.

Diagnose und Prognose.

Die Erkennung dieser Krankheit ist gewöhnlich so leicht, dass sie jeder Laie, der sie nur einmal gesehen hat, auf den ersten Blick wieder erkennt, und sie unterscheidet sich durch die unausgesetzte, viele Wochen anhaltende Dauer der Symptome von allen anderen Krämpfen, die man noch der nicht ganz passenden Bezeichnung der choreaartigen zusammengefasst hat. Zu letzteren rechnet man das Stottern, das Blinzeln, die Verzerrung des Mundes, das sogenannte Weben und den Schreibekrampf, über welche insgesamt der Wille einen, wenn auch nur vorübergehenden Einfluss hat, und die ausserdem

nur zufallsweise oder höchstens tagweise und durchaus nicht so constantlich wie die Chorea auftreten. Eben so wenig gehört hieher die von Dubini beschriebene und nicht sehr treffend als Chorea electrica bezeichnete Krankheit. Nach Hasse stellen sich hier Kopf- und Rückenschmerz, dann elektrische Zuckungen der Extremitäten, welche zuerst halbseitig sind, dann über den ganzen Körper sich erstrecken, ein. Dazwischen kommen allgemeine Convulsionen mit Schweiß und Fieber vor und die Kinder gehen nach einigen Wochen paralytisch zu Grunde.

Die Prognose kann für die grosse Mehrzahl der Fälle vollkommen günstig gestellt werden, in $\frac{1}{4}$, längstens $\frac{1}{2}$ Jahr heilen die meisten Kinder bei einer einigermaßen rationellen Behandlung vollständig. Die Chorea, welche nach einzelnen Autoren in Epilepsie und Blödsinn übergeht, beruht eben auf materieller Erkrankung der Centralorgane und ist demnach nicht zum reinen Veitstanz zu rechnen.

Recidive sind nicht selten; mir wurden schon zweimal Kinder gebracht, welche vollkommen genesen, mehrere Monate ganz verschont geblieben waren, hierauf aber von neuem von einer langwierigen Chorea befallen wurden. Entschieden bleibt bei diesen Kindern eine grosse Neigung zu Neuralgien der verschiedensten Art zurück. Merkwürdig ist, dass nach statistischen Zusammenstellungen bei Knaben die Heilung viel langsamer erfolgt als bei Mädchen, bei jenen dauert die Behandlung 74—81 Tage, bei diesen nur 33—37 Tage. Der letztere Durchschnittstermin scheint übrigens etwas gar zu kurz gegriffen zu sein.

Therapie.

Eine causale Behandlung kommt schon deshalb fast niemals in Betracht, weil, wie bei der Aetiologie gezeigt worden, eine wirkliche Begründung der Ursachen bisher noch nicht gelungen ist. Zu berücksichtigen sind in dieser Beziehung der Aufenthalt in einer feuchten Wohnung, freiwilliger Abgang von Würmern, Ovarie, Beginn der Menstruation und die rheumatischen Complicationen.

Die medicamentöse Behandlung mit einer Umassse von Mitteln kann nur dann gebührend gewürdigt werden, wenn man sich die spontane Heilung der Chorea stets in's Gedächtniss zurückruft. Es erfolgt eben auf jedes Mittel und trotz jedes Mittels, wenn es nicht gar zu absurd und intensiv toxisch ist, nach einigen Wochen, längstens Monaten Genesung. Dieser Ueberfluss an Heilmitteln findet sich nur bei zwei in ihren Ausgängen ganz entgegengesetzten Krankheitsklassen, nämlich bei denen, welche spontan heilen und bei denen, welche fast regelmässig unheilbar sind. Als Prototyp der letzteren mag die Epilepsie gelten. —

Wenn die Krankheit mit Gefässerregung in kräftiger Individuen auftritt, so hat man Blutentziehungen für rathlich befunden, und Sydenham als Gewährsmann angeführt. Mir scheint jedoch eine jede Antiphlogose unnütz, wenn nicht gar schädlich, indem die besprochene Gefässerregung durchaus keinen bedenklichen Charakter hat und bei längerem Bestehen der Krankheit sich vielmehr häufig ein arthritischer Zustand einstellt, der durch vorausgegangene Blutentziehungen beschleunigt wird. Die ableitenden Mittel auf den Nacken und längs der Wirbelsäule applicirt, worunter besonders die Salben mit Tinctura

stibiatum und Sublimat, die Vesicantien und das Croceum gerühmt werden, sind nutzlose Qualereien, welche den armen Mädchen bleibende, zum Theil entstellende Narben zurücklassen und für späterhin ihre geselligen Vergnügungen, den Besuch der Bälle etc., verkürzen können.

Weniger bedenklich sind die Ableitungen auf den Darmkanal, die man durch Mittelsalze, Ricinusöl, Rhabarber, Senna oder Aloe erzielen und bei Verdacht auf Eingeweidewürmer ganz passend mit Wurmmitteln verbinden kann. Calomel und Brechweinstein sind wegen ihrer nachtheiligen constitutionellen Wirkungen sowohl in grossen wie in kleinen Dosen zu vermeiden, was um so leichter geschehen kann, als der spezifische Einfluss der letztgenannten Mittel auf die Chorea durchaus kein deutlicher ist.

Fehlt die Gefässerregung schon zu Anfang der Krankheit, so kann man sogleich zu den empirischen Mitteln greifen, unter welchen jedenfalls das Eisen das rationellste ist, zumal wenn die Kinder anämisch sind und an beginnender Chlorose leiden. Die Eisenpräparate und eisenhaltigen Mineralwässer werden von den meisten und besten Therapeuten als nützlich empfohlen und können ohne allen Schaden viele Wochen lang auch nach Ablauf der Muskelerkrankung fortgegeben werden. Stellt sich hiedurch eine zu beträchtliche Obstipation ein, so muss derselben durch obengenannte mildere Abführmittel abgeholfen werden. Welches Präparat gewählt werden soll, ist bezüglich der Wirkung auf das Nervenleiden ziemlich gleichgültig, es richtet sich dies mehr nach der Verdaulichkeit und dem Geschmack zum Einnehmen. Zum Verschlucken von Pillen verstehen sich Kinder, namentlich kleinere, sehr schlecht; obwohl sie mit grösster Leichtigkeit einige Dutzend Kirschkerne verschlucken, und immer eigens dazu angehalten werden müssen, sie nicht zu verschlucken, so kann man sie oft nicht dazu bringen, ein gleiches mit harten Pillen zu thun. Sie heissen auf dieselben und behalten die Stücke so lange im Munde, bis sie weich werden, wodurch natürlich der Zweck der Pillen, das Medicament geschmacklos in den Magen zu bringen, total verfehlt wird. Die Darreichung von Pulvern ist auf die Länge unbequem, sie müssen oft in der Apotheke repetirt werden und werden leicht an der Luft feucht. Ich ziehe deshalb die Eisentinkturen vor und bediene mich fast immer der Tinct. ferri pomati, die am leichtesten assimiliert zu werden scheint. Romberg empfiehlt das Ferrum cyanatum, andere das schwefelsaure oder kohlensaure Eisenoxyd. Nach meinen Beobachtungen wirken grosse Dosen der Eisentinktur durchaus nicht günstiger auf den Verlauf der Chorea als kleine, machen aber leichter Verdauungsstörungen und Verstopfung, woshalb ich niemals für nöthig finde, über 20–30 Tropfen pro die zu steigen. In der Convalescenz können übrigens auch China, Chinin und andere Tonica mit Vortheil abgegeben werden.

Ausserdem gibt es nun eine Menge von empirischen Mitteln, denen allen es weniger an Lebenskräften als an esoterischer Heilkraft mangelt. Zuerst sind hier zu nennen die metallischen Mittel, Zink, Kupfer und Arsenik. Unter den Zinkpräparaten ist das beliebteste das Zinkoxyd — bis zu 1,0 3mal täglich gegeben, — dann das schwefelsaure Zink, — 0,05–0,5 in steigender Dosis — das Cyanzink — täglich zu 0,2 — und endlich das Ferrocyanzink. Escobar rühmt das kohlensaure Zink zu 0,1–0,8 pro die.

Der Kupfersalmiak und das schwefelsaure Kupfer sind wegen ihrer nauseausen Wirkung mit Recht verlassen. Ein gleiches sollte wegen möglicher Intoxication mit der Tinct. arsenic. Fowler. geschehen, für welche Henoeh wieder aufgetreten ist.

Die Narcotica zu versuchen, liegt bei der Muskelstarre sehr nah. Man hat mit denselben mannigfach experimentirt. Opium, Belladonna, Hyoscyamus, Haichisch, Blassaure, Aconitin, Atropin, sind längstens wieder verlassen, auch das Strychnin, von Troussseau vorgeschlagen, ist von allen tüchtigen Aerzten verworfen worden.

Vorübergehende Erleichterung verschafft bei sehr heftiger Chorea, bei der die Kinder Nachts nicht zur Ruhe kommen können, das Chloroform. Oefter repetirte Inhalationen nehmen aber den Kopf ein und stören die Verdauung. Chloralhydrat wirkt auch hier sehr zweckmäßig, beruhigend ohne unangenehme Folgen.

Ebenso zahlreich wie die Narcotica hat man auch schon die vegetabilischen und animalischen Nervina angewendet, Baldrian, As foetida, Campher, Moschus, Castoreum, Arnica, Colchicum etc. Von öfterlicherer Wirkung sind die kalten Bäder und die Begießungen in trockener Wärme, welche, da sie den Kindern meistens sehr unangenehm sind, wenigstens das bezwecken, dass die Willenskraft es gut als nur immer möglich angeregt wird, den unwillkürlichen Bewegungen zu widerstehen. Dupuytren ist ein begeisterter Lobredner der kalten Bäder und Begießungen und hält bei deren consequentem Gebrauch eine jede Chorea für heilbar, worin er doch vielleicht etwas zu weit gehen dürfte.

Da manche Mädchen kalte Begießungen und Bäder durchaus nicht vertragen, so kamen auch die warmen in Anwendung und unter diesen namentlich die Schwefelbäder. Man gibt zu diesem Zwecke in jedes Bad 120,0 Kalisulfideller und lässt die Kinder täglich eine Stunde lang im Bade sitzen. Rutz ist der Meinung, dass die Krankheit dadurch auf 24 Tage abgekürzt wird; Köhler aber bemerkt hiezu, dass es auch Fälle gibt, wo die Verschlimmerung der Krankheit den Fortgebrauch der Schwefelbäder verhindert.

Was die psychische Behandlung der Chorea-kranken betrifft, so wird mit Strenge viel häufiger geschloffen als gelüftet, womit jedoch nicht gesagt sein soll, dass die Anregung der Willenskraft ganz außer Acht gelassen werden sollte. Man muss durch Güte und Versprechen kleiner Geschenke die Kinder veranlassen stille zu halten, bis 10 oder 20 und sofort gezählt worden, man muss sie kleine leichte Hand- und Fußbewegungen machen lassen und sie nach gelingender Ausführung belohnen etc.

Das Festhalten, Binden und Schönen der Kinder hat man bisher für nachtheilig gehalten, in neuerer Zeit sind jedoch wieder einzelne Fälle bekannt gemacht worden, in denen die Anlegung von Schönen — zuerst nur des Nachts, wo wegen Heftigkeit der Chorea die Kinder nicht zur Ruhe kommen konnten, dann auch Tag und Nacht mehrere Tage lang fortgesetzt — eine auffallende Besserung und sofortige Heilung zu Wege brachten (Monahan in Dublin). Es wird bei dieser Behandlung wohl nur für eine sanfte Fixirung der Extremitäten durch passend gebogene und gepolsterte Schönen gesorgt werden dürfen, während den Bewegungen des Rumpfes kaum Einhalt ge-

than werden könnte. Jedenfalls ist diese Methode genauerer Prüfung würdig.

Die oben empfohlenen, kleinen, willkürlichen Bewegungen hat die schwedische Heilgymnastik systematischer ausgebildet, indem zuerst passive, dann die sog. duplicirten und endlich active complicirtere geübt werden.

Die diätetische Behandlung ist von keiner besonderen Wichtigkeit. Die unregelmässig und schlecht genährten Kinder der Armen heilen ungefähr ebenso schnell als die der wohlhabenden Klasse, wo jedes Stückchen Brod und Fleisch erst nach Einholung des ärztlichen Consensus gereicht wird. Eine gesunde trockne Wahrung und Aufenthalt in frischer Luft beschleunigt die Heilung, geistige Anstrengung verzögert sie, bei Organisten gelingt sie häufig gar nicht.

Fassen wir die ganze Therapie zusammen, so besteht sie im Wesentlichen in kalten Begiessungen und Bädern, Darreichung von Eisen und vernünftiger psychischer Willenstärkung. Bei den heftigsten Formen ist Chloralhydrat dem übrigen Narcothis vorzuziehen, auch wäre ein Versuch mit den Schienen nicht contraindicirt.

4) Chorea major. Der grosse Veitstanz. Chorea Germanorum.

Ein ausserordentlich seltenes Uebel, unter welchem man auch wieder Krampfkrankheiten verschiedener Art versteht. Die Chorea major befallt fast nur Mädchen, und zwar nur solche, welche sich der Pubertät nähern. Das Wesentliche der Krankheit besteht darin, dass die Kinder Paroxysmen von geordneten, scheinbar mit Bewusstsein und eigenem Willen ausgeführten Bewegungen bekommen, wobei sich eine eigenthümliche Potenzirung der geistigen Fähigkeiten einstellt. Der Uebergang zum Somnambulismus, Metallfühlen, thierischen Magnetismus, zur Wunderrucht und wie diese räthselhaften Zustände sonst noch heissen mögen, liegt sehr nahe, und es bedarf des ganzen ärztlichen Scharfsinns, hier die richtige Grenze zwischen Betrug, Selbsttäuschung und wirklichen pathologischen Processen zu treffen.

Symptome.

Die Erscheinungen sind bei den einzelnen Kranken so mannigfaltig, dass es schwierig ist, ein für alle Fälle passendes Krankheitsbild zu entwerfen. Dem Ausbruch der Paroxysmen gehen fast immer psychische und körperliche Vorboten voraus. Zu den ersteren gehören Traurigkeit, grosse Zerstretheit, ängstliches Wesen, Gespensterfurcht, lebhafte Träume, unruhiger Schlaf, zu den letzteren Herzklopfen, Cardialgie, Verdauungsstörungen, Appetitmangel, Kopf- und Rückenschmerzen.

Endlich kommt es zu wirklichen Paroxysmen. Die Kranken begreifen scheinbar willkürliche, bald einfache, bald complicirte Bewegungen zu machen, die sie mit unnatürlicher Kraft, Sicherheit, Schnelligkeit und Ausdauer ausführen. Man sieht die Kranken schwimmen, klettern, springen, tanzen, kriechen und die merkwürdigsten Körperverrenkungen versuchen.

Bei anderen kommt es wieder mehr zur rein psychischen Alienation

oder Exaltation, sie fangen an zu dichten, zu predigen, zu singen, mit grosser Zungenfertigkeit oder gesteigertem Pathos Unsinn zu schwätzen, oder Thierlaute zu imitiren.

Der Willenseinfluss ist nicht immer vollkommen aufgehoben, die einen können durch kein Hinderniss und keine Schmerzreizung aus ihrem Paroxysmus gebracht werden, während andere durch ein einziges Glas Wasser, auf einmal in's Gesicht gegossen, wieder zur Vernunft gebracht werden.

Am besten lässt sich dieser Zustand mit einer nicht vollkommenen Chlorsäuremarkose vergleichen, in der die Kranken eben auch in einer ungewohnten Aufregung sich befinden. Diese Paroxysmen dauern bald nur einige Minuten, bald mehrere Stunden und enden entweder, indem die Kranken ruhiger werden, sich verwundert umsehen und wie aus einem Traum erwachen, oder indem sie in einen tiefen, oft viele Stunden dauernden Schlaf verfallen. Die Erinnerung an den Zustand ist verschieden. Sie erinnern sich an das, was im Anfalle gesagt und geschehen ist, entweder so, wie man sich eines Traumes erinnert, oder es haftet gar nichts davon im Gedächtnisse.

Reflexbewegungen auf äussere Reize bleiben während des Anfalles ganz aus oder kommen nur auf einzelne derselben zu Stande, wodurch immer der Verdacht auf Betrug sich regen muss. Wenn z. B. ein Mädchen Kacipen, Stechen, Schlagen unbeachtet erträgt, auf Kitteln der Nasenlöcher aber nicht, auf kaltes Begiessen momentane zusammenfährt und durch Brechen unter Wehklagen zu sich kommt, so liegt gewöhnlich keine wirkliche Erkrankung, sondern vielmehr eine Geistesverwirrung zu Grunde, in Folge deren die exaltirten Kinder um jeden Preis Aufsehen erregen wollen.

Der Verlauf der ganzen Krankheit ist wieder ein sehr verschiedener. Es kann mit einem einzigen Anfalle alles beendet sein, oder es folgen viele Anfälle in kleinen oder grossen Intervallen von einigen Stunden bis zu vielen Tagen aufeinander. Ist die Zwischenzeit zweier Paroxysmen eine kurze von nur einigen Tagen, so wird das Allgemeinbefinden kaum jemals normal, indem immer Muskelschwäche, wunderliches, verstörtes Wesen und Verdauungsstörungen zurückbleiben. Die ganze Krankheit dauert nur einige Wochen oder Monate, und geht mit Eintritt regelmässiger Menstruation in vollkommene Genesung über. Es sind auch Recidive beobachtet worden, wobei die Periode von neuem zurückblieb oder unregelmässig wurde. Nach der Genesung stellt sich bei den meisten dieser Mädchen, namentlich den sog. Heilseherinnen, eine ausserordentliche Fruchtbarekeit und Neigung zu Fettleibigkeit ein.

Was das Geschlecht betrifft, so befiel die Krankheit nach einer Statistik von Wicke, der 126 Fälle gesammelt hat, 88 Mädchen und 38 Knaben. Von 107 Kranken, bei welchen der Anfang der Krankheit ermittelt werden konnte, standen 84 zwischen dem 10.—20. Lebensjahre und unter diesen wieder 62 zwischen dem 10.—15. Jahre. Erbliche Anlage ist öfter nachzuweisen, fast immer wurde die Erziehung dieser Kranken von hysterischen, überspannten Müttern geleitet.

Ueber die materielle Basis dieses Zustandes im Gehirn lassen sich nur Vermuthungen angeben. Keines Falles sind einzelne bestimmte Theile desselben erkrankt, sonst müssten die Symptome constanter und

gleichmässiger sein, und keinesfalls wird hier ein entzündliches Exsudat oder überhaupt eine bleibende räumliche Veränderung im Gehirn angenommen werden dürfen, weil die Krankheit fast immer in Genesung endigt und nur ausnahmsweise in Paralyse oder Epilepsie übergeht. Die Gesamthatigkeit des ganzen Gehirnes ist eben in erhöhtem Maasse gesteigert und diese Steigerung macht sich bald mehr in einer grösseren Reizbarkeit des motorischen Nervensystemes, bald mehr in einer Exaltation der psychischen Richtung des Gehirnes geltend. Hasse sagt sehr treffend: „Es gibt nur einen Zustand, welcher zur Erklärung dieser sonderbaren Krankheit benützt werden kann, der Schlaf und das Träumen. Denkt man sich das so mannigfaltige, bald einförmige, bald wechselvolle Spiel der Träume in wirkliche Action übersetzt, so hat man eigentlich alle Vorgänge des grossen Veisthanzes beisammen.“

Zur Vervollständigung dieser Analogie kommt noch, dass der Paroxysmus mit einer Art von Einschlafen, von Verwinkensein beginnt und mit einem Erwachen, wie aus einem Traume, wieder aufhört, so dass wir nach dieser Anschauung in der Chorea major nichts als einen potenzierten lebhaften Traum mit grosser Reizbarkeit des Sensoriums vor uns hätten.

Die Prognose ist wohl in so fern günstig, als die Krankheit nicht tödtlich ist und die Anfälle fast immer, wenn auch erst nach langer Zeit, sistiren; hingegen bleibt diesen Individuen lebenslänglich etwas wunderliches, bizarres zurück, das den näheren Umgang mit ihnen nicht wünschenswerth erscheinen lässt. Bald verfallen sie religiöser Schwärmerei, bald exaltirten Liebeshändeln, und fast niemals sehen sie im Rufe einer ruhigen, vernünftigen Frau.

Behandlung.

Es gibt keine Medicamente, welche mit Sicherheit die Anfälle vermeiden, nicht einmal solche, die die Krankheit abkürzen können. Hingegen bietet die obige Beschaffenheit des Körpers häufig Gelegenheit zu therapeutischen Eingriffen. In der Regel leiden diese Mädchen an Chlorose und hartnäckiger Obstipation, weshalb Eisen und zwischen Laxantia gewöhnlich indicirt sind. Meistens ist die Verstopfung so schwer zu beseitigen, dass man endlich zu starken Drastica greifen muss, auf welche dann schliesslich einige copiose Ausleerungen folgen.

Die Hauptsache bleibt immer die psychische Behandlung. Wenn die Anfälle einmal zum Gegenstand allgemeiner Bewunderung und des Stüdigespräches geworden sind, so hören sie Jahre lang nicht mehr auf. Es ist deshalb vor Allem nöthig, den Kindern eine passende Umgebung zu schaffen und bei exaltirten Angehörigen ist es am besten, wenn sie sofort zu anderen Leuten gebracht werden. Die Anfälle müssen ruhig abgewartet, und wenn sie vorüber sind, vollkommen ignoriert werden.

Im übrigen hat man dafür Sorge zu tragen, dass sie sich keinen Schaden durch die unbedingten Bewegungen zufügen.

Niemals darf man den Kindern wieder erzählen, was sie während der Anfälle gethan und gesprochen haben.

Alle aufregende Lektüre und Gesellschaft ist strenge zu meiden,

angemessene körperliche Bewegung und selbst Anstrengung hat den doppelten Vortheil, dass dadurch die Verdauung angeregt und der Geist von schädlichen Phantasien abgehalten wird. Hasse hält die Versuche mit dem animalischen Magnetismus und überhaupt alles Experimentiren für verwerflich. In dem einzigen Falle, der mir aus eigener Praxis zu Gebote steht, war das kalte Wasser von entschiedenem Nutzen. Nachdem das höchst überspannt erzogene 12jährige Kind endlich einmal von seiner halbverrückten Mutter getrennt und in dem vernünftigen Grossvater gebracht worden war, hörten die Anfälle nach wenigen kalten Begiessungen gänzlich auf. Die Anfälle bestanden darin, dass sich das Mädchen plötzlich auf den Boden setzte, ein eigenthümliches, granzendes Geschrei erhob und sich blitzschnell dabei um sich selbst drehte. Einige Gläser kalten Wassers mit Vekemenz ihr in's Gesicht geschüttet brachten sie abhold wieder zu sich, und nachdem diese fünfmal wiederholt worden, blieben die Paroxysmen vollständig aus.

5) Epilepsie, Morbus sacer, comitialis, caducus. Fallsucht, die hinfällende Krankheit.

Unter Epilepsie versteht man convulsivische Paroxysmen, die sich öfter wiederholen und von plötzlicher, vollständiger Unterbrechung des Bewusstseins und der Sinnesfunctionen begleitet sind.

Die Handbücher der speciellen Pathologie handeln alle ausführlich von der Epilepsie, ihren Ursachen, der Art der Paroxysmen und deren Folgen, dass es unnöthig erscheint, hier ebenfalls eine erschöpfende Besprechung zu geben, und füglich auf die vortheilhaften Schilderungen von Canstatt, Romberg und Hasse in deren Lehrbüchern verwiesen werden kann. Nur einige den Kindern zukommende Eigenständlichkeiten seien hier erwähnt.

Symptome.

Bei Erwachsenen bemerkt man häufig entfernte und fast immer nahe Vorboten (Aura). Die ersten bestehen in veränderter Gemüthsstimmung, grosser Reizbarkeit, Kopfschmerz, Schwindel, Müdigkeit, die letzteren, welche unmittelbar dem Anfalle vorausgehen und oft so kurz sind, dass die Kranken kaum Zeit haben, sich in ihrer Lagerung vorzubereiten, geben sich kund als Kopfschmerz, Schwindel, Ohrensausen, Schwarzwerden vor den Augen, Wahrnehmung starker Geräusche, Zittern, Frost, Beklemmung und Herzklopfen. Von den entfernten Vorboten bemerkt man bei Kindern schon deshalb nichts, weil die Anfälle bei diesen viel häufiger sind, sich täglich oder wenigstens wöchentlich wiederholen und es deshalb gar nicht zu sehr entfernten Prodromen kommen kann, und die nahen Vorboten, die Aura, werden von den Kindern auch meistens nicht berücksichtigt, weil sie weniger auf sich achten und der Anfall in der That auch so blitzschnell die ruhig spielenden Kinder ergreift, dass überhaupt fast gar keine Aura angenommen werden kann.

Was nun der Paroxysmus selbst betrifft, so beginnt er fast regelmässig mit einem unarticulirten, ungewohnten Schrei oder Stöhnen, auch liessen wohl Thränen über die Wangen, woraus man schliessen

gilt, dass der Beginn des Anfalls schmerzhaft sein müsse, die fernere Schmerzempfindung aber durch die rasch eintretende Bewusstlosigkeit aufgehoben werde. Während oder unmittelbar nach diesem Schrei stürzen die Kinder gewaltsam nieder, sie sinken nicht einfach in die Kniee und so zu Boden, sondern sie fallen mit solcher Vehemenz hin, als wenn sie durch einen plötzlichen heftigen unsichtbaren Stoss von oben und seitwärts zieforgeschleudert würden. Die Richtung, nach welcher sie fallen, wird lediglich bestimmt durch die Stellung des Körpers im Momente des Anfalles und hat keine pathogenomische Bedeutung. Der Fall ist so heftig, dass durch das Niederschlagen schon bedeutende Verletzungen, die selbst den Tod zur Folge hatten, entstanden sind. Es kann mit ziemlicher Bestimmtheit angenommen werden, je plötzlicher der Beginn und jäher der Sturz, um so heftiger und länger wird der Anfall währen.

Nachdem die Kinder hingefallen sind, beginnen die mannigfachsten Constrictionen, bald tonische, bald klönische, bald beide miteinander abwechselnd. Durch Ungleichheit in der Form der Krämpfe zeichnet sich die Epilepsie der Kinder vor der der Erwachsenen besonders aus. Während bei Erwachsenen, namentlich Männern, immer ein Anfall genau so verläuft wie der andere; ist bei Kindern die Dauer und die Art der Krämpfe oft eine verschiedene, und es sind nicht immer die nämlichen Muskelgruppen bei der Contraction theilhaftig. Die häufigsten Erscheinungen sind Zuckernissen, tetanische Stösse und Verkrüppelungen der Extremitäten, Einschlagen der Daumen, Rückwärtskrümmung des Kopfes und die mannigfaltigsten Verkrüppelungen der Gesichts- und Augenmuskeln. Doch ist keines dieser Symptome so constant, dass sein Fehlen die Diagnose der Epilepsie schwankend machen könnte, wenn die übrigen diagnostischen Merkmale hierauf passen. Namentlich ist ohne Begründung die im Volke verbreitete Ansicht, dass Krämpfe, bei denen die Daumen nicht eingeschlagen sind, nicht zu den epileptischen gerechnet werden dürften. Es fehlt dieses allerdings häufige Symptom bei einer beträchtlichen Anzahl sonst ganz ausgesprochener Fälle.

Bei stärkeren Anfällen theilnehmen sich auch die Respirationsmuskeln, wodurch das Athmen nicht mehr gehörig rhythmisch von Statten geht und besonders die Expiration wegen der fortwährenden Contraction der Muskeln, welche hierbei zur Relaxation kommen sollten, mangelhaft wird. Der Thorax erweitert sich in Folge dessen nach allen Richtungen und das Athmungsgeräusch wird nur mehr schwach gehört, insofern man überhaupt die Lungen auscultiren kann, indem die allgemeine Unruhe des Körpers und dann das bald sich einstellende Köcheln, herrührend von dem im Larynx sich ansammelnden Schleim, eine Untersuchung der Lungen oft unmöglich macht. Die unmittelbaren Folgen dieser Respirationstörongen sind: Cyanose, Schwellung der Halsvenen, Injection der Augen, Anschwellung der Zunge und des ganzen Gesichtes, und endlich sogar Blutungen der Conjunctiva, der Nasen- und Mundschleimhaut. Nicht alle Blutungen aus dem Munde jedoch haben ihren Grund in der Respiration, viel häufiger rühren sie von Risswunden der Zunge her, welche zwischen die knirschenden Zähne gerathen ist.

Der Herzmuskel theilnehmigt sich fast niemals an den Krämpfen,

der Puls wird in Folge der allgemeinen Anstrengung wohl etwas beschleunigter, jedoch nicht unrythmisch und kehrt nach beendeten Paroxysmus sogleich zur normalen Zahl zurück.

Bei Kindern geht häufiger als bei Erwachsenen während des Anfalles Stuhl und Urin ab, und da bei ihnen die Schleim- und Speichelsecretion der Mundhöhle überhaupt eine reichlichere ist, so findet sich auch ziemlich regelmäßig der bekannte weisse oder auch blutig roth gefärbte Schaum vor dem Munde. In Folge der grossen körperlichen Anstrengung tritt gegen Ende immer ein profuser Schweiß ein, dabei lassen die starken Verzerrungen nach und die Kinder erwachen wie aus einem Traume und schreien tief seufzend um sich. Die Anfälle dauern fast nie länger als fünf Minuten, die Zeit kommt aber den bekümmerten Angehörigen natürlich viel länger vor und wird ihre Angabe deshalb unwillkürlich sehr übertrieben. Während es erwachsene Epileptische gibt, welche kaum alle Jahre einmal einen Anfall bekommen, werden die leidenden Kinder mindestens jede Woche einmal davon befallen, doch ist durchaus keine Annäherung an eine Regelmässigkeit zu beobachten. Bald entstehen längere Pausen, bald treten wieder alle Tage die Anfälle ein, bald kommen mehrere nach einander zur selben Stunde, so dass man bestimmt einen intermittirenden Charakter annehmen zu dürfen glaubt und desshalb Chinin, natürlich immer vergebens, reicht, bald wieder ein jeder zu einer andern Tageszeit.

Nicht immer sind die einzelnen Paroxysmen so ausgeprägt entwickelt wie die obige Schilderung angibt, sondern es gibt auch viele leichtere Formen, die man mit dem Namen des epileptischen Schwindels belegt hat. Die Kinder fallen hierbei nicht zusammen, taumeln höchstens etwas, suchen sich niederzusetzen oder setzen im Gehen begriffen mit starr verzerrten Gesichtszügen ihren Weg wie im Traume fort. Dieser Zustand dauert kaum länger als eine Minute, kehrt aber öfter im Tage wieder. Auch gibt es Kinder, die verschiedenen starke Anfälle, bald nur einen leichten Schwindel, bald einen heftigen Krampfanfall mit Zusammenstürzen haben. Von diesem leichten Schwindel bis zu den grässlichsten Paroxysmen mit Muskelzuckung, Knochenbrüchen und Blutungen bestehen nun die mannigfaltigsten Uebergänge. Nach einem leichten Anfälle werden die Kinder schnell wieder munter, essen und spielen wie zuvor, nach einem schweren aber verfallen sie in einen langen tiefen Schlaf, aus dem sie mit Kopfschmerz und Mattigkeit, die noch mehrere Tage fort dauert, erwachen.

In den freien Intervallen ist der Gesundheitszustand verschieden je nach der Dauer, der Heftigkeit und Häufigkeit der Anfälle. Manche Kinder, die nur an der leichteren Form leiden, behalten ihr gesundes Aussehen und entwickeln sich körperlich und geistig gehörig fort, andere aber bekommen, besonders nach mehrjähriger Dauer einer heftigen Epilepsie, einen thörichten Ausdruck, werden mürrisch, jähzornig, gefräßig, machen in ihrer geistigen Entwicklung stets Rück- statt Fortschritte, bleiben auch körperlich zurück und verdünnen endlich zu vollkommenen Cretins. Ausserdem finden sich am Körper immer eine Menge Narben von Contusionen in Folge des Hinstützens, die Zähne werden durch das Knirschen abgerieben und die Zunge in Folge der Bewandern zerklüftet.

Leichtere Formen jedoch werden das ganze Leben hindurch ohne Consequenzen ertragen, wie es ja auch bekannt ist, dass geistig eminent begabte Menschen bis an das Ende ihres Lebens an Epilepsie gelitten haben. Die hervorragendsten Epileptiker sind: Julius Caesar, Mahomet, Carl V., Petrarca, Fabius Columna, Rousseau und Napoleon I.

Der Verlauf der Epilepsie ist exquisit chronisch, indem die Kranken sie ihr Leben lang behalten und mit in's Grab nehmen; der Beginn ein exquisit senter, denn es gehen meist nur ganz unbestimmte Vorboten voraus und die Krankheit lässt sich erst durch den ersten Anfall diagnostizieren. Je jünger die Kinder, um so häufiger die Anfälle. Mit dem Alter nimmt die Häufigkeit ab bis zur Pubertät, wo wieder eine Verschlimmerung bemerkt wird; nach Eintritt der Geschlechtsreife nehmen die Anfälle eine constantere Form an und die Intervalle werden gleichmässiger. Eine deutliche Zunahme der Anfälle bemerkt man auf Onanie, Spirituosen und alle geistigen Aufregungen. Mit dem Wachsen und der Abnahme des Mundes, der bei den Laien eine grosse Rolle spielt, kann kein wissenschaftlicher Zusammenhang nachgewiesen werden. Hingegen ist das Klima oder vielleicht nur die Temperatur bei einzelnen Fällen nicht ohne Einfluss. Ich kenne einen Mann, der nur in den kalten Wintermonaten an einer leichten Epilepsie leidet, im Sommer ganz frei ist. Nachdem er nun zwei Jahre hindurch den Winter in Algier verbracht hat, ist gar kein Anfall mehr eingetreten.

Während acuter, febrilhafter Krankheiten passirt die Epilepsie, durch Verschlimmerung chronischer, krankhafter Zustände, wie Helminthen, Verstopfung, Neuralgien nimmt sie über zu. Der Einfluss auf die Geistesfunctionen wurde oben schon angeführt.

Der gewöhnlichste Ausgang ist eben Fortbestand bis zum Tode. Die Epilepsie hindert die Individuen zwar nicht, gross zu werden und ein Alter von 30—40 Jahren zu erreichen; aus statistischen Berechnungen geht jedoch deutlich hervor, dass die dieses Alter nur selten überleben. Heftige Fälle gehen gewöhnlich in andere Gelenkleiden, Hämiplegie, Manie oder Blödsinn über, welchen die Kranken alsbald erliegen. Genesung ist ein ganz seltenes Ereigniss, das bei Kindern jedoch noch öfter zur Beobachtung kommt als bei Erwachsenen. Man hat bei Kindern Epilepsie aufhören sehen, nachdem die vier Backenzähne durchgebrochen waren, zuweilen auch auf Ortswechsel. Das Nähere darüber ist bei der Aetiologie nachzufragen. Die Genesung ist entweder eine plötzliche oder eine allmähige. Es ist entweder der letzte Anfall noch ebenso stark, als die früheren, oder die Anfälle nehmen gradatim ab und gehen über in einen leichten epileptischen Schwindel, der schliesslich auch ausbleibt.

Aetiologie.

So schwierig es in den meisten Fällen ist, die wahre Ursache der Epilepsie zu ergründen, so muss doch gerade hier ein besonders sorgfältiges Examen und eine genaue Inspection des ganzen Körpers vorgenommen werden, weil nur darauf hin eine rationelle Behandlung eingeleitet werden kann. Die Form der Anfälle gibt wenig oder gar keine Anhaltspunkte für die Aetiologie und bei Kindern kann man um so weniger auf die Beschreibung einer bestimmten Art von Area hoffen,

als dieselbe überhaupt sehr kurz ist und nach dem Anfälle gleich wieder vergessen wird.

Was das Lebensalter betrifft, so verschont die Epilepsie keines. Die kleinen Kinder leiden im Allgemeinen selten an wahrer Epilepsie, wenn, was nothwendig geschehen muss, die häufigere Eclampsie streng davon ausgeschlossen wird. Die Eclampsie unterscheidet sich von unserer Krankheit deutlich dadurch, dass sie fast nur beim Ausbruche acuter Krankheiten sich einstellt, dass also das Allgemeinbefinden nach Beendigung des Anfalles durchaus nicht in den früheren Zustand zurückkehrt und dass sie ziemlich oft tödtlich ist, während epileptische Anfälle fast regelmässig gefahrlos sind.

Nach einer statistischen Zusammenstellung von Beau vertheilen sich 211 Epileptische dem Alter nach folgendermassen:

Angeborene Epilepsie	17	Beginn von 20–30 Jahren	25
Beginn bis zu 6 Jahren	22	30–40	12
" " 6–12	43	40–50	15
" " 12–16	49	50–60	5
" " 16–20	17	60–61	1

Zwei Drittheile dieser Kranken also hatten bei Beginn der Krankheit noch nicht das 16. Lebensjahr erreicht.

Bezüglich des Geschlechtes ist es für Erwachsene allgemein angenommen, dass mehr Frauen epileptisch sind als Männer, eine tabellarische Zusammenstellung epileptischer Kinder, nach dem Geschlecht geschieden, ist mir nicht bekannt, aus den Fällen, die mir bis jetzt vorgekommen sind, kann man ein derartiges Verhältnis nicht entnehmen, indem mir mehr Knaben als Mädchen im Gedächtniss sind.

Die Erblichkeit ist allgemein selbst bei den Laien anerkannt. Es ist durchaus nicht zutrug, dass die ererbte Epilepsie auch eine angeborene, d. h. eine bald nach der Geburt eintretende sei, sie kann lange latent bleiben und erst zur Zeit der Pubertätsentwicklung oder selbst noch später sich einstellen. Die angeborene Epilepsie wird namentlich beobachtet, wenn epileptische Mütter während der Schwangerschaft häufig an Anfällen zu leiden hatten. Sie ist bei Kindern unter einem Jahr nur sehr schwer von Eclampsie oder allgemeinen Fräses zu unterscheiden und charakterisirt sich erst durch den chronischen Verlauf und den Mangel aller nachfolgenden Krankheiten nach überstandem Anfall.

Zuweilen überspringt die Epilepsie eine ganze Generation und kehrt bei der zweiten mit früherer Heftigkeit wieder, oder sie befallt nur einen Theil der Nachkommen, bald die weiblichen, bald die männlichen.

Ausser den genannten Ursachen werden in den Lehrbüchern noch viele andere näher aufgeführt, deren Stichhaltigkeit jedoch sehr in Frage gestellt werden muss. So ist es z. B. doch ziemlich willkürlich, grosse Gemüthsbewegungen, namentlich Schreck, Furcht oder Zorn, als wirkliche Veranlassungen anzuklagen. Wenn diese der Fall wäre, so müsste wohl die übergrosse Mehrzahl aller Menschen epileptisch sein. Je nachdem die Aera ihren Ausgangspunkt wählt, unterscheidet man eine Epilepsia spinalis — thoracica — abdominalis — nephritica — genitalis — peripherica, ohne dass bei den Sectionen sich diese Annahmen gewöhnlich bestätigen.

Bei Kindern kommt hauptsächlich eine auf Tuberculose basirte Fallucht vor. Ein grosser Tuberkel in den Bronchialdrüsen oder im Gehirn, eine hypertrophirte, tuberculöse Lymphdrüse übt auf die umliegenden Nerven einen Druck aus, als dessen Resultat die Epilepsie entsteht. Dasselbe gilt von den seltenen günstigen Fällen, wo der Cryptorchidismus die Ursache ist. Diese heilen, wenn der Hode noch nachträglich heruntersteigt, oder, im Falle des Stockenbleibens im Canalis inguinalis, nach dessen Dilatation und Castration des Hodens.

Unter den peripheren Veranlassungen ist die häufigste der Durchbruch eines Backenzahnes, auch eines Weisheitszahnes, warauf man auch schon Genesung hat eintreten sehen. Viel seltener ist die oft wiederersüßte Heilung durch Ausschneidung einer Narbe. Seitdem dieses Factum bekannt geworden, sucht man bei den Epileptikern oft nach Narben, findet deren wohl auch und excidirt sie mit den besten Hoffnungen, die Anfälle kehren sich aber gewöhnlich gar nicht an dieses Verfahren, sondern bestehen vor wie nach fort.

Die Sectionen Epileptischer liefern durchaus keine gleichmässigen Resultate. Zumeilen fallen sie ganz negativ aus. In vielen Fällen zeigen sich die mannigfachsten Veränderungen des Gehirns, Atrophie und Hypertrophie, Verhärtung und Erweichung, plastisches und seröses Exsudat der Gehirnhaute, Blutungen, Tuberkel und Abscesse der Substanz, Beule, Exostosen, Caries oder Necrose der Kopfknochen. Bei den angeborenen Epilepsien findet man ausserdem asymmetrische Schädelknochen, Abflachung der Stirn, breites oder zugespitztes Hinterhaupt, die Schädelknochen bald auffallend verdickt, bald wieder ver dünnt. Elliotson hat vollkommen Recht, wenn er sagt, diese Art der Schädelknochen bedinge nicht nothwendig Epilepsie; nur so viel ist gewiss, dass dieses Uebel bei mangelhafter Entwicklung des Gehirnes sich oft genug einstellt. In den älteren Compendien spielen die Gehirn-injectionen des Gehirnes und Rückenmarkes eine grosse Rolle, in neuerer Zeit hält man mit Recht diese Anomalieen der Blutvertheilung für Erscheinungen, die in der Agone oder gar erst nach dem Tode entstehen. Der Befund in den übrigen Organen kann noch mannig-facher sein als der im Gehirn, d. h. mit anderen Worten, die Epilep-tiker können ausser an den Folgen dieses chronischen Leidens an allen möglichen acuten und chronischen Krankheiten zu Grunde gehen.

Bei genauer Präparation des Nervensystemes hat man schon öfter Nervino gefunden.

Diagnose.

Bei weiblichen Erwachsenen ist die Hauptschwierigkeit der Dia-gnose, die hysterischen Anfälle von wirklichen epileptischen zu unter-scheiden, was namentlich dadurch möglich ist, dass eben bei ersteren das Bewusstsein nicht vollständig schwindet, deshalb auch kein Hin-stürzen und keine Bisswunden der Zunge vorkommen können. Bei Kindern handelt es sich nicht um Hysterie, sondern um Eclampsie. Ein eclampsischer Anfall für sich allein kann unmöglich von einem epileptischen unterschieden werden, erst der darauffolgende Zustand liefert Unterscheidungsmerkmale. Nach einem eclampsischen Anfälle fühlen sich die Kinder niemals wohl, fiebern immer, bekommen ein acutes Exanthem oder irgend eine andere acute Krankheit oder er-

brechen wenigstens unverdaulichen Mageninhalt. Epileptische Kinder sind am selben oder wenigstens am darauffolgenden Tage wieder vollkommen wohl und ohne Spur von Fieber.

Ganz verdorbene Kinder kommen zuweilen auch auf den Gedanken, Epilepsie zu simuliren, um sich vor körperlichen Strafen zu schützen, indem sie sehr richtig bemerkt haben, dass wirklich epileptische Kinder niemals streng bestraft werden. Es wird ihnen diese Simulation hauptsächlich in grossen Instituten und Schulen erleichtert, wo sie häufig Gelegenheit haben, epileptische Anfälle zu beobachten. Die Unterscheidung ist, wenn die Kinder gehörig raffinirt sind und Nachahmungstalent haben, nicht immer leicht und es darf keinesfalls unbedingt Simulation angenommen werden, so lange nicht evidente Beweise vorliegen. Den Lehrern ist anzurathen, solche Kinder jedenfalls für den Anfang mit der den Epileptischen gegebenen Nachsicht zu behandeln und lieber sich das eine oder andere Mal betrügen zu lassen, als den Zustand eines wirklich kranken Kindes durch ungeeignete Strafe betrübselig zu verschlimmern. Schwerlich dürfte den Simulanten die Nachahmung der starken Targessens des Gesichtes während des Anfalles und noch weniger die darauffolgende abnorme Blässe gelingen. Nach Marc ist es sehr beschwerlich, einem wirklichen Epileptischen den Daumen zu strecken und die Faust zu öffnen, wenn dies aber einmal geschehen ist, so blüht die Hand geöffnet. Der Simulant weiss von dieser Eigenthümlichkeit nichts und wird die Faust gleich wieder schliessen, sobald er keinen Widerstand mehr fühlt. Es müsste jedoch erst noch eine grössere Reihe Epileptischer auf dieses Symptom untersucht werden, bevor man ihm unbedingte Geltung zuerkennen darf.

Behandlung.

Unter allen Capiteln der speciellen Therapie ist das von der Epilepsie das längste und zugleich unerspriesslichste. Es finden sich hier alle möglichen Mittel vertreten und die ihnen zugeschriebenen Erfolge sind so brillant, dass eine grosse medicinische Scopia das gebieth, sie zu bezweifeln. Mag auch bei vielen Mitteln Betrug oder wenigstens Selbsttäuschung und mangelhafte Beobachtung der Grund der vermeintlichen Wirkung sein, so wird eine klare Einsicht durch den Umstand besonders noch erschwert, dass auf alle Mittel, gleichviel welcher chemischen Beschaffenheit sie sein mögen, jedesmal am Anfange deutliche Besserung eintritt. Diese schon von Esquirol gemachte Erfahrung hat sich seitdem unendlich oft bestätigt und zeigt deutlich, dass der psychische Zustand von einigem Einfluss auf den Krankheitsprocess ist.

Die Behandlung selbst umfasst 1) die Prophylaxis, 2) die Entfernung der Ursachen, 3) die Anwendung der Specifica und 4) eine allgemeine körperliche und geistige Hygiene.

ad 1) Die Prophylaxe besteht darin, dass man wegen der vererbten Erblichkeit Epileptische vom Heirathen abhält und dass man das Kind einer epileptischen Mutter nicht zu diesem, sondern zu einer gesunde Amme legt. Im Uebrigen müssen die Kinder epileptischer Eltern mit möglichster Schonung erzogen werden. Man vermeide jede Ueberreizung des Nervensystemes durch frühzeitiges und angestrengtes Lernen oder durch schreckenregende Eindrücke, Anschelten, Strafen, Gespenstergeschichten etc.

ad 2) Die causale Behandlung ist, wo die Ursache wirklich ergründet worden, weitaus die günstigste. Leider gelingt die Auf-
findung der wahren Ursache viel seltener als gewöhnlich angenommen
wird, denn die von den Angehörigen gemachten Angaben, von einem
Fall, von einem Schreck, von einer überstandenen Krankheit u. s. w.
dürfen nur mit grösster Vorsicht aufgenommen werden.

Vor Allem müssen die Kinder ganz entkleidet und sämtliche
Körpertheile einer minutiösen Untersuchung unterworfen werden, niemals
ist die Aussage der Angehörigen, dass der ganze Körper normal ge-
bildet sei, zur Unterlassung dieses Examens genügen. Man hat hier-
durch schon öfter an den Gliedern und überhaupt in der peripherischen
Nervenzahn eine auf den Nerven drückende Geschwulst, eine den
Nerven zerrende Narbe, einen fremden, eingekapselten Körper gefun-
den, nach deren Entfernung die Epilepsie nicht wiederkehrte. Sogar
durch Ausschneiden eines Hühnereies und Ausreissen cariöser Zähne
ist sie schon geheilt worden sein (?). Am sichersten wirkt bei dieser
peripherischen Epilepsie die Resektion des betreffenden Nerven. Eine
besondere Aufmerksamkeit verdienen natürlich die Zustände des Ge-
hirnes und seiner nächsten Umgebung. Die Kopfknochen sind sorg-
fältig auf Narben, Einrisse, Othorhoen, syphilitische Exostosen etc.
zu untersuchen, chronische Congestivzustände des Gehirnes sollen durch
Ableitung auf den Darmkanal oder ableitende Hautreize, wie Vesicatores,
Pustelheilen, Haarseile in den Nacken und selbst Moxen beseitigt
werden. Zu diesem Zwecke wurden sogar schon die Carotiden unter-
bunden, später machte man auch Versuche sie zu comprimiren, die
bisher negativ ausgefallen sind. Wenn nach Ausschneidung von Narben
der Kopfschwarte die Anfälle nicht nachlassen, so ist die Trepanation
des früher beschädigten Knochens indicirt, welcher Operation Tissot
es sehr das Wort redet, dass er sie in allen aufgegebenen Fällen ver-
sucht wissen will.

Sind Würmer zugegen, so müssen sie durch die bei dem Capitel
„Eingeweidewürmer“ angeführten Methoden entfernt werden. Neigung
zu Verstopfung ist durch öftern Clystiere oder ein abführendes Wasser
zu bekämpfen. Die Genitalien sind genau auf Onanie zu untersuchen.
Schnell abgeheilte Hautausschläge und sistirte habituelle Schweisse
können zuweilen wieder hervorgerufen werden.

Die Behandlung der Anfälle selbst besteht wesentlich im
Schutze vor Verletzungen. Die Möbel seien abgerundet, der Ofen ver-
gittert, der Boden mit Teppich belegt und die Lagerstätte niedrig,
damit die Kranken bei nachlässigen Anfällen durch Sturz aus dem Bette
sich nicht zu sehr beschädigen. Die Kranken dürfen nie ohne Auf-
sicht bleiben. Alles Fixiren bei Beginn des Anfalles ist schädlich,
besagende Kleidungsstücke sind zu öffnen. Alle während des Anfalles
vorgewonnenen Prozeduren, Reiben, Begiessen mit Wasser, Com-
pression der Carotiden, Magnetisiren, Emathemen reizender Gasarten,
Öffnen der Daumen, Zubinden des Gesichtes und wie immer diese
medizinischen und Volksmittel heissen mögen, sind entweder nutzlos
oder bringen zum Theil auch wirklichen Schaden.

Die Versuche, bei einer länger dauernden Aura den Anfall selbst
zu verhindern, sind bisher noch nicht sehr gelungen. Es können über-
haupt nur die Anfälle möglicher Weise aufgehalten werden, welche

peripherischen Ursprungs sind. Man unterbindet dann das betreffende Glied fest und nimmt die Binde erst nach mehreren Stunden allmählig löstend wieder ab. Auf diese Weise gelangt es allerdings in einzelnen Fällen, den Anfall gänzlich zu verhüten, in andern aber wirkt dieses Verfahren so beängstigend, dass die Kranken dringend um schnelle Entfernung der Binde bitten und lieber den Anfall aushalten. Nach dem Anfälle erholen sich die Kinder gewöhnlich sehr schnell, so dass von einer Nachbehandlung nicht die Rede sein kann. Bösht längere Zeit Sopor, Müdigkeit oder Brechreiz zurück, so genügt ein Senftüg oder ein ableitendes Fussbad zu deren Beseitigung.

ad 3) Die anti-epileptischen Specifica haben sich seit langer Zeit so gewaltig vermehrt, dass die noch immer übliche Bezeichnung „Specifica“ als wahrer Hohn der Aerzte betrachtet werden kann. Es wäre unmöglich, das ganze Register der im Gebrauche gewesenen und noch gebrauchten Anti-epileptica hier wieder zu geben, nur die bekanntesten seien kurz erwähnt.

Für die Behandlung frischer Fälle eignen sich nach Köbber folgende mild wirkende Stoffe.

1) Rad. *Artemisia vulgaris* 0,5—2,0 des frischen Pulvers möglichst kurz vor dem Anfalle gegeben.

2) Rad. *Valerianae* täglich 0,5—1,0 des frischen Pulvers.

3) *Fluxus Zinci* von 0,05—1,0 überhaupt in möglichst grosser Dosis, von vielen Aerzten, namentlich von Herpin gerühmt. Die Behandlung soll bis zu drei Monaten fortgesetzt werden. Das balthin-saure Zink ist allerdings eine Verbindung zweier Epileptica, die Wirkung des Zinkes scheint jedoch durch Balthin-säure nicht verstärkt zu werden. Andere gehen lieber das schwefelsaure Zink 0,05—0,3 pro die.

Bei mehr veralteten Fällen, gegen welche die bisher genannten Mittel schon ohne Erfolg versucht worden sind, kommen folgende Mittel in Anwendung.

1) Der Kupfersalmiak und verschiedene andere Kupferpräparate, womit man wegen nussweisser Eigenschaft gewöhnlich nicht höher als auf 0,01 höchstens 0,02 steigern kann.

2) *Argentum nitricum*, von vielen Autoren, namentlich von Heim, empfohlen, bei Kindern täglich 0,01—0,06 muss Jahre lang fortgereicht werden. Die Gefahr, dass die Haut sich dabei grau färbt, scheint keine sehr grosse zu sein, indem sie nur bei sehr wenigen Kranken eintritt, mir z. B. ist sie trotz mässiger Anwendung dieses Mittels noch niemals begegnet. Die grosse Vorsicht, die man anwendet, um das salpetersaure Silber als solches in den Magen zu bringen, ist wahrscheinlich überflüssig, indem sich bei den stets vorhandenen Chlorverbindungen des Magensaftes im Magen doch jedenfalls gleich Chlorsilber bildet.

3) Das Quecksilber, innerlich als Calomel, Sublimat oder Zinnober, äusserlich als graue Salbe im Gebrauch, dürfte nur bei Verdacht auf *Tophi syphilitici* angezeigt, ausserdem aber wegen seiner constitutionellen Nachtheile sehr schädlich sein.

4) Von metallischen Mitteln sind noch zu nennen das essigsaure Blei, das Zinnoxid, das salpetersaure Wismuth, die Eisenpräparate, Mangan, Arsenik und das in neuester Zeit so viel gepriesene Bromkalium.

5) Die Narcotica wurden vielfach gebraucht und finden sich regelmäßig in den mannigfachen Geheimmitteln. Vom Opium weiß man keine bestimmte Heilwirkung, wohl aber sieht man bei dessen Gebrauch sehr häufig und rasch sich Blödsinn entwickeln. Belladonnawurzel, in neuerer Zeit das Atropin zu 0,001—0,005 Chloroform, Aether, Extr. Stramonii, Hyocyanus, Digitalis, Agaricus muscarius, Narcissus, Pseudonarcissus, Nuxvomica und Strychnin (0,002—0,03 pro die) sind mannigfach empfohlen.

6) Schließlich noch eine Reihe von Vegetabilien und andern Medicamenten aus den verschiedensten Klassen der Heilmittellehre: *Selinum palustre*, Indigo, *Viscum quercinum*, *Sedum acre*, *Folia marianum*, *Radix Paeoniae*, *Corydalon umbilicum*, *Scutellaria perfoliata*, *Ara fetida*, Moschus, Bibergeil, Campher, Bernstein, China und deren Präparate, *Rad. Dictamnus albi*, Pfefferkörner, Terpentinöl, Dippelöl, Phosphor, mineralische Säuren.

ad 4) Die allgemeine körperliche und geistige Hygiene ist von grosser Wichtigkeit. Die Kost darf nicht zu nährend sein und die Alkoholien müssen ganz verboten werden, indem man bei vielen Kranken auf jede Indigestion und noch sicherer auf jeden Schluck alkoholhaltigen Getränkes einen Anfall eintreten sieht. Verstopfung darf niemals geduldet werden. Unterstützung der Hautthätigkeit durch kaltes und warmes Baden und lüfteres Transpiriren ist in allen Fällen angezeigt. Körperliche Anstrengung, namentlich im Freien, wie Gärtnerei und Feldbau, ist oft ein completes Heilmittel. Unter den körperlichen Uebungen dürfen natürlich nur solche gewählt werden, welche keine Gefahr im Falle eines eintretenden Paroxysmus mit sich bringen, so würde z. B. das Reiten und Schwimmen kaum empfohlen werden können. Reisen und Veränderung des Klimas, besonders das Vertauschen eines kälteren mit einem wärmeren, lässt die Anfälle oft vollständig pausiren, wenn die Zerstreuung und die angenehme Gemüthsstimmung, welche den meisten Reisenden eigen ist, nicht wenig beitragen mag. Es ist eine bekannte Thatsache, dass die Kinder fast niemals während ihrer Spiele oder einer körperlichen Beschäftigung einen Anfall bekommen, sondern nur des Nachts oder wenn sie mürrisch und müsig dazuliegen.

Geistige Anstrengung darf ihnen nicht erlassen werden, es schummert der Geist, wenn er nicht geübt wird, nur um so sicherer ein. Die Lehrstunden müssen aber so gegeben werden, dass die Kinder daran Interesse haben und gerne lernen, was freilich nicht jeder Lehrer zu erreichen versteht. In öffentlichen Schulen sollten solche Kinder wo möglich nicht geschickt werden, denn sie lernen doch meistens schlechter als gesunde und werden wegen ihrer Anfälle von diesen gefürchtet oder gar verspottet. Die geistige Depression wird durch diese Verhältnisse beträchtlich gesteigert und es ist für ein Individuum, das in seiner Jugend an Epilepsie litt, später aber vollkommen genes, ein wesentlicher Nachtheil, wenn die ganze Stadt von der so sehr verabscheuten Krankheit Kenntniss bekommen hat.

Anhang.

A. *Suctus voluptabilis*. Wonnosaugen.

Bei vielen Kindern beobachtet man ein gewohnheitsmässiges Wonnosaugen, wovon Lindner in Pest in neuester Zeit ausführlichere Mittheilungen macht.

In Mittel- und Süddeutschland werden solche Kinder mit dem populären Namen „Damenlutscher oder Lutscher“ bezeichnet. Man versteht hierunter einen unwiderstehlichen Drang zum Saugen an den Fingern, dem Handrücken, dem Arme und in seltenen Fällen sogar an den Fusszehen. Andere Kinder machen fortwährend saugende Lippen- und Zungenbewegungen mit oder ohne Vorstrecken der Zungenspitze, wobei sie gerne einen anderen Körpertheil, namentlich das Ohr-läppchen, *punctum voluptabile*, festhalten.

Wenn solche Kinder mit der Mutter oder anderen Personen in einem Bette schlafen, so übertragen sie auch ganz einen solchen Wonnepunkt auf ihre Schlafgenossen. Endlich gibt es Lutscher, welche diese Wonnebewegungen bis zur Ekstase treiben, so dass sie sich selbst Schmerz bereiten und Proceßuren vornehmen, die anderen Kindern höchst unangenehm wären. Es sei hier nur an das leidenschaftlich ausgeübte Abbeißen der Fingernägel erinnert, das in manchen Familien entschieden hereditär vorkommt. Die Folgen des Lutschens sind häufig Skoliosen der Wirbelsäule, bedingt durch das anhaltende Krümmen eines Armes, Mißbildung der Lippen, ja sogar der Kieferknochen und mannigfache Unregelmässigkeiten der Zähne. Viele solcher Kinder bleiben in ihrer geistigen Entwicklung zurück, wie ja auch bei den meisten Jüdten dergleichen Wonnebewegungen vorkommen. Der Uebergang zur Onanie, welchen man für sehr nahelegend halten könnte, ist übrigens nicht häufig, unter Lindner's 69 Fällen nur einmal, beobachtet worden.

Aetiologie.

Die Ursachen dieser eigenthümlichen Zustände sind noch wenig aufgeklärt. Der Sauglappen oder Schnuller, dies bekannte Beruhigungsmittel schreiender Kinder, wurde von einigen Autoren als erste Veranlassung angenommen. Nach Lindner hatten aber unter 69 Lutschern, aus 54 Familien stammend, nur 3 im ersten Lebensjahre den Schnuller erhalten. In 2 Familien meiner Praxis, in welchen das Nagelbeißen hereditär vorkommt, besteht gleichzeitig auch erbliche Disposition zu Geisteskrankheit.

Diese Wonnebewegungen widerstehen ausserordentlich hartnäckig allen pädagogischen Methoden, weder durch Stränge noch durch Güte sind sie zu beseitigen. Gewöhnlich hören sie nach einigen Jahren, wenn schon längst alle Correctionversuche aufgegeben werden sind, von selbst auf. Der Spott der Kameraden und die erwachende Eitelkeit tragen vielleicht auch zu deren endlicher Berwindung bei.

Da namentlich vor dem Einschlafen und nach dem Erwachen der Drang besonders gross ist, soll man grössere Kinder nicht zu spät zu Bett bringen und Morgens nach dem Erwachen sogleich wieder herausnehmen. Die Hand muss natürlich consequent vom Wonnepunkte entfernt werden. Von internen Mitteln hat man noch kein wirklichen Erfolg zu verzeichnen.

B. Geisteskrankheiten.

Bei Kindern kommt vorzugsweise Blödsinn, Idiotismus vor. Man muss zwischen wirklichem Idiotismus und zurückbleibender, langamer Geistesentwicklung unterscheiden, obwohl es allerdings Uebergangsstufen gibt, bei denen diese Unterscheidung schwierig ist. Bei wahren Idioten bleibt immer auch die körperliche Entwicklung sichtlich zurück, während viele Kinder mit äusserst geringen Geistesgaben, sog. *enfants arriérés*, gerade körperlich um so besser gedeihen.

Auch am Schädel der Idioten finden sich immer beträchtliche Abnormitäten, die auf angeborener Kleinheit des Gehirnes beruhen. Der Schädelumfang ist gering, der Kopf ist von vorne nach hinten oder von den Seiten zusammengedrückt, zugespitzt, im Gegensatz zu dem endemischen Cretinismus, der am exquisitesten in einzelnen Thälern Tyrols zu finden ist und sich durch grosse, dem Viereck sich nähernde Schädelform und Verdickung der Knochen zu erkennen gibt. Der auf Gehirnkleinheit beruhende Idiotismus kommt sporadisch und überall vor und scheint durch Verwandtenehe begünstigt zu werden. Nach den statistischen Zusammenstellungen von Bemis in Kentucky stammen von 100 Idioten 15 aus Ehen, welche zwischen Geschwisterkindern geschlossen worden sind. Der Cretinismus tritt nur in engen düsteren Thälern auf und wird in der Ebene fast nie beobachtet. Ob Trunksucht im Beischlaf auch blödsinnige Kinder erzeugt, muss sehr bezweifelt werden, indem dieselben in diesem Falle wahrscheinlich viel häufiger wären.

Symptome.

Die Grade des Idiotismus sind verschieden. Im höchsten Grade mangelt alle geistige Regung und auch die Sinnesorgane functioniren nur äusserst unvollkommen. Taubheit ist häufig. Vom Sprechlernen ist keine Rede, nicht einmal der Versuch wird gemacht, durch Lallen sich verständlich zu machen, das Geschrei ist rau, monoton. Die Kinder lernen spät sitzen, gar nicht laufen, verschlingen gierig die zugereichte Speise ohne alle Prüfung, lassen, so lang sie leben, Urin und Stuhl unter sich gehen und bekommen in Folge dessen atrophische Muskeln und eine rauhe, oft mit Geschwüren bedeckte Haut. Die meisten dieser Individuen sterben glücklicher Weise schon während der ersten Dentition unter Convulsionen und erreichen niemals die Pubertät. —

In einem minder hohen Grade lernen die Kinder lallen, später auch gehen, und stellen sich Regungen des Instinktes ein. Sie begehren Speise und Trank, unterscheiden ihre Umgebung und lassen sich ungefähr wie gelchrige Thiere an Reinlichkeit und zu kleinen mechanischen Verrichtungen gewöhnen. Ihr Gang bleibt aber immer unsicher, der Gesichtsausdruck böde, die Muskulatur schwach, oft treten Convulsionen und nachträgliche Paralyse ein. Auch diese Kinder überstehen selten die erste und zweite Dentition und erreichen kein hohes Alter.

Im geringsten Grade, der eben als Uebergang zur einfachen Geisteschwäche angesehen werden muss, ist die Kleinheit des Kopfes nicht mehr auffallend, der Körper entwickelt sich, wenn auch langsam, zu fast normaler Beschaffenheit, und nur ein oder der andere Sinn

bleibt stumpf, schwaches Gesicht oder Taubstummheit macht auch diese Individuen meistens zu unnützen Gliedern der menschlichen Gesellschaft.

Behandlung.

Mangelhafte Gehirnbildung kann natürlich nie der Gegenstand direkter Behandlung sein, sondern es kann immer nur eine mögliche Weckung der schwachen geistigen Fähigkeiten durch eine passende Erziehung erzielt werden. Die erste Bedingung, solche Kinder möglichst lang am Leben zu erhalten, ist die Gewöhnung zur Reinlichkeit, ohne diese tritt immer Geschwursbildung der Haut und alsbald Atrophie ein. Am besten werden die Kinder aus dem elterlichen Hause entfernt, indem die hierzu nöthige Strenge und langjährige Konsequenz selten bei der eigenen Mutter gefunden wird. Dann kommt es darauf an, durch fortgesetzte aufmerksame Beobachtung endlich eine oder die andere Regung zu entdecken und zu dieser geschickt anzuknüpfen, wobei sich als zwei Hauptschwierigkeiten die Indolenz und die complete Zerstreuung der Idioten herausstellen. Der Unterricht dieser armen Geschöpfe erfordert eine fast übermenschliche Geduld, die sich nur ausserst selten findet, weshalb es denn auch in den meisten Fällen bei der Gewöhnung zur Reinlichkeit verbleibt. —

Andere Geisteskrankheiten sind bei kleinen Kindern sehr selten, nach vollendeter zweiter Dentition werden sie öfter beobachtet. Nach einer statistischen Zusammenstellung der während drei Jahren in Bicêtre vorgekommenen Fälle trafen durchschnittlich auf 1000 Geisteskranken zehn jugendliche Irre — die Epileptischen und Blödsinnigen nicht mit eingerechnet. Aus der Anamnese ergab sich, dass bei allen Fällen ausser erblicher Anlage und früheren Krankheiten eine verkehrte Erziehung als Hauptursache galt. Le Paulmier, der Verf. dieser Statistik, unterscheidet drei Normen von Manie im jugendlichen Alter: 1) die maniakalische Exaltation, 2) die Tobsucht und 3) die Verwildertheit.

Bei der ersten Form ist die Urtheilskraft nicht ganz aufgehoben, jedoch ein merklicher Mangel an Ueberlegung vorhanden. Die Kranken sind geschwätzig, aufgereggt, eitel und überlassen sich thörichter Verschwendung, sowie schamlosen und gewaltthätigen Handlungen. Im zweiten Grade, der Tobsucht, ist die Ideenverwirrung ausgesprochen, der Kranke springt unablässig von einem Gegenstande zum anderen, von einem Gefühlsextrem in das andere. Bei der dritten und höchsten Form endlich ist jede Ideenassociation aufgehoben; es gesellen sich dann nicht selten Paranoia und Grössenwahn hinzu, die Zeichen der beginnenden Paralyse und des Blödsinns.

Unabhängig von den eigentlichen Symptomen der Manie complicirt sich die Psychose im jugendlichen Alter oft mit Chorea oder einer Art von Starrsucht, welche in verschiedenen lange andauernden Anfällen auftritt und in unbestimmten Zwischenfällen wiederkehrt.

West spricht von geisteskranken Kindern, die erst 6—7 Jahre alt waren, die Mehrzahl dieser Kranken jedoch hat das zehnte Jahr schon erreicht und nähert sich der Pubertät. Die Prognose ist im Allgemeinen günstiger als bei erwachsenen Irren, auch Delicanten aber besteht immer eine grosse Neigung zu Rückfällen. Man hat

beobachtet, dass, je länger das Stadium der Vorläufer dauert, um so schlimmer die Prognose sich gestaltet. Jedenfalls ist der Schluss gerechtfertigt, dass — wenn auch öfter die Heilung sich als eine andauernde erweist — immerhin eine im kindlichen Alter auftretende psychische Störung als eine sehr ernste Erkrankung zu betrachten ist.

Die Behandlung gelingt im eifrigen Hano nur sehr schwer, und es ist mit aller Energie auf die Transferirung in eine Irrenanstalt zu dringen.

B. Höhere Sinnesorgane.

1. Gesichtssinn.

Die Ophthalmologie hat sich jetzt zu einer so ausgebildeten Specialität entwickelt, dass es nicht mehr am Platze ist, die bei Kindern vorkommenden Augenkrankheiten in einem allgemeinen Lehrbuch der Pädiatrik ausführlich zu bearbeiten. Es muss vielmehr auf die speziellen Lehrbücher der Augenheilkunde verwiesen werden und die dem Kindern ganz besonders unkommenen und die angeborenen Augenkrankheiten sollen hier auch nur eine cursoriale Besprechung erfahren.

1) Epicanthus. Die angeborene Augenwinkelfalte.

Man versteht unter Epicanthus eine normwidrige Anhäufung von Cutis in der Gegend der Nasenwurzel nach den Augenwinkeln zu, wodurch auf beiden Seiten eine halbkugelförmige Falte entsteht, die den inneren Augenwinkel taschenartig bedeckt. Die obere Spitze dieser Mondichel befindet sich an der Nasenwurzel, die untere verläuft sich in der Wangenhaut. Die Nasenwurzel ist immer sehr abgeflacht und die Nasenknochen stehen in einem ganz stumpfen Winkel zu einander, so dass die durch Fettanhäufung elevirten Hautfalten in einem Niveau mit der eingedrückten Nase liegen. Die Tasche geht niemals so weit, dass sie das Gesichtsfeld beeinträchtigt, bedeckt aber vollkommen den inneren Augenwinkel und kann bis zum inneren Rande der Cornua reichen. Die Ursache des Uebels ist nach v. Armon in dem flachen Nasenrücken und einer laxen Anheftung der Cutis auf den Nasen- und Thränenbeinen zu suchen. Ganz genügend ist jedoch diese Aetiologie nicht, da es auch Kinder gibt mit eingedrückter Nase und leicht verschobener Haut, welche diese Falte durchaus nicht zeigen.

Der Epicanthus ist immer angeboren und beiderseitig, kann aber auf der einen Seite grösser sein als auf der andern. Wenn man mit zwei Fingern die Haut des Nasenrückens zu einer Falte erhebt, so verschwindet er und es ist dies auch ein deutlicher Fingerzeig für die Richtigkeit des operativen Eingreifens. Da man den Epicanthus nicht gar selten bei Neugeborenen, aber niemals bei Erwachsenen sieht, so geht daraus hervor, dass er bei zunehmendem Wachsthum sich verkleinert und endlich ganz verschwindet. Wo dies nicht frühzeitig geschieht, kann man durch Ausschneidung einer Längsfalte auf der Nasenwurzel und blutige Naht der Wundränder diesem kleinen Uebel leicht abhelfen.

2) Cyclopia, Monophthalmia.

Bei Monstrositäten kommt vollständiger Defekt der Augenhöhlen vor, das Stirnbein geht unmittelbar in den Oberkiefer über und statt der Orbita findet sich nur eine flache Rinne im Knochen. Bei mangelhafter Bildung des Gehirnes, Hemicephalia, sind die Knochen der Orbita nur rudimentär gebildet, und namentlich ist der obere Rand derselben sehr verkleinert und ganz in der Nähe des Schloches. Die Cyclopia endlich ist ebenfalls nur bei mangelhaften Orbitalknochen denkbar, hier fehlen immer das Siebbein, die Thränenbeine, die Nasenbeine, und auch das Keilbein ist in seiner Form verändert. Es sind diese latter Bildungsfehler, die nur an lebensunfähigen Monstrositäten vorkommen und klinisch kein weiteres Interesse bieten.

3) Bildungsfehler des inneren Auges.

a) Coloboma iridis. Iridischisma, die angeborene Spalte der Iris, ist ein der Hasenscharte analoger Process; die Spalte geht in den meisten Fällen nach unten und das Uebel ist häufiger auf beiden Augen als nur auf dem einen. Ihre Ränder convergiren gegen den Ciliarrand zu und sind nur selten parallel oder divergirend, so dass die Pupille meist die Form einer Birne mit nach abwärts gerichtetem Stiele bekommt. In seltenen Fällen beobachtet man eine Spalte im grossen Kreise der Iris allein, so dass eine normale runde Pupille und ausserdem eine periphere, dreieckige, von ersterer durch einen irisfarbigen Querbalken getrennt, vorhanden ist. Bei abwechselnder Beschattung und Beleuchtung eines Colobomas sieht man nur an der der Spalte gegenüberliegenden Partie deutliche Erweiterung und Verengung, die Ränder des Colobomas verkürzen und verlängern sich nur wenig und können auch bei starker Beleuchtung nicht einander näher rücken. Erblichkeit des Uebels wurde schon mehrmals beobachtet. Als Complicationen kommen vor: Microphthalmus, ovale Cornea, Centrallinsenstar, Hasenscharte, Hyposphadiasis, Gehirndefekte und das Colobom des oberen Augenlides. Dieses letztere wird nur am oberen Lide beobachtet und besteht in einer engen Spalte des Lidknorpels, wobei die äussere Haut nicht mit gespalten ist. Eine embryologische Erklärung dieses äusserst seltenen Bildungsfehlers, wie sie z. B. für die Hasenscharte so einfach sich ergibt, ist hier nicht zu finden, da zu keiner Zeit des Embryobens das obere Augenlid aus zwei Theilen besteht.

b) Irideremia. Angeborener gänzlicher oder theilweiser Mangel der Iris wird immer auf beiden Augen zugleich beobachtet, einen einzigen von Meixson beschriebenen Fall ausgenommen. Man sieht entweder gar keine Iris oder nur einen schmalen, rudimentären Streifen. Die Pupille ist dabei niemals gehörig schwarz, und bei gewissen Stellungen zum Lichte leuchtet der Augenhintergrund nach Art der Katzenaugen, was auch bei grossen Colobomen zuweilen vorkommt. Die Hornhaut ist gewöhnlich nicht normal, sie ist oblong oder geht allmählig in die Sklera über, oder ist, ebenso wie die Linse, zuweilen etwas getrübt.

Solche Kinder sind natürlich immer kurzsichtig und zwicker

wegen zu grosser Lichtperception die Augenlider zusammen, wodurch sie sich eine Art von Ersatz ihres Pupillarmangels schaffen.

Wegen dieser Unvollständigkeit der Sehkraft stellt sich auch ein fortwährendes Rollen des Bulbus (*Nystagmus oscillatorius und rotatorius*) ein.

Nach Arlt hat dieser Bildungsfehler niemals zur Erblindung durch Lähmung der Netzhaut geführt, wohl aber stellen sich häufig Entzündung der Cornea und Conjunctiva und auch allmählig Linsen- trübung ein.

Die Behandlung muss sich darauf beschränken, durch blosse Gläser oder künstliche Diaphragmen den Ueberfluss von Licht zu dämpfen.

c) Der Kernstaar. *Cataracta nuclearis* ist ein scharf begrenzter, mahlkorngrosser, grauweisser Punkt im Centrum der Linse, um welchen zuweilen noch ein lichter Nebelhof gelagert ist. Er kommt meist auf beiden Augen vor und ist oft mit Irismangel oder Colobom complicirt. Ausserdem entwickeln sich bei Kindern auch nach der Geburt noch weisse Punkte in der Linse oder deren Kapsel und senden wohl auch radienartige weisse Streifen aus; das Sehvermögen wird dadurch zwar getrübt, allein nicht vollständig aufgehoben und es kommt nie zu einer allgemeinen Trübung der ganzen Linse.

d) *Atrophia pupillae congenita*. Der angeborene Verschluss der Pupille beruht auf dem anomalen Fortbestand der Pupillarmembran nach der Geburt. Nach Bischoff bilden die *Membrana capsulopupillaris* und die *Membrana pupillaris* zusammen einen gefässartigen Sack, welcher, von dem hinteren Umfange der Linsenkapsel ausgehend, sich durch die hintere Augenkammer bis gegen die Iris hinzieht, hier mit derselben durch Gefässe in Verbindung steht und durch seine vordere Wand die *Membrana pupillaris* darstellt. Da nun in früherer Zeit die Linse dicht hinter der Cornea liegt und noch keine Iris vorhanden ist, so scheint dieser Sack ursprünglich nur die Linse und ihre Kapsel zu umfassen. Wenn die Iris nun sich mehr entwickelt, so verzieht sie mit den vorderen Partien dieses Sackes, hält bei weiterem Zurückweichen der Linse nach Entstehung der vorderen Augenkammer die verwachsene Membran zurück und es entsteht so eine wirkliche Haut vor der Pupille, die Pupillarmembran. Dieselbe sollte vom siebenten Monate an schwinden und bei der Geburt nicht mehr vorhanden sein, sie besteht aber oft als durchsichtige Membran mit wenig oder gar keinen Gefässen noch längere Zeit nach der Geburt fort.

Nach Stellwag von Carion gibt es eine Menge von Fällen, in welchen die Pupillarmembran in völliger Integrität an Neugeborenen und selbst an Erwachsenen beobachtet worden ist. Sie erscheint als ein feines, graues Häutchen, welches, genau im Niveau des Schloches gespannt, die Pupille verschliesst, das Sehvermögen bedeutend schwächt und die Iris unbeweglich macht. In einzelnen Fällen ist diese Haut schon durchlöcherter oder es hängen nur mehr einzelne Fetzen an Pupillarrande. Stellwag warnt vor der leicht möglichen Verwachsung mit organisirten Exsudaten und Kapselstaaren und hält die Prognose des angeborenen Pupillenverschlusses für günstig. Die Natur hält mit der Zeit nach, was sie vor der Geburt versäumt hat. Die Membran reissert unter dem Zuge der Irimuskeln ein und die zerrissenen

Lappen werden allmählig aufgesaugt. Das Uebel ist übrigens ein solches und ist einzelnen beschäftigten Oculisten noch nicht vorgekommen. —

So viel von den angeborenen Bildungsfehlern des Auges. Zu Augenkrankheiten ist das kindliche Alter überhaupt bedeutend disponirt und wir müßten ein vollkommenes Lehrbuch der Ophthalmologie geben, wenn alle hier vorkommenden Zustände besprochen werden sollten. Zwei den Kindern speciell zukommende Augenleiden, die Blennorrhoe der Nongebereinen und die ödematöse Conjunctivitis während der Zahnung sind schon bei den entsprechenden Capiteln pag. 68 und 101 besonders abgehandelt worden. Ueber die Angenerkrankungen scrophulöser Kinder wird, um die Totalschilderung nicht zu schwächern, bei der Scrophulosis noch Einiges nachgetragen werden. Die übrigen Augenleiden unterscheiden sich fast in nichts von denen, die bei Erwachsenen vorkommen, und können somit füglich umgangen werden. Im Allgemeinen ist nur noch zu bemerken, dass bei Kindern namentlich die äusseren Gebilde, Coenae, Conjunctiva, Lider und Muskelapparat erkranken, während Erwachsene häufiger an Veränderungen des inneren Auges, Iris, Linse, Glaskörper, Chorioidea und Retina leiden.

II. Gehörn.

1) Bildungsfehler am Gehörorgane.

a) Mangel der Ohrmuschel. Delectus auriculae.

Es kommt zuweilen eine abnorme Kleinheit, Schrumpfung oder ein vollständiger Mangel der Ohrmuschel auf einer oder beiden Seiten angeboren vor, wenn gewöhnlich noch Bildungsfehler anderer Organe complicirt sind. Ausser der sehr auffallenden Deformität wird dadurch noch eine wenn auch nur geringe Beeinträchtigung des Gehörs bedingt.

Wenn überhaupt eine Behandlung eingeleitet werden soll und nicht vorgezogen wird, durch die Haare den Defekt zu maskiren, was bei einiger Gewohnheit sehr leicht erreicht wird, so bleibt nichts übrig als das Tragen eines künstlichen Ohrs. Die künstlichen Ohren aus Papiermaché, gepresstem Leder oder getriebenen Metall, mit Oelfarbe angestrichen, werden entweder mittelst einer Klammer an die rudimentäre Muschel, oder wenn gar kein Anhaltspunkt vorhanden ist, mittelst einer über den Kopf gehenden, von den Haaren zu bedeckenden Feder fixirt. Es eignen sich hierzu natürlich nur ältere, vernünftige Kinder. Die Otoplastik, die Ohrbildung aus der benachbarten Haut, hat nach Rau noch niemals ein der Ohrmuschel ähnliches Gebilde zu Stande gebracht und ist deshalb bei der Schmerzhaftigkeit der Operation und den nicht zu vermeidenden Narben ganz zu verwerfen.

Ausser dem Mangel kommt noch ziemlich häufig eine fehlerhafte Stellung der Ohrmuschel vor. Sie liegt entweder ganz dicht am Schädelsknochen an, *Auricula adpressa*, oder steht im rechten Winkel vom Schädel ab. Gegen die erstere Abnormität wird, obwohl die Feinheit des Gehörs dadurch einigermaßen geschwächt ist, fast niemals Rücksicht genommen, was gegen die letztere aus Schönheitsrücksichten sehr oft geschieht. Bei Neugeborenen lassen sich stark abstoßende Ohren leicht

durch Heftpflasterstreifen, die einige Wochen lang angelegt werden müssen, äusserst zurückbringen. Es wurde mir einmal ein Kind gebracht, dessen eines Ohr vollkommen normal stand, während die andere Muschel so nach vorwärts gebogen oder eigentlich geknickt war, dass man bloss ihre hintere Fläche zu sehen bekam und der Gehörgang ganz damit bedeckt wurde. Auch diese bedeutende Deformität wurde durch mehrwöchentlichen Heftpflasterverband bleibend gehoben.

4) Die Verschlössung des Gehörganges. *Atrisia, Obliteration, Imperforatio aetatis adultae.*

Es kommt wohl vor, dass in Folge einer Knochenabnormität der knöcherne Kanal gänzlich fehlt, gewöhnlich aber ist derselbe normal vorhanden und es ist nur seine Mündung membranös verschlossen. Dazu gesellt sich als Complication Defect oder Verkrüppelung der Ohrmuschel. Die Mündung des Gehörkanales ist entweder durch eine kleine Vertiefung angezeigt oder die verschliessende Haut ist so glatt darüber gespannt, dass man weder durch Gesicht noch Gefühl den Knöcherring mit Bestimmtheit ermitteln kann. Selten ist diese Pseudomembran weiter innen zu finden, so dass der Gehörkanal als ein kurzer blinder Sack erscheint. Die quergespannte Membran unterscheidet sich vom wirklichen Trommelfell durch ihre oberflächliche Lage und durch ihre Unempfindlichkeit gegen Berührung mit der Sonde. Das Gehör wird durch dieses Uebel nahezu aufgehoben, glücklicher Weise jedoch kommt dieser Bildungsfehler gewöhnlich nur auf einem Öhre vor. Der membranöse Verschluss ist wohl zu unterscheiden vom der mechanischen Verstopfung des Gehörganges durch *Vernix caseosa* oder bei grösseren Kindern durch Schmutz und fremde Körper aller Art. Es bleibt die Verschlössung des Ohrs oft lange verborgen, wenn das äussere Ohr gut gebildet ist, und wird erst nach Jahren von den Kindern selbst bei zunehmender eigener Beobachtung entdeckt.

Behandlung.

Es kann nur durch Operation abgeholfen werden. Dieselbe besteht darin, dass man die verschliessende Membran mittelst eines Kreuzschnittes spaltet, die Lappen mit einer feinen Hakenpincette fasst und mit einem gekrümmten Scheerchen abträgt. Am schwierigsten ist die Nachbehandlung, indem eine grosse Neigung zur Wiederverwachsung besteht, welche man durch eingeklebte Charpie, Pressschwamm, Darmsaiten und später durch feine silberne Röhrchen bekämpfen muss. Trotzdem verschliesst sich der Gehörgang zuweilen noch nach vielen Monaten. Bei knöchernem Verschluss, welcher kaum jemals ohne anderweitige grössere Bildungsfehler, *Hemicephalie* etc. vorkommt, ist natürlich von einer Operation nichts zu hoffen.

2) Die einfache Entzündung des Gehörganges. *Otitis externa.*

Wir übergangen die Entzündungen und übrigen Veränderungen der Ohrmuschel, welche ebenso wie andere Partθειen der Körperoberfläche von verschiedenen Hautkrankheiten befallen werden kann, und wenden uns gleich zur *Otitis externa acuta und chronica.*

Symptome.

Der Gehörgang stellt einen blinden Sack dar, dessen Basis das Trommelfell bildet. Seine vorderen Parthiëen sind mit Talgdrüsen, seine hinteren, dem knöchernen Kanale entsprechenden, mit Ohrschmaldrüsen versehen. Wenn auch seine Haut, so weit die Talgdrüsen gehen, der äusseren Haut analog ist, so sind doch die Charaktere der Auskleidung des knöchernen Gehörganges davon weit verschieden. Im physiologischen Zustande passt hierfür die Bezeichnung Schleimhaut durchaus nicht, indem das Secret, das Ohrschmalz, nicht die geringste Aehnlichkeit mit Schleim hat. Im entzündlichen Prozesse freilich wird das Secret schleimig eiterig, mit Ausnahme des Geruches nicht von dem einer Ozoena zu unterscheiden, und es kann dann wohl angenommen werden, dass die so erkrankte Haut die Eigenschaften einer Schleimhaut angenommen hat. Hat diese Umwandlung stattgefunden, so hören die Ohrschmaldrüsen auf zu funktionieren, und es kann als ein Zeichen von eingetretener Besserung angesehen werden, wenn wieder Ohrschmalz zum Vorschein kommt.

Bei der Entzündung des Gehörganges nun kann man eine erythematöse und eine catarrhalische Form unterscheiden.

Bei der erythematösen Otitis findet man bei genauer Untersuchung mit dem Ohrspiegel Röthung des Gehörganges und Vermehrung eines braunen Ohrschmalzes. Nach einigen Tagen desquamiert der ganze Gehörgang in grösseren oder kleineren Schuppen, das wasserhaft angesammelte Ohrschmalz trocknet in krümeligen Krusten ein und fällt bei passender Lagerung von selbst heraus oder wird im Bade herangespült. Schmerzhaft ist dieser sehr häufige Process fast gar nicht, man kann die Ohrmuschel an allen Seiten drücken und zerren, ohne dass die Kinder Schmerz äussern. Das Allgemeinbefinden bleibt hierbei ungestört, und es wird die ganze Veränderung meist zufällig bei Kindern entdeckt, welche wegen anderer Erkrankungen vorgestellt werden.

Die catarrhalische Otitis macht viel bedeutendere locale und allgemeine Symptome wie die erythematöse. Nach einem Anfang juckenden, dann wirklich empfindlichen Schmerzes, der mehrere Tage ohne weitere Veränderungen dauern kann, stellt sich gelbweisser, gleichmässig dünnflüssiger oder flockiger Ausfluss ein, der zuerst unbedeutend, später intensiv nach stinkenden Fettsäuren riecht. Der Ausfluss ist nicht fortwährend gleich stark und lässt sich am besten nach den Flecken taxiren, welche sich des Morgens auf dem Kopfkissen der Kinder finden. Diese Flecken erreichen bei profusen Otorrhöen die Grösse einer halben Hand. Nach einigen Tagen oder Wochen hört bei der einfachen, nicht dyskrasischen Otitis externa der Ausfluss auf, er wird sparsam käseartig und die Secretion des Ohrschmalzes stellt sich wieder ein. Die während der Otorrhö eingetretene Schwerhörigkeit hebt sich ebenfalls wieder vollkommen. Das gelieferte Secret vertrocknet theilweise in der Ohrmuschel, sitzt sie an und es entstehen leichtblutende Erosionen und grössere flache Geschwüre in der Ohrmuschel, an dem Ohrfläppchen und den nächst gelegenen Halsparthiën. Zugleich schwillt die Haut des Gehörganges so bedeutend an, dass sich die Wandungen fast berühren und man auch nach gründlicher Reinigung bei dem besten Lichte kein Tympanum zu sehen bekommt.

Die Untersuchung mit dem Ohrenspiegel ist äusserst schmerzhaft, verursacht leicht Blutungen und ist bei ihrer Erfolglosigkeit wegen der Schwellung der entzündeten Theile ganz zu unterlassen.

Bei dyskrasischen, namentlich scrofulösen Kindern wird die Otorrhöe leicht chronisch. Sie setzt oft monatlang in der warmen Jahreszeit aus und kehrt im Winter mit erneuter Heftigkeit wieder. Das Secret ist bald glasig schleimig, bald wieder gelb eitrig und ätzt gewöhnlich das Ohrfläppchen auf. Die Schleimhaut ist weniger infiltrirt als bei der acuten Form, bei längerem Bestehen können aber endlich polypöse Wucherungen auf ihr sich bilden, welche eine Zunahme der Schwerehörigkeit bedingen.

Eine chronische Otorrhöe ist selbst bei vollkommener Störung des Ausflusses nie als geheilt zu betrachten, wenn man in der Tiefe des Gehörganges kein Ohrenschmalz, sondern nur eine käsig schmierige, übelriechende Masse findet, ein Beweis, dass die Haut noch nicht zu ihrer normalen Funktion zurückgekehrt und die eitrigen Secretien nur gemindert ist.

Erst wenn deutliches Ohrenschmalz vorhanden, darf eine vollkommene Genesung angenommen werden. Die chronische Otorrhöe befällt selten beide Ohren zu gleicher Zeit und gleich stark, sondern es findet gewöhnlich ein alternirendes Verhältniss statt.

Die Prognose richtet sich wesentlich nach der Beschaffenheit der Auskleidung des Gehörganges und nach der Constitution des Kindes. Je stärker die Schwellung, die Excoriationen oder gar die Granulationen und polypösen Wucherungen hier sind, um so langsamer wird Heilung erzielt werden. Bei scrofulösen Kindern gelingt die Heilung ebenfalls sehr schwer und das Uebel kehrt bei jeder Erkältung, nach jedem Unwohlsein wieder. Nach Rau und Wilde kommen die gefährlichsten, schlimmsten Ausgänge, Perforation des Trommelfelles, secundäre Periootitis und Gehirnerkrankung, niemals im Gefolge der einfachen catarrhalischen Otitis externa vor. Es soll diese Anschauung aus ungenauen Diagnosen entstanden sein, welche freilich hier um so verzehlicher sind, als man eben trotz allen Auspeitzens doch mehrere Wochen lang keine gehörige Einsicht des Gehörganges bekommen kann, wenn die Anschwellung eine bedeutende ist.

Aetiologie.

Es existirt bei vielen Kindern ein inniger Zusammenhang zwischen den Erkrankungen des Mundes und des Ohres, wie sich dies bei der anatomischen Nachbarschaft auch leicht einsehen lässt. So gibt es namentlich Kinder, welche beim Durchbruch eines jeden Zahnes sowohl in der ersten als auch zweiten Dentition Ohrenschmerzen und eine kürzer oder länger dauernde Otorrhöe bekommen. Besonders häufig tritt dieselbe auch secundär nach Scharlach und Masern auf und gesellt sich zu scrofulösen Kopfausschlägen, wo man dann auch die Hauteruption ganz deutlich im Gehörgang erkennt. Die Otorrhöen kleiner atrophischer Kinder vor Beginn der Zahnung gehören in den meisten Fällen nicht zu den einfachen externen, sondern zu den Entzündungen des mittleren Ohres, deren Beschreibung unten folgen wird.

Therapie.

Die einfache, äussere Otitis verläuft auch ohne Behandlung gewöhnlich günstig. Man quäle die Kinder nicht mit den so sehr beliebten Vesicatoren und Pustelhalben, wodurch zum ersten Uebel nur ein zweites hinzugefügt wird ohne Minderung des ersten. Am Anfange genügen täglich 2–3 Einspritzungen mit lauwarmem Wasser und ein leichter Verschluss des Ohres mittels feiner Charpie. Bei grosser Schmerzhaftigkeit und anhaltender Schlaflosigkeit gebe man den Kindern je nach dem Alter Abends 1–4 Tropfen Opiumtinktur. In den ersten Tagen des Ausflusses nützen adstringirende Einspritzungen nichts, sondern verursachen meistens nur Schmerzen und nach kurzer Abnahme eine profuse Vermehrung des Ausflusses, weshalb man sich am besten acht Tage lang auf Injectionen mit warmem Wasser beschränkt. Unter den adstringirenden Mitteln halte ich für das beste und reichlichste eine Alaunlösung (1 : 10 Wasser), wovon man nach vorgängiger Wasserinspritzung und sanfter Abtrocknung des Ohres bei schlotterhaftem Kopfe einige Tropfen Morgens und Abends träufelt. Es wirkt diese Lösung ebenso adstringirend als Hollerstein und hat dabei den wesentlichen Vortheil, dass sie weder Haut noch Wäsche schwarz färbt. Nach einigen Wochen sistirt der Ausfluss gänzlich. Wenn kein Ohrenschmalz sich zeigen will, so sind die Entzündungen von Leberthran 10 mit R. Jod. 0,02 am Platze, worauf unter länger dauerndem Jucken die normale Secretion zurückkehrt. —

Bei scrophulösen Kindern ist dabei stets noch eine allgemeine Behandlung mit Leberthran, Eisen, Bädern, Landluft, Gymnastik etc., wie dies weiter unten bei der Scrophulose ausführlicher erörtert werden soll, einzuleiten.

3) Abscesse im Gehörgang. Otitis externa phlegmonosa.

Die Symptome der Phlegmone mit Eiterbildung sind viel stärker als die der vorigen Form. Da vorzugewiesener nur der vordere knorpelige Theil des Gehörganges eine Zellgewebsschicht besitzt, während im knöchernen Theile die Bohrhaut mit der Bedeckungshaut in innigem Zusammenhang steht, so kommen die Abscesse auch lediglich nur in den vorderen, leicht sichtbaren Partikeln des Gehörganges vor. Der Schmerz ist anfangs erträglich und nichts als allgemeine Rötze und leichte Schwellung zu bemerken.

Nach 24–48 Stunden steigert sich aber der Schmerz zu einer fürchterlichen Höhe, die Kinder schreien Tag und Nacht ohne aussetzen, essen und schlafen nicht mehr, und jede Bewegung des Unterkiefers vermehrt den Schmerz noch, weshalb sie nur undeutlich sprechen und vorsichtig schlucken. Selbst kleine Kinder von wenigen Monaten können davon befallen werden und machen ihre Umgebung durch häufiges Greifen nach dem Ohre aufmerksam auf den Sitz des Uebels. Nachdem diese Schmerzen 2–3 Tage in gleicher Heftigkeit und endlich klopfend fortgedauert haben und nur durch verhältnissmässig grosse Gaben Morphinum auf einige Stunden beruhigt werden konnten, ist der Gehörgang inzwischen vollständig verschwollen, und wenn man nun mit einer Sonde untersucht, so findet man, dass die Geschwulst keine gleichmässige mehr ist, sondern von einem Theile des Gehör-

ganges, gewöhnlich dem unteren, als ein kleiner, erbsengrosser, durcheinander Eitersack sich erhebt. Sticht man diesen Sack mit einer Spinnadel auf oder öffnet er sich spontan, so sind nach Ausfluss einiger Tropfen Eiter und Blut die Schmerzen plötzlich geloben, der kleine Abscess eiert nur wenige Tage, schliesst sich dann vollkommen, die Rötze und Geschwulst der Nachbarschaft geht zurück, und in kürzester Zeit ist das ganze Uebel, welches die Umgebung des Kindes fast zur Verzweiflung gebracht hatte, spurlos verschwunden.

Wirkliche unfehlbare Ursachen sind mir nicht bekannt. Der Ohrabscess befällt ebenso gut gesunde wie scrophulöse, besonders häufig aber zahnende Kinder. Die Prognose ist ausserordentlich günstig, was dem minder Erfahrenen bei den stürmischen Anfangssymptomen nicht immer wahrscheinlich vorkommt. Fast niemals bleiben Verhärtungen oder Blosslegung des Knorpels und Knochens mit Exfoliation zurück. Die Periostritis im äusseren Gehörgange ist bei Kindern ausserordentlich selten, hingegen rühren die unten folgenden Erkrankungen des mittleren Ohrs oft genug von Periostritis her. —

Therapie.

Die Hauptaufgabe ist die Milderung des wirklich höchst qualenden Schmerzes, zu welchem Zwecke die vorsichtige Darreichung von Opium oder Morphinum als das zweckmässigste erscheint. Sehr wesentlich ist es auch, den Kranken ein hartes Kopfkissen von Rosshaaren zu geben, wodurch sie leichter im Stande sind, das Ohr frei von der Berührung des Kissens zu halten. Oertlich wird am besten lauwarmes Wasser eingebracht, nicht eingespritzt und der Dampf von heissem Camillenthee auf den Abscess geleitet, Cataplasmen machen beim Anlegen und Wegnehmen unfehlbar heftige Schmerzen und beschleunigen die Abscessbildung nicht merklich. Die grösste Erleichterung verschafft man den Kranken, wenn man möglichst früh den Abscess öffnet, wozu ein einfacher Einstich vollkommen genügt. Nachdem noch einige Tage lang Injectionen gemacht worden sind, ist das ganze Uebel fast regelmässig geloben.

4) Entzündung des mittleren Ohrs. Otitis interna.

Bei der Entzündung des mittleren Ohrs kann entweder bloss die Schleimhaut allein oder nebst der Schleimhaut auch das Periostr und der Knochen afficirt sein, weshalb man 1) einen Catarrhus und 2) eine Periostritis auris mediae unterscheiden muss.

a) Catarrhus auris mediae.

Da diese Krankheit gewöhnlich auf beiden Ohren vorkommt, so ist sie auch als die häufigste Ursache der später entstehenden Taubheit zu betrachten. Der Catarrh setzt sich wahrscheinlich von der Eustachischen Trompete in die Trommelhöhle fort, und die einmal entzündete Trommelhöhlschleimhaut verhält sich eben so wie andere chronisch afficirte Schleimhäute. Es kommen bald Besserungen, bald wieder Verschlimmerungen vor, am schlechtesten hören die Kinder bei feuchtem Wetter und wenn sie an Schnupfen oder Angina leiden. Zuweilen stellt sich nach starkem Räuspern,

Niesen oder Erbrechen plötzlich ein mässig gutes Gehör ein, das aber nach einigen Stunden regelmässig wieder verschwindet.

Die Diagnose des Catarrhes der Trommelfelle lässt sich bei Kindern nicht so bestimmt und objektiv stellen als bei Erwachsenen, indem erstere sich die Eustachische Trompete nicht gutwillig catheterisiren lassen und hiemit der objektive Hauptbeweis, die Untersuchung mittelst der Luftdouche, abgeht. Die Untersuchung des äusseren Gehörgangs mit dem Ohrspiegel liefert negative Resultate, es ist hiernach nichts abnormes zu entdecken, und die schwachen Farbenveränderungen des Tympanums, auf welche einzelne Otolatriker grossen Werth legen, bieten auch keine hinlänglichen diagnostischen Anhaltspunkte.

Das Hauptsymptom ist eben eine je nach dem Wetter wechselnde Schwerhörigkeit, verbunden mit catarrhalischen Erscheinungen in der Mund- und Nasenhöhle, und ein negativer Befund im äusseren Gehörgange. —

Der Verlauf ist ein sehr trauriger, indem fast in keinem Falle von chronischem Catarrh ein feines Gehör wiederkehrt, sondern die Kranken sehr zufrieden sein müssen, wenn das Uebel sich nicht mehr und mehr verschlimmert und in völlige Taubheit übergeht. Die Ursache ist meistens Erblichkeit und zwar der scrophulösen Dyskrasie, welche bei diesen zur Schwerhörigkeit geneigten Kindern sich auffallend weniger auf andern Theilen, dem Augen, der Nase und der Haut localisirt.

Behandlung.

Da, wie schon erwähnt, bei Kindern sich der Catheterismus der Eustachischen Trompete und somit die Luftdouche nur selten leicht appliciren lässt, so muss sich die örtliche Behandlung auf Excipiation der vergrösserten Mandeln, Abschneidung des verlängerten Zepthens, Inhalation adstringirender Flüssigkeiten oder Einblasungen von Alampulver auf die hintere Pharynxwand beschränken. Da die meisten schwerhörigen Kinder scrophulös sind und ich vielfach beobachtet habe, dass gerade diese nur selten und in geringem Maasse an Hautausschlägen leiden, so habe ich bis jetzt in drei Fällen Jahre lang einer Pustelanschlag abschwächungsweise hinter den Ohren und an verschiedenen Stellen des Halses unterhalten und kann mit dieser Behandlung nur zufrieden sein, indem zwei dieser Kinder entschieden besser hören, das dritte aber keine merkliche Verschlechterung erkennen lässt. Ich streiche folgendes Pflaster:

Rp. Emplast. adhäsiv. flav. 4/0

Tartar. stibiat. 1/0

Thaler gross auf Leinwand und lasse es vier Tage lang auf der Haut liegen, worauf dieselbe mit blutigen Pusteln bedeckt ist, die mehrere Tage nicht zur Heilung kommen. Sobald diese Pusteln ganz geheilt sind, wird an einer andern Stelle dasselbe Verfahren wiederholt.

Im Uebrigen hat man die Kinder vor Catarrhen zu wahren, was am besten durch Abhärtung, durch tägliche kalte Waschungen und Landensfesteit geschieht. Gegen die Scrophulose ist Leberthran und Eisen indicirt.

h) Die Reinkautenentzündung des mittleren Ohres. Periostritis.
Die eigentliche Otitis interna.

Die Periostritis des mittleren Ohres ist die wichtigste und gefährlichste aller Ohrenkrankheiten, indem durch dieselbe nicht bloss die heftigsten Schmerzen verursacht werden und häufig vollkommener Verlust des Gehöres eintritt, sondern auch das Leben durch eitrige Meningitis im höchsten Grade gefährdet ist. Sie hat deshalb von jeher die ungetheilte Aufmerksamkeit der Otiatriker auf sich gezogen und ihre Symptome und Ausgänge sind ausführlicher beschrieben als die aller übrigen Ohrenkrankheiten.

Symptome.

Die Krankheit beginnt bei Kindern fast immer plötzlich und befällt glücklicher Weise nur ein Ohr, niemals beide zugleich. Es stellt sich ein rasch zunehmender, bohrender, stechender Schmerz in dem erkrankten Ohre ein, der nach den Nachbartheilen, den Schläfen, dem Hinterhaupt, dem Halse und den Kiefern ausstrahlt und in kürzester Zeit so intensiv wird, dass die Kinder sich wie rasend gebärden, unruhig umhertreiben und schreien und sich auf keine Weise beruhigen lassen. Die grösste Intensität erreicht der Schmerz zur Nachtzeit, auch wird er durch alle Bewegungen am Kopfe, Schlucken, Niesen, Husten und besonders auch durch laute Geräusche gesteigert. Die erhöhte Reizbarkeit der Gehörsnerven jedoch, die sich durch grosse Empfindlichkeit gegen Lärm und durch fortwährendes Ohrensausen zu erkennen gibt, lässt nur zu bald nach und macht einer mehr oder minder vollkommenen Taubheit Platz. Diese so stürmischen heftigen Symptome verfallen natürlich nicht ihre Rückwirkung auf das Allgemeinzustand. Es tritt heftiges Fieber, sehr frequenter, harter Puls, heisse Haut, allgemeines Unbehagen, Angstschweiss und grosser Durst ein.

Bei Säuglingen lassen sich die eben aufgezählten Symptome nicht alle eintreten. Dieselben sind ausserordentlich unruhig, vermehren ihr Geschrei bei jedem Lärm, greifen öfter nach dem Ohre, erwachen sogleich eingeschlämmt durch das leiseste Geräusch unter schmerzlichen Weklagen und reiben den Kopf fortwährend hin und her. Druck auf das erkrankte Ohr verursacht laute Schmerzensschreie. An die Brust gelegt, saugen sie nur ganz kurze Zeit und setzen dann schreiend ab, weil die Saugbewegung den Schmerz ebenfalls vermehrt, hingegen nehmen sie aus einem Löffel gereichtes Getränk mit Begierde zu sich. Wie jeder Schmerz und jede febrilhafte Krankheit, so kann auch dieser Zustand partielle oder allgemeine Convulsionen veranlassen, worauf dann die Verwechselung mit anderen Cerebralerkrankungen leicht geschehen kann.

Die Untersuchung des äusseren Gehörganges ergibt in den ersten Tagen der Erkrankung kein positives Resultat, sie ist übrigens namentlich bei Zuziehung des Ohrspiegels ausserordentlich schmerzhaft.

Diese heftigen Erscheinungen dauern niemals länger als fünf, höchstens sechs Tage. Es kann bis zu dieser Zeit in Ausnahmefällen der Tod unter Convulsionen und meningitischen Erscheinungen eingetreten sein, es kann wohl auch unter allmählichem Nachlass des Schmerzes eine wirkliche einfache Zertheilung der Entzündung statt-

finden, wobei jedoch immer der Verdacht auf einen ärgsten Irrthum bestehen bleibt. Meistens setzt diese Entzündung Eiter und das gesetzte eitrige Exsudat bricht sich nun auf verschiedenen Wegen Bahn nach aussen.

Der gewöhnliche Ausgang ist Perforation des Trommelfelles, Ausfließen eines blutig gestreuten, höchst stinkenden Eiters, Abgang der Gehörknöchelchen und einzelner Knochenstückchen und endlich Heilung der Peristitis mit vollständiger Taubheit des erkrankten Ohres. Es kommt übrigens auch vor, dass die Gehörknöchelchen nicht mit abgehen, dass das durchlöcherete Trommelfell sich nach Abfluss des Eiters wieder schließt und dann nur eine geringe Schwerhörigkeit zurückbleibt.

Für die Entleerung des Eiters durch die Eustachische Trompete existiren in der Literatur einzelne Beispiele. Sie scheinen sich jedoch nur sehr selten zu ereignen und sind übrigens bei Kindern, welche diesen Eiter schlucken und nicht durch Röhren aus dem Munde entfernen, schwer nachzuweisen.

Der zweite oft zu beobachtende Ausweg des Eiters geht in die Hohlräume des Zitzenfortsatzes. Eine oedematöse Rötze zeigt sich dann hinter der Ohrmuschel, es wölbt sich die geröthete Partie mehr und mehr, fluctuirt immer deutlicher und bricht, sich selbst überlassen, endlich auf. Der anfangs copios abfließende, blutgemischte Eiter hat ebenfalls einen penetranten Geruch, führt einzelne Knochenkrümchen mit sich und wird nach einigen Wochen schäumig, fadenziehend. Die Untersuchung mit der Sonde ergiebt fast immer ein oder zwei Knochenstellen, zuweilen sind dieselben wegen gekrümmten und winkligen Verlaufes nicht zu entlocken, und der Eiter ist so reich an Schwefelwasserstoff und Schwefelammonium, dass die silberne Sonde nach anfließt. Erst nach vielen Monaten, selbst nach Jahren schliessen sich endlich die Fistelöffnung, die eingezogene Hautnarbe aber bleibt mit dem Knochen verwachsen. Auch hier ist der gewöhnlichste Ausgang: Taubheit, der selten günstige: ein geringer Grad von Schwerhörigkeit. Kommt die Caries in das Bereich des Fallopischen Kanals, so entsteht Krampf und später Lähmung der entsprechenden Gesichtsmuskeln wegen Reizung und Druck des hier durchtretenden N. facialis. Nicht in allen Fällen ist diese Lähmung eine bleibende, sondern kann nach baldigem Abflusse des den Druck ausübenden Eiters wieder verschwinden; wenn sie aber einmal einige Monate gedauert hat, so besteht sie gewöhnlich Zeitlangens fort.

Als das schlimmste Ereigniss ist zu betrachten die Beteiligung des Labyrinths und Necrose des Felsenbeins mit consecutiver eitriger Meningitis und Encephalitis. Die Eiterherde der Gehirnhäute communiciren gewöhnlich mit dem Eiter des inneren Ohres und können bei Durchbruch des Trommelfelles sich sogar nach aussen entleeren. Es kommen aber auch Abscesse im Gehirn vor, ohne dass das Felsenbein deutlich erkrankt ist, wodurch bewiesen wird, dass die Otitis interna auch ausser direkter, mechanischer Fortsetzung eine consecutiv Hirnentzündung bedingen kann. Diese Gehirnerkrankungen scheinen regelmässig zum lethalen Ende zu führen.

Prognostisch ist, wenn man von der höchst zweifelhaften Zurechnung mit Recht absieht, die Perforation des Trommelfelles mit Ab-

auss des Eiters nach Aussen als der günstigste Ausgang zu betrachten, zumal wenn das seltene Glück sich ereignet, dass die Gehörknöchelchen erhalten bleiben und die Oeffnung im Tympanum sich wieder schliesst.

Minder glücklich ist schon die Caries des Zitzenfortsatzes, wobei die Schwerhörigkeit gewöhnlich bedeutender wird, die Fisteln Jahre lang nicht ruheless und schmerzhaft, eingezogene Narben entstehen. Bei Caries des Felsenbeines, die sich durch schwere meningitische Symptome, halbseitige Convulsionen und später Lähmung zu erkennen gibt, ist die Prognose fast durchgängig lethal zu stellen. Im Allgemeinen ist anzunehmen, dass die an Otitis interna erkrankenden Kinder im höchsten Grade scrophulös sind und dass sich demnach mit grosser Wahrscheinlichkeit nach Eintritt der Pubertät Tuberculose der Lungen entwickeln wird.

Ätiologie.

Scrophulosis und Tuberculosis geben das Hauptmoment für diese Affection ab. Sie alternirt entweder mit scrophulösen Exanthemen, und die Krankheit localisirt sich nach deren raschem Verloerben sogleich im inneren Ohre ohne gleichzeitige äussere Otitis, oder es verursacht ein ebenfalls scrophulöser Ohrsfluss des Gehörganges endlich Durchbruch des Trommelfelles und der Eiter gelangt nun in das mittlere Ohr. Auch im Gefolge acuter Exantheme, namentlich des Scharlachs, tritt dieses Leiden auf. Als Gelegenheitsursachen sind zu erwähnen: fremde Körper im äusseren Ohre, die das Trommelfell reizen, chemische, ätzende Flüssigkeiten, die muthwillig, zufällig oder in verkehrter Absicht in das Ohr gebracht werden, und endlich heftigere Verletzungen und Schläge auf die Ohrengegend.

Behandlung.

Die ausserordentliche Heftigkeit der Schmerzen im Anfange der Krankheit veranlasst die Angehörigen des Kindes zu dem Begehren, möglichst rasch Abhilfe zu schaffen, was jedoch in den meisten Fällen nicht so rasch, als es wünschenswerth ist, geschehen kann. Das zuverlässigste unter den schmerzstillenden Mitteln, das Opium, darf nämlich bei kleinen Kindern, die die erste Dentition noch nicht überstanden haben, nicht gereicht werden, weil dadurch sofort Sopor und dann Gehörswir entstehen und so die Wirkungen des Opiums und des auf das Gehirn sich fortsetzenden Krankheitsprocesses nicht mehr unterschieden werden können. Man darf zwar auch bei kleinen Kindern vorsichtige Versuche mit Opium anstellen; denn nicht bei allen treten diese gefürchteten Nachwirkungen ein, allein man muss sich dann auf zu kleine Dosen beschränken, dass die gewünschte Schmerzstillung gewöhnlich auch ausreicht.

Bessere Erfolge hat man bei kleinen Kindern vom Bitternadelwasser und dem Belladonnaextract gesehen. Da fast alle davon befallenen Kinder scrophulös sind, so muss man mit den topischen Blutentziehungen, deren schmerzstillende Wirkung allerdings nicht zu verkennen ist, sehr sparsam sein, indem der Schmerz und das Fieber die Kinder ohnehin schon weit genug herunterbringen.

Man soll den Kindern niemals mehr Blutegel hinter das Ohr

setzen, als sie Jahre zählen. Allgemeine Blutentziehungen sind gänzlich zu meiden.

Im äusseren Gehörgang und auf der Ohrschale sollen wir meistens gar nichts und der Schmerz ist am leichtesten zu ertragen, wenn das Ohr ganz frei, mit nichts in Berührung steht. Wird der Schmerz nach einigen Tagen klapfend und röthet sich die Gegend des Zitzenfortsatzes, so kann man mit Vortheil in den Gehörgang warme Dämpfe von Chamillen- oder Lavendelthee leiten und die hintere Ohrgegend cataplasmairen. Mit dem Durchbruch des Eiters durch das Trommelfell oder den proc. mastoideus nach aussen hört plötzlich der Schmerz auf und es handelt sich nun hauptsächlich darum, den Abfluss gehörig zu erhalten. Es ist zu diesem Zwecke dringend nöthig, den Angehörigen eine gute Spritze von Zinn, nicht von Glas zu verschaffen, und ihnen den Gebrauch derselben gründlich beizubringen. Noch zweckmässiger ist für diese Fälle der continuirliche, sanfte Wasserstrom, wie er durch die Weber'sche Douche, ursprünglich nur für die Nase bestimmt, erzeugt wird. Fleissige, 2—3stündliche Injectionen mit warmem Wasser Meten die einzige Garantie, dass der Eiterabfluss ohne Störung und schmerzlos von Statten gehe. Das Ausfüllen des Gehörganges mit der zusammengedrehten Ecke eines Scheupfades ist reizend und deshalb verwerflich. Geschieht aber gar nichts zur Entfernung des Eiters, so bilden sich, besonders am Zitzenfortsatz, Krusten, der Abfluss stockt und es entstehen neue Schmerzen. Wenn das entzündliche Stadium schon vor einigen Wochen abgelaufen ist, kann man mit abstrahirenden Injectionen beginnen, wozu sich am besten eine Alamborg (1:10 Wasser) eignet. Rau empfiehlt bei Caries des Zitzenfortsatzes eine Kupfervitriollösung, (0,1—0,5 auf 20,0 Wasser) zum Einspritzen in die Knochenhöhlräume.

Innerlich gibt man allgemein während des entzündlichen Stadiums bis zum Durchbrechen des Eiters Calomel in kleinen Dosen, wodurch jedenfalls der Stuhl offen gehalten und die Fieberhitze gemindert, der Uebergang in Eiterung jedoch nicht verhindert wird. Später bedürfen die Kinder einer roborigenden, antiscrophulösen Behandlung, Lobsterthran, Eisen, China, Beer, Wein, Fleischkost, Seebäder und Landluft.

Indem wir bezüglich der selteneren Entzündungen des inneren Ohres, dann des Ohrzwarms und der nervösen Taubheit auf die Specialwerke von Rau, Tröltsch und Erhard verweisen, haben wir nur noch übrig einige Bemerkungen über:

5) Die fremden Körper im Ohre.

Es hängt wenig mit der natürlichen Neugierde des Kindes zusammen, dass es an seinem Körper verschiedene Experimente vornimmt und die an die Oberfläche mündenden Höhlen genauer untersucht. Aus diesem Grunde herrscht auch eine ganz besondere Neigung, kleine Gegenstände in die Höhle zu schieben und nun deren Wirkung abzuwarten. Die in den Gehörgang geschobenen Gegenstände lassen sich bei einfallendem Sonnenlicht meistens leicht erkennen, nur wenn schon Anschwellung in Folge des Reizes sich eingestellt hat, kann die Untersuchung schwierig werden. Sollen dürfen wir mit grosser Vorsicht

gebannt werden, da der fremde Körper hierdurch leicht tiefer hingestossen wird.

Die Symptome, welche durch einen fremden Körper im Ohre erzeugt werden, sind sehr verschieden je nach Form und Beschaffenheit desselben. Glatte, runde Körper, die im Ohre nicht anschwellen, machen oft lange gar keine Symptome, über kurz oder lang schwillt jedoch der Gehörgang immer an und es entsteht schmerzhafter Otterhöe. Durch die Otterhöe und besonders auch durch misslungene Extractionsversuche wird das Trommelfell leicht perforirt und es treten nun alle Zeichen der im vorigen Abschnitt beschriebenen Otitis interna auf. Unter den eingebrachten Gegenständen sind die gewöhnlichsten: Kirschkern, Traubenkerne, Erbsen, Bohnen, Linsen, Steinchen, Glasperlen, Papierkügel, Zuckerplättchen. Die bei alten Leuten so häufig vorkommenden Klumpen, aus verhärtetem Ohrenschnitz, Baumwolle und Schmutz bestehend, sowie auch die steinigen Concremente, die sogenannten Otolithen, kommen bei Kindern fast niemals vor. Lebende Thiere machen zwar anfangs sehr unangenehme Empfindungen, bleiben jedoch bald am Ohrenschnitz kleben und sterben ab oder können auch leicht durch einige Tropfen Wasser oder verdünnten Weingeist getödtet werden. Die *Forficula auricularis*, der vom Volk so gefürchtete Ohrwurm, bringt keine besonderen Gefahren mit sich, sondern verhält sich im Ohre so unschädlich wie alle übrigen lebenden Thiere desselben Calibers.

Am heftigsten sind die Symptome bei ätzenden Stoffen, Hallenteiz, Kallauge und mineralischen Säuren, wodurch das Tympanum in kürzester Zeit zerstört und die ganze schreckliche Symptomenreihe der Otitis interna verursacht wird. Von den nicht ätzenden Körpern sind jene die schlimmsten, welche organischer Natur sind und durch die warme Feuchtigkeit des Gehörganges aufquellen, was besonders für Erbsen, Bohnen und Linsen, in geringerem Grade auch für alle Fruchtkerne gilt. Steinchen und Glasperlen werden lange ohne Beschwerden ertragen, wenn sie nicht durch allzu forcirte Extractionsversuche fest eingeklebt worden sind. Am günstigsten gestaltet sich das Verhältniss bei eingebrachten, harten Zuckerwaaren, welche bald erweichen und zerfließen, was durch einige Tropfen Wasser natürlich sehr befördert wird.

Behandlung.

Der einzigen und Hauptindication, der Entfernung des fremden Körpers kann nicht immer sogleich Genüge geleistet werden, indem die Schwellung und Schmerzhaftigkeit des Gehörganges zuweilen dieselbe momentan unmöglich macht. Diese Symptome müssen durch Blutigel, Cataplasmen, Einträufelungen von Oel und Einspritzungen mit lauwarmem Wasser zuerst gemildert werden. Die Methoden, den fremden Körper zu entfernen, sind sehr mannigfaltig, zum Theil aber auch umständlich und abentheuerlich. Das sicherste und einfachste Mittel, ihn flott zu machen, ist jedenfalls die forcirte Einspritzung eines Warmwassersprays. Der fremde Körper ist fast niemals genau von der Form des Gehörganges, das Wasser gelangt also hinter denselben und bringt ihn allmählig zum Schwimmen, worauf er am Ausgange des Gehörganges zum Vorschein kommt und leicht herausgenommen werden kann. Ge-

lingt die Entfernung auf diese Weise nicht, so muss man zu den Hebeln greifen. Die Hebel verfertigt man sich selbst, indem man das stumpfe Ende einer feinen Haarnadel nach der Fläche krümmt und damit an besten an der hinteren Seite des Gehörganges den fremden Körper zu umgehen sucht. Auch kleine spitze Haken, die man leicht einführt und dann von hinten scharf einsetzt, können in verzweifelter Fällen benutzt werden, es ist jedoch dabei grosse Vorsicht nöthig, denn die Spitze des Hakens bricht schnell ab und man verletzt bei einiger Unruhe des Kranken leicht das Trommelfell. Pinzetten sind bei runden Körpern, wie bei den Erbsen, Bohnen, Steinchen, Perlen etc. meist nutzlos oder sogar schädlich, indem ihre beiden Branchen zu viel Raum einnehmen und den grössten Durchmesser doch nicht erfassen können. Sie gleiten meist ab und stossen dadurch den fremden Körper nur tiefer hinein.

Eine dritte Methode, welche zwar sehr schmerzhaft, allein häufig erfolglos ist, besteht in der Extraction mittelst eines Klebstoffes, den man vorher in passender Weise mit dem fremden Körper in Verbindung gebracht hat. Man schiebt zu diesem Zwecke einen vorne und hinten glatt abgeschliffenen Federkiel in das Ohr und durch diesen auf den fremden Körper ein in Leim getränktes Bändchen. Nach einigen Stunden klebt das Bändchen ziemlich fest an und es gelingt nun zuweilen die Extraction in erwünschter Weise. Bei fest eingekleideten Steinen etc. kommt jedoch das Bändchen meist allein zum Vorschein und die ganze Prozedur war vergeblich.

Alle diese Extractionversuche erfordern eine ausserordentliche Ruhe und Stillschaffigkeit des Patienten, die man von einem Kinde nicht erwarten darf. Es muss deshalb in den meisten Fällen eine Chloroformanarkose vorgenommen werden, wodurch die ganze Manipulation ausserordentlich erleichtert wird. Die hierauf sich einstellende Otitis und Otorrhoe muss nach den schon angegebenen Principien behandelt werden, löst aber auch ohne Behandlung viel schneller wieder auf als ein dyskrasischer Ohrfluss.

6. Capitel.

Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane.

A. Nieren.

1) Bildungsfehler der Nieren.

Die Nieren fehlen niemals gänzlich und sind selbst bei den unvollkommensten Missgeburten zum Theile vorhanden. Häufiger ist nur eine Niere vorhanden, wobei Rekitansky einen Unterschied zwischen der unpaarigen und der einfachen Niere macht. Bei der ersten findet sich an normaler Stelle, links oder rechts von der Wirbelsäule, eine Niere, die sich auch in Gestalt nur wenig von der

gewöhnlichen unterscheidet, während auf der gegenüberliegenden Seite keine Spur zu finden ist. Die einfache Niere hingegen ist eine abnorme Verschmelzung zweier Nieren, als deren geringster Grad die Hufeisenniere (*ren unguiformis*) zu betrachten ist. In diesem Fall existiren noch zwei getrennte Nieren von normaler Gestalt, welche an ihrem unteren Ende mittelst einer platten Substanzbrücke verbunden sind. Je tiefer diese Verbindung wird, um so deutlicher tritt die Form der einfachen Niere hervor. Endlich verschmelzen auch die beiden Hilus und es erscheint an der Vorderseite ein Hilus. Die einfache Niere rückt immer weiter nach unten und liegt in der Regel in der Gegend des Promontoriums, selten gleich der unpaarigen am unteren Ende der Medianlinie.

Außerdem kommen noch verschiedene, kleinere Abweichungen der Gestalt vor, wobei zu bemerken, dass die Niere der Neugeborenen auch im Normalzustande eine etwas grobhöckerige bucklige Gestalt hat, im Allgemeinen rundlicher ist und nach oben eine deutliche Abflachung zeigt.

2) Der Harnsäureinfarkt der Neugeborenen. *Infarctus renal.*

Der Harnsäureinfarkt ist eine Entdeckung der Neuzeit, um welche sich besonders Verneis, Engel, Schlossberger, Virchow, Hesselung und Martin in Berlin verdient gemacht haben. Er stellt sich dar als eine scharf markirte, goldgelbe Streifung der Pyramiden, und diese Streifen laufen alle concentrisch in den Papillen zusammen, weshalb sie dort auch am dicksten gefunden werden. Unter dem Mikroskope geben sie sich als cylindrische Stälchen zu erkennen, welche bei stärkerer Compression zerfallen und aus ein rothes Pulver, bestehend aus amorphen, harnsauren Salzen, feiner Epithelien der geraden Harnkanälchen und kleinen, rhomboidrischen Harnsäurekrystallen, zum Vorschein kommen lassen. Wenn man diese goldgelben Streifen in den Papillen findet, so liegen gewöhnlich auch einzeln darselben als carminrothes Pulver im Nierenbecken und im abhängigsten Theile der Harnblase.

Der Harnsäureinfarkt kommt bei zwei Dritttheilen der Kinder vor, welche nach dem zweiten und vor dem dritten Lebenstage gestorben sind. Bei Todtgeborenen zeigt er sich fast niemals, bei Kindern, die nur einen Tag lang geathmet haben, selten, hingegen besteht er häufig länger als elf Tage, so dass man ihn annahmsweise sogar noch bei Kindern trifft, welche 4—6 Wochen lang gelebt haben.

Dass wir es hier nicht mit einem pathologischen, sondern einem physiologischen Prozesse zu thun haben, geht schon aus der Häufigkeit, aus dem Mangel aller krankhaften Zeichen bei Lebzeiten und aus den immer zufälligen Befunde bei Kindern, die an anderen Krankheiten gestorben sind, hervor. Es lässt sich dieser Vorgang nach Virchow ganz ungenzungen auf folgende Weise erklären: Unmittelbar nach der Geburt beginnt in Folge des Athmungsprocesses eine viel raschere Oxydation der Gewebe, als deren Resultat unter anderen Produkten auch die Harnsäure sich einstellt. Dieselbe wird an Basen gebunden in die Niere ausgeschieden, findet aber bei den Neugeborenen noch nicht die hinreichende Wassermenge, um gelöst zu bleiben. Die

massenhaft ausgeschiedenen harnsauren Salze schlagen sich nun in den geraden Harnkanälchen nieder und erscheinen gelb, indem sie den Farbstoff hiebei binden. Der später in grösserer Menge secretirte und deshalb verdünntere Harn löst sie zum Theil wieder auf, zum Theil schiebt er sie aufgelöst vor sich her und führt sie in die Blase und von da nach aussen. Man findet auch in der That bei den meisten Neugeborenen in den Windeln hie und da ein rothes Pulver, das sich bei genauerer Untersuchung als Harnsaureinfarkt charakterisirt. Zu dieser Erklärung passt allerdings das wenn auch ausserst seltene Vorkommen des Harnsaureinfarktes bei Todgeborenen nicht, und es geht daraus hervor, dass dieselbe nicht vollkommen erschöpfend ist. Der Harnsaureinfarkt ist zwar als ein entschieden physiologischer Vorgang anzusehen, doch gibt er auch Veranlassung zu pathologischen Processen, nämlich zu dem so häufigen Abgange von Gries und zur Bildung von Blasensteinen. Der Kern des Blasensteins besteht bei den Kindern in Wirklichkeit auch immer aus Harnsäure.

Für die gerichtliche Medicin ist der Harnsaureinfarkt nicht ohne Bedeutung, indem er ein jedenfalls ebenso sicheres Beweis für das Gelbthum als der Laugehalt der Lungen und vor diesem Zeichen noch den Vorrang hat, dass er sich bei beginnender Fäulnis nicht so schnell verändert. Im Uebrigen ist er bis jetzt bloss von pathologisch-anatomischem Interesse.

3) Morbus Brightii. Die Bright'sche Nierenkrankung.

Bei Kindern kommt fast nur die acute Form von Morbus Brightii vor und zwar nur als Nachkrankheit des Scharlachs. Die chronische Form ist so selten, dass ich sie erst ein einziges Mal bei einem tuberculösen Knaben von 10 Jahren beobachtet habe. Die letztere unterscheidet sich in nichts von der bei Erwachsenen vorkommenden Erkrankung, und wir können deshalb in dieser Beziehung auf die neueren Handbücher und namentlich auf die Frierich'sche Monographie, das Prototyp einer fleissigen, erschöpfenden Abhandlung, verweisen.

Wir beschränken uns auf eine eingehendere Betrachtung der acuten Form.

Pathologische Anatomie.

Die Nieren zeigen gewöhnlich jene Veränderungen, die Frierich dem Ende des ersten oder dem Anfange des zweiten Stadiums zuschreibt. Sie sind sichtlich vergrössert und zwar in Folge einer Volumenzunahme der Corticalsubstanz, welche dunkelroth gefärbt, nährwendig ist. Die Schnittfläche ist sehr feucht und lässt ein klebriges, blutiges Serum abstreifen. Auch findet man häufig kleine, stecknadelkopfgrosse Blutextravasate in ihr. Die Pyramiden sind bei weitem weniger verändert und zeigen nichts als stärkere Gefässinjection, die eine allgemeine, dunkle Röthung veranlasst.

Die Vergrösserung der Niere hat ihren Grund in einem Faserstoffexsudate, das die gewundenen Harnkanälchen ausfüllt und in der von der Schnittfläche abgestreiften Flüssigkeit mikroskopisch nachgewiesen werden kann. Es finden sich dann unter dem Mikroskope zahlreiche bright'sche Cylinder, die bald klar, hyalin, bald noch mit Epithel-

vollen umgeben sind, bald deutliche Blutkörperchen einschliessen. In viel geringerer Menge kommen die Cylinder auch in den geraden Harnkanälchen vor, fehlen übrigens nie im Bodensatz des erweiskaltigen Urines. Wenn die Kinder gleich zu Anfang dem Process erliegen, so enthält der Urin viele Blutkörperchen und ist davon dunkelroth gefärbt, nach längerer Zeit ist er hellgelb, trübe, Blutkörperchen und Blutfarbstoff sind verschwunden, Eiweiss und Cylinder aber immer noch nachzuweisen. In diesem letzteren Falle zeigt die Corticalsubstanz mehr die Charaktere des zweiten Stadiums nach der Eintheilung von Frerichs.

Sie verliert dabei ihre dunkelrothe Farbe mehr und mehr und wird zuerst stellenweise, dann überall massig gelb. Die Blutkörperchen in den verstopften Capillaren zerfallen, werden sammt dem Farbstoff resorbirt oder weiter geschwemmt und das Exsudat innerhalb der Harnkanälchen geht ebenfalls eine Rückbildung ein. Die Cylinder zerfallen zu Fettmetakotylen, behalten wohl noch lose ihre Form, verlieren sie aber schon durch den einfachen Druck des Deckgläschens, weshalb deren Anwendung in diesem Stadium nicht immer thöricht ist.

Die Niere behält ihre Volumenzunahme bei, ist sehr brüchig, die Kapsel lässt sich leicht abziehen und die Oberfläche zeigt sich alsdann etwas granulirt. Diese nicht lockrige Beschaffenheit entsteht dadurch, dass die Fettmetamorphose und der darauffolgende Schwund nicht in allen Theilen der Rindensubstanz gleichmässig vor sich geht. Während die eine Parthie schon collabirt und zu schwinden beginnt, ist eine andere noch starr von Exsudat und nimmt nach dem früheren grossen Raum ein.

Die Menge des Urines in der Blase ist in ganz acuten Fällen eine geringe, bei Kindern, die erst nach mehreren Wochen zu Grunde gehen, kann sie wieder zu ihrem normalen Maasse zurückgekehrt sein.

Ausserdem findet man fast in allen Leichen Anasarca und hydroptische Ergüsse im Peritonialsack, in den Pleuren, im Herzbeutel, oft combinirt mit entzündlichen Anschwellungen namentlich auf der Pleura. In den übrigen Organen konnten keine so constanten Veränderungen, welche wir bei der chronischen Form Erwachsener finden, nicht vor.

Symptome.

Die ersten Zeichen der Nierenkrankung stellen sich gewöhnlich zur Zeit der stärksten Desquamation, am Ende der dritten Woche ein. Die Kinder, schon ganz munter und längst wieder bei gutem Appetit, verlieren denselben plötzlich wieder. Sie bekommen Uebelkeiten, wohl auch Erbrechen; Fieber und Mattigkeit stellen sich von neuem wieder ein. Zu gleicher Zeit bekommt das Gesicht ein gedunsenes Aussehen, die Haut der unteren Angulider wölbt sich zu kleinen glänzenden Stücken und in wenigen Stunden ist die ganze Körperoberfläche von Anasarca ergriffen. Dabei bemerkt man eine sichtlich Sittirung der Harnsecretion, oft heftige Schmerzen in der Nierengegend, in den schwersten Fällen lassen die Kinder länger als 24 Stunden keinen Urin und entleeren endlich unter lebhaften Schmerzen einige Tropfen blutig gefärbten, concentrirten Harnes. In vielen Fällen aber ist der Harn nicht so sehr vermindert und nicht blutig gefärbt, sondern

von blassgelber Farbe und klar, so dass die einfache Besichtigung gar keine Veränderung an ihm erkennen lässt.

Die chemischen und mikroskopischen Veränderungen des Harnes sind dieselben, wie bei Morbus Brightii der Erwachsenen. Die Menge des Eiweisses ist in den ersten Tagen, wenn nicht sehr viel Blut beige-mischt ist, geringer als später und hält sich zwischen 10 und 30 pro mille. Die approximative Bestimmung des Eiweissverlustes lässt sich ausstellen, indem man täglich eine gewisse Menge Harn in einem in Grade eingetheilten Probirgläschen kocht und das gefällte Eiweiss 24 Stunden lang sich senken lässt. Weiss man nun die Menge der ganzen täglichen Harnmenge, so kann man leicht berechnen, wie viel Cubikcentimeter Eiweiss täglich durch den Urin entleert worden. Genaue Resultate werden durch meine optische Eiweissprobe erzielt. Bei Kindern ist jedoch das Sammeln des 24stündigen Urines mit ziemlichem Schwierigkeiten verbunden, indem sie immer bei der Stuhlentleerung auch Urin lassen.

Die Cylinder findet man am sichersten und in grösster Menge, wenn man einen vor mehreren Stunden gelassenen Urin langsam abfließen lässt und den Rest in ein kaltes Champagnerglas gießt. In diesem Glas bleibt der Urin wieder mehrere Stunden ruhig stehen, hierauf giesst man ihn bis auf einige Tropfen ab und untersucht an diesen letzten Tropfen mikroskopisch. Findet man auf diese Weise keine Cylinder, so kann man sicher sein, dass wirklich keine vorhanden sind. In allen Fällen von acutem Morb. Brightii aber sieht man dieselben dicht gedrängt neben und übereinander liegen und bekommt durch Besichtigung und Vergleich einer grösseren Anzahl dieser Gebilde die geläuterte Einsicht in das Wesen der ganzen Krankheit. Je nach der Dauer des Uebels haben die Cylinder die verschiedensten Eigenschaften, von denen schon oben bei der pathologischen Anatomie gesprochen wurde.

Die Harnmenge ist im Allgemeinen vermindert, die Salze sind ebenfalls vermindert, der Farbstoff aber hat in den meisten Fällen zugenommen, im Verlaufe jedoch bekommt der Urin wieder eine normale, strohgelbe Farbe. Die häufigen Trübungen und Sedimente rühren theils von der Gegenwart sehr vieler Cylinder, theils von reichlichen Epithelien und von karnsauren Salzen.

Besteht die Entleerung eines eiweisshaltigen Urines einige Tage lang fort, so nimmt das Answerka mehr und mehr überhand und bald stellen sich auch die Symptome von Hohlenwasserericht ein. Der Unterleib wölbt sich mehr und mehr; percutirt man ihn in sitzender Stellung, so findet man vollkommene Dämpfung an dem unteren Perithien, in der Rückenlage ergibt sich deutliche Fluctuation, die übrigens hier nebstbei noch einen zweiten Grund in der Hautwasserericht hat. Noch auffälliger sind die Symptome der Brustwasserericht. Je grösser der seröse Erguss in den Pleurahöhlen wird, um so schneller und beschwerlicher athmen die Kinder, der matte Percussionsschall geht weiter und weiter herauf, man hört wenig oder gar kein Respirationsgeräusch mehr, sondern nur durch die Rippen fortgeleitete Rasselgeräusche. Das meistens gleichzeitig eintretende Hydropericardium macht den Puls unregelmässig, aussetzend, klein, die Dämpfung in der Herzgegend nimmt an Umfang zu, ist jedoch wegen des dazwischen bestehenden Hydrothorax

nicht genau zu begrenzen. Dabei steigert sich die Athemnoth der Kinder in erschrecklicher Weise. Sie sitzen nach Art der Krupkranken aufrecht in ihrem Bettchen und schlafen, wenn es überhaupt dazu kommt, mit vorgebeugtem Kopfe. Sie klammern sich mit den Händen an das Bett an, um die mm. pectorales zu fixiren und zur möglichsten Erweiterung des Thorax benutzen zu können, und sehen sich mit kläglich ängstlichen Blicken allerwärts nach Hilfe um.

Die Kinder können bei zunehmendem Hydrothorax suffocatorisch, wohl auch durch Glottisödem zu Grunde gehen, oder es stellen sich in Folge der tiefen Nierenerkrankung urämische Symptome ein. Die letzteren manifestiren sich oft frühzeitig als heftige Kopfschmerzen, Eclampsien, Abnahme des Gewichtes, des Gehörs, Sopor und Delirien, nach kann ein Erschöpfungstod durch hartnäckiges Erbrechen und profuse Diarrhöen herbeigeführt werden.

Uebergang in die chronische Form des M. Brightii kommt bei Scharlach fast niemals vor, entweder sterben die Kinder bald unter den oben bezeichneten Symptomen oder es nimmt nach 2–3 Wochen das Eiweiss im Urin ab, dasselbe wird in grosser Menge gelassen, die Ödeme und Ergüsse in den serösen Säcken verschwinden wieder und es tritt hierauf eine vollständige Genesung ein. Hieron könnte ich mich einmal durch die Section eines Kindes überzeugen, das ich kein halbes Jahr vorher an acutem M. Brightii behandelt hatte und später durch einen heftigen Typhus verlor. Die Corticalsubstanz der Nieren war hier ganz normal, weder zu gross noch zu klein und unterschied sich auch mikroskopisch in keiner Weise von einer gesunden Niere.

Nicht alle Nephritiden, die mit und nach dem Scharlach auftreten, verlaufen mit Hydrops, resp. es kommt in einzelnen Fällen nicht hinzu, indem der Tod zu früh eintritt. Es gehören hierher die meisten Scharlachfieber, welche unter Convulsionen, Erbrechen und Coma rasch tödtlich enden und deren unglücklicher Ausgang oft irrtümlich auf die Heftigkeit des Fiebers, auf ein vorzeitiges Zurücktreten des Exanthes, auf Hydrocephalus acutus oder noch bequemer auf die intensive toxische Wirkung des Contagiums geschoben wird. Die genauere Untersuchung der Nierenrinde ergibt in den meisten dieser rapid verlaufenden Fälle eine deutliche Veränderung und zwar die des ersten Stadiums brightischer Erkrankung.

Umgekehrt kommen aber auch einzelne Fälle von Hautwassersucht nach Scharlach ohne Erkrankung der Nieren, ohne Albuminurie vor. Nach Frorichs wird dieses einfache Anasarca durch Erkältungen während der Desquamationsperiode veranlaßt und beruht auf einer Paralyse der Gefässnerven der Haut und des Unterhautzellgewebes.

Ueber das Vorkommen und die Häufigkeit der Nephritis nach Scharlach bestehen die widersprechendsten Angaben. Während die einen Anoren $\frac{1}{2}$ und selbst $\frac{3}{4}$ aller Scharlachkinder daran erkranken sehen, beobachten ihn andere nur sehr selten, unter 20 oder 50 Fällen einmal. Die ersteren glauben, es könne nur darauf an, in allen Fällen gründlich und genau den Harn zu untersuchen, die letzteren weisen diesen Vorwurf mit Entrüstung zurück und zeihen ihre Gegner der größten Uebertreibung. Beide aber können möglicher Weise vollkommen Recht haben, denn es richtet diess sich lediglich nach dem

Charakter der Epidemien und nicht nach der Intensität der Erkrankung. In einzelnen Epidemien werden fast alle Scharlachkranken hydropisch, in anderen kaum einige Prozent.

Von 100 Scharlachkranken beobachteten Hydropsie

Haidenhain bei	80 Proc.
James Miller bei	27 „
Wood in Edinburg bei	12½ „
Rosch bei	10 „
Frerichs bei	4 „

Seit mehreren Jahren ist der Scharlach in München endemisch, jedoch nur schwach contagiös, und ich habe mindestens 50 bis 60 Fälle behandelt, erst zweimal kam mir Albuminurie und zwar nur sehr vorübergehend vor.

Behandlung.

Das meiste in dieser Krankheit leistet der Arzt durch eine wichtige Prophylaxis. Man muss die Localität, in welcher ein Scharlachkind liegt, sorgfältig auf Luftbewegung, Temperaturverhältnisse und Feuchtigkeit prüfen, und muss jenem Zimmer den Vorzug geben, in welchem durch Öffnen der Thür kein unangenehmer Zug entsteht, das gehörig erwärmt und gelüftet werden kann und dessen Wände selbstverständlich trocken sind. Da Fetteinreibungen die Haut notorisch gegen Temperaturunterschiede weniger empfindlich machen, so sind dieselben jedenfalls anzustellen, wenn sie noch bei weitem nicht jene Garantie bieten, die Schneemann ihnen zuschreiben wollte.

Mit diesem Regime ist fortzufahren, bis die Desquamation vollständig vorüber und das Kind durch einige Bäder wieder zu grösserem Temperaturwechsel gewöhnt worden ist.

Ist einmal Wassersucht und Albuminurie eingetreten, so muss man die Stase in den Nieren durch Anregung anderer Secretionen, der Haut und des Darmes, zu paralyisiren. Aus der Klasse der Laxantien gibt man am besten das Calomel, das Ol. Ricini, später auch Sena, Jalappa und Colocynthis und meidet mit Recht die salinischen Abführmittel, da die Salze grösseren Theils resorbirt und dann durch die Nieren ausgeschieden werden. Bei Kindern, welche überhaupt am Durchfalle genügt sind, muss man jedoch sehr vorsichtig sein, indem sonst profuse, bis zum Tode fortbestehende Durchfälle verursacht werden können. Die Hautsecretion, welche bei Anasarca sehr gering ist, kann man durch heisse Bäder und kleine Dosen Tart. stibiat. oder, wenn die Kinder sehr unruhig sind, durch kleine Dosen Opium oder Campher anzuregen versuchen. Das Hauptaugenmerk ist immer auf die Urinsecretion zu richten. Kommt diese gehörig in Gang, so genesen die Kinder fast alle bei guter Wart und Pflege, bleibt sie aber vermindert, so muss man sie durch Diuretica vermehren. Als das beste Diureticum, das einzige, das keine unangenehmen Nebenwirkungen hat und längere Zeit ohne Störung der Verdauung gereicht werden kann, ist der Roob Juniperi, möglichst frisch bereitet, zu empfehlen. Die Kinder nehmen ihn gerne und mit etwas Wasser verdünnt meist gern und man kann ihnen leicht 2—3 Kaffeelöffel in 24 Stunden beibringen. Ich habe mich schon zum öfteren von der augenscheinlich günstigen Wirkung dieses Mittels überzeugt und gebe

ihm bei Kindern den Vorzug vor der Digitalis, dem Weinstein und dem Kali acetatum.

Die drohende Urämie muss durch Pflanzen Säuren und Laugenbäder bekämpft werden. Gegen profuse Durchfälle zeigt sich der Bismucker, täglich zu 0,1–0,2, mit Opium verbunden, am wirksamsten. Sollte das Oedem und die Albuminurie nach 3–4 Wochen nicht verschwinden, was jedoch gewöhnlich der Fall ist, so ist eine tonisirende Behandlung mit Tannin, China und Eisenpräparaten angezeigt. Gegen die zurückbleibende Anämie genügt die Darreichung guter, leicht verdaulicher Kost und der Genuss einer frischen Landluft.

4) Nierensteine, Nierentuberkel, Nierencysten.

Obgleich die Concrementbildung im aegypthischen Systeme der Kinder häufig ist und ihren Grund in dem schon besprochenen, physiologischen Harnsäureinfarkt hat, so kommt es doch nur sehr selten zu grösseren Steinen, welche beträchtliche Symptome verursachen müssten. Man beobachtet in diesen Fällen entschiedene Nierenschmerzen, einen eitrigen Bodensatz im Urin und Abgang von kleinen Concrementen unter heftigen Schmerzen im Verlaufe der Ureteren und der Harnröhre. Der Eiter im Harn rührt her von einer secundären Entzündung des Nierenbeckens und der gewölbten Schleimhaut der Harnleiter und der Blase.

Die Behandlung besteht im Wesentlichen darin, die Kinder möglichst viel Wasser trinken zu lassen, indem hierdurch einerseits die bestehenden Concremente leichter fortgeschwemmt werden und andererseits ein dünnter Urin eher eine Verkleinerung des Grusses als einen neuen Ansatz von Niederschlägen bewirken muss. Wenn grosse Ulcerationen im Nierenbecken entstanden sind, so stellt sich Fieber ein, das bald den Charakter des hektischen annimmt, und es tritt der Tod ein, oder die erkrankte Niere kann endlich ganz obsolesziren und es ricurirt für sie die noch übrige gesunde.

Der Nierentuberkel tritt in doppelter Form auf. Das eine Mal wird die Niere zugleich mit den meisten übrigen, parenchymatösen Organen von Miliartuberculose befallen, welche fast gar keine Nierensymptome macht und erst in der Leiche entdeckt wird, das andere Mal ist die Tuberculose bei Kraben mehr örtlicher Natur und erstreckt sich von einem tuberculösen Hoden aus auf die Seldemhaut der Blase, der Ureteren und endlich auch auf die Nieren. In diesem Falle kann ein grosser Theil der Niere von gelbem, käsigem Tuberkel durchsetzt werden und so hypertrophiren, dass die Oberfläche wückerig wird. Es kommt sogar Schmelzung des gelben Tuberkels vor, wodurch zuletzt eine tuberculöse Nierencaverne und endlich Nierenphthise entsteht. Die Behandlung der Nierentuberculose ist sehr trostlos und muss sich lediglich darauf beschränken, durch roborende Mittel und Leberthran die Constitution zu verbessern.

Die Cystenformation ist in den Nieren ein sehr gewöhnlicher Process und kommt sogar schon angeboren vor. Es sind in der Literatur Geburtstfälle bekannt, in denen der Leib durch fötale Cystenbildung in beiden Nieren so aufgetrieben wurde, dass dadurch ein Hinderniss der Geburt gegeben war. Einzelne Cysten von der Grösse eines

Hanfkorpus bei einer Kirsche findet man sehr häufig bei den verschiedensten Sectionen. Sie sind immer ganz oberflächlich in der Corticalsubstanz gelagert und meist mit hellem dünnflüssigem Serum gefüllt. Die chemische Untersuchung dieses Serums ergibt einen geringen Eiweißgehalt und nur ausnahmsweise die den Harn charakterisirenden chemischen Körper, Harnstoff und Harnsäure. Als Ursache dieser Cysten nimmt man allgemein Verstopfung einzelner Harnkanälchen durch Harnsaureinfarkt, später auch durch kalkige Concremente, Extravasate und cylindrische Exsudate an. Der Acrophalocystenack und die zusammengesetzten Cystoide sind in der Niere der Kinder theilweis selten und können deshalb füglich übergangen werden.

B. Harnblase.

1) Bildungsfehler.

A. Völliger Mangel der Blase kommt höchst selten vor und ist immer mit Bildungsfehlern anderer Organe combinirt. Die Harnleiter münden dann in den Nabel, den Mastdarm oder die Scheide. Häufiger wird beobachtet:

B. Spalte der Harnblase, *Prolapus*, z. *Defectus*, z. *Ectopia*, *inversio vesicae urinariae*. Man versteht unter allen diesen Bezeichnungen einen Defekt der vorderen Blasenwand und des entsprechenden Theiles der Bauchwand, so dass die hintere Blasenwand frei an Tage liegt. Tafel III. Fig. 10.

Man unterscheidet zwei Formen, eine totale und eine partielle. Bei der ersteren erstreckt sich die Bauchspalte vom Nabel bis in das Schambein und die Genitalien, bei der letzteren findet sich ein wohlgeformter Nabel, normale Genitalien und nur eine kleine Oeffnung in der vorderen Bauchwand. Beim Neugeborenen besteht in der Gegend der Urinblase eine hochrothe Lücke von der Größe eines Thalers und darüber, welche von einem scharfen Hautringe begrenzt wird. Erst nach der Geburt wird diese rothe Lücke, gebildet aus der hinteren Blasenwand, durch die Anwendung der Bauchpresse während des Schreiens und der Stuhlentleerung nach auswärts gestülpt und erscheint dann als eine fleischartige, weiche fluctuirende Geschwulst. Dieselbe ist stets feucht und schlüpfrig und zeigt nach unten jeder Seite ein kleines Knöpfchen, die Einmündungstellen der Ureteren, welche man besonders deutlich erkennt, wenn man die Geschwulst etwas nach oben verschiebt. Bei längerer Beobachtung sieht man den Urin tropfenweise aus diesen Punkten ansickern, und es entsteht bei dieser freien Vertheilung des Harnes eine sehr rasche Entwicklung von kohlensaurem Ammoniak, das an dem bekannten scharfen Geruche zu erkennen ist.

Nach einigen Jahren wächst der Hautring unter zunehmender Wulstung etwas über den Vorfall hinüber und verkleinert so die Ansicht der Blaseschleimhaut, immer aber bleibt ein grosses Stück der hinteren Blasenwand unbedeckt. Dieses freiliegende Stück verliert nach und nach den Charakter der Schleimhaut, wird oberhalb der Ureteren ziemlich trocken, callös, unempfindlich, unterhalb derselben

erzerrt der Prolapsus häufig in Folge des fortwährend abfließenden, ununterbrochenen Harnes und bekommt ein fangloses Aussehen.

Die completen Harnblaspaspalten erstrecken sich immer bis in die Genitalien. Der Penis ist sehr kurz, nahe der umgestülpten Blase, und entweder total oder theilweise gespalten, in letzterem Falle hat er das Aussehen, als wäre er von der Harnröhre aus nach oben gespalten, so dass die Harnröhre keinen geschlossenen Kanal, sondern eine nach oben offene Rinne darstellt. Bei weit gehenden Spalten hängt an beiden Seiten ein längerer Appendix, der gespaltenen Penis, und es kann sich die Theilung bis in das Scrotum erstrecken, wodurch die Unterscheidung des Geschlechtes zweifelhaft werden kann. Diese Unterscheidung wird um so schwieriger, wenn, wie es gewöhnlich der Fall ist, die Hoden noch in der Bauchhöhle geblieben sind.

Beim weiblichen Geschlechte finden sich analoge Spaltungen. Die Clitoris ist getheilt, die grossen und kleinen Labien klaffen und die Scheide fehlt oft gänzlich. Der Damm ist ausserordentlich kurz und der After liegt unmittelbar hinter den Genitalien, er kann sogar so weit nach vorne gerückt sein, dass er in die hintere Blasenwand selbst einmündet und der Koth sich ebenfalls aus dem Blasenverfallende entleert.

Bei so hochgradigen Spaltungen sind die queren Schambeinäste nur rudimentär vorhanden. Sie liegen in der Nähe des Vortalles entweder einfach auf, oder hängen hinter demselben durch ein schmales Band mit einander zusammen. Das Becken ist in seinem queren Durchmesser sehr weit, von hinten nach vorne aber vorengt. Das Kreuz- und Steissbein sind stark nach vorne gekrümmt, womit wohl auch die Kürze des Damms und die Mündung des Afters weit nach vorne zusammenhängt.

Die Folgen dieses Uebels sind je nach seiner Ausdehnung verschieden. In allen Fällen entwickeln die damit behafteten Kranken einen übelhaften Uringeruch und leiden an beständigen Excretionen in der Umgegend der Ureteremündung. Bei Spaltung des Penis, dem höchsten Grade von Epispadie, oder bei mangelhafter Entwicklung der Scheide sind die Individuen natürlich fortpflanzungsunfähig. Uebrigens sind solche Kinder vollkommen lebensfähig und man kennt Fälle, in denen das vierzigste Lebensjahr erreicht wurde. Huxham beschreibt sogar einen sehr merkwürdigen Fall von einer Frau, welche mit Prolapsus vesicae congenitus und Cloakenbildung behaftet war, im 24ten Jahre heirathete, concipirte und gebar! Der Gatte eines solchen Wesens verdient fast eine ebenso grosse Bewunderung als dieses selbst.

Ueber die Entstehung der Ectopie der Blase wurden schon mannigfache Hypothesen aufgestellt. Die Erklärung, welche J. Müller gibt, erscheint als die plausibelste.

Nach diesem Autor bildet sich die Harnblase nicht durch Umlegen eines Blattes, sondern nur durch allmähliche Erweiterung des mit dem Urachus vom Sinus urogenitalis sich abschnürenden Schlauchkes. Der Urachus entsteht aber ebenfalls nicht durch Umlegen eines Blattes, sondern ist nur der Hals der Allantois, welche ursprünglich als Bläschen aus dem Darmkanal hervorwächst. Aus diesen beiden Thatfachen folgert J. Müller, dass wir es hier nicht mit einer Bildungs-

lenkung, nicht mit einem Stöhenbleiben der Harnblase auf einer früheren Entwicklungsstufe zu thun haben. Er ist vielmehr der Ansicht, dass der Mangel der vorderen Blasenwand auf einer Ruptur der Blase beruht, welche zu einer Zeit sich ereignet, wo die Bauchdecken noch nicht vollständig gebildet sind. Die Ruptur muss ihren Grund in einer ständigen oder vorübergehenden Unwegsamkeit der Harnröhre haben, wodurch der in der Blase angesammelte Harn dieselbe so weit ausdehnt, bis sie endlich platzt. Es entsteht hierdurch eine Oeffnung zwischen dem Nabel und den äusseren Genitalien. Der leichteste Grad dieser Missbildung ist Epispadie, Abfluss des Harnes an der oberen Fläche des Penis oder oberhalb der Scham, die gefährliche Folge aber ist eine grössere Oeffnung zwischen Nabel und Schamleiste.

Behandlung.

An eine Verschliessung des Defektes durch Anfrischung der Ränder und Vereinigung mittelst Nadeln lässt sich überhaupt nur denken, wenn eine permeable Harnröhre vorhanden ist, aber auch in diesem, übrigens selteneren Falle, wird meines Wissens die Operation regelmässig durch den die Wundfläche berührenden Urin vereitelt. Man muss sich also darauf beschränken, durch möglichste Reinlichkeit und Bestreichung mit Oel die Excoriationen zu verhüten und zu heilen. Wenn die Kinder grösser werden, kann man versuchen, durch den Apparat von Earle den ekthhaften Geruch zu mindern. Derselbe besteht in einem hohlen Silberschild, in welchen eine mit einem Hahn verschlossene Gutschukröhre führt. Er wird durch ein doppeltes Bindband an die umgestülpte Blase angedrückt. —

C. Cloakenbildung. Communication des Mastdarmes mit der Blase wurde schon bei den Bildungsfehlern des Mastdarmes besprochen.

2) Blasenentzündung, Blasenentzündung, Cystitis.

Eine seltene Krankheit im Kindesalter. Sie kommt vor in Folge äusserer Verletzungen oder früher Blasensteine, ausserdem nur noch auf Missbrauch von Canthariden, und endlich nach am Schluss schwerer Krankheiten, Typhus, Cholera, Blattern.

Pathologische Anatomie.

Die oben angeführten Ursachen veranlassen fast immer nur die Cystitis mucosa, den Catarrh der Schleimhaut, und nur die äusseren Verletzungen können in ganz seltenen Fällen Cystitis serosa — Entzündung des serösen Ueberzuges der Blase — oder Pericystitis — Entzündung des die Blase locker umgebenden Bindgewebes — verursachen.

Die entzündete Blaseschleimhaut ist stark injicirt, bei längerem Bestehen bräunlich pigmentirt, verdickt, am Boden finden sich grosse Mengen Schleim, auch können wohl Excoriationen, Geschwüre und Divertikelbildungen vor. Die grössten Veränderungen finden sich immer bei Gegenwart eines Steines mit rauher Oberfläche.

Symptome.

Die Bläsensymptome können sich in einzelnen Fällen sehr rasch entwickeln, z. B. bei Kindern, welche gegen Cantharidenpflaster empfindlich sind, schon 12 Stunden nach Application des Pflasters, bei Blasensteinen hingegen treten sie sehr schleichend ein, bessern sich oft wieder und recidiviren von neuem.

Die nie fehlenden Symptome sind Schmerz und Empfindlichkeit der Blasengegend, des Damms und der Harnröhre, fortwährender Harndrang und schmerzhafter, tropfenweise Entleerung eines dunkeln, trüben, selbst blättrigen Urins. In den höchsten Graden, wenn es bei Kindern jedoch fast niemals kommt, vollständige Harnverhaltung. Ausdehnung der Blase, Fieber, typhöse und peritonitische Symptome, Sopor, grünes Erbrechen, Collapsus, Angstschreies etc.

Der Harn enthält immer grosse Mengen von Blasenepithel, Schleim und Eiter, wird molkig trübe gelassen, klärt sich auch nach längeren Stehen nicht vollkommen und bekommt einen dicken, zahnförmigen Bodensatz. Er zersetzt sich sehr schnell, entwickelt Ammoniak und färbt endlich auch silberne Instrumente bräunlich. Bei diphtheritischer Cystitis, welche nur in schlecht ventilirten Spitälern mit Diphtheritis anderer Schleimhäute complicirt beobachtet wird, gehen unter heftigen Drängen auch grössere Membranen mit dem Urin ab, die mikroskopisch leicht als Diphtheritis zu erkennen sind.

Der Verlauf der Cystitis ist sehr verschieden nach dem Ursachem. Am schnellsten und sichersten vergeht die durch Cantharidenpflaster erzeugte. Nach einigen Tagen wird über der Urin wieder vollkommen klar, ohne Schmerz entleert, und der ganze Process ist spurlos verschwunden. Länger dauert die Cystitis am Ende schwerer Krankheiten, doch endet auch diese, wenn anders der Körper sich überhaupt wieder erholt und kräftigt, nach einigen Wochen in Genesung. Die Prognose der traumatischen Cystitis richtet sich nach der Schwere der Verletzung, wobei man stets im Auge behalten muss, dass gemäss der grösseren Reproduktionskraft im kindlichen Alter auch grosse Tymen in überraschend kurzer Zeit heilen können.

Am schlimmsten verhält sich die durch Blasensteine unterhaltene Cystitis. Es kann zwar auch hier ausnahmsweise vorkommen, dass trotz der Anwesenheit des Steines der Blasenentzündung verschwindet, was vielleicht bei ganz glatter Oberfläche des Steines möglich ist, gewöhnlich aber dauern die entzündlichen Symptome so lange fort, als der Stein in der Blase sich befindet, und verschwinden erst gänzlich nach dessen gelungener Entfernung. Steinkranke Kinder mit Blasenentzündung entwickeln sich geistig und körperlich sehr schlecht, und man kann, wenn die Diagnose einmal hinlänglich gesichert ist, nicht rasch genug zum Steinschnitt schreiten, zumal diese Operation bei Kindern umgleich leichter und gefahrloser ist, als bei Erwachsenen.

Behandlung.

Die Beseitigung der Ursachen ist der wesentlichste Theil der Kur. Liegt das Cantharidenpflaster noch auf der Körperoberfläche, so muss es natürlich gleich entfernt werden. Es kommt nicht gerade selten vor, dass langsam wirkende Vesicatorie mehrere Tage liegen bleiben, ohne örtlich besonders zu belästigen, plötzlich stellen sich die

Blasenschmerzen ein und die unkundige Umgebung ahnt nicht im Geringsten den innigen Zusammenhang zwischen dem schlechten alten Pflaster und den heftigen, besänftigenden Symptomen.

Im übrigen hat man durch grosse Mengen Mandelmilch oder Hanfemulsionen den Harn möglichst zu verdünnen und durch Blausäure, Milch und Wassertropfen ihm möglichst wenig an Salzen zu machen.

Die Quantität des gelassenen Harnes muss streng kontrollirt und die Blasegegend öfters percussirt werden. Sobald sich hier eine Dämpfung zeigt, ist der Urin mittelst des Catheters zu entleeren. Letzterer darf aber niemals in der Harnröhre liegen bleiben, indem der Zutritt der Luft die Entzündung bedeutend verschärft.

Die interne Behandlung hat auf eine zweckmässige Entleerung des Darmes und Anregung der Darmsecretion zu wirken, wobei man die salutarsten Abführmittel natürlich meiden muss. Am besten wirken hier einige Calomelpulver 0.06 pro dosi. Gegen den Harnwieg erweisen sich feuchte warme Tücher, auf die Blasegegend gelegt, sehr wirksam, bei Schlaflosigkeit sind die Opiumpräparate und das Bittermandelwasser zu empfehlen. Bei chronischem Blasenkatarrh gibt man Tannin innerlich, täglich bis zu $\frac{1}{2}$ Gramm, oder macht adstringierende Injectionen in die Blase. Steinkranke müssen unter allen Bedingungen operirt werden.

3) Enuresis, Incontinentia urinae, Mictio involuntaria. Das nächtliche Bettpiessen.

Beständiges Harträufeln und ganz unwillkürlicher Harnabgang kommt bei älteren Kindern nur vor, wenn bedeutende Gehirnfeler zugegen sind, bei Blotismus und chronischem Wasserkopf. Es beruht dann dieser Zustand auf einer wirklichen Blasenlähmung, sowohl der Muskulatur als der Blasenmuskulatur, wodurch trotz reichlichen Inhalts der Blase doch immer nur einzelne Tropfen abfliessen. Dieser Zustand besteht unanlässlich bei Tage und Nacht fort und ist wohl zu unterscheiden von dem nächtlichen Bettpiessen sonst gut entwickelter Kinder.

Letzteres kommt viel häufiger bei Knaben vor als bei Mädchen und dauert meistens bis zum 12. Lebensjahre, in Ausnahmefällen selbst bis zum Eintritt der Pubertät. Es beruht keinesfalls auf grossen organischen, noch cerebralen Veränderungen, sonst ginge es nicht regelmässig in Genesung über und würde auch am Tage fortbestehen. Es muss hier eine geringere Perceptionsfähigkeit der Blase auf den Harnreiz bestehen, in deren Folge derselbe im Schlafe nicht vollständig zum Bewusstsein gelangt, oder der Schlaf muss so tief sein, dass der gewöhnliche Reiz des Harnes auf die gefüllte Blase nicht hinreicht, die Kinder zu erwecken. Für letztere Anschauung spricht besonders der Umstand, dass viele Kinder bestimmt angeben, sie hätten deutlich geträumt, wie sie auf dem Topf saßen und ihren Harn in der gewöhnlichen Manier entleerten. Gewöhnlich piessen sie nur einmal des Nachts und zwar schon in den ersten Stunden des Schlafes in's Bett. Mit der Erklärung, dass Trägheit, abge Gewohnheit oder Unachtsamkeit die gewöhnliche Ursache der Enuresis nocturna sei, kann ich mich nicht einverstanden erklären. Bei den meisten von mir beobachteten Fällen waren die Kinder durch ihr eigenes Ehrgefühl oder mangel-

siehe Strafen lohhaft dafür interessirt, das Uebel zu vermeiden, und doch gelingt ihnen diess ohne passende Behandlung erst nach vielen Monaten oder gar Jahren.

Die Ansicht einzelner Autoren, es möchten chemische Veränderungen des Harnes die Schuld hieran tragen, kann ich ebenfalls nicht bestätigen, indem noch in drei Fällen angestellte Harnuntersuchungen lehrten, dass weder quantitativ noch qualitativ der Harn in irgend einer Weise von seiner normalen Zusammensetzung abweicht. Hingegen ist die Angabe richtig, dass die meisten davon befallenen Kinder sich überhaupt keiner vollkommenen Gesundheit erfreuen und gewöhnlich an scrophulösen Affectionen der verschiedensten Art, an Räscheitis oder an Helminthen leiden.

Die Folgen dieses Uebels sind namentlich unangenehme, indem namentlich die psychische Entwicklung dabei leidet. Das Ehrgefühl der Kinder wird durch die vielen Strafen, die sie erfahren, abgestampft, sie werden scham, ängstlich und bekommen keinen persönlichen Muth. Wenn nicht grosse und deshalb ziemlich kostspielige Reinlichkeit gehandhabt wird, so bekommt das Bett und bald auch das ganze Zimmer einen schwer zu vertilgenden, unangenehmen Geruch, und es mischen sich der Luft Gasarten bei, die keinesfalls dem Stoffwechsel günstig sind. Endlich bekommen die Kinder durch den Urin tiefe, langsam heilende Geschwüre an den Nates und an den unteren Extremitäten.

Behandlung.

Eine causale Behandlung kann nothwendig werden, wenn sich deutliche Symptome von Eingeweidewürmern, von Scrophulosis oder nervöser Hyperästhesie kund geben. Man gibt in diesen Fällen Anthelmintika, Leberthran, Eisen, China und aromatische Bäder. Die letzteren empfieht besonders Lallemand sehr. Er lässt 4—5 Hände voll aromatischer Kräuterspecies in einem bedeckten Gefässe ansethen, dann dieses Decoct und ausserdem ein Glas Brantwein in's Bad giessen, worauf dasselbe mit einem Tuche bedeckt wird, so dass bloss der Kopf des Kindes herausragt. Die Kinder bleiben $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ Stunde lang in diesem Bade, und nach einigen Bädern kann die Quantität der Kräuter und des Brantweins verdoppelt werden. Solche Bäder müssen täglich oder jeden zweiten Tag einige Wochen lang fortgesetzt werden, worauf Genesung eintritt.

Die diätetische Behandlung hat darauf Rücksicht zu nehmen, dass die Kinder schon mehrere Stunden vor dem Schlafengehen nichts Flüssiges mehr bekommen, wodurch die Urinsecretion jedenfalls auf ein Minimum herabgesetzt wird, und, wenn auch Nachts der Harn willkürlich abgeht, die Quantität jedenfalls eine ganz geringe ist. Da man zu wiederholten Malen die Beobachtung gemacht hat, dass die Kinder regelmässig einspissen, wenn sie auf dem Rücken liegen, und nur bleiben in der Seitenlage, so lässt man sie in letzterer Lage einschlafen. Damit sie im Schlafe nicht auf den Rücken zu liegen kommen, bindet man ihnen ein Tuch um den Leib, in welchem ein harter Knopf sich befindet, der gerade auf die Wirbelsäule gebunden wird. Sobald sie sich im Schlafe drehen und auf den Rücken legen wollen, weckt sie der alsdann entstehende Schmerz auf.

Es klingt dieser Rath sehr einfach und plausibel, die Ausführung

dasselben misslingt aber gewöhnlich, weil die Kinder keine so feste Binde um den Leib vortragen, dass der Knopf die ganze Nacht hindurch nicht verrückt. Die Kinder passen eben meistens doch ein, und wenn man sie aufhebt, so ist der Knopf nach der Seite geschoben.

Zu psychischen und körperlichen Züchtigungen braucht der Arzt niemals zu raten. Diese Mittel sind gewöhnlich schon im ausgebreitetsten Masse aber erfolglos angewendet worden, bevor er consultiert wird. Noch weniger sind Schreckmittel, die Androhung des glühenden Eisens nach Boerhaave und Casper, zu gestatten oder gar zu empfehlen, indem höchst ein sehr schädlicher Einfluss auf das Nervensystem geübt werden kann.

Unter den inneren Mitteln sind namentlich zwei besonders wirksam, die Belladonna und die *Nux. vomica*.

Man gibt das Belladonnaextract, jeden Abend zu 0,005–0,01 und steigt mit der Dosis bis zur Erweiterung der Pupille. Bei dieser Behandlung hört die Enuresis allerdings einige Tage auf, allein Recidive sind sehr gewöhnlich, und es ist doch nicht rathsam, allzulange mit grossen Dosen dieses Mittels fortzufahren. Eine viel reichhaltigere Wirkung habe ich schon in vielen Fällen von Strychnin nux. gesehen. Es ist diesem Präparate der Vorzug vor dem Extr. nux. vomicae spin. zu geben, indem der Strychningehalt des letzteren durchaus kein constant ist und eine allmähliche Steigerung desselben viel weniger Garantie gegen Vergiftungs Symptome bietet. Man gibt es am besten in Pulverform, einfach mit Zucker abgerieben. Kindern, die über drei Jahre alt sind, lässt man zuerst 0,001, dann 0,002 etc. bis zu 0,008 nehmen und muss immer starken Kaffee vorrätig haben, wodurch allentfalls eintretende Zuckungen, die ersten Intoxications Symptome, am sichersten beseitigt werden. Mit dieser Behandlung kommt man in 8–14 Tagen vollständig zum Ziele, und gewöhnlich hat die Belang auch Bestand.

Der nahe liegende Versuch, den Penis mit einem Bändchen fest zu binden, um so rein mechanisch den Abfluss des Harnes zu verhindern, ist unanstehbar, indem hiadurch rasch Oedem des Penis und Erectionen entstehen. Es ist mir sogar schon der Fall vorgekommen, dass ein Knabe aus Furcht vor den brutalen Züchtigungen, die er wegen seiner Enuresis zu erleiden hatte, sich den Penis so fest zuhand, dass er am andern Morgen den Knopf nicht mehr lösen konnte. Es stellte sich endlich partielle Gangrän und eine Harnröhrenfistel ein.

4) Ischuria, Harnverhaltung, (*urgo, hessem, ré-casse, Ham*)

Die Harnverhaltung ist bei Erwachsenen und Kindern nur ein Symptom verschiedenartiger Krankheitszustände, keine selbstständige Krankheit. Man unterscheidet deshalb eine Ischuria paralytica, spastica, inflammatoria, organica und mechanica. Von allen diesen Arten kommt bei kleinen Kindern nur eine einzige vor, Ischuria spastica. Reizbare Kinder, die viel an Blähungen und Colick leiden, lassen zuweilen länger als 12 Stunden keinen Urin mehr, wodurch die erpflegenden Personen in grosse Angst gerathen. Die Kinder sind dabei sehr unruhig, lassen ein pressendes Geschrei vernehmen, ziehen die Beine an den Leib und sagen nur kurze Zeit an der Brust. Die

geringe Aufnahme von Getränk macht es ihnen zur um so länger möglich, keinen Urin zu lassen. Das Uebel ist übrigens sehr unbedeutend, und wir sind noch nie Fälle vorgekommen, wo wirkliche mechanische Hindernisse zu überwinden gewesen wären. Das einzige, was man bei Kindern von wenigen Wochen zu berücksichtigen hätte, ist der Abgang des Harnsaureinfarktes in Gestalt kleiner, röthlicher, zum Theil scharfkantiger Körnchen.

Behandlung

Dieselbe ist äusserst einfach, indem die Einführung einer etwas gekrümmten, geölten Sonde in die Blase jedesmal sogleich Urinentleerung veranlasst. Zur Verhütung feruorier Blasenkrämpfe ist die Auflegung eines Camillensäckchens auf die Blasenregion sehr zu empfehlen, wie überhaupt die Camillen in der Kinderpraxis eine viel zuverlässigere Wirkung haben als bei Erwachsenen.

b) Der Blasenstein. Calculus vesicae. Steinkrankheit, Lithiasis. (ὁ λίθος, Stein.)

Die Steinkrankheit ist bei Knaben verhältnissmässig sehr häufig. Beinahe 10 Procent sämtlicher zum Steinschnitt kommenden Individuen sind Kinder unter 10 Jahren, wie aus den statistischen Angaben von Prent erhellt, der von 1216 Steinschnitten, die in den grossen Spitätern von Bristol, Leeds und Norwich gemacht wurden, berichtet. Die Gründe dieser merkwürdigen Erscheinung finden sich 1) im physiologischen Harnsaureinfarkt, wovon leicht einige Körnchen in der Blase liegen bleiben und den Kern des Steines abgeben können und 2) in der Menge von Phosphaten, welche sich im Harn rachitischer Kinder finden. Der Harn wird bei der Rachitis so reich an phosphorsäurem und kohlensaurem Kalk, dass, wenn die Kinder auf den Boden des Zimmers uriniren und der Harn daselbst verdunstet, eine deutliche Schichte weissen Pulvers zurückbleibt, worauf ich selbst schon von einer gut beobachtenden Kinderfrau aufmerksam gemacht wurde.

Uebrigens kommen bei Kindern alle Arten von Blasensteinen vor, Urate, Oxalate und Phosphate. Die Harnsäuresteine bestehen aus dieser Säure und ihren Salzen, sind ziemlich hart, aber glatt, meist braunlich gefärbt, — weil der Farbstoff des Harnes fast immer zugleich mit den Harnsäureniederschlägen herausfällt — und bilden in der Regel den Kern eines Steines, wenn auch die äusseren Schichten eine andere chemische Zusammensetzung haben. Die aus phosphorsäurem Kalk und Trippelphosphat bestehenden Steine sind meist weich, locker gefärbt, von geringerer Schwere, aber an der Oberfläche rau. Die Oxalsäuresteine endlich, welche bei Kindern nur sehr selten sich bilden, sind die härtesten, von brauner Farbe und höckeriger, warziger Oberfläche, weshalb sie auch Maulbeersteine genannt werden. Die Steine aus Cystin, dann die aus kohlensaurem Kalk sind ausserordentlich selten. Die erstgenannten Steine können sich auch combiniren, wobei dann gewöhnlich der Kern aus Harnsäure, die äusseren Schichten aus Phosphaten bestehen.

Gewöhnlich findet sich nur ein einziger Stein in der Blase; können mehrere vor, so scheiden sie sich, ähnlich wie die Gallen-

steine, an einander ab. Glatte Steine sind sehr beweglich, rasch oder gar stachelige bleiben an irgend einer Stelle des Blasengrundes liegen und verwachsen mit der Schleimhaut. Die Folgen eines Steines sind nach den aufgeführten Umständen verschieden. Es gibt Steinkranke, welche keine Spur von Blasenentzündung haben und fast keine Beschwerden vom Steine empfinden, bei anderen wieder ist die Entleerung des trüben, flockigen Urines mit dem grössten Schmerze verbunden und es stellen sich vom catarrhalisch afficirten Blasenhalse aus excentrische Schmerzen in den Mastdarm, den Penis und den Oberschenkeln ein.

Symptome.

Es gehört zuweilen grosse Aufmerksamkeit und Uebung dazu, einen Stein mit Bestimmtheit zu diagnosticiren, zumal die Diagnose so sicher sein muss, dass eine eingreifende, lebensgefährliche Operation darauf hin unternommen werden kann. Nach Pithe sind die zuverlässigsten Zeichen:

1) Die subjective Empfindung von einem schweren, beweglichen Körper in der Blase, welcher nach der Stellung des Körpers eine Lage ändert, ein bei Kindern selten zu beobachtendes Symptom.

2) Schmerzen im Blasenhalse beim Stehen, Gehen, Sitzen, Stuhldrang. Sie durch anhaltend ruhiges Liegen verschwinden, durch forcirte Bewegungen, Laufen, Fahren, Reiten bis in's Unerträgliche sich steigern, worauf dann der bestehende Blasenentzündung sich beträchtlich verschärft und endlich sogar blutiger Urin abgehen kann.

Diese Schmerzen werden oft ebenso empfindlich an der Spitze der Eichel und im Verlauf der Harnröhre gefühlt, wodurch die Kranken veranlasst werden, beständig ihren Penis in der Hand zu halten, endlich emuliren und einen auffallend mächtigen Penis mit langem Präputium bekommen.

3) Schmerz und Beschwerden während des Urinirens. Die Schmerzen werden gegen das Ende zu am heftigsten und dauern noch längere Zeit nachher an. Zuweilen wird der Harnstrahl plötzlich unterbrochen und kehrt erst wieder, wenn das Kind sich zurückgelegt oder irgend eine andere Stellung eingenommen hat. Die Kinder beschreiben dann deutlich das Gefühl eines plötzlich sich vorlegenden fremden Körpers, den sie durch andere Körperlagerung wieder wegbringen können.

4) Das wesentlichste Zeichen liefert immer die Untersuchung mit der Steinsonde. Ein durch die Sonde erzeugter, vernehmbarer Klang kann von gar nichts anderem als einem Blasensteine herrühren. Ueberdies kann man durch den mehr oder minder hohen Klang und durch leichtes Berühren des Steines selbst einen approximativen Schluss auf dessen Härte, Glätte und Beweglichkeit machen. Je kleiner der Stein, um so schwieriger natürlich dessen Aufsuchung. Man muss zuweilen die Kranken in verschiedenen Positionen, im Stehen, Sitzen in der Bauch- oder Seitenlage, bei voller und halbvoller Blase untersuchen, bis man den Stein deutlich zu percutiren bekommt. In einzelnen Fällen kann man ihn mittelst des in den Mastdarm eingeführten Zeigefingers erreichen. Bei Kindern gelingt dieser Catheterismus mit der Steinsonde nur selten vollkommen ohne Chloroformnarcose.

Der Verlauf der Krankheit ist fast immer derselbe. Nur in ganz

lehenen Fällen gehen Steine, welche die Grösse einer Bohne einmal übersteigen, noch durch die Harnröhre ab, noch seltener werden sie in Folge eines Ulcerationsprocesses durch den Mastdarm, die Scheide oder den Darm entleert.

Die Kranken behalten, wenn keine Kunsthilfe eintritt, ihren Stein bis an das Ende des Lebens, welches jedoch unter beständigen Beschwerden viele Jahre lang fortbestehen kann. Endlich werden sie durch hektisches Fieber, Appetitmangel, Erschöpfung und Schlaflosigkeit atrophisch und gehen eben so zu Grunde, oder es stellen sich auch urämische Symptome und Nephritis ein, wobei der Tod rasch erfolgen kann.

Behandlung.

Die einzige Indication ist Entfernung der Krankheitsursache, des fremden Körpers aus der Blase. Dieselbe wurde schon durch die verschiedensten internen Mittel, die sog. Lithotriptica, und durch direkte Injektionen in die Blase versucht; die Wirkung der steinlösenden Mittel ist jedoch immer noch eine höchst problematische. Man empfiehlt verschiedene Bäder, namentlich Vichy, Kreuznach, Eger, Franzensbad etc., unter den Medicamenten die kohlensauren Alkalien, das Phosphoraminium, die Herba ure auri, endlich noch den Elektromagnetismus und schwache Injektionen von Flüssigkeiten, welche concentrirt den Stein wohl lösen könnten, allein in diesem Verhältnisse nicht in die Blase gebraucht werden dürfen.

Die mechanische Entfernung des Steines durch die Harnröhre gelingt nur bei ganz kleinen Exemplaren beim weiblichen Geschlechte. Die männliche Harnröhre eignet sich wegen ihrer Enge und Länge fast niemals hierzu.

Es bleibt also nur die chirurgische Hilfe, der Steinschnitt und die Lithotripsie, übrig. Die Beschreibung dieser Operationen gehört in die chirurgische Operationslehre und findet sich vortrefflich in Pitha's Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane, Virchow's Pathologie und Therapie.

Bezüglich der Wahl der Operation, ob Steinschnitt oder Lithotripsie, sei hier nur erwähnt, dass bei Kindern noch viel mehr als bei Erwachsenen dem Steinschnitte der Vorzug zu geben ist. Die Kinder liefern nach Angabe aller erfahrenen Chirurgen ein ausserordentlich günstiges Genesungsverhältniss. Die Steine sind selten gross, die Reaktion meist gering und die Heilung erfolgt fast in allen Fällen rasch, während der Lithotripsie besonders die Enge der kindlichen Harnröhre entgegensteht, wodurch eben auch bei jeder Sitzung chloreximirt werden muss und die consecutiven Schmerzen beim Abgang der Fragmente sehr heftig werden.

C. Mäuliche Genitalien.

I. Penis.

1) Bildungsfehler.

a) Angeborene Phimosis (φ γαστρον Verengung). Man versteht darunter eine angeborene so bedeutende Verlängerung und zugleich

Enge der Vorhaut, dass dieselbe nicht über die Eichel zurückgezogen werden kann. Ein gewisser Grad dieses Zustandes ist bei kleinen Knaben physiologisch, und nur selten kann die Vorhaut bis zur gänzlichen Enklöpfung der Eichel zurückgezogen werden, in der Regel jedoch so weit, dass man die Mündung der Harnröhre und die nächst gelegenen Parthien leicht zu Gesicht bekommt.

Kann man auf keine Weise das Präputium bis zur Harnröhrenmündung zurückziehen, so nennt man diesen Zustand angeborene Phimosis. Die Folgen hiervon sind gewöhnlich sehr gering. Die Oeffnung in der Vorhaut ist weit genug, dass der Harn in einem Strahle abfließen kann, und bei zunehmenden Jahren bleibt dieser Ueberfluss von Vorhaut in seinem Wachsthum zurück, die Spitze der Eichel wird sichtbar und bei eintretender Mannbarkeit ist das ganze Uebel gehoben.

Zuweilen entsteht theils durch Unreinlichkeit, theils durch äussere Verletzung, theils in Folge einer Balanitis beträchtliche Schwellung der Vorhaut, und nun kann der Urin wirklich die geschwellte Oeffnung nicht mehr passieren. Die Vorhaut dehnt sich blasenartig aus, wird missfärbig, die Kinder sind sehr unruhig und pressen unter heftigen Schreien nur wenige Tropfen Urin aus der fast gänzlich verschlossenen Oeffnung. Man hat sogar schon Gangrän entstehen sehen.

Die ausseren vorkommenden festen Verwachsungen der inneren Platte der Vorhaut mit der Eichel sind gewöhnlich nicht angeboren, sondern Folge früherer Ulcerationsprocesse dieser Theile.

Behandlung.

Leichtere Grade von Schwellung der überflüssigen Vorhaut kann man durch Bestreichen mit Oel und durch Reizlichkeit heben, bei beträchtlicheren Hindernissen ist es am einfachsten, den unnützen Hautzipfel mit der Schere abzuschneiden, worauf die äussere Platte der Vorhaut sich bedeutend weiter zurückzieht als die innere straff gespannte, in welche man deshalb noch einen kleinen Längsschnitt machen muss. Die beiden Wundränder legen sich alsdann ziemlich genau zusammen oder können wohl auch durch einige feine Nähte zusammengehalten werden, die Blutung und consecutive Schwellung ist nur gering, und in wenigen Tagen ist die Heilung vollendet.

1) Angeborene Paraphimosis. Sie kommt mit und ohne Hypospadie vor und beruht auf einer wahren Hemmungsbildung. Die Eichel hat nämlich in frühester Zeit des Embryonallebens noch keine Vorhaut, ist imperforirt und die künftige Harnröhrenmündung ist nur durch eine weisse Stelle angezeigt. Erst allmählig bildet sich hinter der Corona glandis eine Hautfalte, die zukünftige Vorhaut, welche nach und nach vorne wächst und bald die ganze Eichel, in welcher mittlerweile die Harnröhre sich entwickelt hat, bedeckt. Ein Zurückbleiben dieses Wachstums, wobei gewöhnlich auch das rudimentäre Präputium mit der Eichel verwächst, stellt die Paraphimosis congenita, oder richtiger gesagt, den *Defectus praeputii congenitus*, dar. Häufig ist damit Hypospadie verbunden und besonders oft ist das Frenulum so verkürzt, dass bei später erfolgenden Erektionen die Harnröhrenmündung nach unten gezerrt wird. Eigenthümlich ist die von Ammon erzählte Beobachtung, dass bei Judenknaben angeborener Defect der Vorhaut gar nicht selten vorkommt, also Fortleben eines künstlich erzeugten

Formfehler sich einstellt. Eine Analogie für diese Thatsache weist auch das Thierreich auf, indem bei Hunderracen, welchen man den Schweif zu stützen pflegt, viel häufiger schweiflose Junge geboren werden, als bei anderen Racen, die durch diese Unsitte nicht verunmelt werden.

Therapeutische Eingriffe gegen diesen Formfehler sind durchaus unzählig, nur bei zu kurzem Frenulum könnte vielleicht in späteren Jahren eine Durchschneidung nothwendig werden, wenn bei eintretenden Erektionen dadurch die Eichel schmerzhaft verzerrt würde.

7) Angeborene Verwachsung der Harnröhre. *Atroxia urethrae*. Es kann entweder bloss das Orificum urethrae verklebt, häufig verschlossen sein, oder es ist ein grösseres Stück der Harnröhre unwegsam. Im ersteren Falle sieht man beim Uriniren die Harnröhre bis zum Verschlusse sich ausdehnen und kann man durch einen leichten Längseinstich mit dem Explorativ-Troikart das ganze Uebel heben, im zweiten Falle, der jedoch sehr selten ist und fast nur mit Hypo- oder Epispadie complicirt vorkommt, ist die Operation sehr schwierig, und es muss schliesslich, wenn die Auffindung der Harnröhre in keiner Weise gelingt, der Blasenstich vorgenommen werden.

8) Anomale Mündung der Harnröhre. *Hypospadia* und *Epispadia*. Bei der *Hypospadia* ist die Harnröhre an ihrer unteren Fläche nicht bis zur Spitze des Penis verwachsen, sondern stellt gegen diese zu eine offene Rinne dar, so dass die Mündung der Röhre nicht am Ende, sondern an der unteren Fläche des Penis sich findet. Bei den leichteren Graden von *Hypospadia*, wo die Öffnung noch im Verlaufe des Penis ist, haben die Individuen keine andere Unbequemlichkeit, als dass eben der Strahl des willkürlich ablassenden Harnes nicht direkt nach vorne, sondern gerade nach abwärts fliesst, was jedoch grössere Kinder durch Aufwärtshalten des Penis corrigiren lernen. Bei den höchsten Graden aber ist nicht nur die ganze Harnröhre, sondern auch der Hodensack und selbst noch das Perineum gespalten, und die Blase mündet ganz direkt in diese Spalte. Die Verwachsung mit *Hermaphroditismus* liegt hier sehr nahe, zumal wenn die Hoden in der Bauchhöhle zurückgeblieben sind, was gewöhnlich der Fall ist. Mit Bestimmtheit lässt sich in diesen Fällen das Geschlecht erst in späteren Jahren entscheiden, wenn die Geschlechtslebe erwacht, männliche Stimme, männlicher Körperbau und Bartwuchs sich einstellen.

Ihren genetischen Charakter nach ist die *Hypospadia* eine echte Bildungsanomalie; denn die Harnröhre des Penis ist ursprünglich nicht vorhanden, sondern nur durch eine Rinne angedeutet, und mündet in dem ebenfalls noch gespaltenen Hodensack.

Die Versuche, auf chirurgischem Wege eine normale Harnröhre herzustellen und die anomale Öffnung zu schliessen, gelingen wegen der ätzenden Eigenschaften des unvermeidlichen Urines nur sehr selten.

Unter *Epispadia* versteht man Spaltung der Harnröhre nach oben, so dass ihre eigentliche Mündung an der Dorsalfläche des Penis liegt. Die Spaltung beschränkt sich entweder nur auf die Eichel, oder auf den ganzen Penis, und als der höchste Grad dieses Bildungsfehlers ist die *Ektopie* der Blase anzusehen, deren ausführlichere Schilderung schon oben pag. 406 gegeben wurde. Es ist dieser Zu-

stand viel seltener als die Hypospadie. Wenn die Oeffnung der Harnröhre nahe der Eichel ist, so können die Kinder nach Willkür uriniren und vermögen später dabei den Penis auch so zu halten, dass sie sich nicht verunreinigen. Ist aber die Mündung ganz an der Wurzel des Penis, so besteht gewöhnlich Incontinentia und es stellen sich alle die traurigen Folgen dieses Uebels ein. Zeugungsfähigkeit ist solchen Individuen nur dann direkt abzusprechen, wenn die Mündung so weit nach hinten liegt, dass sie bei der Immissio penis nicht in die Vagina gelangt.

2) Balanitis. Die Entzündung der Vorhaut (ή βλάβη
die Eichel).

Zweites läuft sich bei grösseren Knaben das Smegma praeputii in beträchtlicher Menge an, wird hart und geht chemische Zersetzungen ein, wodurch die Eichel und die Vorhaut sich entzünden. Dasselbe kann auch durch äusserliche Verletzungen und fortwährendes Spielen mit der Vorhaut, wie dies den Onanisten und Wurmkranken eigen ist, veranlasst werden.

Man sieht sodann die Vorhaut geschwollen, an ihrer Mündung verklebt und kann sie nur unter heftigen Schmerzenseindrücken zurückziehen. Die Eichel erscheint geröthet, mit Eiter bedeckt und bei ihrer vollständigen Enthüllung kommen grössere Klumpen einer käsig, höchst penetrant riechenden Masse aus der Vorhautfalte zu Tage. Mit Entfernung dieser Massen ist gewöhnlich schon die Ursache des Uebels gehoben, das dann nach wenigen Tagen spontan heilt. Die Heilung wird zweckmässig durch Bäder und Umschläge mit Bleiwasser unterstützt.

Wenn die Vorhaut wegen zu starker ödematöser Schwellung nicht zurückgedrückt und so die Hauptverursachung, das verhärtete Smegma, nicht entfernt werden kann, so dauert die Entzündung bedeutend länger, es kann sogar zu Abscessen und Perforation des Präputiums kommen. Ich behandelte einmal einen Knaben an einer sehr heftigen Balanitis und konnte in keiner Weise die Vorhaut zurückbringen. Einspritzungen von Oel und warme Umschläge, welche sonst das Oedem zum Schwinden bringen, blieben erfolglos. Da zeigte sich am dritten Tage an der Vorhaut in der Nähe des Bändchens eine blauschwarze Stelle, es stellte sich circumscripte Gangrän ein und schliesslich sah man in dieser Gangrän eine hellere Stelle, die sich bei genauerer Untersuchung als der Knopf eines Fadens zu erkennen gab. Nachdem man diesen Knopf mit der Pinzette möglichst hervorgezogen und durchschnitten hatte, kam ein langer Faden zum Vorschein, nach dessen Entfernung die Gangrän sich begrenzte, die Balanitis schwand und in wenigen Tagen Heilung eintrat. Der unthätige Knabe hatte sich nach zurückgezogener Vorhaut den Faden um die Eichel, welche alsbald anschwell, geknüpft und konnte von denselben nicht mehr losbringen. Die Furcht vor Strafe verhielt ihn am Geständnis seines unglücklichen Experimentes und so musste er warten, bis sich der Faden diese Bahn gebrochen. Da sich jedoch die Gangrän auf eine erbsengrosse Stelle beschränkte, so blieb der ganze Process ohne weitere Folgen.

Die Behandlung der einfachen Balanitis beschränkt sich auf Entfernung des Smegma's, Reinlichkeit, adstringierende Bäder und Umschläge. Verwachsungen zwischen Präputium und Eichel sind niemals zu befürchten.

3) Erworbene Paraphimosis.

Bei Kindern entsteht Paraphimosis wegen des langen, engen Präputiums viel häufiger als bei Erwachsenen. Die Knaben spielen und zerren gern daran, bis sie plötzlich die ganze Eichel frei gebracht haben. Der enge Rand der Vorhaut, durch die kegelförmige Eichel allmählig und schmerzlos ausgebeutet, retrahiert sich von hinter der gelabfallenden Corona glandis wieder, und es gehört eine viel grössere Geschicklichkeit dazu, die Vorhaut wieder vorzubringen, als zu deren Zurückziehen nötig war. Die bestürzten Kinder suchen gewöhnlich ihr Missgeschick zu verharmlichen, die Einschnürung veranlaßt mittlerweile eine bedeutende Schwellung und Difformität des Penis, und die Eltern, endlich aufmerksam gemacht, erschrecken ausserordentlich über diese ihnen ganz fremde Form des Gliedes. Sich selbst überlassen sinkt die Geschwulst der Eichel mehrere Tage lang zu und gestaltet diese endlich zu einem unförmlichen, blauen Knopfe um, abdamit aber mit nach und nach spontane Abnahme des Volums ein, indem der Vorhautrand sich erweitert, und endlich schlüpft die Eichel auch ohne Kunsthilfe wieder hinter die Vorhaut zurück. Gangrän der Eichel sah ich noch niemals durch einfache Einschnürung des Vorhautrandes, wohl aber durch Einschnürung mittelst eines Fadens, wie oben schon mitgeteilt wurde, entstehen. Die geringere Gefahr im ersteren Falle rührt eben von der endlichen Ausdehnbarkeit der Vorhaut selbst her.

Behandlung.

Es gibt nicht leicht eine dankbarere Behandlung als die der Paraphimosis. Die höchst bestürzte Mutter bringt ein nach ihrer Ansicht schon verstümmeltes Kind zum Arzte und verlässt denselben nach einigen Minuten freudestrahlend, indem durch die gelungene Reposition die normale Form des Gliedes hergestellt worden.

Das Verfahren der Reposition besteht einfach darin, dass man mit beiden Zeige- und Mittelfingern die hinter der Eichel gewulstete Vorhaut fasst und zu gleicher Zeit mit beiden Daumen auf die Eichel von vorne drückt; es entsteht hierdurch an der Vorhaut ein Zug nach vorne, an der Eichel eine Bewegung nach rückwärts, und das Resultat dieser Manipulation ist ein Herübergleiten der Vorhaut über die Corona glandis, worauf die letztere in kürzester Zeit wieder ihre normale Form und Farbe annimmt. Bei veralteten, Tage lang bestehenden Fällen kann man durch einen continuirlich über das Glied geleiteten Strahl kalten Wassers das Volumen der Eichel verkleinern und den bei der Reposition unvermeidlichen Schmerz verringern. Mir sind schon viele solche Paraphimosen vorgekommen, ich war bisher noch bei einer jeden im Stande, die Reposition zu machen und glaube deshalb, dass die Pädiatriker, welche Umschläge mit Bleiwasser und verschiedenen Adstringentien bis zur spontanen Heilung anrothen, mit obigem Verfahren nicht vertraut sind.

Nachbehandlung ist in keiner Weise nöthig, indem die wieder an Ort und Stelle gebrachten Theile alsbald die normale Form annehmen. Vor Recidiven ist man auch gesichert, indem die einmal so geängstigten Kinder niemals mehr darnach Verlangen tragen, ihre ganze Fichel entblößt zu sehen.

4) Onania, Masturbatio.

Kommt zwar auch bei Mädchen vor, bei diesen jedoch viel seltener und in ihren Folgen unbedeutender als bei Knaben. Man versteht hierunter verschiedene Berührungen des Penis, namentlich Reiben in der heißen Hand oder Kneten, wodurch dasselbe zur Erektion und endlich zu einem vorzeitigen Samenergusse gebracht wird. Mädchen kitscheln sich selbst oder gegenseitig mit den Fingern oder anderen länglichen Gegenständen in der Vagina und bringen hiedurch Schmerz, Rötzung und stärkere Secretion der Vaginalschleimhaut zu Stande, wodurch die Unart für die Zukunft sich von selbst verbietet.

Anders verhält sich die Sache bei Knaben. Dieselben bekommen hiedurch ein so gesteigertes Wollustgefühl, dass sie trotz der härtesten Strafen und der besten eigenen Vorsätze Jahre lang von diesen unglücklichen Manipulationen nicht mehr lassen können. Sie magen hierbei oft stilllich ab, bleiben in ihrer körperlichen und besonders auch geistigen Entwicklung zurück, werden anämisch, bekommen braune oder bläuliche Färbung der unteren Augenlider, einen apathischen Gesichtsausdruck und schlaffe Muskulatur. Früher beliebte Spiele werden ihnen gleichgültig, sie ziehen sich überall schnell zurück und sind am liebsten allein, um ungestört ihrer Neigung zu fröhnen. Der Gang wird unsicher, schleppend mit nach einwärts gebogenen Knien. Die Abmagerung ist am auffallendsten an den unteren Extremitäten und der Lendengegend, während der Penis an Länge und Dicke unverhältnissmäßig zunimmt. Die Vorhaut wird verkürzt und geht so leicht zurück wie bei Erwachsenen; eine kurze Berührung des Penis genügt, eine Erektion zu veranlassen.

Zur wirklichen *Tabes dorsalis*, welche in populären Schriften gewöhnlich in Aussicht gestellt wird, kommt es nur äusserst selten, indem die eben geschilderten Symptome doch endlich die Kinder zur Besinnung bringen und sie nun selbst sich alle Mühe geben, das Uebel zu vermeiden. Es kommt sehr viel darauf an, in welchem Alter die Knaben dieses Laster erlernen. Je später sie dazu kommen, je näher der Mannbarkeit sie sind, um so geringere Folgen werden beobachtet. Knaben, die über zehn Jahre alt sind, bringen es durch längeres Onaniren endlich zur Ejaculation einer schleimigen Flüssigkeit; ob dieselbe schon Samenflüssigkeit enthält, ist meines Wissens noch nicht untersucht worden, es könnte möglicher Weise auch prostaticher Saft sein. Das kleinste Kind, bei dem bis jetzt Onanie beobachtet wurde, war ein elf Monate altes Mädchen. Dasselbe schob sich nach der Schamspalte, immer heftiger und hastiger, zog die Beine an den Leib, verzerrte die Gesichtszüge grimassend und liess ein lautes Schreien vernehmen. Es ist dieser Bericht einzig in seiner Art, es fragt sich nur, ob nicht das Kind einen kleinen Ausschlag oder einen fremden Körper

in der Vagina hatte, in welchem Falle dann die Bewegungen viel einfacher als juckende zu erklären wären.

Bei weitem nicht alle onanirenden Knaben leiden an den geschilderten Folgen, sondern viele behalten ein blühendes Aussehen und gedeihen geistig und körperlich so gut wie vorher. Harnärzte in grösseren Knabeninstituten versicherten mir, dass die Mehrzahl der constatirten Onanisten keinen körperlichen Nachtheil davon hatten, und viele robuste Männer mit grosser Zeugungskraft, welche mich wegen anderen Unwohlseins consultirten, gestanden mir schon häufig, dass sie in ihrer Jugend Jahre lang onanirten.

Ursachen.

Die gewöhnlichste Veranlassung ist der Nachahmungstrieb der Knaben. Es zeigt ein Onanist seine Kunststücke oder macht sie wohl gar am Penis eines anderen unerfahrenen Knaben, und von dieser Stufe an beginnt der letztere dasselbe Laster. Es kommt deshalb die Onanie bei Knaben, welche in Instituten erzogen werden, viel häufiger vor, als bei solchen, die in der Familie bleiben können.

Alles, was Erektion macht, befördert den Hang zur Onanie. Hierher gehören schwere Federbetten, zu mährhafte Fleischkost, alkoholische Getränke und unsittliche Bilder und Erzählungen. Ausserdem kann das Uebel direkt veranlasst werden durch juckende Anschläge am Penis, grössere Anhäufung von *Smegma praeputii* und durch *Oxyuris vermicularis*, welche vom Mastdarm aus unter die Vorhaut oder in die Vagina kriechen können.

Behandlung.

Nach den Mittheilungen eines erfahrenen Institutsarztes ist medicamentos gar nichts gegen beginnende Onanie zu machen, sondern man kann blos durch strenge Aufsicht die Ausübung des Lasters so viel als möglich erschweren. Zu diesem Behufe müssen in den Schlafsälen beständig Wachen aufgestellt sein, welche die Bewegungen unter der Decke controlliren und die Knaben im Betretungsfall sogleich abdecken und bestrafen müssen. Die Matratzen müssen hart gepolstert sein, die Zudecken sollen nicht aus Federkissen, sondern aus wollenen Decken bestehen, durch welche man die Conturen des Körpers viel leichter erkennt. Die Bestrafungen solcher Knaben müssen sehr streng sein, doch vor den übrigen geheim gehalten werden, überhaupt kommt alles darauf an, dass möglichst wenig Knaben das Laster kennen lernen, weshalb die schnelligste Entlassung eines Onanisten das beste Mittel gegen weitere Verbreitung ist. Für Entfernung der oben angeführten Ursachen muss ängstlich Sorge getragen werden. Es ist nicht statthaft, dass Knaben, welche der Onanie verdächtig, jedoch nicht überwiesen sind, ausführlich und öfter am Penis untersucht werden, indem noch unschuldige Hördurch aufmerksam gemacht und dazu veranlasst werden können. Gegen die Folgen der Onanie, Abmagerung und mangelhafte Entwicklung gelten kalte Biegungen und Bäder als das beste Mittel, gegen die zuweilen eintretende Fettsucht solcher Kinder, wodurch ihnen ein höchst auffallendes, komisches Aussehen gegeben wird, darf unter keiner Bedingung mit Jod noch jodhaltigen Mineralwässern eingeschritten

werden, da hierauf gewöhnlich Abmagerung und rasch Tuberkulose sich einstellt.

Sehr ungeeignet sind übrigens die Drohungen mancher Lehrer und Vorstände, es würde hierdurch die Gesundheit infallibel untergraben und der Tod müsse bald eintreten. Die Knaben lassen allerdings hierauf auch oft von der Quasie, verfallen aber in eine tiefe Melancholie, die sie bis in's Mannesalter hinein nicht mehr verlässt. Eine tüchtige körperliche Züchtigung führt ebenso gut zum Ziele und dieser traurige Seelenzustand wird gänzlich vermieden.

8. Hoden.

(1) Cryptorchidien. (γενετὶς verborgen, α ὄρχις Hoden.)

Im neunten Monat des Fötallebens steigen die Hoden aus der Bauchhöhle in das Scrotum herunter, und ein ausgetragener Knabe kommt mit beiden Hoden an ihrer normalen Stelle zur Welt. Nebenmonatkinder werden gewöhnlich mit leerem Hodensacke geboren und häufig Meist auch bei ausgetragenen Kindern der eine oder andere Hoden, selten beide, längere Zeit zurück, so dass ungefähr gegen zehn Procent sämmtlicher neugeborener Knaben in dieser Beziehung Abnormalitäten zeigen. In der übergrossen Mehrzahl dieser Fälle steigt der Hoden in den ersten Lebenswochen ohne alle Symptome herunter und nur selten sieht man grössere Knaben mit nur einem Hoden; noch seltener aber mit ganz leerem Hodensack. Man nennt diese Individuen Monorchiden, Testicardi, Cryptorchiden. Die letztere Bezeichnung ist die treffendste, denn sie besitzen keineswegs nur einen Hoden, sondern zwei, die aber nicht an ihrer normalen Stelle sich befinden. Kommt ein Cryptorchis zur Section, so findet man den zurückgebliebenen Hoden nicht an seiner ursprünglich physiologischen Stelle, den Nieren. Er liegt gewöhnlich am Eingange des Canalis vaginalis oder in diesem selbst, oder vor demselben in der Leisten-gegend, wo man ihn auch bei Lebzeiten als harte elliptische Geschwulst, schmerzhaft auf stärkeren Druck, entdecken kann.

Zuweilen hebt die Natur bei beginnender Pubertät das Herabsteigen des Hodens nach, desensus testiculi scrotinus, was nicht immer unter besonderen Symptomen, sondern ganz unvermerkt geschieht kann. Der Hoden steigt jedoch nie mehr in den Grund des Scrotums, indem der Samenstrang etwas an seinem Längenwachthum eingekürzt hat. In andern Fällen soll hierbei ein heftiger pressender Schmerz entstehen, und man will sogar beobachtet haben, dass Menschen hieran gestorben sind. Die mechanische Todesursache ist meines Wissens nicht genau ermittelt und dürfte vielleicht in Gangrän des abge schnürten Hodens zu suchen sein.

Nach Ammon kann sich der Hoden auch einen falschen Weg bahnen und unter dem Schenkelbogen, wo er mit einer Cruralhernie verwechselt werden könnte, oder am Damm zum Vorschein kommen. Weitere unglückliche Folgen der Cryptorchie gibt es nicht, namentlich ist sie nicht die Ursache von Impotenz.

Durch Kunsthilfe lässt sich dieser Bildungsfehler nicht corrigiren. Es gibt kein Mittel, den in der Bauchhöhle zurückgebliebenen Hoden

heranziehen, und nur direkten Schaden kann man anstellen, wenn man das Heraustoigen des im Scheidenkanale befindlichen Hodens durch Expulsirverbände beschleunigen wollte. Selbst wenn eine Darmschlinge zugleich mit dem Hoden aus dem Scheidenkanale austritt, und Compressionsversuche nicht rathsam. Das Beste in diesem Falle ist, zu warten, bis der Hode im Scrotum angelangt ist, dann die Hernie zu reponiren und durch ein gutes Bruchband zurückzuhalten.

2) Hydrocele. Der Wasserbruch.

Ein sehr dünner Doppelsack, die Tunica vaginalis propria, hüllt den Hoden und Nebenhoden ein und enthält im physiologischen Zustande nur wenig Tropfen Serum, um die Schlüpfrigkeit der reibenden Flächen zu vermitteln. Eine Verwachsung dieses Serums deckt den Sack zum Theil, seine innere Fläche berührt nirgend mehr die innere und das Scrotum hat eine sichtlich Vergrößerung erfahren. Wir nennen diesen Zustand Hydrocele.

Bei kleinen Kindern kommt die Hydrocele ausserordentlich häufig vor, gewöhnlich ist nur ein Hode erkrankt, zuweilen auch beide. Ihre Entstehung verdankt sie in den meisten Fällen einem mangelhaften Verschlusse des Canalis vaginalis, nachdem der Hode ihn passiert hat. Es senkt sich nun das Sekret des ganzen Peritonäums in den Hodensack und stellt eine Hydrocele dar. Dieselbe ist im strengsten Sinne des Wortes nicht angeboren, sondern entsteht erst einige Tage oder Wochen nach der Geburt. Die Disposition hierzu, der offene Vaginalkanal jedoch ist angeboren und deshalb kann diese auch vom Wasserbruche selbst gesagt werden. Man unterscheidet folgende vier Arten:

1) Hydrocele canalis vaginalis testiculi aperta. Tafel III. Fig. 11. In ihrem ausgesprochenen Grade eine seltene Form. Sie gibt sich zu erkennen als eine längliche Geschwulst, die vom Grunde des Scheidenkanals bis unter den Hoden reicht. Der Hode ist gar nicht oder nur sehr unbestimmt zu fühlen, der Samenstrang ist wegen des ihn umspülenden Wassers zur Dicke eines Bleistiftes ausgeleert. Charakteristisch für diese Form ist, dass bei Eintritt der Bauchpresse die Geschwulst bedeutend grösser und praller, bei Nachlass derselben wieder kleiner und weicher wird. Dasselbe geschieht, wenn man den Hodensack in die Höhe hebt, wodurch sein Inhalt in die Bauchhöhle zurückfliesst, was zuweilen bei engerer Communication nur auf angelegten Druck gelingt. Die Verwechslung mit einem äussern Leistenbruch ist nicht immer leicht zu vermeiden. Die Form ist dieselbe und der Inhalt lässt sich ebenfalls reponiren. Die Wassergeschwulst jedoch ist gegen Sonnen- oder Kerzenlicht entschieden transparent, der Peritoneumschwall derselben ist matt, während eine Hernie immer sonor klingt, und der Hode ist bei der Hydrocele nicht zu isoliren, was bei einer Hernie leicht möglich ist. Dem geübteren Diagnostiker genügt zur Sicherstellung einer Diagnose schon die Art, wie die Geschwulst schwindet. Der Darm tritt auf Druck meist plötzlich und mit einem geräuschvollen Geräusch zurück, während die Hydrocele nur allmählig, durchaus nicht ruckweise sich verkleinert.

2) Hydrocele fundi canalis vaginalis testiculi clausi. Tafel III.

Fig. 12. Bei weitem die häufigste Form. Sie ist gewöhnlich nicht angeboren, sondern entsteht erst einige Wochen nach der Geburt. Die Geschwulst ist rund, durchscheinend und lässt sich durch Druck nicht verkleinern. Der Hoden liegt nach oben und hinten und kann nur dunkel durchgefühlt werden. Der Samenstrang zeigt ein ganz normales Verhalten. Diese Hydrocele ist häufig beiderseitig und wird dann von den Angehörigen wegen der gleichmässigen Vergrösserung beider Hoden weniger leicht bemerkt, als wenn nur ein Hoden erkrankt ist.

3) *Hydrocele colli canalis vaginalis aperta*. Taf. III. Fig. 13. Man findet hier den Samenstrang von seiner Bauchhöhlenmündung an bis hinauf in die Hälfte des Hodensackes erweitert und mit Wasser gefüllt, während ein ganz normaler, nicht vergrösserter Hoden in der Tiefe des Scrotums deutlich zu fühlen ist. Die Scheidenhaut umgibt den Hoden allseitig und ist erst oberhalb desselben hydropisch ausgedehnt. Auf Druck verkleinert sich die Geschwulst, das Wasser kann in die Bauchhöhle zurückgedrängt werden, der Samenstrang wird aber wegen der Verdickung der Scheidenhaut niemals so dünn, als der der gesunden Seite. Zu dieser Hydrocele und zu der sub 1 beschriebenen können sich, da der Vaginalkanal offen steht, leicht Hernien gesellen. Von einer Hernie sie zu unterscheiden, ist oft nicht leicht, die Art, wie die Geschwulst schwindet, ob langsam oder plötzlich mit einem geräuschvollen Geräusche, ist hier noch der beste Anhaltspunkt. Auch diese Form ist sehr selten.

4) *Hydrocele colli canalis vaginalis clausa*. Taf. III. Fig. 14. Hier ist der Samenstrang an seiner Austrittsstelle aus dem Inguinalringe von normaler Dicke und verläuft auch in dieser Weise eine kurze Strecke, dehnt sich dann plötzlich zu einer länglichen Cyste aus, die nach unten oben so rasch wieder abnimmt, und der Hoden ist ebenso wie bei der vorigen Form von normaler Grösse und Consistenz. Man unterrichtet sich von den eben beschriebenen Verhältnissen am besten, wenn man zuerst die beiden Hoden aufsucht, sie mit einander vergleicht und dann an dem der kugelförmigen Seite einen leichten Zug ausübt, wodurch die Untersuchung des Samenstranges wesentlich erleichtert wird. Diese Form ist ziemlich häufig, gewöhnlich aber unilateraler. Sie lässt sich wohl verschieben, so gut wie ein gesunder Samenstrang, wird aber durch Druck nicht kleiner, indem der Scheidenkanal verschlossen ist.

So viel von den einzelnen Formen. Die häufigste ist die zweite, ebenfalls noch häufig die vierte, während die erste nur selten und die dritte am seltensten beobachtet wird.

Der Inhalt dieser Hydroceelen ist, wenn noch keine eingeleitete Behandlung mit ihnen vorgenommen worden, ein dünnflüssiges, klar hellgelbes Serum von der chemischen Zusammensetzung eines mit etwas Wasser verdünnten Bluteserums. Wenn schon öfter punktiert worden, ein Scissorum durchgezogen oder reizende Salben eingeschmiert worden sind, so wird die dann punktierte Flüssigkeit milchig trübe und zeigt einen ziemlichen Zellenreichtum.

Der spontane Verlauf der sämtlichen Formen ist, wenn auch langsam, fast regelmässig günstig. Die ungünstigste Complication ist eine durch den offen gebliebenen Inguinalkanal mit hervorgetretener Hernie, wodurch der Verschluss dieses Canales und somit die Resorption der Hydrocele sehr retardirt wird. Fast in allen übrigen Fällen stellt

sich mit der Zeit, wenn auch erst nach Monaten, eine spontane Resorption des ergossenen Serums ein und es restirt nur mehr eine Verdickung der Tunica vaginalis propria. Auch in den seltenen Fällen der mit der Bauchhöhle communicirenden Hydroceken tritt Resorption ein, nachdem bei zunehmendem Gebrauch der unteren Extremitäten der Leistenring sich zu schliessen pflegt.

Behandlung.

Da fast alle Hydroceken bei Kindern, die das erste Lebensjahr noch nicht überschritten haben, spontan heilen, so handelt es sich nur darum, diese Naturheilung durch zweckmäßige Mittel zu unterstützen; als solche sind beliebt: trockene Wärme, aromatische Räucherungen, abstringirende Fomente aus Salmiak und Essig, Wein, verdünnter Jodtinktur etc. und endlich Compression der Geschwulst durch Heftpflaster oder Collodium. Die angeborene, offene Hydrocele heilt am schnellsten, wenn man ihren Inhalt in die Bauchhöhle zurückdrückt und hierauf ein Bruchband anlegt. Das einfachste und sicherste Mittel bleibt übrigens immer die Acupunktur. Dieselbe kann mit jeder beliebigen Nadel bewerkstelligt werden. Man spannt sich den Wasserbruch mit zwei Fingern und sticht nun die Nadel mehrmals in die gespannte Haut, wodurch ebenso viele Tröpfchen Serum zum Vorschein kommen, als Einstiche gemacht worden sind. Die äusseren Hautstiche heilen sich sogleich wieder, die Einschnitte in die Scheidentaut jedoch klaffen länger und es entsteht nun durch Austritt des Serums ein Oedem des Hodensackes, das sich in einigen Tagen spontan resorbirt und mittlerweile das äussere und innere Blatt des Scheidenkanals so aneinandergedrückt hat, dass Verklebung und kein neuer Erguss mehr eintritt. Gelingt auf den ersten Versuch noch keine vollständige Heilung, so kann diese kleine Operation ohne allen Nachtheil öfters wiederholt werden.

Hydroceken bei älteren Kindern und die des Samenstranges weichen sich ohne alle chirurgischen Eingriffe einer längeren fortgesetzten Bepinselung mit Jodtinktur.

B. Weibliche Genitalien.

1) Bildungsfehler.

Die Bildungsfehler der weiblichen Geschlechtstheile sind im Allgemeinen seltener als die der männlichen und werden mit wenigen Ausnahmen erst zur Zeit der Pubertät entdeckt, indem die dadurch verursachten Symptome erst mit der Geschlechtsreife sich bemerkbar machen.

Zu einem richtigen Verständnisse dieser Entwicklungsfehler muss die Bemerkung aus der Embryologie vorausgeschickt werden, dass der Uterus mit seinen Eileitern und die Scheide sich in der Weise aus den Müller'schen Gängen hervorbilden, dass der untere Theil der letzteren zum Canalis genitalis verschmilzt und dann eine quere Einkerbung erfolgt, wodurch er in zwei Stücke, die Gebärmutter und Scheide, getheilt wird. Aus diesem Grunde lassen sich nach Veit alle diese Missbildungen in zwei Klassen bringen, die erste entsteht durch eine

mangelhafte Entwicklung des einen oder beider Müller'schen Gänge, die zweite durch eine mangelhafte Verwachsung der beiden übrigen vollkommen ausgebildeten Gänge.

1. Classe: a) Die Müller'schen Gänge sind vollständig in ihrer Entwicklung zurückgeblieben und es findet sich demnach weder Scheide noch Uterus, sondern die äusseren Genitalien münden in einen ganz kurzen Blindack. b) Die Scheide ist in normaler Länge vorhanden, es fehlt aber der Uterus oder ist nur rudimentär entwickelt. c) Scheide und Vaginalportion sind von normaler Grösse, der Uterus jedoch ist wegen mangelhafter Verwachsung des Anfangstheiles der Müller'schen Gänge getheilt, Uterus bicornis, atrophisch und endigt in zwei atrophische Eileiter. d) Nur der eine Müller'sche Gang ist verkümmert oder fehlt gänzlich, wodurch der Uterus unicornis entsteht. Das entsprechende Ovarium ist in diesem Falle meist normal gebildet, ausserdem sind bei Verkümmern des Uterus auch die Ovarien zu verkümmert.

Diese sämtlichen Missbildungen bleiben bei Kindern ohne alle Symptome, und da sie keine äussere Formveränderung veranlassen, auch unentdeckt. Erst bei Eintritt der Periode stellen sich Störungen ein, es bildet sich irgend eine Menstruatio vicaria aus.

2. Classe. a) Der Uterus ist gut entwickelt, aber seine Hörner sind getrennt, Uterus bicornis. Die Trennung geht durch das ganze Organ, es ragen zwei Vaginalportionen in die einfache oder auch doppelte Vagina, wobei sogar zwei Hymen bestehen können. b) Es ist äusserlich am Uterus gar keine Formveränderung oder nur eine leichte Furchung zu entdecken, seine Höhle aber ist durch eine mittlere Scheidewand in zwei senkrecht nebeneinander gelagerte Fächer getheilt, Uterus bilocularis.

Auch diese Missbildungen haben durchaus keinen Nachtheil für die Entwicklung des Kindes und werden fast immer nur zufällig bei Sectionen gefunden. Nur die getheilte Scheide oder doppeltes Hymen werden der äusseren Beachtung nicht entgehen.

Die als Entwicklungsfehler der äusseren Genitalien bezeichneten Zustände sind gewöhnlich nicht wirklich angeboren, sondern bilden sich erst im Verlaufe der Jahre aus ursprünglich normalen Genitalien heraus. Diess gilt namentlich von der vergrösserten Clitoris und den verlängerten grossen Schamlippen, den sog. Hottentottenochsen. Ein partieller Verschluss der äusseren Labien kommt ausserdem noch bei kleinen Mädchen vor, welche an tiefgehenden, diphtheritischen Ulcerationen derselben gelitten haben und nicht mit der gehörigen Reinlichkeit und Sorgfalt behandelt wurden.

2) Catarrh der Genitalschleimhaut. Fluor albus, Leucorrhoea.

Symptome.

Unter Fluor albus versteht man eine derartig vermehrte Secretion der Vagina und Vulva, dass das Secret tropfenweise an den grossen Schamlippen zum Vorschein kommt, theils über die Schenkel und den Damm fliesset und die Wäsche beschmutzt, theils auch verdunstet und sich als Krusten an den Schamlippen ansetzt. Es entsteht hierdurch eine secundäre Schwellung und Röthung und bei geringer Reinlichkeit

oder in der Sommerhitze auch Excoriation der äusseren Genitalien und benachbarten Theile.

Das Secret ist Anfangs dickflüssig, hellgelb, homogen, später gegen Ende des Processes, oder bei scrofulösen Mädchen gleich im Beginne, schleimig, fadenziehend, zellenarm, nach Art des catarrhalischen Nasenschleimes. Wenn es einmal zu Excoriationen gekommen, so mischt sich das daher stammende Blut dem Schleime bei und verleiht ihm eine braunrothe Farbe. Ueber den Ort der Entstehung des Secretes, ob aus dem Uterus oder der Vagina oder aus beiden, kann man bei kleinen Mädchen nicht entscheiden, indem das Hymen stets geschwollen ist und eine Erweiterung der Vagina mittels kleiner Specula mit Recht nur ungern vorgenommen wird. Der raschere Verlauf der kindlichen Leukorrhöe spricht dafür, dass sie von der Schleimhaut der Vagina und nicht von der des Uterus stammt, während bekanntlich die Blennorrhöen des Uterus bei Erwachsenen mindestens Jahre lang trotz aller Behandlung fortdauern.

Weicht man die Krusten, welche die äusseren Genitalien verkleben, auf und untersucht die kleinen Labien, den Eingang der Vagina und das Hymen, so findet man diese Theile geschwollen, geröthet und schmerzhaft bei Berührung. Urethritis, welche sich durch Ausfliessen eines Tropfens Eiter aus der Harnröhre und lebhaften Schmerz beim Uriniren zu erkennen gibt, ist zuweilen, jedoch nicht häufig zugegen. Grössere Mädchen klagen auch über Schmerzen an den Genitalien und gehen, namentlich wenn Excoriationen zugegen sind, mit gespreizten Beinen, um jede Reibung möglichst zu vermeiden.

Der Verlauf der Leukorrhöe ist zwar immer ein chronischer, und ich erinnere mich keines Falles, der unter sechs Wochen geheilt wäre, doch steht die Genesung immer viel näher in Aussicht als bei Erwachsenen, indem sie stets nach längstens einigen Monaten eintritt. Nur bei Kindern mit vorgeschrittener Tuberculose und heftigem Fieber sah ich sie bis zum Tode in ungeschwächtem Grade fortdauern, worauf sich dann bei der Section jene warzige, granulirte Beschaffenheit der Vagina zeigte, die wir so häufig bei alten Leukorrhöen Erwachsener beobachten.

Ursachen.

Es kann allerdings nicht gelugnet werden, dass auch schon bei Kindern von wenigen Jahren Infection durch Trippergift vorkommt. Ein unglückseliger Aberglaube besteht im Volke, dass der Tripper des männlichen Gliedes schwindet, wenn dasselbe mit einem Hymen in Berührung gebracht wird, und auf Grund des Gerüchtes wird so manche Verführung zur Unzucht begangen. Wer öfter solche unglücklichen Kinder untersucht und beobachtet hat, wird deutlich den sonderbaren, unkindlichen, befangenen Ausdruck derselben bemerkt haben. Und stellt man nun die einfache Frage, woher denn diese Krankheit komme, so verliert sich der letzte Rest von Unbefangenheit. Die Kinder betheuern entweder gleich mit einer auffallenden verrätherischen Lebhaftigkeit ihre Unschuld, oder sie kommen durch diese Frage in sündliche Verlegenheit und sagen nur schüchtern und leise aus, dass sie nichts darüber wüssten. Ist gar keine Veränderung in dem Betragen der Kinder zu bemerken, so kann man mit ziemlicher Bestimm-

heit annehmen, dass keine Infection stattgefunden hat, und muss dann eine spontane oder mechanische Entstehung für wahrscheinlich halten. Entstehen an den grossen Schamlippen und um den After herum Cystidome, so ist gar kein Zweifel mehr vorhanden, dass eine wirkliche Infection stattgefunden hat.

Spontan entsteht die Leukorrhöe besonders oft bei scrophulösen und tuberculösen Kindern in feuchten Wohnungen, mechanisch entweder durch zufällige Einbringung fremder Körper, oder durch Ueberkriechen von Oxyuris in die Scheide, oder endlich durch Onanie. Da in der gerichtlichen Medicin so sehr urgirtes Symptom für stattgehabte Nothnacht, die trichterförmige Beschaffenheit und betrüfliche Schwellung der äusseren Genitalien, ist nur in ganz exquisiten Fällen und häufiger Wiederholung zu verwerthen. Durch eine einfache Berührung der männlichen Eichel mit dem Hymen kann niemals eine bleibende Formveränderung, nicht einmal eine betrüflichere Quetschung und consecutive Schwellung entstehen.

Behandlung.

Für die Behandlung ist es ganz gleichgültig, ob die Leukorrhöe durch Tripperinfection oder spontan entstanden ist. In beiden Fällen leisten Reinlichkeit und tägliche ganze Bäder die wesentlichsten Dienste. Am schnellsten heilen die mechanisch entstandenen. Nach Entfernung eines Stückchen Holz, einer Bohne, einer Glasperle etc., welche Gegenstände hinter dem Hymen sich verbergen und nicht ganz leicht wieder herausgezogen werden können, hört die Röthung und Eiterung in wenigen Tagen auf.

Fast ebenso rasch gelingt die Heilung der durch Oxyuris bedingten Leukorrhöe, wenn man täglich mehrmals den Mastdarm mit kaltem Wasser, und wegen grösserer Empfindlichkeit die Vagina mit warmem Wasser gehörig anspritzt. Schlimmer schon wird die Prognose, wenn Onanie die Veranlassung ist. Die Mädchen hören wegen des Schmerzes wohl einige Tage lang auf zu coämiren, sobald derselbe aber nachgelassen, beginnt die alte Unart von neuem und erzeugt so fortwährend Recidive, die nur durch die strengste Aufsicht, welche Tag und Nacht unaufhörlich fortzusetzen ist, verhütet werden können.

Die aus Berührung mit Trippercontagium entstandene Leukorrhöe dauert mindestens sechs Wochen, kann aber auch mehrere Monate währen, die entzündlichen Erkrankungen, Röthe, Schmerz und Geschwulst sind anfangs so bedestend, dass die Kinder nicht mehr im Stande sind zu gehen, und das Secret exsccirt schnell die Labien und Schenkel. Am hartnäckigsten ist das Uebel auch ohne Infection bei sehr scrophulösen oder vorgeschrittenen tuberculösen Individuen. Es dauert hier Jahre lang und besteht, wenn hektisches Fieber zur Tuberculose hinreißt, bis zum Tode.

Kräftigen, vorher gesunden, durch Infection erkrankten Kindern reicht man sehr vorthellhaft Laxantien, Jalappa, Senna, Aloe und Mittelbalke längere Zeit fort, dyskrasische Individuen hingegen müssen gleich von vornherein roborirend mit Eisen, China und Fleischliß behandelt werden.

Die örtliche Behandlung erstreckt sich bei den ungünstigen Verhältnissen der kindlichen Genitalien auf fleissige Injectionen mit

kaltem oder warmem Wasser und zur Nachtzeit auf Einlegen eines Charpiebauschs in die Vulva. Diese Charpie wird sehr passend mit einer Alaunlösung (1:10 Wasser) oder mit einer Tanninlösung (4:30 Wasser) getränkt. Der Eisenvitriol und der Hallsenstein wirken allerdings auch sehr günstig auf die blennorrhöische Schleimhaut ein, verderben aber die Wäsche vollkommen, weshalb sie von ökonomischen Müttern sehr ungern in Gebrauch gezogen werden.

Bei scrophulösen Kindern leisten Seebäder oder jodhaltige Brunnen, Heilbrenn, Kreuznach, sowie der Lebertbrun die besten Dienste. An den äusseren Genitalien bestehende Hautausschläge, Eczem, Impetigo und Prurigo, müssen mit Reinlichkeit und trocknenden Salben möglichst rasch beseitigt werden, indem das Vaginalsecret sie fortwährend befeuchtet und die beiden Uebel nachtheilig auf einander einwirken.

3) Diphtheritis und Gangrän der weiblichen Genitalien.

Diphtheritis kommt fast niemals sporadisch, sondern immer nur in schlecht ventilirten Spitälern, Findel- und Waisenhäusern vor. Sie ist bei uns im Allgemeinen selten und entwickelt sich noch am häufigsten während und nach einer blutartigen Masernepidemie, wo sie dann auch in dicht überfüllten, feuchten Wohnungen des Proletariats sich einsiedelt. Die Diphtheritis ist keine locale, vielmehr eine Allgemein-erkrankung, wie dies schon beim Krup erwähnt wurde und aus dem Fieber, dem schnellen Collapsus und gewöhnlich tödtlichen Ausgange zur Genüge zu ersehen ist.

Das Uebel beginnt, wie der einfache weisse Fluss, mit Röthung und Schwellung der Vulva, jedoch stellt sich sogleich heftiges Fieber, heisse Haut, frequenter Puls und Zunahme des Durstes ein. Zieht man nun die grossen Labien auseinander, so sieht man die Schleimhaut mit grauweissen Membranen inselförmig bedeckt. Die Gestalt derselben ist bald kreisförmig, bald durch Confluiren mehrerer Inseln unregelmässig conturirt. Sie lassen sich anfangs nur schwer mittelst einer Pinzette abziehen, zerfallen aber bald fötzig und hinterlassen einen graugelben Grund, auf welchem nach Abfall der ersten Fetzen sich sogleich wieder neue, membranöse Exsudate entwickeln. Die von Membranen freie Schleimhaut ist geschwollen und schmutzig roth. Der Geruch des jauchigen Secretes ist ausserordentlich intensiv, der Tage lang an den Händen haftet. Das Allgemeinbefinden verschlechtert sich hierbei rasch, das Fieber nimmt einen typhösen Charakter an, colliquative Diarrhöen stellen sich ein, die Jauche riecht endlich brandig, auch die Membranen und ihr Grund werden brandig, und wenige Tage nach Beginn des Uebels tritt der Tod ein.

Die Gangrän der Vulva entsteht entweder aus der eben geschilderten Diphtheritis oder gerade so wie Noma bei Kindern, welche eine fieberhafte Krankheit, Typhus, Blattern, Scharlach, Masern, eben durchgemacht haben. Sie stellt sich zuweilen so rasch und ohne subjective Symptome ein, dass erst der beunruhigende Geruch die Umgebung zu einer aufmerksameren Untersuchung veranlasst. Man findet dann in der Regel an der Innenfläche der grossen Schamlippen einige Beuteln, welche rasch platzen und eine brandige Jauche entleeren. In anderen Fällen, wo die Gangrän in den tieferen Gewebsschichten der

Lahien sich entwickelt, beginnen die letzteren edematös zu schwellen, werden erst nach mehrtägigen Schmerzen an einzelnen Stellen blau und brechen endlich auf, wobei dann eine grössere Brandfläche zum Vorschein kommt. Der Brand ist meistens feucht, schreitet rasch vorwärts und endet gewöhnlich mit dem Tode. In der Leiche findet man ausser den örtlichen Zerstörungen noch einen Catarrh der Schleimhaut und öfters auch pyämische Keble in den Lungen, der Milz etc.

Therapie.

Die Behandlung dieser Prozesse ist eine sehr missliche. Gegen Diphtheritis wird die innerliche Darreichung des kohlensauren Kali (tägl. 4.0) als specifisch wirkend empfohlen. Gewöhnlich jedoch kann nach Medoruch das letale Ende nicht aufgehalten werden. Gegen Gangrän ist sogleich eine möglichst reberirende Behandlung einzuleiten. Örtlich macht man Einspinelungen mit concentrirten Mineraläuren oder einer starken Sublimatlösung. Die letztere übt auf Diphtheritis eine entschieden günstige Wirkung aus, während eine solche in den von mir beobachteten Fällen von Gangrän regelmässig vermisst wurde.

Haemorrhagia vaginae. Vaginalblutung.

Bei Neugeborenen oder einige Tage alten Mädchen wird in seltenen Fällen eine leichte Vaginalblutung beobachtet. Die Blutung ist gewöhnlich unbedeutend und es sickern täglich nur einige Tropfen zwischen den Labien hervor. Häufig schwellen zu gleicher Zeit die Brustdrüsen etwas an und entleeren auf mässigen Druck einige Tropfen einer milchigen Flüssigkeit.

Die Vaginalblutungen werden niemals profus und als solche gefährlich. In den zwei Fällen, die ich bisher zu beobachten Gelegenheit hatte, trat jedoch nach einigen Tagen profuser Darmcatarrh und Atrophie ein, was sich übrigens viel natürlicher auf den Mangel der Mutterbrust als auf die vorausgegangene Blutung zurückführen lässt.

Billard und Olivier d'Angers haben diese kleinen Blutungen öfter beobachtet und konnten keine nachtheiligen Folgen wahrnehmen. Ganz ausnahmsweise kommt auch bei kleineren Mädchen von einigen Jahren eine regelmässige Menstruation vor. Es werden Fälle erzählt, wo dieselbe constant wiederkehrte und sogar schon Schwangerschaft im 8. bis 12. Lebensjahre stattfand.

Ausserdem sieht man, namentlich in tuberculösen Familien, die Mädchen sich schon vorzeitig entwickeln, im zehnten Lebensjahre und noch früher, worauf die bisherigen scrophulösen Erkrankungen sich rasch zurückbilden, um aber nur zu häufig von tuberculösen abgölzt zu werden.

Therapie.

Bei der Geringfügigkeit der Blutung Neugeborener erscheint es nicht angemessen, sie durch kalte Injectionen oder Einbringung blutstillender Mittel vorzeitig zu stillen. Man wartet am besten, bis sie von selbst sistirt, und setzt nur während ihres Bestehens die warmen Bäder aus.

7. Capitel.

Krankheiten der Haut.

Bei Kindern kommen alle Hautkrankheiten und zwar die meisten noch viel häufiger als bei Erwachsenen vor. Da jedoch bei der Anlage dieses Lehrbuches Kenntniss der spec. Pathologie, somit auch der Hautkrankheiten, vorausgesetzt wird, so können wir uns darauf beschränken, nur jene Veränderungen der Haut zu geben, welche fast ausschliesslich bei Kindern beobachtet werden, oder, wenn sie auch bei Erwachsenen häufig vorkommen, bei Kindern wegen grösserer Zartheit der Haut eine andere Therapie verlangen. Einzelne Hautkrankheiten wurden schon in früheren Capiteln besprochen, der Greis pag. 6, die Zellgeschwulstverhärtung pag. 62, der Wasserkreis pag. 93, die Ausschläge während der ersten Dentition pag. 199, während des Abdominaltyphus pag. 171, der Naevus vasculosus pag. 307, andere entschieden dyskrasische sollen noch bei den Dyskrasien, Syphilis und Scrophulosis, abgehandelt werden, und so bleiben uns für diesen Abschnitt nur die acuten Exantheme und einzelne wenige chronische Efflorescenzen übrig.

1) Scharlach. *Scarlatina*.

Der Scharlach ist, wie überhaupt alle acuten, contagiösen Exantheme, nicht als einfache Hautkrankheit, sondern vielmehr als eine Allgemeinerkrankung aufzufassen, als deren augenfälligstes Symptom allerdings die Veränderung auf der Haut geben kann. Er war von jeher der Gegenstand anhaltender Aufmerksamkeit der Aerzte, so dass sich bei Comstati allein bis zum Jahre 1846 eine Literatur von 181 Arbeiten findet, welche bis auf unsere Tage noch um einige Tausend Nummern vermehrt worden sind. Der Grund dieser Unzahl von Abhandlungen liegt theils in der Leichtigkeit der Beobachtung und dem häufigen Vorkommen, theils in der eigenthümlichen Erscheinung, dass fast jede Epidemie kleine Variationen bietet, welche in den früheren nur wenig und unvollkommen beobachtet wurden. Zur Vereinfachung wird hier zuerst die Beschreibung eines regelmässigen Scharlachs gegeben werden, worauf dann sämmtliche Variationen und Complicationen in einem speciellen Abschnitte folgen sollen.

A. Normaler Scharlach. *Scarlatina legitima*.

Symptome.

Der legitime Scharlach durchläuft drei ziemlich scharf geschiedene Stadien: 1) Die Incubation und die Vorläufer, 2) den Ausbruch und die Blüthe des Exanthemes, und 3) dessen Schwinden mit endlicher Desquamation.

1) Das Incubations- und Vorläuferstadium.

Die Incubation dauert vom Tage der Ansteckung bis zum Auftreten des Fieberfrostes, von wo an man das Vorläuferstadium rechnet.

Es ist dieser Zeitraum durchaus nicht bei allen Kindern gleich lang, in den meisten Fällen dauert er 6—8 Tage. Hieron bedeutend abweichende Angaben müssen mit grosser Vorsicht aufgenommen werden, indem es während einer Epidemie nur sehr selten gelingt, den Tag der Ansteckung mit absoluter Bestimmtheit anzugeben. Die Gelegenheiten der Ansteckung durch persönlichen Verkehr, namentlich mit noch desquamirenden Recruescenten, dann durch Uebertragung von dritten Personen sind so mannigfaltig und schwer controlirbar, dass man wohl berechtigt ist, an Angaben, die von der gewöhnlichen Anzahl 6—8 Tage bedeutend differiren, zu zweifeln.

Wenn man nicht weiss, dass die Kinder infectirt sind, so bemerkt man während der Incubationszeit gewöhnlich keine krankhaften Symptome. Haben die Eltern in Erfahrung gebracht, dass sich ihr Kind einer Ansteckung ausgesetzt hat, so beobachten sie von dieser Stunde an eine Menge von Veränderungen an ihm, welche meist subjectiver Natur einen deutlicheren Beweis elterlicher Sorgfalt als medicinisches Scharflickes liefern. In der That kommen aber einige wenige Fälle vor, wo vom Momente der Ansteckung an die Kinder sich unwohl fühlen, niedergeschlagen sind, unruhig schlafen und geringeren Appetit zeigen, bis endlich deutlichere Fichersymptome den Anfang des Vorläuferstadiums anzeigern.

Das wirkliche Vorläuferstadium umfasst einen Zeitraum von 1—3 Tagen. Die Symptome, die während desselben eintreten, sind immer so deutlich, dass die Umgebung sie bemerkt, jedoch keineswegs deshalb stets die gleichen. Gewöhnlich haben sie nicht viel Charakteristisches. Leichtes Frösteln, abwechselnde Hitze und Kälte, oder auch ein wirklicher Schüttelfrost, erhöhte Hauttemperatur, sehr beschleunigter Puls, starker Durst, Appetitlosigkeit, Uebelkeit, bei plötzlichem Eintritt des Fichers auch Erbrechen, sind die gewöhnlichen Erscheinungen. Ein Symptom macht, namentlich während des Herrschens einer Epidemie, den Ausbruch des Scharlachs mehr als wahrscheinlich, es ist diese eine leichte Angina, verursacht durch allgemeine Rötzung und Schwellung des ganzen hinteren Abschnittes der Mundhöhle, des Gaumensegels, der Mandeln und hinteren Pharynxwand. Wichtige Anhaltspunkte für den Ausbruch eines Scharlachs sind ferner der auffallend heisse Athem, die grosse Pulsfrequenz, die Gluthitze der Haut und die starken abendlichen Exacerbationen, welche sich bis zu Delirien und Convulsionen steigern können.

Nachdem diese Symptome einen, längstens drei Tage gedauert haben, beginnt die Eruption des Ausschlages und damit das zweite Stadium.

2) Das Stadium der Eruption und Florescent

Das Exanthem zeigt sich zuerst am Halse und im Gesichte und breitet sich von da aus rasch über den ganzen Körper aus, in zwölf Stunden ist gewöhnlich der Ausbruch vollendet. Es beginnt in der Weise, dass sich zuerst kleine, kaum sichtbare noch fühlbare Pünktchen am Halse einstellen, auf welche dann rasch eine deutliche Rötze folgt. Wenn die Rötze nicht gleichmässig den ganzen Körper bedeckt, sondern nur in Form von grösseren, rothen Flecken auf weissen,

normalem Grunde auftritt, so bezeichnet man diese Art: *Scarlatina variegata*; ist der ganze Körper geröthet: *Scarlatina laevigata*. Diese beiden Formen lassen sich nicht exact trennen, indem oft an einzelnen Körperparthien die eine, an anderen die andere beobachtet wird und noch häufiger die *Sc. variegata* auf der Höhe des Ausschlages zur *laevigata* sich steigert.

Vorher gesunde, gutgehaltene Kinder werden im wahren Sinne des Wortes krebseroth; je anämischer, je schwächer die Kranken vorher waren, um so weniger intensiv entwickelt sich die Scharlachröthe. Am dunkelsten wird die Röthe bei der abendlichen Exacerbation und bei körperlicher Anstrengung, z. B. Schreien, am schwächsten, wenn die Kinder sich blosslegen und kühl werden.

Der normale, einfache Scharlach steht deutlich vier Tage lang, in den ersten beiden Tagen erreichen die Hautröthe und die allgemeinen Symptome ihren Gipfel, in den zwei letzten Tagen nehmen sowohl die örtlichen als allgemeinen Erscheinungen wieder ab.

Zugleich mit dem Ausbruche des Exanthemes steigern sich die angiosen Beschwerden beträchtlich, doch ist die Scharlachangina nie so heftig und schmerzhaft, als eine einfache Tonsillitis mit bedeutender Anschwellung, wenn sie eben in Eiterung übergeht. Die sog. Scharlachzunge ist auch am charakteristischsten nach der Eruption. Sie ist an der Wurzel und in der Mitte weiss belegt, an den Rändern und der Spitze dunkelroth gefärbt, die Papillae fungiformes sind etwas geschwellt und geben der Zunge ein granulirtcs Ansehen, weshalb man ihr bei der Aehnlichkeit der Farbe nicht unpassend den Namen „Himbeerzunge“ beigelegt hat. Zuweilen ist die Schwellung der Papillen eine so bedeutende, dass sie auch weiter hinten, wo schon der weisse Belag begonnen hat, noch als rothe Punkte hervorragen und somit die weisse Zunge roth gepunktelt erscheinen lassen.

Die Hauttemperatur ist in den ersten beiden Tagen enorm hoch, dem Gefühle nach höher an jenen Hautstellen, welche gehörig geröthet sind. Ich fand sie einmal am ersten Tage der Eruption in der Achselgrube bis auf 41,6 C. gestiegen. Der Puls ist ebenfalls sehr beschleunigt, der Durst gross. Die tiefe, allgemeine Depression, welche vor dem Ausbruche des Exanthemes zuweilen so bedeutend wird, dass die Kinder ganz collabirt wie Sterbende aussehen, lässt nach erfolgtem Ausbruche nach.

Heim gab zuerst an, dass die Scharlachkranken einen eigenthümlichen Geruch verbreiten. Der Geruch wird als sehr intensiv geschildert, indem man ihn mit Haringslauge, altem Käse oder gar mit einem Messergeruche verglichen hat. Ich bin nun mit einem ausserordentlich feinen Geruchsorgane begabt und untersuchte bei vielen Kranken diesen angeblich specifischen Geruch mit aller Aufmerksamkeit, muss jedoch gestehen, dass mir ein so specifischer Geruch noch niemals vorgekommen ist. Sehr viele Kinder riechen allerdings unangenehm, was eben daher kommt, dass die Angehörigen durchaus die Bett- und Leibwäsche nicht wechseln lassen, die Kinder im Bett selbst auf den Nachtopf setzen und sie oft über acht Tage lang mit keinem andern Schwamme berühren. Es entsteht hierdurch ein Gemisch von Gerüchen, wozu Fäces, Urin und Schweiß die Hauptbestandtheile liefern. Sobald man aber den Anus und die Genitalien ordentlich rein-

gen, die Wäsche wechseln und die Kinder in ein frisches Bett bringen lässt, verschwindet in allen Fällen der sog. spezifische Geruch.

Es ist möglich, dass zu Heim's Zeiten der Scharlach von einem solchen begleitet war, in unserer Zeit existirt derselbe nicht mehr.

Gegen den vierten Tag zu lassen nun die örtlichen und allgemeinen Symptome bedeutend nach. Die Angina verschwindet spurlos, das Exanthem erblaßt, das Fieber beschränkt sich auf immer schwächer werdende abendliche Exacerbationen, die Kinder setzen sich wieder auf, fangen an zu spielen und begreifen wieder zu essen.

3) Stadium der Desquamation.

Die Hautröthe erblaßt an den Stellen, wo sie zuerst bemerkt wurde, also am Hals und auf der Brust auch wieder meist, und schwindet zuletzt von der Lendengegend und der inneren Schenkelfläche, wo die letzten Spuren noch bis zum sechsten und siebenten Tage vom Ausbruche an gesehen werden. Vor der Desquamation stellt sich meist ein profuser Schweiß und anhaltendes, ziemlich heftiges Hautjucken ein, wesshalb denn die Epidermis rissig wird und sich in grössern Schuppen stellenweise in ganzen Fetzen ablöst. Die neue Epidermis ist in den ersten Tagen schwach rosenroth gefärbt und von besonderer Glätte, nimmt aber bald die Eigenschaften der eben abgeschälten an. Am grossartigsten ist die Abschälung an den Fingern und Zehen, wo sich zuweilen die ganze Epidermis in einem Stücke wie ein Handschuhfinger abziehen lässt. Ein ähnlicher Desquamationsprocess geht auch auf den Schleimhäuten vor sich. Die Kinder raspeln und heben ohne Beschwerden einen trübem Schleim aus, die Zunge stösst ebenfalls ihr Epithel ab, der Harn wird trüb und enthält aus den verschiedenen Abschnitten des tropischen Apparates ungeheure Mengen Epithelzellen. Es werden endlich auch einige grosse schleimige Stühle von aashaft penetrantem Geruche entleert.

Die Desquamation beginnt gewöhnlich gleich nach dem Erlöschen des Exanthemes, kann sich aber auch bis 14 Tage später verzögern, was besonders dann stattfindet, wenn die Genesung durch irgend einen andern intercurrenten Process, z. B. die Zahnung oder einen Catarrh der Bronchien, des Darinkanals etc. unterbrochen wird. Je stärker die Röthe, um so schneller und grosslappiger die Abschuppung.

Dieses wäre das Bild des legitimen Scharlachs. Die Variationen davon sind ausserordentlich mannigfaltig und lassen sich niemals ganz erschöpfend geben. Sie können am besten von folgenden Gesichtspunkten aus betrachtet werden: 1) Unvollkommenheit oder formelle Verschiedenheit des Exanthemes, 2) Modificationen der Schleimhautbetheiligung, 3) Intensität der Allgemeinerkrankung und 4) anormale Localisationen.

B. Varietäten des Scharlachs.

1) Unvollkommenheit oder formelle Verschiedenheit des Exanthemes.

Zu einem vollkommenen Scharlach gehören als Hauptsymptome Röthung der Haut und Angina; fehlt eines dieser beiden, so haben

wir die Variation des unvollkommenen Scharlachs und zwar je nachdem das eine oder andere fehlt: 1) *Scarlatina sine angina* und 2) *Scarlatina sine exanthemate*.

ad 1) Diese Form wird ziemlich oft beobachtet. Das Exanthem kann vollkommen zum Ausbruch kommen, regelmässig vorhanden, auch die Desquamation sich rechtzeitig und gütig einstellen, und doch klagen die Kinder nie über Schlagbeschwerden, und die Mandeln sind dem entsprechend nicht geschwollen und kaum geröthet. Die allgemeinen Symptome sind hierbei niemals von besonderer Heftigkeit, und die Schleimhautkrisen immer unbedeutend.

ad 2) So leicht und sicher die erste Unvollkommenheit zu diagnosticiren ist, so schwer ist es die zweite, indem Verwechslung mit einfachen Anginen, welche die Kinder während einer Scharlachepidemie ja auch acquiriren können, kaum zu vermeiden sind. Bei der Scharlach-angina gelten als charakteristische Momente: die weite Verbreitung der Röthe, die Himbeersinge, die Seltenheit der Abscessbildung in den Mandeln und die Heftigkeit des Fiebers, welche Symptome möglicherweise aber sämmtlich auch ohne Scharlach bei der einfachen Angina eines reizbaren Kindes sich zeigen können. Man kann mit Bestimmtheit die Scharlachangina nur dann diagnosticiren, wenn man dasselbe Individuum schon früher an einfacher Angina behandelt hat und nun eine beträchtliche Verschiedenheit in der Form und dem Fieber wahrnimmt.

Dass die Kinder nach Scharlach ohne Exanthem auch vollständig sich häuten sollen, wird mehrfach von Autoren angegeben; ich habe dies noch niemals beobachtet und halte es für räthlicher, bei wirklicher Desquamation einen, wenn auch nur wenige Stunden stehenden Hautausschlag anzunehmen.

Zwischen diesen beiden Formen liegt natürlich eine Reihe von Uebergängen. Es gibt ganze Epidemien, wo das Exanthem verhältnissmässig stark, die Angina schwach ist, und umgekehrt Epidemien, wo die Angina sehr heftige Beschwerden verursacht, während das Exanthem oft nur ganz kurze Zeit und nur an einzelnen Körperstellen sichtbar wird.

Bezüglich der Form des Exanthems haben wir vor allen 1) die *Scarlatina variegata*, 2) die *S. laevigata*. Bei der ersten entstehen zuerst thaler- bis handgrosse rothe Flecken, welche durch eine gewisse Parthie gesunder Haut von einander getrennt bleiben. Bei der zweiten wird die ganze Haut vom Gesicht bis zu den Füßen kirschroth, in welchem Falle immer die Desquamation am beträchtlichsten ist. Die erstere Form geht auf der Höhe des Exanthems wohl auch in die zweite über.

Wenn das Exsudat der Cutis massenhaft wird, so entstehen auf der Oberfläche eine Unzahl kleiner Knötchen, wodurch die Haut rau, wie eine Gänsehaut sich anfühlt.

Diese Knötchen entstehen durch Vergrößerung der Hautpapillen. Man nennt diese Art *Scarlatina papulosa*.

Bei noch grösserer Exudation endlich sammelt sich das Exsudat zu Bläschen, die ganze Haut bedeckt sich mit unzähligen mohnsamengrossen Vesikeln, welche eine alkalisch reagirende, trübe Flüssigkeit enthalten, platzen und eine mehrfache Desquamation veranlassen. *Scarlatina miliaris*, der Scharlachfrüesl.

In einzelnen Epidemien stehen diese Bläschen so dicht, dass sie zu grösseren Blasen confluiren können, was man *Scarlatina vesicularis, pustulosa, pemphigoides* genannt hat. Zur Miliarenbildung kommt es gewöhnlich nur bei ganz ausgesprochenen, schweren Fällen. —

2) Modificationen der Schleimhautbetheiligung.

Dass der Scharlach keine Hautkrankheit, sondern eine Allgemeinerkrankung ist, geht hauptsächlich aus den mannigfachen Affectionen der Schleimhäute hervor.

An der normalen Stelle, in der Mundhöhle, sind die Veränderungen von sehr verschiedener Intensität. Das Gaumensegel und die Mandeln sind entweder nur einfach geröthet, oder geröthet und beträchtlich geschwollen, oder sie bedecken sich in bösartigen Epidemien unter ungünstigen, äusseren Verhältnissen mit grauweißen Membranen, es tritt die *Angina diphtheritica* auf. Die diphtheritischen Membranen fallen sich am häufigsten auf den Mandeln und können durch Gurgeln theilweise abgelöst werden, worauf die Schleimhaut geröthet, erodirt an Vorschein kommt und sich nach wenigen Stunden mit einer neuen Membran bedeckt. Der Geruch aus dem Munde ist hierbei sehr widerlich, das Schlucken ist erschwert und aus der Nase fließt ein übelriechender Schleim, wenn sich die Diphtheritis nach aufwärts in den Choanen verbreitet hat. Die nächstgelegenen Sinusmaxillär- und Halsdrüsen sind dann immer geschwollen und gehen zuweilen in Eiterung über. Die Allgemeinerkrankung ist hierbei stets sehr intensiv und schneller Collapse tritt ein, wenn die Diphtheritis brandig wird. Dabei wird der Geruch aus dem Munde unerträglich ansthaft, es stellen sich grosse Schling- und Athmungsbeschwerden, Diarrhöen, Delirien oder Coma und bald darauf der Tod ein.

Bezüglich ihrer Ausdehnung zeigt die Angina ebenfalls Verschiedenheiten. Sie beschränkt sich in gutartigen Epidemien auf das Gaumensegel und die Mandeln, erstreckt sich aber, zumeistlich aber wenn die diphtheritische Form auftritt, auch auf die Rachenröhren, die Nasenhöhle, die Highmehöhle, den Pharynx und den Larynx, wodurch je nach den ergriffenen Partien Schwerhörigkeit, Coryza, grosse Schlingbeschwerden oder krampfhafte Symptome auftreten können. Die Epidemien mit diphtheritischer oder gar gangränöser Angina gehören immer zu den bösartigsten.

3) Intensität der Allgemeinerkrankung.

Unsere Verfahren nahmen 1) einen erethischen, 2) einen syncyhalen, 3) einen torpiden und 4) einen septischen Scharlach an. Wenn sich auch diese Trennung in verschiedene Formen nicht immer streng durchführen lässt, indem häufig bei einem und demselben Falle mehrere derselben nacheinander beobachtet werden, so muss doch zugestanden werden, dass der Charakter der allgemeinen Reaction in den einzelnen Epidemien ein sehr verschiedener sein kann. Hier kommt noch die Verschiedenheit je nach der Individualität. Im Allgemeinen kann angenommen werden, je kräftiger und gesunder ein Kind vor

der Aufnahme des Scharlachgiftes weg, um so synochaler, entzündlicher ist die Reaction seines Organismus, je schwächerer und dyskrasischer, um so septischer wird der Process verlaufen.

Unter erythrischem Scharlach versteht man das Krankheitsbild, welches wir als normalen Scharlach oben gestellt haben. Die Vorläufer, der Ausbruch, die örtlichen und allgemeinen Veränderungen treten mit keiner gefährlichen Heftigkeit auf und der Verlauf ist desshalb immer ein günstiger. Es darf mit einem normalen Vorläuferstadium und Ausbruch jedoch noch nicht mit Bestimmtheit auf einen ebenso normalen Verlauf gerechnet werden, indem zu jeder Zeit der Charakter des Fiebers sich ändern kann.

Die synochale, entzündliche Form zeichnet sich durch rasches Auftreten der Krankheit, heftiges Fieber, stark entwickeltes Exanthem mit Priesbildung, beträchtliche Angina und Gehirnerscheinungen, Schlaflosigkeit, Delirien, Kopfschmerz und Lichtscheu aus.

In einzelnen Epidemien ist die torpide oder nervöse Form die vorherrschende. Die Krankheit beginnt hierbei sogleich mit grosser Prostration, Schwindel, stilles Delirien, Öthmachten und Coma. Der Puls ist zwar ausserordentlich beschleunigt, aber klein und leicht zu comprimiren. Die Angina hat Neigung in Diphtheritis überzugehen. Das Exanthem bricht unvollkommen, nur an einzelnen Körperstellen aus, die Extremitäten sind öfter kühl als warm. Die Zunge wird trocken, wie bei Typhosen, es stellen sich wohl profuse Diarrhöen ein und die Kranken sterben gewöhnlich sehr bald am zweiten bis vierten Tage der Erkrankung. Bei der Section findet man in der Regel keine den Tod genügend erklärende örtliche Ursache, so dass man die Einwirkung des Scharlachgiftes auf das Blut und das Nervensystem als solche annehmen muss. Genesen solche Kinder, so sind sie gefährlichen Nachkrankheiten ausgesetzt und convalesciren in allen Fällen nur sehr langsam.

Als höchsten Grad der torpiden Form kann man die septische gelten lassen, wo der Ausschlag gewöhnlich gar nicht zum Ausbruch kommt, da unter Bildung von Petechien, unter profusen Blutungen der Nasenschleimhaut, des Darmes und der Nieren der Tod sich in kürzester Frist einstellt. Die Diphtheritis der Mundhöhle wird in diesen desolaten Fällen schon wenige Stunden nach ihrem ersten Auftreten brandig.

b) Anomale Localisationen.

Nicht immer beschränken sich die örtlichen Veränderungen auf die Haut und die Mundhöhle, sondern in einzelnen Epidemien erkranken neben diesen genannten Organen noch andere beträchtlich. So wird von Epidemien berichtet, in welchen viele Kinder auf der Höhe der Krankheit Pleuritis oder Pneumonie bekamen und daran zu Grunde gingen; in anderen starben sie plötzlich unter tetanischen Krämpfen und man fand in der Leiche starkes Oedem, wohl auch eiterige Ablagerung in den Gehirnhäuten. Zuweilen theilte sich, namentlich bei beginnender Desquamation, die Darmschleimhaut in hohem Grade und es entstehen profuse Darmcatarrhe oder dysenterische Diarrhöen mit sehr schmerzhaftem Tenismus. Die häufigste aber unter allen

anormalen Localisationen ist die auf die Nieren, wodurch der acut-brigntische Hydrops entsteht. Derselbe ist pag. 403 schon ausführlich abgehandelt. Er kommt in einzelnen Epidemien sehr häufig, in andern fast gar nicht vor. In den letzten Münchener Epidemien gehörte er unter größten Seltenheiten und stellte sich selbst da nicht ein, wo in der ärmsten Classe der Bevölkerung der Mangel aller Pflege und Aufsicht ihn sicher erwarten liess. In anderen Epidemien werden die Hülfe und noch mehr der Erkrankten trotz aller Pflege hydropisch, so dass man einer vorsichtigen Behandlung die Möglichkeit einer Prophylaxis zwar nicht abstreiten darf, jedoch bekennen muss, dass die Hauptveranlassung in dem Charakter der Epidemie zu suchen ist.

Wo die Angina bedenkend ist, da stellt sich auch sehr gewöhnlich Anschwellung der Lymphdrüsen des Halses, zuweilen auch Parotitis ein. Das Nähere hierüber findet sich pag. 106 im Abschnitte von der metastatischen Parotitis. Aus gleichem Grunde kann sich auch eine Coryza oder eine Otorrhoe entwickeln, indem die Schleimhauterkrankung, namentlich die diphteritische Form sich in die Nasenhöhle forpflanzen kann, oder durch die Mittheilung der Entzündung der Röhre Otis interna veranlasst, worauf dann das Tympanum perforirt und der Eiter nach aussen abfließt.

Endlich werden noch Metastasen in das Unterhautzellgewebe mit grossartiger Abscessbildung beobachtet und bei der septischen und septischen Form kann rasch gangränöser Decubitus sich einstellen.

Die Nachkrankheiten eines starken Scharlachs sind sehr mannigfaltig. Am häufigsten werden beobachtet: chronische seröse Ergüsse in der Pleura, dem Pericardium oder einem Gelenke nach Mörtes Beigitt, Blödsinn, Chorea, Lähmungen, Taubheit, Aphasie, Blindheit nach heftigen Gehirnerscheinungen; bei rachetischen Kindern und unreinlicher Pflege auch Noma.

Die Differentialdiagnose von Scharlach und Masern wird weiter unten bei den Masern gegeben werden. Weder die pathologische Anatomie noch die chemischen Untersuchungen des Blutes und der Excreta geben irgend eine Aufklärung über das Wesen des Scharlachgiftes. Man findet in der Leiche mit Ausnahme der Schwellung oder Diphteritis der Mandeln gar keine constanten Veränderungen.

Aetiologie.

Der Scharlach entsteht durch Contagium. Dasselbe haftet am stärksten an den Hautfetzen, welche während der Desquamation von der Haut sich ablösen, weshalb auch zu dieser Zeit, nicht während der Blüthe des Exanthems, am häufigsten die Ansteckung erfolgt und eine Verschleppung möglich ist. Uebrigens ist der Zeitpunkt, zu welchem die Ansteckungsfähigkeit beginnt und wieder erlischt, noch nicht festgestellt. Es werden Fälle erzählt, wo Kinder schon im Vorläufstadium angesteckt haben sollen, und wieder andere, wo nach längst beendeter Desquamation noch Infection stattgefunden hat.

Die Contagiosität ist nicht in allen Epidemien gleich ausgesprochen, in manchen ist sie so eminent, dass alle Kinder einer Familie erkranken, sobald bei einem der Scharlach ausgebrochen, in andern ist sie so gering, dass die Mehrzahl der Kinder trotz häufiger Berührung mit Kranken gesund bleibt. Die Inoculationen mit Scharlachblut oder

Serum der Frieselbläschen wurden von Stoll, Harwood und Miquel mannigfach angestellt und hatten häufig den Erfolg, dass Scharlach entstand, welcher ebenso heftig und selbst heftiger war, als der zur Impfung verwandete. Wenn man durch Impfung nur eine Ansteckung, aber keine Schwächung und engere Localisirung des Giftes erzielen kann, so entspricht sie natürlich ihrem Zwecke nicht. Man braucht hienü gar nicht diese complicirtere Manipulation, sondern nur eine einfache Berührung mit Scharlachkranken. Am empfänglichsten sind die Kinder zwischen zwei bis zwölf Jahren. Kleine Kinder bekommen ihn nur selten, bei ganz heftigen Epidemien. Die Sterblichkeit wechselt zwischen 2—20 Procent. Dass ein Individuum zweimal den Scharlach bekommen könne, wird von einzelnen zuverlässigen Autoren versichert. Es scheint sich dies jedoch so ausserordentlich selten zu ereignen, dass man eher geneigt ist, einen Beobachtungsfehler, der bei den diagnostischen Schwierigkeiten mancher Fälle sehr verzeihlich ist, anzunehmen.

Behandlung.

Die Verschiedenheit der einzelnen Epidemien macht es unmöglich, eine auf alle Scharlachkrankungen passende Therapie anzugeben, und schwächt schon vornherein das Vertrauen auf die vielen als Specifica gerühmten Mittel im höchsten Grade.

Es ist überflüssig, die vielen prophylaktischen Mittel aufzuzählen, da keines sich in Wirklichkeit bewährt hat. Die einzige vernünftige Prophylaxe besteht in einer vollkommenen Absperrung der Kinder von allen Scharlachkranken und allen Personen, die mit solchen in Berührung kommen. Diese Absperrung muss jedenfalls fünf bis sechs Wochen für jeden Kranken dauern, wie weit aber und auf welchen Umwegen der Scharlach durch dritte Personen verschleppt worden kann, ist gar nicht zu ermitteln. In schweren Epidemien, in welchen ein grosser Theil der Erkrankten zu Grunde geht, ist es am sichersten, wenn die Kinder den Ort ganz verlassen, was, da die Epidemien oft lange dauern und in vielen Orten zugleich herrschen, mit grossen Opfern verbunden ist.

Die Behandlung des Scharlachs wird entweder mit specifischen Mitteln und Methoden versucht oder ist eine einfach expectativ symptomatische.

Zu den specifischen Mitteln gehören: das kohlensaure Ammoniak zu 4,0—8,0 auf 150 Lösung — das Chlorwasser 4,0 auf 250,0 Lösung — die Mineralsäuren — die Essigsäure 2,0—4,0 pro die.

Als specifische Methoden waren oder sind zum Theil noch in Gebrauch: Allgemeine Blutentziehungen — Brech- und Abführmittel — kalte Begiessungen, die methodischen Kaltwasserkuren haben zwar den von den älteren Aerzten gefürchteten Schock nicht gebracht, in schweren Epidemien jedoch sich wirkungslos erwiesen — Fomentationen, schon oft gerühmt und wieder vergessen, von Schneemann neuerdings zugleich mit einer kühlenden Behandlung dringend empfohlen. Schneemann lässt die Scharlachkranken vom ersten Tage an drei Wochen lang Morgens, Mittags und Abends, in der vierten Woche nur einmal täglich am ganzen Körper, den Kopf ausgenommen, mit Speck einreiben. Dabei soll die Zimmertemperatur höchstens 13° betragen, das Bett nur während der Eruption streng gehütet, so lang

das Fieber dauert, kühlende Diät und innerlich kein Medicament verordnet werden. Mit Rücksicht auf Schneemann's ein grosses Gewicht auf gründliche, oft wiederholte Ventilation, übertreibt jedoch seine Abkühlung, wenn er rath, die Temperatur des Zimmers auf 10 bis 12° herabzubringen und jeden Tag die Fenster des Krankenzimmers drei Stunden lang zu öffnen. —

Es bedarf wohl kaum einer besonderen Berichtigung, dass eine sog. Specifica und specifischen Methoden durchaus keine spezifische Wirkung haben, sondern in schweren Epidemien, also mit einander an der Virulenz des Scharlachgiftes zu scheitern werden. In leichten Epidemien empfehlen sich die am meisten, wodurch die Kinder am wenigsten gequält und an Kräften geschwächt werden. Unter den inneren Mitteln wird deshalb einer verdünnten Mineralsäure, unter den äusseren einer mässigen Petteinreibung der Vorzug zu geben sein. —

Die expectativ symptomatische Behandlung beschränkt sich auf Abhaltung aller Schädlichkeiten, welche auf den Verlauf ungünstig einwirken könnten, und auf Minderung einzelner Beschwerden und besonders stürmischer Symptome.

Eine gehörige Ventilation des Krankenzimmers ist immer die wesentlichste Garantie eines günstigen Verlaufes. Dieselbe wird am vollständigsten bewerkstelligt, wenn man zwei neben einander liegende Zimmer zur Benützung hat, so dass der Patient die Hälfte des Tages in diesem, die Hälfte in jenem zubringen kann. Die Temperatur des Zimmers sei, während das Exanthem steht, 13° R., nach Erlausen desselben, oder wenn es nicht gehörig zur Entwicklung kommt, etwas höher als niedriger. Die Kleider und Bettdecken des Kindes müssen so eingerichtet sein, dass es nicht immer transpirirt, aber doch nicht vollkommen sich abkühlen kann. Die Diät sei, so lange Fieber vorhanden, eine antifebrile, wo Verstopfung zugegen, eine leicht eröffnende, namentlich Compot, das die Kinder jeder Zeit gerne nehmen, und, wo Neigung zur Diarrhöe besteht, eine stopfende Schleimsuppe, schleimige Getränke. Ist das Fieber verschwunden, so verzögert eine so karge Ernährung die Convalescenz; mit milden, leicht verdaulichen einfachen Nahrungsmitteln braucht man nicht so ängstlich zu sein.

Nachdem die Desquamation schon seit mehreren Tagen gehend in Gang gekommen, kann ihre Vollendung durch einige mit grosser Vorsicht gegebene Bäder beschleunigt werden, worauf der Kranke allmählig wieder an die freie Luft gebracht werden darf. Um gegen alle denkbaren Verwürfe sich sicher zu stellen, that man gut, die Kinder im ganzen sechs Wochen lang nicht aus dem Zimmer zu lassen, was in den ersten Stunden und bei mangelhafter Aufsicht wirklich nicht immer durchzuführen ist. Interne reicht man bei normalem Scharlach ein indifferentes, leicht säuerliches, salinisches oder schleimiges Medicament, bei schlecht entwickeltem Exanthem täglich 20 kohlensaures Ammoniak in 150 CC. Vehikel.

Bei der symptomatischen Behandlung einzelner länger oder drohender Erscheinungen darf man nicht zu eilig noch zu energisch verfahren. Das starke Fieber vor der Eruption könnte zu Hysterischen, zu Calomel oder Brechweinstein verleiten, wodurch man

jedoch den Verkauf sicherer verzögern als das Fieber zum Schwinden bringen wird.

Eine längere Verzögerung des Ausbruches sucht man durch Senfteige und reizende Waschungen mit warmem Essig oder mit Lauge abzukürzen. Das bestehende Exanthem wird sehr zweckmäßig mit Speckeinreibungen behandelt, wodurch sowohl das lästige Hautjucken gemildert, als auch ein Schutz vor rascher Abkühlung gewährt wird.

Drohende Gehirnsymptome, Delirien, Schlafsucht oder Coma werden am deutlichsten durch intensive kalte Begießungen des kurz geschorenen Kopfes, die stündlich wiederholt werden müssen, gebessert. Narcotica veranlassen zuweilen einen bedenklich raschen Collapsus und werden deshalb in den ersten Tagen besser gemieden. Bei den torpiden, septischen Formen muss man bald zum Chinin, Campher, Wein, Moschus und Castoreum greifen und die Kräfte möglichst zu erhalten suchen.

Bei den bösartigen diphtheritischen Anginen wäre eine energische örtliche Behandlung, Einblasen von ungereinigten Schwefelblumen, stündliche Inhalationen von Kalkwasser oder verdünnter Milchsäure 2,5 auf 30,0, sehr erspriesslich. Die Prostration der Kinder und ihr Widerstreben tritt aber meist hinderlich in den Weg. Aus gleichem Grunde kommen nur selten Gargarismen in Anwendung und man muss sich darauf beschränken, den Kindern interne Mittel zu geben, welche als Antidiphtheritica gelten. Die besten sind das kohlensaure Kali und das chlorsaure Kali, das erstere hat einen wirklich günstigen Einfluss auf die Reinigung der Schleimhaut, das letztere nimmt den sauerstoff Geruch. Man gibt beide Salze getrennt in wässrigen Lösungen, von jedem täglich bis zu 4,0.

Die Behandlung der Albuminurie wurde schon früher besprochen, ebenso die der Parotitis nach Scharlach. Darmcatarrhe müssen durch Opium, Mucilagines und Adstringentien möglichst rasch beseitigt werden. Lähmungen und Krämpfe nach Scharlach erfordern die gegen diese Uebel schon früher pag. 359 angegebene Behandlung; consecutive Gelenkentzündungen und seröse Ergüsse bessern sich auf warme schmerzstillende Umschläge und Resolventien.

2) Masern. Morbilli.

Unter Masern versteht man einen acuten ansteckenden Hautausschlag, der in kleinen, runden, rothen Flecken besteht, mit catarrhischen Erscheinungen verbunden ist und mit kleinartiger Abschuppung endet.

Da die einzelnen Masernepidemien, gerade so wie die Scharlach-epidemien, bedeutende Variationen erkennen lassen, in ihrem Verlaufe, ihrer Gefährlichkeit und in ihren Nachkrankheiten sehr verschieden sind, so wird es am zweckmässigsten sein, zuerst ein Bild des normalen Verlaufes zu geben und dann die Variationen der Reihe nach anzuführen.

A. Normale Morbilli.

Es lassen sich mit ziemlicher Schärfe 1) ein Stadium der Vorboten, 2) Stadium des Ausbruches, 3) Stadium der Blüthe und 4) Stadium der Abschuppung unterscheiden.

1) Stadium der Vorboten. Stadium invasionis.

Bei kräftigen Kindern und leichten Epidemien sind die Vorboten nicht so mächtig, dass die Kinder sich niederlegen und das Bild einer ernsten Erkrankung bieten. Die gewöhnlichen Beschwerden sind Schnupfen, fließende Nase und häufiges Niesen mit consecutiver Schwellung der Nasenschleimhaut, geröthete Conjunctiva, Thränen der Augen, leichte Blepharitis, Lichtscheu, Heiserkeit und trockner bellender Husten. Die allgemeinen Symptome reduciren sich auf Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Appetitmangel, etwas erhöhte Hauttemperatur, Dämmerfieber oder Fiebertoxerabation, die bei reizbaren Kindern sich Nachts bis zu Delirien steigern kann. Die Zunge ist belegt, der Geschmack schwach, Druck auf den Magen empfindlich. Zuweilen lassen sich stärkeres Nasenbluten die Fiebersymptome nach.

Diese Zeichen steigern sich sämmtlich von Tag zu Tag und beginnen gewöhnlich erst einige Tage nach geschehener Ansteckung.

Nach Kerschönsteiner's genauen Untersuchungen verläuft in Familien mit mehreren Kindern, von denen eines an den Masern erkrankt ist, immer ein Zeitraum von 10—12 Tagen, bis weitere Erkrankungen eintreten. Panum, welcher auf den Varicellen unter äusserst günstigen Verhältnissen eine Epidemie beobachtete, nimmt ein Incubationsstadium von genau 14 Tagen an. Da man weiss, dass das Exanthem sobald es auf der Haut erschienen ist, auch ansteckt, so kann man mit grosser Wahrscheinlichkeit annehmen, dass die später erkrankten Kinder das Maserngift 10—14 Tage mit sich herumtragen. Die oben geschilderten Vorboten stellen sich erst 3—5 Tage vor dem wirklichen Ausbruche des Exanthemes ein, und es ist demnach klar, dass das Maserngift die ersten 6—7 Tage nach seiner Infektion durchaus wirkungslos bleibt.

2) Stadium des Ausbruches. Stadium eruptionis.

Das Exanthem bricht zuerst im Gesichte, auf den Wangen ober dem Nasenrücken aus und kriecht von da über den Hals zum Kopfe an die oberen und zuletzt auch unteren Extremitäten. Bei vorher gesunden Kindern ist der Ausbruch in 24 Stunden vollendet, geht in allgemeinen jedoch langsamer von Statten als der des Scharlachs.

Das Exanthem beginnt mit blassrothen, kleinen, runden Flecken von der Grösse einer Linse. Dieselben röthen sich mehr und mehr, wenn sie sehr dicht stehen, auch wohl zu unregelmässigen Figuren zusammen, lassen aber immer stellenweise normale Haut zwischen sich. Mit zunehmender Röthe erheben sie sich auch über das Niveau der Haut und werden auf der Höhe der Erhabenheiten etwas gelblich, so Blasenbildung kommt es jedoch niemals. Beim Ausbruche der echten Pocken bestehen einige Stunden dieselben rothen erhabenen Hautstellen und lassen sich in keiner Weise ähnlich von den Masern unterscheiden. Die allgemeinen Symptome jedoch sind bei diesen beiden Exanthemen sehr verschieden, und die Leihen Blattern kommt in civilisirten Ländern wegen allgemeinen Impfwanges so gut wie gar nicht mehr bei Kindern vor.

Die rothen, erhabenen Stellen fühlen sich härter an als die normale Haut, und die darüber streichende Hand bekommt ein ganz eigenthümliches Gefühl von ungleicher Härte. Auf der Schleimhaut des Mundes sind wohl auch einzelne ungleich röthere Stellen zu entdecken, das Exanthem ist übrigens hier bei weitem nicht so deutlich als bei Scharlach.

Die allgemeinen Symptome erreichen mit dem Ausbruche des Fiebers ihren höchsten Grad, die meisten Kinder deliriren, sind sehr unruhig und machen den Eindruck schwerer Erkrankung. Der Stuhl ist angehalten, Urin hochroth, reich an Harnsäure und Harnstoff.

3) Stadium der Blüthe. *Stadium florentissimae.*

Die Masern stehen vier Tage lang auf der Haut. Das Fieber und die Schleimhautsymptome dauern gemässigt fort, die allgemeine Verstimmlung jedoch nimmt sichtlich ab. Der Ausschlag erbliust in derselben Reihenfolge, in der er erschienen ist, zuerst im Gesichte, dann am Rumpfe und zuletzt an den unteren Extremitäten. Die grösste Schwellung und Spannung findet sich am zweiten Tage nach dem Ausbruche, am dritten Tage lässt dieselbe schon nach. Die Haut wird zusehends gelblich, bevor sie zur normalen Färbung zurückkehrt und am vierten sieht man bloss mehr leichte Spuren des erblasenden Exanthemes. In gleichem Masse mindert sich die Conjunctivitis und der Nasencatarrh, während der Bronchocatarrh gemäss der grossen diphtherischen Ausdehnung der Schleimhautfläche noch lange Zeit und oft in höherem Grade als zu Anfang anhält. Die Expectoration wird hierbei sehr beträchtlich. Sobald das Exanthem am ganzen Körper erbliust ist, beginnt das

4) Stadium der Abschuppung. *Stadium desquamationis.*

Überall, wo das Exanthem aufgetreten ist, da stösst sich die Epidermis ab, allein nicht so, wie beim Scharlach, in grösseren Lappen, sondern immer nur in ganz kleinen Schuppen, die oft wie ein weisser Staub auf der Haut liegen und am besten gesehen werden, wenn man dieselbe mit einem schwarzen Tuche reibt. Je stärker das Exanthem war, um so weisser und stäubiger wird das schwarze Tuch. Die Schleimhaut der Nase und der Augen ist nun vollkommen frei, die der Bronchien aber liefert auch bei ganz normalen Masern noch mehrere Wochen lang eine ziemliche Menge Secret, das durch Husten entfernt wird.

Das Allgemeinbefinden bessert sich ausserordentlich schnell, so dass es kaum möglich ist, die Kinder länger als 3—4 Tage nach Erblässung des Exanthemes im Bette zu halten. Sie bieten mit Ausnahme eines sie wenig belästigenden Hustens durchaus keine krankhaften Symptome mehr, der Schlaf ist gut, der Appetit vortreflich, Stuhl und Urin normal und die durch das Fieber heruntergekommenen Kräfte sind in wenigen Tagen wieder ersetzt. Dies wäre das Bild der normalen Masern, wie sie in einer mässigen Epidemie bei einem sonst gesunden Kinde verlaufen.

B. Variationen und Nachkrankheiten.

Wir haben hier zu betrachten: 1) Abweichungen bezüglich des Exanthemes, 2) bezüglich der Schleimhaut, 3) bezüglich der Allgemeinerkrankung und 4) eine Reihe von häufigen, bösartigen Nachkrankheiten.

1) Modificationen des Exanthemes.

Das Exanthem stellt sich nicht immer in der oben geschilderten Ordnung ein. Bei reizbaren Kindern und übertrieben warmer Bedeckung bricht es schon am zweiten Tage nach Eintritt der Verböten aus und hält sich auch nicht an die gewöhnliche Reihenfolge. Es kann statt im Gesichte an den unteren Extremitäten zuerst auftreten. An einzelnen Stellen können die kleinen rothen Flecke confluiren, so dass man Schwierigkeit hat, das Exanthem von Scharlach zu unterscheiden. Diese grösseren rothen Stellen sind aber niemals über den ganzen Körper verbreitet und man findet immer noch Märcel charakteristisches Masernexanthem. Auch zu Masern gewöhnt sich zuweilen ein Blökenausschlag, der sog. Frieseel, jedoch viel seltener als zu Scharlach, worauf dann die Abschuppung in grösseren Schuppen und reichlicher sich einstellt. In bösartigen Epidemien wird das Exanthem bläulich, es verschwindet nicht spurlos, sondern hinterlässt Erythema und ist mit den bösartigsten Schleimhautrekrankungen complicirt.

Die Dauer der Blüthe kann verschieden lang sein. Zumeist steht es nur 2–3 Tage, es kann aber auch 5–6 Tage lang anhalten sein, ja es wird sogar berichtet, dass es vollkommen verschwunden war und nach einigen Tagen mit neuem Fieber wiedergekehrt ist.

2) Betheiligung der Schleimhäute.

Die Schleimhäute erkranken im Allgemeinen bei den Masern viel ausgelehnter und intensiver als im Scharlach und es droht von daher viel häufiger Gefahr als von der Infection des Blutes durch das Maserngift.

Die gewöhnliche Conjunctivitis kann sich zu einer bösartigen Blnorrhöe mit starkem Oedem der Lider steigern.

Der Nasencatarrh kann einen so heftigen Reiz der Schleimhaut bedingen, dass fortwährendes Niesen, eine bedeutende Congestion und endliche Erschöpfung eintritt.

Die Entzündung des Gaumensegels und des Kehlkopfs verursachen zuweilen einen ununterbrochenen Hustenreiz, der zu wahren Paroxysmen nach Art des Keuchstossens, mit Erbrechen und Blutungen ansetzt.

In bösartigen Epidemien bleibt es nicht bei einfacher Congestion und bei Catarrh der Schleimhäute, sondern es entwickeln sich abhäll diphtheritische Membranen auf denselben, wodurch Perforation der Cornea und Gangrän der Lider, aschhaft riechende Coryza und Salivation, bei Uebergreifen auf den Larynx aber der so häufige und gefährliche diphtheritische Krup entsteht.

Lobäre und lobuläre Pneumonie sind bei den Masern seltener

erdtlich häufig und namentlich erliegen denselben sehr viele kleine Kinder unter einem Jahre.

Der Darmkanal ist viel seltener bei der Erkrankung betheiligt als die Respirationsorgane, doch kommen auch Diarrhöen, zuweilen sehr pernicioser Art, vor. Das urapertische System erkränkt im Gegensatz zu Scharlach, wo Nephritis und Albuminurie zu den häufigsten Complicationen gehören, nur ganz ausnahmsweise. Bei Mädchen kommt zuweilen Diphtheritis der Vagina, die gewöhnlich mit Gangrän der Labien und Tod endigt, vor.

3) Charakter des Fiebers.

Man nimmt ebenso wie beim Scharlach 1) einen erythrischen, 2) einen synochalen, 3) einen torpiden und 4) einen septischen Charakter der Miasm an, welcher sowohl in ganzen Epidemien, als auch bei einzelnen Constitutionen sich geltend machen kann. Es gilt hier alles, was beim Scharlach schon angegeben wurde.

Der gewöhnliche Charakter ist der erythrische, wie er unter „A. Normale Morbillen“ geschildert worden ist. Kein Symptom gelangt zu einer gefährlichen Höhe, das Exanthem kommt und verschwindet zu rechter Zeit, ist von mässiger Intensität, die Schleimhauterkrankungen, das Fieber und die Gehirnsymptome halten sich in den gehörigen Schranken, und es treten keine Nachkrankheiten auf.

Wenn die Gefässeraction sehr bedeutend wird, so nimmt man den synochalen, entzündlichen Charakter an. Er kündigt sich meist schon durch ein stürmisches Vorläuferstadium an. Die entzündlichen Affectionen der Schleimhäute sind sehr heftig, die Haut wird brennend heiss und der ganze Körper ist alsbald mit dunkelrothen, prominenten Flecken übersät. Die Gehirnsymptome sind hierbei sehr bedrohlich, wilde Delirien wechseln mit tiefem, soporösem Schlaf ab. Das stark entwickelte Exanthem steht meist länger als vier Tage und ist am fünften und sechsten Tage noch deutlich zu erkennen. Die Abschuppung ist der vorhergehenden starken Hautcongestion entsprechend ziemlich beträchtlich. Nachkrankheiten werden häufig beobachtet.

In bösartigen Epidemien und bei dyskrasischen, besonders scrophulösen Kindern ist der torpide Charakter des Fiebers der vorherrschende. Es zieht sich hierbei schon das Prodromalstadium unter bedenklichen Symptomen in die Länge und von Anfang an fällt eine ausserordentlich schnelle Kräfteabnahme besonders auf. Die Kinder klagen über Schwindel und Gliederschmerzen, haben fortwährende Angst, Unruhe und Schlaflosigkeit. Der Puls ist sehr accelerirt, aber klein und leicht zu unterdrücken. Erbrechen, profuse Diarrhöen, krupöse Hostenanfälle lassen schon vor Ausbruch des Exanthemes eine ungünstige Prognose stellen.

Das Exanthem selbst erscheint bei dieser Form nur selten zur rechten Zeit und gehörig entwickelt, es verschwindet bald wieder, zeigt sich nur an einzelnen Körperstellen und erreicht nicht die gewöhnliche, hochrothe Farbe.

Die Schleimhäute neigen sehr zur diphtheritischen Entzündung, Profuse Diarrhöen, maligne Bronchitis, Krup oder einfache Entkräftung

ohne nachweisbare örtliche Veränderungen machen dem Leben nur zu oft ein Ende.

Die höchste Entwicklung dieses Charakters nun ist der septische oder putride. Das Exanthem tritt hier ebenfalls unregelmäßig auf und ist zugleich mit Echylosen complicirt. Unter den Gehirnsymptomen sind Coma und Ohnmächten die vorwiegenden. Die diphtherischen Schleimhäute neigen schnell zur Gangrän, die sich bei Mädchen bald auf die Vulva erstreckt. Profuse Nasen- und Darmblutungen können in kürzester Zeit einen hohen Grad von Anämie, einer mortaliſchen Zustand herbeiführen.

Nicht immer muss dieser torpide oder putride Charakter von Anfang an zugegen sein. Es kommt auch vor, dass Mägen, welche zuerst synochal auftraten, im Verlaufe von einigen Tagen ihren Charakter total zum torpiden umändern, weshalb auch diese Trennung in verschiedene Formen weniger einen streng wissenschaftlichen als vielmehr praktischen, therapeutischen Werth hat.

4) Nachkrankheiten.

Die häufigste und zugleich bösartigste Nachkrankheit der Mägen ist die Tuberculose. Sie entwickelt sich zuweilen sehr rasch und intensiv als miliare Tuberculose, so dass die Kinder gar nicht mehr dazu kommen, das Bett zu verlassen, sondern unmittelbar nach dem Verschwinden des Exanthemes fort und fort sichern, husten und abmagern. Gewöhnlich aber wird ein längeres Intervall zwischen dem Exanthem und dem Eintritt der tuberculösen Symptome beobachtet. Die Kinder stehen wieder auf, sind fieberfrei und bei gutem Appetit, und die überstandene Krankheit ist längst vergessen. Ein leichtes Bronchialcatarrh jedoch ist zurückgeblieben und lässt sich durch die sorgsamste Pflege, gleichmässige Temperatur und die verschiedenen Expectorantien nicht beseitigen. Ganz allmählig stellen sich abendliche Exacerbationen, dann allgemeines Unwohlsein, Traurigkeit und Abnahme der Kräfte ein, wobei der Husten immer stärker und häufiger wird. Die Abmagerung wird nun von Tag zu Tag deutlicher, die tuberculösen Erscheinungen lassen sich allmählich auch physikalisch nachweisen und nehmen in den meisten Fällen bis zum Tode zu. Nur ausnahmsweise können sie zum Stillstand und zur Rückbildung gebracht werden, worauf die Kinder noch Jahre lang eine Neigung zu Bronchitis behalten und oft genug noch neue tuberculöse Insulte erfahren. Die ausführlichere Schilderung der hierher gehörigen Symptome findet sich bei der Lungentuberculose pag. 266.

Eine andere Nachkrankheit, auch meistens complicirt mit Tuberculose, ist Otorrhöe, welche der adstringirenden Behandlung oft viele Monate widersteht. Sehr gewöhnlich auch sind Impetigo und Eczem im Gesicht, am behaarten Theile des Kopfes und namentlich hinter der Ohrmuschel. Chronische Augenentzündung, vorwiegend Blepharitis, bleibt bei atrophischen Kindern Jahre lang zurück.

Die Diphtheritis verursacht zuweilen noch sehr spät eine chronische Heiserkeit oder einen Krup, welcher im Allgemeinen eine günstigere Prognose bietet als der rein fibrinöse Krup.

Darmcatarrhe kommen ebenfalls vor, werden aber selten quantitativ und lassen sich durch Diät und passende Adstringentien schnell beseitigen.

Bei schlecht gepflegten, dyskrasischen Kindern stellt sich zuweilen auch Noma ein.

Die übrigen als Nachkrankheiten aufgeführten Veränderungen, Hydrothorax, Ascites, Pericarditis, Meningitis etc. treten so selten ein, dass man in Zweifel geräth, ob man ihnen einen direkten Zusammenhang mit den Masern zugestehen soll.

Bei den Sectionen findet man lobuläre oder lobäre Pneumonie, Diphtheritis der Mundhöhle und ihre Folgen, Darmcatarrh, Gangrän der Vulva etc., aber weder im Blute noch in irgend einem Organe eine Veränderung, welche über das Wesen der Masern näheren Aufschluss geben könnte.

Diagnose.

Die Masern können mit exanthematischem Typhus, Erythem und Scharlach verwechselt werden. Der exanthematische Typhus, wie er namentlich in den russischen Ostseeprovinzen, Polen und Ostpreussen die herrschende Form ist, lässt sich, was das Exanthem selbst betrifft, in vielen Fällen von den Masern nicht unterscheiden. Der Verlauf der typhösen Roscola aber und die Zeit ihres Eintretens sind viel variabler. Man sieht in ein und derselben Fleckfieberepidemie bei dem einen Kranken das Exanthem neun Tage, bei dem andern wieder nur zwei Tage lang bestehen und bald am dritten, bald am achten Tage auftreten. Im Gesicht findet sich die typhöse Roscola sehr selten, die morbillöse regelmässig. Der eminent typische Verlauf, die charakteristischen Symptome der Catarrhe und des Fiebers sichern hinlänglich vor jeder Verwechslung.

Sehr viele Neugeborene und ältere Säuglinge bekommen ein feinpunkirtes Erythem über den ganzen Körper, das der Form des Ausschlages nach sich durchaus nicht von den Masern unterscheidet. Dasselbe rührt höchst wahrscheinlich von mechanischen Ursachen her, indem die junge, zarte Lederhaut gegen den Reiz der atmosphärischen Luft, der Bäder und Kleidungsstücke noch nicht gehörig abgestumpft ist und die Hautpapillen sich entzünden und vergrössern. Dieses Exanthem besteht meist mehrere Tage, verschwindet, kehrt zuweilen wieder, ist aber gewöhnlich nicht mit catarrhalischen Symptomen complicirt. Sind diese zufälliger Weise auch zugegen, so verläuft der ganze Process doch nicht so typisch und wird nicht von so heftigem Fieber eingeleitet, als die Masern. Ausserdem kommt das Erythem der Neugeborenen ohne alle Contagion vor, und für die Annahme desselben spricht auch namentlich, dass Neugeborene sehr wenig empfänglich für das Maserncontagium sind und gewöhnlich verschont bleiben, wenn auch wirklich grössere Kinder in demselben Hause davon inficirt worden sind.

Die Unterscheidung zwischen Masern und Scharlach bietet zuweilen ziemliche Schwierigkeiten, zumal wenn beide Exantheme zu gleicher Zeit in einer Stadt vorkommen. Es wird deshalb nützlich sein, wenn die Hauptsymptome und Unterscheidungsmerkmale beider Krankheiten nochmals neben einander aufgeführt werden.

Differentialdiagnose.

Masern.

Das Verlaufsstadium dauert 3—4 Tage.

Als Prodromalsymptome sind die constantesten: Conjunctivitis, Lichtscheu, Nasen- und Bronchialcatarrh, Niesen, Schnupfen, Heiserkeit, Husten, Pulsfrequenz und Hauttemperatur nur mässig erhöht.

Das Exanthem besteht in kleinen, rothen, rundlichen Flecken, welche schwach über die Haut erhaben sind und nur an wenigen Stellen zu grösseren ungleich erhabenen Flecken coaguliren. Es breitet zuerst im Gesichte aus.

Mit dem Ausbruch des Exanthemes schwinden die bedenklichen allgemeinen Symptome.

Das Masernexanthem steht im Allgemeinen etwas länger als das des Scharlachs. Es ist am vierten Tage ganz deutlich, am fünften und sechsten oft noch schwach zu sehen.

Abscuppung in feinem, weissen Pulver.

Nachkrankheiten: Tuberculosis, Bröncelitis, Augenentzündungen, Eczem, Krup und Pneumonie.

Trotz dieser differentiellen Anhaltspunkte bleibt die Diagnose bei manchen Fällen zweifelhaft, weshalb denn auch die freilich nicht sagenden Namen: *Scarlatina morbillosa* und *Morbilli scarlatinosi* geschaffen worden sind.

Die Prognose wird, wie beim Scharlach meist zu schlecht, bei der Masern zu günstig gestellt, indem man die nur scheinbar gemessenen Kranken alle für wirklich geheilt hält. Die Tuberculosis jedoch, welche sich nach dem Morbille sehr häufig und mannigfaltig entwickelt, rafft noch viele derselben weg, so dass, wenn man die Beobachtungen lange fortsetzen kann, das Mortalitätsverhältniss kein gar so günstiges mehr ist.

Während der Blüthe des Exanthemes oder unmittelbar nach der Desquamation sterben allerdings nur sehr wenig Kinder, besonders wenn sie das erste Lebensjahr schon zurückgelegt haben, hingegen befällt die nachfolgende Tuberculosis immerhin einige Procente von Kindern aller Altersklassen.

Ätiologie.

Die Masern sind eminent ansteckend, so dass bei uns in den Städten wenigstens fast alle Menschen, welche noch nicht durchgeseht sind,

Scharlach.

Schon am 2—3. Tage Ausbruch des Exanthemes.

Die catarrhalischen Symptome fehlen hier fast gänzlich. Hingegen sind deutliche Schlagenbeschwerden, beruhend auf Rötzung und Schwellung der Mandeln, zugegen. Das Fieber ist schon vor Ausbruch des Exanthemes sehr heftig.

Das Exanthem überzieht meist den ganzen Körper oder stellt mindestens grosse platte, unregelmässige Flecken dar. Es ist am stärksten an den von Kleidern bedeckten Hautstellen. Es beginnt am Halse und verschmirt gewöhnlich das Gesicht.

Fieber und Angina dauern ungeschwächt während der Blüthe fort.

Das Scharlachexanthem ist in der Regel am vierten Tage vollkommen verschwunden.

Abscuppung in grossen Lappen.

Nachkrankheiten: Nephritis, Hydrops, Parotitis, Otorrhoe.

davon ergriffen werden. Das Contagium ist sehr flüchtig, und es bedarf zur Ansteckung durchaus keiner directen Berührung mit Masernkranken. Die Uebertragbarkeit durch dritte Personen lässt sich zuweilen klar nachweisen.

Die Impfvorsuche mit dem Blute Masernkranker, deren Exanthem sich in der Blüthe befindet, sollen meistens anschlagen und am 7.—10. Tage normale ziemlich gutartige Masern erzeugen. Da der Process hiedurch nicht localisirt wird und der Verlauf ungefähr derselbe ist, als wenn die Kinder zufällig angesteckt worden wären, so haben diese Inoculationen natürlich gar keinen praktischen Werth.

Das Maserncontagium verhält sich gegen andere Infectionen nicht exclusiv. So sah man namentlich schon Varicellen-, Blattern- und Intermittenskranken davon befallen werden. Wenn Krätzkranke Morbillen bekommen, so heilt die Krätze gewöhnlich spontan und auffallend schnell, was seinen Grund vielleicht darin hat, dass die Krätzmilbe durch das Contagium oder die materiellen Veränderungen der Cutis an Grunde geht.

Auffallend ist schliesslich noch der Zusammenhang der Masern mit dem Keuchhusten. Man bemerkt, dass das eine Contagium gewöhnlich das andere abtödt, namentlich folgt der Keuchhusten oft auf die Masern, so dass man eine gewisse Verwandtschaft beider Processen annehmen darf.

Behandlung.

Wir haben keine prophylaktischen Medicamente gegen das Maserncontagium, alle bisher angegebenen haben nicht Stich gehalten. Die Impfung ist, wie schon erwähnt worden, unpraktisch, indem man mit vieler Mühe dasselbe erreicht, was die Kinder gewöhnlich von selbst acquiriren, nämlich einen vollkommenen Masernprocess. Die Absperrung von Masernkranken und allen mit ihnen zusammenkommenden Personen ist das einzig sichere Mittel, eine Infection zu verhüten. Dieselbe gelingt aber während des Herrschens einer wirklichen Epidemie nur durch Ortswechsel sicher und ist hauptsächlich angezeigt bei ausgesprochen tuberculösen Kindern, bei welchen die Masern regelmässig eine rasche Zunahme der Dyskrasie verursachen.

Die einfachen regelmässig verlaufenden Masern erfordern lediglich eine expectative Behandlung. Eingreifende Mittel, wie Blutentziehungen, Tartarus subiacus oder Laxantien, stören in vielen Fällen den regelmässigen Verlauf, ohne die gefahrdrohenden Symptome, wegen deren sie in Anwendung kommen, zu beseitigen.

Der beste Schutz gegen einen unregelmässigen Verlauf und gegen Nachkrankheiten ist eine gleichmässige ziemlich hohe Zimmertemperatur, 15° R. so lange die Kranken im Bett sind, 16° R. wenn sie aufstehen sollen. So lange eine Spur von Exanthem zu sehen ist, darf das Bett nicht verlassen werden, und nach vollständigem Verschwinden desselben muss wenigstens noch 14 Tage, bei ungünstiger Jahreszeit noch länger, das Zimmer gehütet werden.

Schwere Federbetten, in welche nach der alten Mode die Kinder bis an das Kinn sich stecken müssen, verursachen eine zu starke Transpiration, auf welche nur um so höherer Erkältung eintritt. Rohhaar-matratzen und einfache wollene Decken sind dem Zwecke entsprechen-

der. Sehr wesentlich ist eine gründliche Ventilation des Krankenzimmers, die am besten gelingt, wenn der Kranke zwei nebeneinander liegende Zimmer benutzen kann.

Reinlich gewöhnte Kinder empfinden es sehr unlieb, wenn ihnen mehrere Tage lang das Gesicht und die Hände nicht gewaschen werden, wie das noch von vielen älteren Aerzten verordnet wird. Allen Masernkranken, die ich bisher zu behandeln hatte, wurden täglich zweimal das Gesicht und die Hände mit lauwarmem Wasser gewaschen, ohne dass jemals von dieser Proccedur schlimme Folgen beobachtet worden wären. Es ist demnach die unnütze Quälerei der Entsehung des Waschwassers gänzlich zu verwerfen.

Die Diät muss streng antifebril sein, so lange noch Spuren von Fieber sich regen. Bei erwachendem Appetite die Kinder fasten zu lassen, ist grausam und verzögert nur die *Reconvalescentia*. An Kinder nicht verdauten Nahrungsmitteln, wie Milch, Suppe und trockenem Weissbrot waren sich die Kinder niemals krank. Bei Neigung zu Diarrhöe reicht man stopfende, bei Obstipation leicht eröffnende Nahrungsmittel und Getränke.

Die Behandlung der unregelmässigen Masern, der Complicationen und Nachkrankheiten ist eine problematische, indem man fast von allen hier empfohlenen Mitteln keine recht entschiedene Wirkung beobachtet.

Die Masern mit deutlich synochaem, entzündlichem Character vertragen 1,0—3,0 Salpeter gut, bei ganz robusten, grösseren Kindern werden bedenkliche Kopfsymptome auch ganz passend durch einige Blutegel gemildert. Bei der torpiden, der nervösen Form sind Mineral-säuren, China und Wein indicirt. Heftiger Hauterreiz wird durch *Saccolica*, *Belladonna*, Bittermandelwasser oder Opium beseitigt. Schwere Gehirnsymptome erfordern kalte Begiessungen des kahlgeschorenen Kopfes. Zu rasch verschwindendes Exanthem oder eine Verzögerung des Ausbruches muss mit Hautreizen, am besten mit mehrfacher Seifeigen behandelt werden. Auch Clystiere mit verdünntem Essig sind zu diesem Zwecke empfehlend worden.

Starke Diarrhöen müssen in allen Fällen durch Opium und Astringentien beseitigt werden, schwache Diarrhöen üben bei sonst gut genährten Kindern einen günstigen Einfluss auf die Gehirnsymptome aus.

Die diphtheritischen Schleimhautaffectionen bessern sich auf innerliche Behandlung mit grossen Gaben chloresauren Kali's, mindestens 3,0—4,0 pro die. Dass die kritische Behandlung mit Höllenstein ganz erfolglos ist, wurde schon bei der Diphtheritis im Allgemeinen pag. 50 ausführlicher besprochen. Gegen wirkliche Sepsis, profuse Schleimhaut-entzündungen, gangränöse Diphtheritis, Echinymosen der Cutis, muss man ein möglichst roborisirendes Verfahren mit grossen Dosen alten Weins, China, Moschus und Naphten einleiten. Ausserordentlich hat man Waschungen mit Chlörwasser empfohlen. Ich kann jedoch nicht verhehlen, dass noch diese Behandlungsmethode in wirklich septischen Fällen noch immer im Stiche gelassen hat.

Die nach Morbilen sich entwickelnde Tuberculosis bleibt verhältnissmässig öfter wieder stille stehen, als die ganz spontan entstehende. Einen günstigen Einfluss auf diesen Verlauf haben grössere Dosen China, wovon man einen Tag um den andern 0,15—0,30 auf einmal gibt. Ein Jahr lang fortgesetzter Gebrauch des Leberthrans kräftigt die E-

nährung und bewahrt auch vielleicht den Organismus vor neuen tuberculösen Insaluten. Landluft, Seebäder und eine vernünftige Abhärtung sind die besten Prophylactica gegen Fortschritte tuberculöser Erkrankungen.

3) Röttheln. Rubellae.

Aetiologie und Symptome.

Es gibt kaum eine Krankheit, über welche die Ansichten der Autoren so weit auseinandergehen als über die Röttheln. Die Einen halten sie für einen modificirten Scharlach, die Anderen für Masern, wieder Andere für eine Mischform beider. Ueberdies wurden febrile Erythema, Urticaria, selbst Typhus- und Choleraexanthem als Rubella beschrieben, und die Verwirrung wurde endlich so heillos, dass die neueren Autoren kurzen Process machten, die ganze Krankheit leugneten und allenfalls dunkle Fälle irgend einer der obengenannten Ausschlagformen anzuhängen.

Zu dieser letzteren Ansicht bekannte ich mich auch, bis ich im Frühjahr 1865 eines Besseren belehrt wurde. Zu jener Zeit kamen von Mitte März bis Mitte Mai elf Personen, Kinder von $\frac{1}{2}$ —8 Jahren und drei Erwachsene in meine Behandlung, welche ohne deutliche Vorboten an einem acuten Exanthem litten, das sich in keiner Weise von Masern unterschied. Fünf weitere Fälle bekam mein Freund Lindwurm zur selben Zeit zu behandeln, und einige Münchener Aerzte erinnerten sich auf mein nachträgliches Befragen, zur gleichen Zeit eine eigenenthümliche Form einer fieberhaften Urticaria mit masernartigem Exanthem gesehen zu haben. Weder vor noch nachher ist mir dieser Ausschlag wieder zu Gesicht gekommen, auch ging keine Masern- oder Scharlachepidemie kurz voraus, noch folgten solche nach. Derselbe Process wird von Köstlin in Stuttgart folgendermassen geschildert: Im Winter 1860/61 herrschte eine ausgedehnte Rötthelnepidemie in der Dauer von 5—6 Monaten durch ganz Stuttgart. Das Exanthem war nicht glatt, sondern leicht papulös mit einem Stich in's Gelbliche, floss nicht zusammen, sondern bildete kürzere oder längere, öfters gewundene, selten gerade Streifen, meistens über die ganze Oberfläche des Körpers; nicht selten war das Exanthem von Hautjucken begleitet und verschwand in der Regel nach zwei bis drei Tagen, bisweilen noch schneller. Meist erschien und verlief dasselbe ohne jedwede catarrhalische Symptome, auch das Fieber fehlte oder war kaum ange deutet; dagegen zeigte das Exanthem grosse Ansteckungsfähigkeit, durchseuchte ganze Familien, und einige Kinder wurden in derselben Epidemie zweimal befallen. Dasselbe Exanthem trat gleichzeitig an verschiedenen anderen Orten Württembergs auf.

In neuester Zeit wurden 23 weitere Fälle von exquisiter Rubella in einer unter Thomas' Leitung von O. Oesterreich verfassten Leipziger Dissertation, sowie auch jene fünf Fälle von Lindwurm und eine eigene Beobachtung von dessen Assistenten Arnold im bayr. Intelligenzblatt veröffentlicht. Endlich beschrieb Mettenheimer in Schwerin eine Rötthelnepidemie im Sommer 1869, welche der Schilderung nach genau zu den schon angeführten passt und von dem Berichterstatter als Rubellae bezeichnet wird.

Die von mir beobachteten Symptome lassen sich kurz fassen. Das Exanthem unterschied sich Anfangs in nichts von dem der Morbillen. Hautkorn- bis Linsen-grosse rote Flecke bedecken den ganzen Körper und verursachen meist beträchtliches Jucken. Diese Flecke stehen an manchen Stellen so dicht, dass sie schliesslich coalesciren und unregelmässige Figuren bilden. Sie erheben sich auch etwas über das Niveau der übrigen normalen Haut und bieten, wenn man auch mit dem Finger darüber streicht, das Gefühl einer ungleichen Härte. Wel verschieden aber von den Masern verläuft dieses Exanthem bezüglich der Dauer. Es schwandet nämlich schon nach einem, längstens nach zwei Tagen vollkommen, und die darauf folgende Abschuppung ist sehr unbedeutend, kaum merklich. Das gleiche gilt von den catarrhischen Symptomen. Wenn auch bei stark entwickeltem Exanthem im Gesicht die Lider schwellen und die Conjunctiva etwas geröthet ist, so fehlt doch ausnahmslos der Bronchialcatarrh, welcher hingegen bei Morbillen ein charakteristisches, nie ausbleibendes Symptom ist. Ein Vorläuferstadium war in meinen Fällen kaum zu bemerken und die deutlichen Fiebererscheinungen am ersten Tage verschwinden mit dem abhald erfolgenden Erlassen des Exanthems so vollständig, dass die Kinder am dritten Tage nicht mehr im Bett zu halten sind und ohne jegliche Nachkrankheit sogleich complet genesen.

Behandlung.

Mit einer rein expectativen Behandlung reicht man vollkommen aus. Innerlich verdünnte Säuren, äusserlich kalte Waschungen gegen das lästige Jucken war der ganze Heilapparat, der gegen dieses unschuldigste aller acuten fieberhaften Exantheme in Anwendung kam.

4) Variola, die Blattern, Pocken.

Die selten Menschenblattern sind das ausgebildetste aller acuten Exantheme, kommen aber jetzt durch den in fast allen civilisirten Ländern eingeführten Impfwang seltener vor und werden von den leuchtendsten Formen, der Variolois, auch Variola modificata genannt, und von dem Variellen mit der Zeit vielleicht ganz verdrängt werden.

Man versteht unter Variola einen fieberhaften, contagiosen, typisch verlaufenden Pustelausschlag, der sich in mehrere Perioden theilen lässt.

Symptome.

Wir unterscheiden drei deutliche Stadien: 1) Das Stadium der Incubation und der Vorläufer, 2) das des blühenden Exanthems und 3) das der Abtrocknung.

1) Stadium incubationis et prodromorum.

Die Zeit von der Aufnahme des Contagiums bis zum Ausbruch des Exanthems schwankt zwischen 8—14 Tagen. Die ersten Tage dieses Zeitraumes gehen gewöhnlich ohne alle Symptome vorüber, nur in den letzten drei Tagen vor dem Ausbruche werden mehr und mehr pathologische Erscheinungen beobachtet. Indem ich den Verlauf der

Blattern bei Erwachsenen als bekannt voraussetze, kann ich mich darauf beschränken, die Vorboten, welche bei kleinen Kindern unter einem Jahre vorkommen, zu schildern. Da bei geimpften Kindern keine Variola leicht vorkommt und bei uns gewöhnlich vor beendigten ersten Lebensjahre geimpft wird, so bekommt man nur mehr bei kleinen Kindern diese Form zu sehen.

Man bemerkt an denselben, nachdem sie vorher einige Tage mit reinem oder auch modificirtem Blatterngifte infectirt worden sind, theils gastrische Symptome, Appetitmangel, belegte Zunge, Erbrechen und Obstipation, theils Symptome von Aufregung des Gefäss- und Nervensystems, als heisse Haut, frequenten Puls, grosse Umrinde abwechselnd mit Schlafsucht, Aufschreien und Aufschrecken im Schlafe, Knurren mit den Zähnen, Convulsionen, zuweilen Ohnmachten und raschen Colapsus. Diese sämtlichen Symptome, welche durchaus nichts charakteristisches haben, — denn das bei Erwachsenen so bezeichnende, subjective Gefühl von Rücken- und Lendenschmerz kann bei Mangel der Sprache nicht geäußert werden — steigern sich nun drei Tage hindurch mit abendlichen Exacerbationen, bis schliesslich das Exanthem ausbricht.

2) Stadium eruptionis et florescentiae

Die ersten Spuren des Ausschlages sieht man im Gesichte, von wo aus sich derselbe auf den Rumpf und die oberen Extremitäten, und zuletzt auf die unteren verbreitet. In 24—48 Stunden ist die Eruption vollendet.

Die Blatternpustel entsteht in der Weise, dass zuerst ein rother etwas erhabener Fleck auf der Haut sich bildet, der in keiner Weise von Maserneranthern zu unterscheiden ist. Im Centrum dieses rothen Fleckes entwickelt sich ein kleines hartes Knötchen und auf demselben ein noch kleineres Bläschen, welches sich aber rasch vergrössert, am zweiten Tage die Grösse eines Stecknadelkopfes, am dritten die einer Linse annimmt und schliesslich die ganze ursprünglich rothe Stelle in eine pralle Pastel von der Grösse einer halben Erbse und einer centralen Delle umwandelt.

Nicht alle ursprünglichen rothen Flecken gehen diese Metamorphose ein, ein grosser Theil derselben kommt nicht zur Bläschenbildung, sondern verschwindet nach einigen Tagen spurlos, was am häufigsten in den unteren Extremitäten vorkommt. An den Füssen ist die Eruption überhaupt immer am schwächsten.

Der Verlauf der Blattern ist, was Form und Dauer des Exanthems betrifft, bei Kindern genau derselbe wie bei Erwachsenen.

Wenn das Exanthem nicht gar so ausgedehnt über den ganzen Körper aufgetreten ist, so lassen nach seinem Ausbruche die allgemeinen Symptome bedeutend nach. Die grosse Umrinde und die Delirien verschwinden, der Puls wird weicher und langsamer, das Athmen regelmässiger, der spezifische Variolageruch aber ist nach dem Ausbruche deutlicher als vorher. Nur bei starker Eruption auf den Schleimhäuten der Augen, der Nase, des Mundes etc. wird keine Minderung der Aufregung bemerkt, indem die grossen, hiernach veranlassten Schmerzen die Kinder nicht zur Ruhe kommen lassen.

Am 6. Tage nach der Eruption oder am 9. des Beginnes der Krankheit stellt sich auch bei den Kindern die *Febria secundaria*, die Eiterungsfeber, ein. Der Entzündungshef auf die Pocken vergrössert sich, das Gesicht schwillt bis zur Unkenntlichkeit an, die Haut wird wieder heiss und es beginnt ein so unerträgliches Hautjucken, dass die Patienten trotz aller Vorkehrungen die Pusteln, die sie mit den Nägeln erreichen können, aufkratzen. So kommt es endlich zum

3) Stadium. Stadium exsiccationis.

Dasselbe beginnt nicht am ganzen Körper zu gleicher Zeit, sondern die Pusteln platzen und vertrocknen in derselben Reihenfolge, in der sie entstanden sind, zuerst die im Gesichte, dann am Halse, an den Handgelenken, am Rumpfe und endlich an den unteren Extremitäten. Jede Pustel vertrocknet ziemlich genau am 9. Tage nach ihrer Entstehung, so dass also, die 2—3 Tage Prodromalstadium eingerechnet, am 11.—12. Tage der Krankheit sämtliche Pusteln die Abtrocknung begonnen haben. Zum spontanen Bersten oder zur einfachen Enttrocknung ohne Bersten kommt es bei Kindern fast niemals, indem sie nicht widerstehen können, das enorme Jucken durch Kratzen und Reiben zu mildern.

So bilden sich nun über den ganzen Körper, besonders aber im Gesichte, braune, dicke Krusten, welche in Ruhe gelassen, nach drei bis fünf Tagen abfallen und eine mit Epidermis bedeckte Narbe zurücklassen, von den Kindern aber häufig vor der Zeit abgekratzt und durch neue dickere ersetzt werden. Die Blatternarben haben bei den Kindern dieselbe Beschaffenheit wie bei den Erwachsenen, nur ist die Umhüllende der Kinder noch bedeutend dünner, die Zerstörung desshalb leichter, und es gleichen sich mit den Jahren auch Unebenheiten, die Anfangs sehr beträchtlich selbsten, mehr und mehr aus.

Die Pocken der Mundhöhle werden in diesem Zeitraume zu tiefen Geschwüren und veranlassen eine vermehrte Schleim- und Speichelsecretion. Mit der Abtrocknung schwand die *Febria secundaria*, der Appetit stellt sich wieder ein und die Genesung schreitet rasch vorwärts. Zuweilen stossen sich die Nägel an den Fingern und Zehen ab.

Die Prognose ist bei Kindern unter einem Jahre unersprechlich ungünstig, gegen 60 Prozent erliegen.

Die Hauptgefahr für kleinere Kinder bringt 1) ein stürmisches Vorläuferstadium, wo tiefer Sopor oder Convulsionen das Leben bedrohen und 2) die *Febria secundaria*, welche eines typhösen, septischen Charakter annehmen kann.

Die quantitativen und qualitativen Verschiedenheiten sind bei Kindern dieselben als bei Erwachsenen. Auch hier haben wir Variolae discretas, cohaerentes, corymbosae, und confluentes, in qualitativer Beziehung Variolae crystallinae, albae, depressae, crustae, gangrenosae etc.

Die häufigsten Complicationen sind: Laryngitis, Pleuritis, Meningitis, Intestinalcatarrh, beträchtliche Augenkrankungen, welche zu Phthisis bulbi führen können, Otorrhöen, Gangrän des Hodensackes.

Als die häufigsten Nachkrankheiten sind zu erwähnen: Furunkel, Zellgewebsabscesse, Pyämie, Gelenkentzündungen, Knochentuberkulose.

und, was bei kleinen Kindern am auffallendsten ist, rasch sich entwickelnde Scrophulosis in allen ihren Formen und Localisationen. Die Sterblichkeit in Folge der Blattern ist bei Kindern unter einem Jahre eine sehr grosse, indem kaum 40 Procent genesen.

Aetiologie.

Die Blattern sind eminent ansteckend und zwar durch die Atmosphäre, durch Contact und durch Inoculation, am ansteckendsten während des Suppurations- und Abtrocknungsstadiums. Das wichtigste aber für die Praxis ist, dass nicht bloss echte Blattern bei Ungeimpften wieder echte Blattern erzeugen, sondern dass zuweilen auch die Berührung mit Varioloiden und selbst ganz leichten Variellen bei einem ungeimpften Kinde die echte Menschenblattern verursachen kann.

Behandlung.

Man spricht bei vielen Krankheiten von einer Prophylaxis, bei keiner aber lässt sich dieselbe mit solcher Bestimmtheit angeben und durch eine einfache unschädliche Procedur ausführen als bei Variola. Es ist diess die Impfung mit der Kuhpockenlymphe, die

Vaccination.

Bei unseren Hausthieren kommen Pustelusschläge vor und besonders kennt man schon seit langer Zeit die Pocken am Euter der Kühe. Ob dieselben immer durch ein Contagium oder auch spontan entstehen, ist noch nicht genügend entschieden, ihr Verlauf ist jedoch genau beobachtet. Canstatt berichtet darüber folgendermassen:

Einige Tage vor dem Ausbruche des Exanthemas fressen die Kühe weniger, geben wenig Milch und haben am Euter eine erhöhte Temperatur. Es zeigen sich hierauf besonders an der Aussenfliche der Euterwarzen kleine, rüthliche Knötchen, die sich in gedellte Pusteln verwandeln und am 4.—7. Tage in voller Reife stehen. Die Pusteln sind perlfarbig, Anfangs mit heller, später trügeriger Lymphe gefüllt und von einem rothen Hofe umgeben. Die Berührung des Euters verursacht den Thieren deutliche Schmerzen. Am 12.—14. Tage verkrusten die Pusteln.

Dass die Knechte und Mägde, welche solche Thiere zu pflegen haben, angesteckt werden können, wusste man schon vor mehr als hundert Jahren, auch war schon öfter aufgefallen, dass diese Leute von den echten Blattern verschont blieben. Eine genaue Prüfung und experimentelle Constatirung dieser Thatsache wurde aber erst von Jenner geliefert, welcher am 14. Mai 1796 zum ersten Male ein achtfähriges Kind mit Stoff von den Händen eines Melkers impfte. Nach regelmässigem Verlauf der Kuhpocke wurde bei diesem Kinde am folgenden 1. Juli die Gegenprobe gemacht, indem man ihm echtes Blatterngift einimpfte. Das Kind blieb unversehrt. Dieser Versuch wurde nun oft wiederholt und im Jahre 1799 errichtete man in London schon die erste öffentliche Impfanstalt. Von nun an verbreitete sich diese heilsame Massregel bald über die ganze civilisirte Erde, und es gibt jetzt fast kein Land mehr, wo die Vaccination im ersten Lebensjahre nicht gesetzlich vorgeschrieben wäre.

Die Vaccination wird am besten in folgender Weise vorgenommen: Man verschafft sich vor allem ein vollkommen normales, gut entwickeltes, an keinerlei Ausschlag leidendes Kind, das acht Tage vorher geimpft worden ist und mehrere legitime Impfpusteln an jedem Arme zeigt. Man sticht nun mit schräg gehaltener Impfadel eine Pustel mehrmals so leicht an, dass nur reine, nicht mit Blut gemischte Lymphe austritt, was in größeren Tropfen erst nach 1–2 Minuten geschieht, indem die Vaccinopusteln bekanntlich nicht einfach blaug, sondern geflüßert sind. Die wohl abgetrocknete Impfadel wird ab dann in diese Lymphe getaucht, so dass sie mit der Vor- und Rückseite damit benetzt ist. Man fasst hierauf den Oberarm des zu impfenden Kindes so unter der Achsel, dass man sich die äussere Fläche desselben gehörig spannt und sticht nun im oberen Drittheil 4–6 Mal die Nadel leicht ein. Die Stiche dürfen nicht sogleich bluten und am sichersten gelingt die Impfung, wenn man nach derselben nur einen kleinen rathen Tropfen bemerken kann. Die Stiche müssen wenigstens 1 Cms. von einander entfernt sein, weil sonst die sich entwickelnden Pusteln conflüiren.

Man impft am besten in den Sommermonaten, weil man im Winter eine langsamere Entwicklung der Pusteln beobachtet. Das beste Alter ist zwischen drei und zwölf Monaten. Bei herrschender Blatternepidemie ist es jedoch rathsam, schon wenige Tage nach der Geburt die Impfung vorzunehmen. Die zu impfenden Kinder müssen vollkommen gesund und nicht gerade in einer Zahnperiode (vide pag. 11) begriffen sein.

Eine besondere Behandlung der Geimpften ist nicht nöthig. So können vor wie nach gebadet werden, und um Reibung zu vermeiden, thut man gut, vom 4.–10. Tage den Arm mit einer feinen Leinwandbinde einzwickeln, wodurch das Erythem der Umgebung am sichersten auf einem mässigen Grade erhalten bleibt.

Die Uebertragung der Dyskrasien durch Vaccination von einem Kinde auf das andere ist nur bezüglich der Syphilis erwiesen. Scrophulis und Blachitis können nicht mitgeimpft werden; da im Publikum jedoch längst nicht die gehörige Einsicht herrscht, so nimmt man, um alle späteren Vorwürfe abzuschneiden, am besten nur ganz wohlgebildete Kinder ohne allen Ausschlag zur Abimpfung.

Die Vorsicht gelöstet, immer Impfstoff vorrätzig zu haben, damit bei Ausbruch einer Blatternepidemie derselbe nicht erst gesucht und verschrieben werden muss. Er wird ohne alle Mühe und Schwierigkeit auf folgende Weise gesammelt: Man sticht eine oder einige gut entwickelte, acht Tage alte Impfpusteln eines gesunden Kindes mehrfach an, wartet ein paar Minuten, bis die ausgetretenen Tropfen gehörig gross geworden sind und hält nun ein gewöhnliches gläsernes Capillarröhrchen mit seiner Mündung in schräger Richtung an des Tropfen. Das Capillarröhrchen muss deshalb schräg, flach aufgesetzt werden, damit bei allenfallsigen Bewegungen des Kindes keine Verletzungen stattfinden. Ich erinnere noch einmal ein Kind in Betheiligung bekommen zu haben, bei dem während der Anlegung des Glasröhrchens durch ungeschickte Hand dasselbe zerbrach, die Glas splitter in die Pustel eindrangen und ein hässliches Erysipel des ganzen Armes veranlassten. Nach den Gesetzen der Capillarität füllt sich das Röhr-

chen alsbald mit Lymphe, welche man bis zur Länge von 2 Centimeter eindringen lässt. Man zieht nun das in der rechten Hand gehaltene Röhrchen zurück, klopft mit der linken Hand ein Paar Mal auf den Rücken der rechten, wodurch bei senkrecht gehaltenem Röhrchen dessen Inhalt noch etwas weiter nach innen dringt und schneidet mit einer Scheere die Enden so ab, dass auf jeder Seite das Glas $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ Zoll über die Lymphe hinausragt. Die beiden Enden werden nun mit einem Tropfen Siegelack verschlossen und es kann der Impfstoff auf diese Weise Jahre lang in flüssiger Form aufbewahrt werden. In niedriger Kollertemperatur von 8—10° R. behält er seine Wirksamkeit bedeutend länger, als wenn man ihn in warmen Wohnzimmern bei circa 15° R. aufbewahrt.

Soll mit einem so conservirten Stoffe eine Impfung vorgenommen werden, so schneidet man mit der Scheere die beiden Siegelackknöpfe wieder ab, schiebt das Capillarröhrchen in ein etwas weiteres, ebenfalls gläsernes Röhrchen hinein, hält beide Röhrchen mit Daumen und Zeigefinger luftdicht zusammen und bläst nun den Impfstoff direct auf die Nadel. Die Impfung wird hierauf, wie jede gewöhnliche von Arm zu Arm, vorgenommen.

Die Entwicklung der Vaccinepustel geht in folgender Weise vor sich: Die kleinen Stiche lassen sich als rothe Tupfen noch einige Stunden lang bemerken. Hat gar keine Blutung stattgefunden, so verschwindet hierauf jede Spur des Einstiches, ist letzteres jedoch der Fall gewesen, so bleiben braune Punkte sichtbar. Am dritten Tage nach der Impfung röthet sich die Impfstelle stärker und so erhebt sich ein kleines, rundes, härtliches Knötchen, auf dessen Spitze sich bis zum fünften Tage ein perlfarbiges Bläschen entwickelt. Dieses Bläschen wächst nun täglich mehr in die Breite, bekommt eine deutliche Delle, wie die Variolapustel, und ist am achten Tage als bläulich-roth durchscheinende Pustel mit rothem Hofe in vollster Blüthe.

Die Pusteln haben einen eiförmigen Run, ihr Inhalt fängt am zehnten Tage an trüb zu werden, der rothe Hof vergrößert sich unter zunehmender Härte mehr und mehr, die Achseldrüsen werden empfindlich und es stellen sich allgemeine Symptome ein. Die Kinder werden sehr unruhig, schlafen die Nacht nicht, haben heisse Haut, grossen Durst und sind zu acuten Krankheiten, namentlich Pneumonien und Darmcatarrhen sehr geneigt. Nach zwei bis drei Tagen verschwinden diese Allgemeinerscheinungen wieder. Am elften Tage erlischt der harte rothe Hof mehr und mehr, die trübe Pustel verliert ihre Delle und spitzt sich etwas zu. Bei gehöriger Schonung platzt sie nicht, sondern trocknet vom Centrum aus zu einer braunen Kruste ein, welche in zwei bis drei Wochen abfällt und eine weisse, vertiefte, etwas unebene Narbe zurücklässt. Wenn sie aufgekratzt wird, so nässt sie einige Stunden und vertrocknet dann ebenfalls zu einer grösseren, unregelmässig contourirten Kruste.

Nicht immer ist der Verlauf der Vaccine so regelmässig und einfach, wie er oben geschildert worden. Das secundäre Fieber wird zuweilen so intensiv, dass Gefahr für das Leben eintreten scheint. Die Kinder bekommen heftige Convulsionen, collabiren, werden ganz bleich oder erbrechen anhaltend zuerst weissen, dann galligen Magenschleim. Von einem tödtlichen Ausgang, der lediglich durch das secundäre

Fieber bedingt sein sollte, hört man jedoch niemals, und wenn Kinder mit Vaccinepusteln sterben, so findet man bei sorgfältiger Section gewöhnlich noch eine anderweitige Todesursache.

Bei Kindern mit feiner, reizbarer Haut erkranken andere Hautstellen, es tritt eine Nesselsucht oder ein varicellenähnlicher Bläschenausschlag am ganzen Körper ein. Scrophulöse Kinder bekommen einen ausgedehnten Pustelanschlag, an welchem namentlich die geringsten Oberarme sich theilnehmen, wo dann die Impfpusteln gar nicht heilen, sondern zu scrophulösen Geschwüren sich umwandeln.

Die schlimmste Complication ist eine erysipelatöse Entzündung der Oberarme, welche bei roher Behandlung besonders dyskrasischer Individuen am 9.—12. Tage sich entwickeln kann. Das Erysipel breitet sich über den ganzen Arm, selbst noch über einen Theil des Rumpfes aus, das Fieber ist dabei sehr heftig, die Genesung geht nur langsam von Station und die Pusteln ulceriren.

Als Anomalien des örtlichen Verlaufes sind eine zu rasche und eine verzögerte Pustelbildung zu erwähnen. Bei schlechtem Impfstoffe, der aus einer mangelhaft entwickelten Pustel stammt, bilden sich schon nach 2—3 Tagen kleine Bläschen, welche, wenig gedellt, kaum die Grösse einer Linse erreichen und nach 6—8 Tagen schon wieder vertrocknen. Eine seltene, der vorigen entgegen gesetzte Anomalie ist, dass die Eruption bedeutend retardirt und die Incubationszeit 8—10 Tage dauert. Bei Vaccination ist mir dasselbe noch niemals begegnet, nur ein einziges Mal bei Revaccination eines 14jährigen Knaben, bei welchem, nachdem die Revaccination längst als erfolglos betrachtet worden war, am zehnten Tage nach der Impfung eine normale Vaccinepustel auftrat und den gewöhnlichen Verlauf nahm.

Als wirkliche Nachkrankheit einer mit allen Cauteilen vorgenommenen Impfung ist nur der plötzliche Ausbruch scrophulöser Affectionen zu erwähnen, wovon die Kinder tuberculöser Eltern oft mit auffällender Schnelligkeit und Vehemenz befallen werden.

Die Frage, auf wie lange Zeit die Vaccination gegen Variola schützt, wurde schon vielfach ventilirt und die darüber gediegenen Untersuchungen haben endlich zur allgemeinen Einführung der Revaccination zur Zeit der Pubertät geführt. Mag man nun annehmen, die Vaccination schütze auf Zeit lebens oder nur auf 10 oder 20 Jahre, so viel steht jedenfalls fest, dass Kinder, welche ordentliche Vaccinepusteln gehabt haben, vor echter Variola vollkommen geschützt sind. Die Vaccination ist somit als ein grosser Gewinn für die ganze Menschheit zu erachten, weshalb das englische Parlament auch einen Act der Dankbarkeit ausübte und ihrem Erfinder Jenner eine Nationalbezahlung von 20,000 Pfd. votirte.

Brächen in einer Familie, in welcher sich ein noch nicht geimpftes Kind befindet, die echten oder modificirten Blattern aus, so hat man bei demselben die Impfung so schnell als möglich vorzunehmen, um den Verlauf des gewöhnlich doch ausbrechenden Exanthems zu mildern. Es verlaufen dann die Vaccine- und die Blatternpusteln ungestört neben einander. Man hat jedoch beobachtet, dass, wenn die Vaccine dem allgemeinen Exanthem zuvorkommt, das letztere einen weniger gefährlichen Charakter annimmt.

So viel von der Vaccination. Die Behandlung der einmal aus-

gebrochenen Blatter ist ebenso expectativ symptomatisch einzuleiten, als die des Scharlachs und der Masern. Man Sorge für gute Ventilation, für eine gleichmäßige Temperatur von 14° R. und enthalte sich aller schwächenden Behandlung, namentlich der Blutentziehungen, des Calomels und der Abführmittel überhaupt. Ist Darmcatarrh zugegen, was bei Kindern unter einem Jahr sehr gewöhnlich ist, so kann man denselben in mäßigem Grade festbestehen lassen, weil die Gehirnsymptome hierdurch wohllich gemildert werden; sobald er aber profus zu werden droht, muss er durch kleine Gaben Opium mit einer Maximaldosis von 2—3 Tropfen Opiumtinctur pro die zum Stillstand gebracht werden.

Mit dem Ausbruche der Pocken stellt sich die Indication ein, die Entwicklung der Pusteln im Gesichte und hiemit die so traurig entstellende Narbenbildung zu verhüten. Die zu diesem Zwecke bisher angegebenen Mittel lassen viel zu wünschen übrig und es entstehen in vielen Fällen trotz aller Behandlung bedeutende Narben. Das sicherste Mittel ist eine frühzeitige Aetzung, die man nach Bretonneau am besten in der Weise ausführt, dass eine goldene spitze Nadel in eine concentrirte Höllensteinslösung getaucht und hiemit jede junge Pustel möglichst früh angestochen wird.

Aetat man am zweiten Tage nach dem Ausbruche, so tritt ein Stillstand in der Entwicklung der Pustel ein, nach einigen Tagen wird die Oberhaut durch eine dünne Kruste emporgehoben und nach Abfall dieser bleibt keine entstellende Narbe zurück.

Diese Aetzung ist jedoch ziemlich schmerzhaft und erfordert bei confluirendem Exanthem eine längere Zeit, weshalb man sich darauf beschränkt, die Augen, die Augenlider, den Nasenrücken und die Nasenflügel auf diese Weise zu behandeln, während man die übrigen Theile des Gesichtes, die Stirne, die Wangen und das Kinn mit Quecksilberpflaster bedeckt. Das Quecksilberpflaster muss jeden zweiten Tag gewechselt und sorgfältig da weggelassen werden, wo sich dennoch vollkommene Pusteln entwickelt haben. Ein Theil der Pusteln geht durch diese Behandlung sicher abortiv zu Grunde, ein anderer kommt nicht zu gehöriger, ausgeformter Entwicklung und nur sehr wenige hinterlassen bleibende, entstellende Narben.

Ausserdem wurden Waschungen mit Sublimatlösung, mit Chlorwasser und Bepinselungen mit Jodtinctur empfohlen. Das allgemeine Verfahren beschränkt sich nach der Eruption auf antiphlogistische Diät, Offenhalten des Stuhles und bei grosser Unruhe auf kleine Dosen Opium.

In der Periode der Eiterung und Abtrocknung wird es dringend nöthig, das Kratzen und vorzeitige Abreissen der Krusten möglichst zu verhüten, zu welchem Zwecke man den Kindern am besten leinene Fausthandschuhe anzieht. Gegen das heftige Hautjucken hat sich Bestreuen der Haut mit Stärkemehl oder Bestreichen mit einem Liment aus Kalkwasser und Olivenöl als heilsam erwiesen. Die gleichmässige Zimmertemperatur dürfen die Kinder erst verlassen, wenn alle Krusten abgefallen sind und die jungen Narben anfangen weiss zu werden.

Wenn das Fieber den stupiden, septischen Charakter angenommen hat, so müssen die Nervina und reborizirenden Mittel in Anwendung

kommen, wie solche schon bei der Therapie des Scharlachs ausführlicher besprochen worden sind.

5) Die modificirten Blattern, Variolois, und die Schaffblattern. Variolae.

Schon lange Zeit vor Entdeckung der Vaccination war Avarus und Laien eine leichte Kindeskrankheit, die Varicellen oder Schafpecken, bekannt. Von dieser niedrigsten Entwicklungsstufe der Blattern aber bis hinauf zur entwickeltsten Form der continuirlichen Variola gibt es eine grosse Reihe von Uebergängen, welche man alle unter dem Namen Variolis, oder modificirte Blattern, Mittelblattern zusammengefasst hat. Sie als eigene für sich bestehende Exantheme ohne direkten Zusammenhang mit den echten Pecken anzusehen, geht dem halb nicht wohl an, weil es schon oft vorgekommen ist, dass Nichtgeimpfte von leichten Varicellenkranken die schwersten Formen der Variola bekamen, und umgekehrt, Geimpfte durch Berührung mit solchen Blatternkranken nur die Varicellen acquirirten.

Zur leichteren Verständigung bleibt es jedoch rathsam, die alten Bezeichnungen beizubehalten, und es sollen deshalb auch die beiden allerdings nicht scharf geschiedenen Krankheitsformen Variolis und Varicellae separat geschildert werden.

Symptome der Varioloiden.

Bei der Variolois können ganz dieselben Stadien beobachtet werden wie bei Variola, nur sind sie alle kürzer und weniger scharf markirt. Die Gesamtdauer der Variola vom Beginn der Vorläufer bis zur Vertrocknung der Pusteln nimmt einen Zeitraum von 16 bis 18 Tagen in Anspruch, die der Variolois nur von 7—11 Tagen.

Die Vorläufer sind die nämlichen wie bei Variola, sie dauern aber gewöhnlich keine vollen drei Tage, sondern nur 24—36 Stunden und sind im Allgemeinen weniger intensiv. Der specifische Pockengeruch fehlt, hingegen stellt sich, was bei Variola gewöhnlich nicht der Fall ist, fast regelmässig ein dunkelrothes, grossfleckiges Hauterythem ein, das man mit dem Namen „Rash“ bezeichnet. Dieses Erythem ist nicht als Anfang des Pustelausschlages zu betrachten, indem die später sich entwickelnden Pusteln eben so gut auf vorher von Rash verschonten als davon befallenen Stellen auftreten können.

Das Exanthem breicht rascher und weniger regelmässig aus. Die Eruption beginnt nicht im Gesichte allein und steigt auch nicht gradatim den Rumpf hinab bis zu den unteren Extremitäten, sondern stellt sich ziemlich gleichzeitig am ganzen Körper ein. Während bei Variola an ein und derselben Körperstelle alle Blattern auf gleicher Entwicklungsstufe stehen und keine Nachschübe beobachten werden, findet man bei Variolois sehr gewöhnlich Knötchen, Bläschen und grosse Pusteln neben einander, und die Zahl der Pusteln vermehrt sich mehrere Tage lang noch fort. Bei Variolois kommen allerdings einzelne Pusteln vor, welche sich bezüglich ihrer Grösse und Structur in keiner Weise von echten Blattern unterscheiden, die Mehrzahl derselben aber bringt es nicht zur gereiften Pustel, sondern vertrocknet als lunkförmiges, hyalines Bläschen zu einem entsprechend dünnen Schorfe.

Die allgemeinen Symptome, welche schon von vornherein bedeutender waren, verschwinden mit dem Ausbruche des Exanthemes entweder gänzlich oder reduciren sich wenigstens auf ein Minimum. Ein wirkliches secundäres Fieber kommt hier nicht vor und die Kranken befinden sich meist auch so wohl, dass sie kaum im Bette zu erhalten sind. Auch die entwickelten Pusteln beginnen spätestens am 5.—6. Tage zu vertrocknen, und zuweilen bemerkt man mitten unter den vertrocknenden noch einige Nachzügler, welche sich zu Bläschen erheben, gewöhnlich aber abortiv wieder zu Grunde gehen. Die Eiterung der Pusteln wird nicht so mächtig, dass die Umgebung sich erysipelatös röthet und dass die Mehrzahl der Pusteln zum Aufplatzen käme. Der gewöhnliche Fall ist, dass sie rasch eintrocknen, dass die Krusten nach einigen Tagen abfallen und leicht geröthete, kaum vertiefte Narben hinterlassen. Die Pusteln auf der Schleimhaut der Mundhöhle und des Pharynx heilen ebenfalls in kürzerer Zeit als bei Variola.

Die Nachkrankheiten sind hier selten und bei vorher gesunden Kindern wenig gefährlich. Zuweilen entwickelt sich eine hartnäckige Furunkulosis oder ein stark nässender Impetigo mit Schwellung der betrachteten Lymphdrüsen. Bei scrophulösen Kindern machen die dyskrasischen Affectionen meistens beträchtliche Fortschritte.

Die Prognose ist hier viel günstiger als bei Variola, indem von Kindern unter einem Jahre nur 8—10 Procent, von älteren Kindern kaum 5—6 Procent erliegen.

Die Gefahr beruht besonders auf Bethheiligung des Larynx, wodurch Krupssymptome und plötzliches Glottisödem entstehen, ferner auf rasch tödtenden Convulsionen, auf Complication mit Pneumonie oder Meningitis und endlich auf dem unstatthausweise sich entwickelnden septischen Charakter des Fiebers.

Therapie der Varioloiden.

Die Vaccination gewährt keinen Schutz gegen Variolois, sondern sie modificirt das Contagium der echten Blattern so weit, dass dessen Uebertragung auf ein geimpftes Kind nur mehr im höchsten Falle Variolois zu erzeugen im Stande ist. Da man jedoch schon vielfach erfahren hat, dass die Variolois bei geimpften Kindern milder verläuft als bei nichtgeimpften, so ist auch in dieser Beziehung die Vaccination als ein wohlthätiges Prophylacticum zu betrachten. —

Die Behandlung der einmal ausgesprochenen Krankheit ist eine rein expectativ symptomatische. Es gilt hier alles, was bei der Therapie der Variola schon gesagt worden. Die Aetzung der Pusteln im Gesichte ist in diesem Falle nicht nöthig, indem die Pusteln weniger tief in die Cutis eindringen und nur leichte Narben zurücklassen. Eine Bedeckung der grösseren Parthieen des Gesichtes mit Quecksilberpflaster genügt in der Regel zur Vorhütung entstehender Narben.

Zu Anfang der Krankheit gibt man am besten verdünnte Mineral-säuren, wenn Diarrhöe zugegen, Mucilaginoso. Bei Larynxkrup leisten intensive Aetzung des Pharynx und der Epiglottis mit einer concentrirten Hollensteinlösung (2,0—3,0 Wasser) die besten Dienste.

Im Stadium der Abtrocknung kann man bei kleineren Kindern

durch Fausthandschuhe von Leinwand das übermüdeige Kratzen zu verhindern suchen, grössere Kinder werden durch diese Procedur natürlich sehr indignirt und heunruhigt. Man begnügt sich hier, die Nägel an Händen und Füßen möglichst kurz schneiden zu lassen.

Die *Reconvalescenz* macht gewöhnlich rasche Fortschritte und es bedarf desshalb nur selten einer speciellen roborirenden Nachbehandlung.

Symptome der Variellen.

Die Variellen, auch falsche, Schaf-, Wasser- oder Steinpocken genannt, sind das ungefährlichste, geringfügigste unter allen scabulösen Exanthemen, so dass die Mehrzahl der Fälle, namentlich wenn eine ausgebreitete Epidemie herrscht, gar nicht in ärztliche Behandlung kommt.

Von Verläufen wird bei grösseren, sonst gesunden Kindern so gut wie nichts bemerkt. Zuweilen geben einen, höchstens zwei Tage lang gastrische Symptome, Erbrechen, Appetitmangel, Magenschmerz, ein leichtes Fieber oder Urinbeschwerden dem Ausbruche des Exanthems voraus.

Ohne besondere Steigerung dieser Vorläufersymptome bricht aus das Exanthem ordnungslos an verschiedenen Körpertheilen zugleich aus. Kleine rothe Flecken erheben sich rasch, in 6—12 Stunden zu linsen- bis erbsengrassen Blasen, welche man einzeln für sich betrachtet von kleinen, durch Verbrennung entstandenen Bläschen nicht unterscheiden kann. Sie sind meist rund oder etwas oval, und wenig gefurcht, so dass sie bei einfachem Antasten meist ihren ganzen Inhalt entleeren. Eine Delle ist gar nicht oder nur sehr leicht vorhanden. Die meisten dieser Bläschen finden sich auf dem Rücken und der Brust, weniger an den Extremitäten und die wenigsten im Gesicht, nur auf der Stirne kommt immer die eine oder andere Pustel zur Erscheinung.

Gewöhnlich heilt es nicht bei einer Eruption, sondern es stellen sich die folgenden Tage Nachschübe ein, so dass frische und ganz vertrocknete Variellenblasen nebeneinander vorkommen können. Wenn auch die meisten Bläschen nicht über die Grösse einer kleinen Linse hinauskommen, so findet man doch bei allen Variellenkranken eine oder einige Pusteln am Rücken oder auf der Stirne, welche schwach gedellt unterscheiden an die echte Variolapustel erinnern.

Der Verlauf der meisten Bläschen ist ein sehr rascher. Ihr Inhalt trübe sich schon nach 2—3 Tagen und vertrocknet am vierten zu einer flachen, blätterigen Kruste, welche nach einigen Tagen abfällt und keine Narbe, sondern bloss einen rothen Flecken zurücklässt. Der schmale rothe Hof, welcher sich zur Zeit des Trübwerdens der Bläschen gebildet hatte, verschwindet wieder, sobald die Krusten vertrocknet sind.

Der rothe Fleck, welcher noch einige Wochen lang den ehemaligen Sitz der Krusten erkennen lässt, ist nach dieser Zeit nicht mehr zu finden.

Wenn einzelne fieberlose Nachschübe den Verlauf nicht besonders in die Länge ziehen, so ist die ganze Krankheit bis auf die roten Spuren der Pustelchen nach 8—10 Tagen vollständig beendet. Nachkrankheiten werden hier nicht beobachtet, nur bei scrophulösen Kindern

entwickeln sich zuweilen direkt aus den Bläschen chronische, nässende Ausschläge und widerstehen dann lange einer austrocknenden Behandlung. Der constante Ausgang der Varicellen ist rasche und vollständige Genesung.

Als Variationen dieser gewöhnlichen Schafpocken werden in der Literatur angeführt: die *Varicellae lenticularis*, wo gar kein Bläschen die Grösse einer Linse überschreitet und keines genakelt ist, und die *Varicellae conformes* oder *acuminatae*, die sog. Horn- oder Spitzpocken, wo sich zuerst harte Knötchen auf der Haut erheben, auf welchen dann am folgenden Tage kleine, spitze Bläschen entstehen. Das Bläschen trocknet schnell wieder ab, und seine härtliche Basis schrumpft unter mehrmaliger Desquamation ein.

Recapituliren wir die wesentlichen Unterschiede zwischen Variolois und Varicellen, so ergibt sich, dass die Varicellen im Gegensatz zu ersteren kurze oder gar keine Vorläufer haben, dass das Exanthem ganz unregelmässig mit vielen Nachschüben ausbricht, das Gesicht fast gänzlich verschont, nach 2–3 Tagen schon wieder abtrocknet und keine Narben hinterlässt. Lebensgefahr oder irgend ein bleibender Nachtheil ist bei Varicellen niemals zu fürchten. Vaccination und überstandene echte Variola gewähren keinen Schutz gegen Varicellen.

Behandlung der Varicellen.

Wenn bei Variolois schon ein expectatives Verfahren für ausreichend erklärt worden, so gilt dasselbe noch viel mehr für Varicellen. Wenn die Kinder, wie gewöhnlich, fieberlos sind, so ist es eine schwere Aufgabe, sie im Bett zu halten. Die Bettwärme ist übrigens bei diesem Exanthem auch gar nicht dringend indicirt, und selbst bei grober Vernachlässigung einer gleichmässigen Temperatur bekommt man keine üblen Folgen zu sehen.

Sind fieberhafte Prodromalsymptome vorhanden, so gibt man leichte Abführmittel, Tamarinden oder Mittelsalze. Die Pusteln lässt man mit etwas Oel oder Cocconsfett bestreichen, reduziert die Kinder einige Tage auf blande, vegetabilische Diät und hält sie in gleicher Zimmertemperatur. Nach Abfall der Krusten wird durch 3–4 lauwarme Bäder die gestörte Thätigkeit der Haut passend wieder angeregt.

6) Erythema neonatorum.

Abgesehen von der physiologischen, rothen Hautfärbung, mit welcher alle normalen Kinder zur Welt kommen, und die erst nach einigen Tagen zuerst gelbroth und endlich hell rosenroth wird, kommt bei Neugeborenen noch sehr häufig ein Erythema papulosum vor.

Symptome.

Dasselbe ist gewöhnlich auf der Brust und dem Rücken am stärksten entwickelt und besteht aus kleinen dunkelrothen Knötchen, welche auf einem ebenfalls rothen Grunde stehen. Die Cutis ist hierbei nur wenig infiltrirt. Hautjucken scheint zugegen zu sein, indem alle Kinder, so lange das Exanthem sichtbar ist, weniger ruhig sind. Auf Fingerdruck schwindet die Rothe schnell, um nach aufgehobenem

Finger sogleich in erhöhtem Maasse wiederzukehren. Nach einigen Tagen erblaßt das Erythem und die dunkelsten Stellen schuppen sich leicht ab.

Es ist im Verlaufe durchaus nichts Typisches zu bemerken und der ganze Process kann bald in zwei, bald erst in 14 Tagen vollendet sein. Auch kann ein und dasselbe Kind öfter als einmal davon befallen werden. Allgemeine Symptome werden hiedurch fast gar nicht veranlaßt, die Kinder haben kein Fieber, keine Schleimhautbetheiligung, und behalten ihren Appetit, wodurch sich diese Erythema schon hinlänglich von Scharlach und Masern unterscheidet. Das Exanthem selbst hat allerdings oft die grösste Ähnlichkeit besonders mit Scharlach, und man muss in der That die begleitenden Symptome zu Hilfe nehmen, um obengenannte acute Exantheme sicher ausschliessen zu können. Uebrigens sind Neugeborene für die letzteren sehr wenig empfänglich.

Aetiologie.

Die Ursachen dieses Erythemes sind hiebei wahrscheinlich ausser, wofür das Befallenwerden in den ersten Lebenstagen und die öftere Wiederkehr bei einem Individuum spricht. Die zarte Haut der Neugeborenen verträgt oben nicht immer gleich von Anfang an den Reiz der Kleider und Bäder gut und gelangt dann zu jenen hohen Graden von Hyperämie, welche das Erythema papulosum darstellen.

Behandlung.

Da das Erythem in kurzer Zeit spontan verläuft, so kann das allen Nachtheil ein rein expectatives Verfahren eingehalten werden. So lange es besteht, muss alle Reibung der Haut gänzlich vermieden werden, und namentlich nach dem Bade, das keinen Tag ausgesetzt werden darf, sollen die Kinder einfach in trockene Tücher eingeschlagen, aber nicht gerieben werden. Leichte Fettenreibungen mit Ol. Oleea oder irgend einem anderen reinen Fette scheinen die Kinder etwas zu beruhigen. Die Hemfchen und Windeln müssen während dieses Zeitraumes möglichst fein und weich sein.

7) Erysipelas. Rothlauf.

Bei grösseren Kindern von 5—15 Jahren kommen Erysipela vor, welche sich in nichts von der Rose der Erwachsenen unterscheiden und desshalb hier auch nicht weiter berücksichtigt werden sollen. Das Erysipel der Neugeborenen und Säuglinge aber bietet, namentlich symptomatisch und prognostisch, so bedeutende Verschiedenheiten dar, dass eine besondere Abhandlung desselben nöthig erscheint.

Es zeichnet sich diese Art von Erysipel durch seine grosse und constante Neigung zum Wandern aus, indem es sich nicht auf einen kleineren, oder grösseren Theil des Körpers beschränkt, sondern über die ganze Hautoberfläche fortkriecht. Immer die zunächst liegenden Theile werden ergriffen, während die vorher erkrankten Partien allmählig erlöschen, und es tritt kein Stillstand der Krankheit ein, bis nicht die ganze Körperoberfläche heimgesucht worden ist. Selbst nicht einmal damit beruhigt sich dieser perniciose Process, sondern beginnt

in seltenen Fällen an einer beliebigen entfernten Stelle von neuem, um noch einmal eine grössere oder geringere Fläche zu durchwandern.

Die localen Symptome sind nicht verschieden von denen der gewöhnlichen Rose: Rötung, Schwellung, Wärme und Schmerz bei Druck. An ein und derselben Stelle blüht das Exanthem in seiner Blüthe 1—3 Tage lang und erbläset auffallend rasch, sobald es neue Partien ergriffen hat.

Der ganze Process dauert im seltenen Falle der Genesung 4 bis 5 Wochen. Neugeborene erliegen regelmässig nach einigen Tagen, Kinder, welche schon mehrere Monate alt sind, genesen auch nur ausnahmsweise.

Ätiologie.

Bei Neugeborenen geht das Erysipel fast regelmässig vom Nabel aus und wird besonders häufig während der Puerperalfieberperiode beobachtet, wo es niemals zu einer normalen Vernarbung des Nabels kommt. Bei älteren Kindern können alle möglichen Hautverletzungen dazu Veranlassung geben. Am häufigsten erfolgt das Erysipel auf Vaccin- und Impetigopusteln, kann aber auch von einem einfachen Wundsein, Intertrigo, einer Hautfalte ausgehen. Bei der grossen Häufigkeit dieser Hautveränderungen einerseits und der Seltenheit der Rose andererseits mass jedoch immer noch eine bestimmte Disposition liegen, ohne welche alle diese Momente ungefährlich bleiben, angenommen werden.

Behandlung.

Alle Versuche, das Erysipel zu localisiren, sein Weiterkriechen zu verhindern, sind bisher erfolglos geblieben. Selbst das Ferrum caudens wurde versucht, es konnte jedoch auch durch diese höchst eingeifende Behandlung kein Stillstand erreicht werden.

Die interne Behandlung muss jedenfalls eine roborirende sein. Die Engländer wollen Erfolge gesehen haben von der Tinct. ferri muricatii oxydat. stündl. zwei Tropfen. Die wenigen Kinder, die ich bisher von Erysipel genesen sah, bekamen von mir täglich 0,10 bis 0,20 Chinin einige Tage hindurch und mehrere Wochen lang stündlich einen Kaffeebettel Bordeaux. Oertlich wurde nur Ol. Coccos angewendet.

8) Intertrigo. Frattola.

Unter Intertrigo versteht man ein Wundwerden, einen Epidermisverlust zwischen den Hautfalten, entstanden durch Reibung zweier gereizter, einander gegenüber liegender Hautflächen. Er kommt am häufigsten vor zwischen den Hinterbacken, in der Schenkelbeuge, unter den Achseln und am Hals. Fette Kinder können bei übrigens vollkommenster Gesundheit und sorgfältigster Pflege in allen Hautfalten fratt werden, bei mageren geschieht dies nur, wenn diarrhöische Stühle und mit Urin durchnässte Windeln längere Zeit mit der Haut in Berührung bleiben.

Der erste Grad des Intertrigo ist Rötung und Feuchtwerden der betreffenden Hautfalte. Die Epidermis erweicht dann ausser-

ordentlich schnell und lässt sich als ein weißer Schleim gewinnes, worauf die Cutis dunkelroth und schmerzhaft gegen Berührung in Tage liegt. Die nun sich einstellende Secretion ist ziemlich beträchtlich und kann bis zu leichter Krustenbildung sich steigern. Bei einiger Reinlichkeit und passender Behandlung ersetzt sich die verloren gegangene Epidermis bald wieder, sind jedoch die Kinder dyskrasisch oder atrophisch und dauert die ursprüngliche Veranlassung, die Diarrhoe fort, so nehmen die Erosionen den geschwürigen Charakter an, können sich mit diphtheritischen Membranen besetzen und in den schlimmsten Fällen sogar gangränös werden.

Der gewöhnliche Intertrigo der fetten Kinder weicht einem geeigneten Verfahren in 2—3 Tagen, der der atrophischen Kinder fast mensals, so lange Diarrhoe besteht.

Behandlung.

Als Prophylacticum streut man bei fetten Kindern ganz passend in die Hautfalten des Büschelsamen, Semen Lycopodii, welcher die Berührung und Reibung verhindert und bei seiner schwach hygroscopischen Eigenschaft lange trocken bleibt. Gewöhnlich aber wird er von den Laien auch als Heilmittel bei schon verlorengegangener Epidermis benutzt und ist hier keineswegs am Platze. Das gelieferte Exsudat verbindet sich mit dem Semen Lycopodii zu harten grossen Krusten und vermehrt die Hautentzündung beträchtlich. Wo dieses ungeeignete Verfahren stattgefunden hat, muss man die Krusten mit etwas Öl erweichen und sanft entfernen. Die vorhandenen Excoriationen bestreicht man am besten mit Blei oder Zinksalbe, welche man in der Arzeneipraxis durch einfachen Talg ersetzen kann. Tägliche, nicht zu warme Bäder sind das beste Präservativ gegen das Fortwachen.

9) Furunculosis.

Kinder verschiedenen Alters leiden sehr häufig an vereinzelter Furunkeln oder Blutschwären, welche, dem rascheren Stoffumsatz im Allgemeinen entsprechend, in kurzer Zeit ihren Pfortsp abstoßen und verhältnissmässig schnell zur Heilung kommen. Anders verhält sich die Sache bei kleinen Kindern tuberculöser Eltern.

Hier stellen sich zuweilen am Hinterhaupte und am ganzen Kopfe überhaupt eine grosse Menge von Furunkeln ein, welche einer nach dem andern aufgehen und so mehrere Wochen lang dem Kinde ausserordentlich grosse Schmerzen bereiten. Das Exsudat ist gewöhnlich kein fester Pfropf, wie er bei den vereinzelteren Furunkeln vorkommt, sondern ein dickflüssiger, gelber oder blaugemischter Eiter, nach dessen Entleerung sich flache mit den Haaren verklebende Krusten bilden.

Dahei schwellen die Drüsen des Nackens und Halses consensuell an, sind sehr schmerzhaft gegen Berührung und gehen auch wohl leicht und da in Eiterung über.

Die Zahl dieser Furunkel kann so bedeutend werden, dass endlich das ganze Hinterhaupt mit confluirenden Krusten bedeckt ist, unter welchen immer wieder neue zum Vorschein kommen, die alten Krusten emporheben und nach Entleerung ihres Eiters die letzteren verkleben helfen. So zieht sich dieser äusserst schmerzvolle Process viele Wochen

Ein, die kleinen Kinder schlafen fast gar nicht, die grösseren am ehesten, wenn sie die Wärterin auf den Arm nimmt, wo sie dann ihr Gesicht auf deren Schulter legen. Endlich trocknen die Krusten ein und es folgen keine neuen Nachschübe mehr. Die Krusten werden locker und können nun leicht sammt den Haaren, insofern selbe nicht schon vorher ausgefallen sind, abgeschnitten werden. Die Spuren der Furunkeln gehen sich nach langer Zeit als blaurothe glänzende Narben zu erkennen. Die secundäre Anschwellung der Cervicaldrüsen verschwindet hierauf ebenfalls. Die Ernährung und Entwicklung der Kinder leidet durch die anhaltende Schlaflosigkeit in hohem Grade, geht aber, wenn die Verdauungsorgane nicht catarrhalisch afficirt sind, nach gebellter Furunculosis wieder rasch von Station.

Bei vollkommen gesunden Kindern wird dieses Uebel fast niemals beobachtet, sondern gewöhnlich ist es der Vorläufer einer grossen Reihe von scrophulösen Erkrankungen.

Behandlung.

Abkürzen lässt sich dieser Process nicht. Das einzige, was der Therapeut thun kann, ist, dass er die anhaltende Unruhe und Schlaflosigkeit zu heben sucht, wodurch dem Kinde und dessen Angehörigen ein grosser Dienst geschieht. Es gelingt dies sehr leicht durch 1–2 Tropfen Opiumtinctur, wodurch bei einem jeden, auch dem unruhigsten Kinde, einige Stunden lang ein erquickender Schlaf eintritt. Nachtheilige Folgen sieht man von einem mässigen Gebrauch der Opiumtinctur niemals.

Oertlich behandelt man die Krusten am besten mit Fett. Man bestreicht sie mehrmals des Tages mit Oel oder irgend einer milden Salbe, worauf sie erweichen und bröcklich werden. Es werden hiedurch die schmerzhaften Zerrungen an den mit den Krusten verklebten Haaren vermieden. Eine vorzeitige Eröffnung der Furunkel bringt keine Erleichterung. Man muss sich darauf beschränken, die gelb durchscheinenden Eiterpunkte mit einer Nadel anzustechen, wodurch die schmerzliche Spannung um einige Stunden abgekürzt werden kann. Zur Verhütung weiterer Krustenbildung müssen an den erkrankten Hautstellen die Haare so kurz als möglich geschnitten werden.

10) Pemphigus benignus (contagiosus).

Unter Pemphigus (ρ $\nu\alpha\phi\epsilon$, die Wasserblase) im Allgemeinen versteht man die spontane Entwicklung von gelben Blasen auf der Haut, welche sich in keiner Weise von kleinen Verbrennungs- oder Cantharidenblasen unterscheiden. Bei syphilitischen Neugeborenen kommt eine sehr bösartige Form vor, welche im Abschnitte von der Syphilis besprochen werden wird. Ausserdem besteht aber, wenn auch selten, noch ein gutartiger Pemphigus, welcher nicht dyskrasischen Ursprungs, zuweilen sogar in geringem Grade contagiosus auftritt. Es befallt dieser mit Vorliebe Säuglinge, ältere Kinder werden weniger ergriffen und am seltensten erkranken Erwachsene. Beispiele von deutlicher Contagiosität erzählen Langhans, Scharlau, Steffen, Hervieux, Olshausen, Klemm und andere. Dohrn berichtet von einer Hebamme, in deren Praxis fast die Hälfte aller von ihr gepflegten

Kinder an Pemphigus erkrankten. Trotzdem dass die Hebamme zwei mal die Praxis auf vier Wochen ganz aufgab, erschienen, wenn sie dieselbe wieder aufnahm, stets neue Pemphigusfälle. Mir selbst war es bisher nur in einem Falle möglich, Ansteckung zu constatiren. Ein Kind bekam in der zweiten Lebenswoche multiple Blasen und Bläschen, von denen einige den Varicellen vollkommen glichen, andere aber die Grösse einer Erbse oder Bohne erreichten. Einige Tage darauf erkrankte die Mutter und die Kinderfrau in derselben Weise, doch war bei den Erwachsenen das Exanthem den Windpocken noch ähnlicher als bei dem Kinde. Eine später am Kinde vorgenommene Vaccination ergab normale Pusteln, so dass man die Möglichkeit einer Verwechslung mit Varicellen vollkommen ausschliessen kann. Die Menge der Blasen ist sehr verschieden, bald sind es nur einige wenige, bald viele Dutzende. Die Eruption tritt keineswegs so streng typisch ein, wie wir dies bei den acuten Infectiouskrankheiten beobachten, sondern es kommen mehrere Tage hindurch Nachschübe vor. Wie schon gesagt, sind die meisten Blasen von Varicellen nicht zu unterscheiden, dazwischen aber kommen immer einige von Erbsen- und Haselnußgrösse vor. Die grossen sind niemals rund, sondern oval, und ihre Längsaxe steht senkrecht zu Körperlänge. Sie entstehen in der Weise, dass sich zuerst die Haut umschreiben röthet, und in den folgenden 24 Stunden dann zur Blase umwandelt. Die letzteren platzen meist oder trocknen nach Art der Cantharidenblasen einfach ein, in allen Fällen aber bekommen sie eine dünne Borke mit schwach rothem Hofe und nach 6—12 Tagen fallen diese Borken ab. Narben bleiben nicht nach, nur wenn ausnahmsweise diphtheritischer Beschlag der Wundfläche sich dazu gesellt, zeigt ein weisses glattes Narbengewebe den Sitz der ehemaligen Blasen deutlich an. Das Exanthem bricht mit Vorliebe im Gesicht und am Rumpfe aus und verschont die Extremitäten oft gänzlich. Die allgemeinen Erscheinungen, bestehend in 1—3tägigem Unwohlsein, abendlichem Fieber, Unruhe und Schlaflosigkeit, sind nur beim Ausbruche und auch da nicht in allen Fällen zu beobachten. Die Harnsecretion ist hierbei in keiner Weise gestört.

Behandlung.

Der gutartige Pemphigus verläuft, wie ja schon der Name sagt, günstig und bedarf keiner besonderen Behandlung. Die von Epidermis entblößten Stellen und die Borken werden durch einfache Pestreibung oder Salbenverband vor kausalen Schädlichkeiten geschützt. In 2—3 Wochen tritt Genesung ein. Complicirt sich hingegen der Process mit Diphtherie, so ist die gegen jenen Process schon angegebene interne Behandlung einzuschlagen. Die diphtheritische Haut verbindet man am zweckmässigsten mit einer einprocentigen Carbolsäurelösung.

II) Scabies. Die Krätze.

Da bei Abfassung dieses Kapitels Kenntniss der Hautkrankheiten im Allgemeinen vorausgesetzt wird, so kann ich die zoologische Beschreibung der Krätzmilbe füglich unterlassen und sogleich mit den durch sie verursachten Veränderungen auf der Haut kleiner Kinder übergehen. Die beste Beschreibung und Abbildung der Milbe finden

sich in Simon's und Hebra's Hautkrankheiten und Küchenmeister's Parasiten.

Symptome.

Die Krätzmilben dringen in die zarte Epidermis der Säuglinge mit besonderer Vorliebe und auffallend rasch ein, und einige Tage nach erfolgter Ansteckung beginnt schon allenthalben das consecutive Exanthem zu erscheinen. Dasselbe ist bei kleinen Kindern je nach ihrem Alter verschieden. Ganz kleine, erst ein paar Wochen alte Kinder bekommen es in geringerem Grade, weil sie noch zu ungeschickt sind, sich intensiv zu kratzen, während Kinder im Alter von mehreren Monaten fast am ganzen Körper damit bedeckt werden.

Das Exanthem ist meist am entwickeltsten an den Händen, an den Fusssohlen, am Gesäss und auf der Bauchhaut und bietet zuerst folgende Form. Es entstehen an verschiedenen Stellen des Körpers stark juckende rosafarbige Papeln, auf deren Spitze sich kleine wasserhelle Bläschen entwickeln. Bleiben diese Bläschen unversehrt, so trüht sich nach einigen Tagen ihr Inhalt, wird eiterig und es entstehen somit grössere oder kleinere Pusteln, die spontan platzen und eine gelbe rindliche Kruste hinterlassen. Werden die Bläschen jedoch, wie es gewöhnlich der Fall ist, vorzeitig aufgekratzt, so bluten die wundgekratzten Stellen etwas und es bilden sich kleine rötlich schwarze Krusten.

Je stärker die Kinder kratzen, um so ausgedehnter wird das Exanthem. Durch Confluenz einzelner Pusteln entstehen besonders oft an den unteren Extremitäten und dem Gesäss grössere Geschwüre, welche lange der Heilung widerstehen. Hat die Krätze nun längere Zeit fortbestanden, so nimmt die ganze Haut, auch jene Parthien, welche frei von Papeln sind, eine schlabige, trockene Beschaffenheit an.

Das Allgemeinbefinden krätzkranker, kleiner Kinder leidet in Folge des unaufhörlichen Juckens und der schlaflosen Nächte beträchtlich, und die Kinder magern, wenn die Krätze nicht gehörig behandelt wird, was leider noch häufig der Fall ist, sichtlich ab.

Was das Alter betrifft, so sind lediglich die Neugeborenen davon verschont, weil eben die Milbe einige Tage Zeit braucht, bis sie sich in die Epidermis einlocht und dann das consecutive Exanthem veranlasst. Erst wenn dieses entstanden, wird man die Gegenwart der Gänge gewahr; denn vorher hat man meist keine Veranlassung, die Haut mit so grosser Aufmerksamkeit zu untersuchen. Sind die Kinder einmal einige Wochen alt, so werden sie für die Krätze sehr empfänglich und acquiriren sie regelmässig, wenn eines oder das andere ihrer Geschwister sie in das Haus gebracht.

Die Krätze ist an kleinen Kindern schwerer zu diagnosticiren als bei Erwachsenen, weil die Milben nicht bei diesen eine Vorliebe für die Hände haben, sondern ihren Gänge am ganzen Körper und zwar sehr vereinzelt graben, so dass man bei einem Kinde oft lange suchen muss, bis man einen charakteristischen Gang aufweisen kann. Das Auffinden der Gänge wird ferner noch dadurch erschwert, dass dieselben weiss bleiben und nur wenig von der übrigen Haut abstoehen, während die an den Händen Erwachsener in Folge der verschiedenen Beschäftigungen bald schwärzlich schmutzig werden und durch einfache

Wäsungen sich nicht mehr weiss waschen lassen. Der Schmutz, der unter die Epidermis gelangt ist, wird natürlich durch das Wasser kaum berührt. Am häufigsten findet man die Gänge bei kleinen Kindern auf der Haut der Sohlen, des Bautes und des Gesässes, sie kommen jedoch auch im Gesichte vor, was man bei Erwachsenen niemals beobachtet. Das consensuelle Exanthem ist bei ersteren immer viel ausgehörter und dichter als bei letzteren.

Ältere Kinder mit feiner Haut haben zuweilen excessiv grosserartige Pusteln, welche die Grösse einer halben Erbse erreichen und selbst noch übersteigen können. Es entleert sich beim Anstechen ein grosser Tropfen Eiter und gewöhnlich füllen sich diese Pusteln nach Entleerung dieses ersten Tropfens noch einigemal wieder. Sie hinterlassen meist dunkel pigmentirte, lange Zeit sichtbare Narben. Man hat diesen grosspusteligen Ausschlag auch die fette Krätze genannt.

Der Verlauf der Scabies ist bei Kindern immer ein sehr langwieriger, wenn nicht die geeignete Therapie eintritt, und kann sich auf Monate hinaus ausdehnen. Die Pusteln und Excoriationen werden dabei immer grösser und zahlreicher, die Unruhe immer anhaltender und die Abmagerung macht bedenkliche Fortschritte. Endlich, wenn fast die ganze Haut mit dicken Schuppen und Krusten bedeckt ist, scheint auch die spontane Heilung ohne direct antiscabiose Behandlung eintreten zu können.

Behandlung.

Die Behandlung scabioser Kinder unterscheidet sich wesentlich von der der Erwachsenen, und ist verschieden, je nachdem der consensuelle Ausschlag bloss aus Papeln oder auch aus Pusteln oder Geschwüren besteht. Bei kleinen Kindern, welche noch wenig kränken können, ist er gewöhnlich nur papulös, bei grösseren stellen sich zahlreiche, grosse Eiterpusteln ein.

Das souveränste Mittel, welches jetzt alle anderen vollständig verdrängt hat, ist der Balsam peruvianus 15,0. Man schmört damit die Kinder des Abends reichlich ein und setzt sie am anderen Morgen in ein Seifenbad. Zur vollständigen Tödtung der Milben genügt schon eine einzige, gründliche Eiuschabung, um ganz sicher zu gehen, wiederholt man aber dieselbe 2—3 Abende nach einander. Der peruvianische Balsam hat den Vortheil vor allen anderen Kratzmitteln, dass er nicht im Geringsten reizt und somit die Heilung der secundären Exantheme nicht stört. Unangenehm ist nur, dass die hierdurch verursachte Wäsche sich schwer reinigen lässt und lange Zeit braune Flecke behält, weshalb es zweckmässig erscheint, die Kinder mit alter, weisser Wäsche einzuhüllen.

Bei Kindern unter fünf Jahren wende ich lediglich dieses Mittel an, bei grösseren kann, wenn wenig Pusteln vorhanden sind, auch die gewöhnliche Solmie Flemingx, Schwefelcalciumlösung, in gleicher Weise wie der Perubalsam gebraucht werden. Mit den beiden obengenannten Medicamenten ist bei sorgfältiger Handhabung eine jede Krätze in 3—4 Tagen heilbar.

Es versteht sich von selbst, dass man in Familien, wo mehrere Glieder an Scabies leiden, zu keinem günstigen Resultat kommt, wenn man nicht alle zu gleicher Zeit einer entsprechenden, möglichst er-

gischen Behandlung unterwirft. In den unteren Klassen der Bevölkerung, wo nicht Wäsche genug zum Wechseln vorhanden und die Beschaffung der Bäder zu kostspielig ist, sind die Chancen für eine baldige Genesung sehr ungünstig und werden erst besser, wenn die älteren Glieder der Familie in einem Spital eine gründliche Cur durchgemacht haben.

12) Der angeborene Naevus, das Muttermal.

Nachdem der Naevus vasculosus, das Gefäßmal, die Teleangiectasie, schon bei den Krankheiten der Gefässe (pag. 307) abgehandelt worden, bleiben nur mehr die angeborenen Pigmentmäler, die Warzen und die angeborenen Fettgeschwülste zur Besprechung übrig.

Unter Pigmentmal, Fleckenmal, Spilus, versteht man rundliche oder mannigfache Figuren darstellende Hautflecken von verschiedener Farbe. Sie sind gelb, braun, schwarz oder grau, und schwanken zwischen der Grösse einer Erbse und einer flachen Hand, ja bedecken in manchen Fällen sogar einen grösseren Körpertheil, den ganzen Rücken, eine ganze Extremität. Die Farbveränderung rührt her von dem im Malpighischen Netz abgelagerten Pigmente. Zuweilen ist die Haut an diesen Stellen etwas gewulstet und höckerig, so dass das Mal über die gesunde Haut prominirt, und ziemlich häufig ist sie mit lockten Haaren besetzt, wodurch sie Aehnlichkeit mit dem braunen Felde eines Thieres bekommt. Nicht immer ist die Pigmentirung an allen Stellen des Naevus gleich vertheilt, bald ist die Peripherie, bald das Centrum heller. Es vergrössern sich diese Pigmentmäler niemals anders als im Verhältnisse des allgemeinen Körperwachstums und zuweilen wird sogar ein vorzeitiger Stillstand im Wachsthum beobachtet.

Unter Warzenmal versteht man höhere Prominenzen der Haut, welche durch Verlängerung der Papillen und Bindegewebsausbildung entstanden und gewöhnlich auch braun pigmentirt sind. Wie Simon zuerst angab, sind dieselben zuweilen halbseitig und erinnern in ihrer Ausbreitung an Herpes zoster. Diese neuropathischen Hautpapillome, auf welche Isid. Neumann neuerdings wieder aufmerksam gemacht hat, sind ziemlich selten. Ich erinnere mich in meiner 25jährigen Praxis nur zweier Fälle, welche beide nach wenigen Monaten spontan heilten. Von diesen angeborenen unterscheiden sich wesentlich die so häufig später entstehenden Warzen älterer Kinder. Diese letzteren bestehen aus einer Anzahl senkrecht stehender Zapfen der verlängerten Hautpapillen, welche von einer harten Epidermislage bedeckt sind. Sie sind nicht pigmentirt, entwickeln sich an den verschiedensten Stellen der Hände und des Gesichtes und verschwinden nach einigen Monaten als spurlos wieder, weshalb sie auch für die sog. Sympathiekuren, für Dummheit und Betrug, ein beliebter Gegenstand der Heilversuche geworden sind. Die zuerst geschilderten angeborenen Warzenmäler verschwinden niemals spontan.

Unter Naevus lipomatodes, Fettgeschwulst, versteht man rundliche oder cylindrische, mit normaler Haut bedeckte Fettauswüchse, welche meist gestielt sind, zuweilen aber auch mit breiter Basis aufsitzen. Sie gehören streng genommen nicht zu den Hautkrankheiten, weil die Cutis hierbei vollkommen unversehrt ist, sondern beruhen auf

einer abnormen Festwucherung des Unterhautfettes. Dieselben wachsen gewöhnlich im Verhältniss zum Körperwachsthum, in einzelnen Fällen aber auch schneller.

Therapie.

Bezüglich der totalen oder partiellen Exstirpation dieser verschiedenen Mäler und der dabei zu berücksichtigenden Cauteleu je nach ihrem Sitze verweisen wir auf die Lehrbücher der Chirurgie. Bei kleineren Nasen können die chirurgischen Eingriffe häufig vermieden werden, indem man die Vaccination in und auf denselben vornimmt. Die Einstiche der Impfadel müssen in diesem Falle so dicht neben einander gemacht werden, dass die daraus entstehenden Pusteln confluen.

Es erhebt sich hierauf am 7.—8. Tage der ganze Nasen in einer hohen, schmerzhaften Pustel, welche längere Zeit eitert und häufig ulcerirt, schliesslich aber meist eine rosaroth oder weisse Narbe zurücklässt. Wenn bei grossen Mälern auch nicht alles Pigment durch dieses Verfahren zerstört werden kann, so werden jedenfalls grössere pigmentlose Inseln in denselben erzeugt, welche spätere Operationen sehr erleichtern können.

Bei Kindern, welche schon geimpft sind, kann man durch fortgesetzte Localbehandlung mit Tartar. stibiatus oder Sublimat tiefe Pustelgeschwüre erzeugen, nach deren Heilung auch häufig weisse Narben zurückbleiben. Jedenfalls werden bei behaarten Mälern die Haarwurzeln hiedurch zerstört, was das Erschreckende derselben bedeutend mindert.

Bei den einfachen, nicht angeborenen Warzen grösserer Kinder, welche gewöhnlich in rascher Folge an verschiedenen Stellen emporknospeln, sind alle chirurgischen Eingriffe, Schneiden, Abbinden und Caustisiren unnöthig, indem sie eben so spontan wieder verschwinden, wie sie gekommen sind. Der innere Gebrauch kleiner Dosen kohlensaurer Alkalien oder der kohlensauren Magnesia soll das Abfallen der Warzen beschleunigen.

II) Verbrennung. Combustio.

Bei der Unzufahrenheit und Ungeschicklichkeit der Kinder kommen Brandwunden sehr oft vor und sind sogar sprichwörtlich geworden. Ein gebranntes Kind fürchtet das Feuer. Am häufigsten brennen sich die Kinder an den oberen Extremitäten und im Gesichte, am gewöhnlichsten an heissen Gefässen oder mit heissen Flüssigkeiten, Milch, Wurst oder Suppe. Es sind aus diesem Grunde die höheren Verbrennungsgrade, völlige Zerstörung und Schmelzbildung selten, und es kommt nur selten weiter als zur Blasenbildung.

Die Eiterung ist jedoch auch nach diesem geringeren Grade von Verbrennung sehr stark und langwierig und die Narben haben grosse Neigung sich zu contrahiren. Bei ausgebreiteter Verbrennung tritt sich schon am zweiten Tage eine enorme Reaction, heftiges Fieber, bei reizbaren Kindern von Convulsionen begleitet, ein. Gewöhnlich sind die allgemeinen Symptome nicht sehr heftig und schwinden bei geeigneter Lagerung und Behandlung des verbrannten Theiles in wenigen Tagen.

Behandlung.

Die richtige Behandlung richtet sich nach dem Grade der Verletzung. Die Schmerzen des einfachen Erythems werden am schnellsten durch Fettstreifen mit darauf folgender Wattebedeckung beseitigt. Kälte ist nur bei kleinen Erythemen rathlich und wird bei ausgebreiteten Verbrennungen von den erfahrensten Chirurgen, Walther, Nussbaum u. a. m., für gefährlich gehalten.

Grosse Blasen muss man durch feine Einstiche entleeren, darf aber ja die Epidermis hierauf nicht entfernen, indem sie schneller als alle Pflaster die Krusten- und Narbenbildung vermittelt. Bestreichungen mit concentrirter Höllesteinlösung 1:8 leisten in diesem Falle die besten Dienste. Bei ausgedehnt blossliegender Cutis sind sie sehr schmerzhaft. Bei Eiterung verbindet man anfangs mit Cerat, später mit Blei- oder Zinksalbe. Von Epidermis entblösste Flächen, z. B. zwischen den Fingern und Zehen dürfen sich nie berühren, sondern müssen durch Ceratlappen und Heftpflaster sorgfältig getrennt werden.

Die bei ausgebreiteten Verbrennungen zuweilen sich einstellende Diarrhöe wird am besten durch Opium gestillt. Die Behandlung der allgemeinen Symptome ist eine antiphlogistische, antifebrile. Gegen anhaltende Unruhe und Schlaflosigkeit ist wieder das Opium als souveränes Mittel zu empfehlen.

Bei tieferen Verbrennungen der Hände und Arme stellen sich mit der Vernarbung beträchtliche Verkürzungen der Sehnen ein, was man durch geeignete Streckverbände zu verhindern suchen muss.

10) Erfrierung. Congelatio.

So lange die Kinder noch nicht laufen können, kommen Erfrierungen der Extremitäten nicht leicht vor. Werden sie in so zartem Alter längere Zeit der Kälte ausgesetzt, so entsteht allgemeine Cyanose und die Kinder schlafen sehr schnell ein, um nicht mehr zu erwachen. Es mag dieses verbrecherische Verfahren wohl öfters ausgeführt werden, als es zu Ohren der Behörde kommt; denn der Nachweis an der Leiche ist kaum möglich.

Bei grösseren Kindern, welche schon gerne mit Schnee spielen und kalte nasse Füsse nur wenig respectiren, sind Frostbeulen im Winter ausserordentlich häufig zu beobachten. Man unterscheidet auch hier, wie bei den Verbrennungen drei Grade. 1. Grad: Röthung, leichte Schwellung, Jucken und Stechen, namentlich in der Wärme, *Pertuis*, die Frostbeule. 2. Grad: Blätige Blasen, welche zum Theil durch die Einwirkung der Kälte, zum Theil aber auch durch den Druck der Schuhe entstehen und desshalb vorzugsweise an den Zehen und Fersen vorkommen. 3. Grad: Gangrän der Hand oder ganzer Extremitäten. Die ersten beiden Grade sind es hauptsächlich, welche bei Kindern sich einstellen.

Behandlung.

Erfrierungen ersten Grades werden, wenn sie noch frisch sind, am besten mit Schnee einige Zeit gerieben. Bestehen dieselben schon länger, so ist deren rasche Beseitigung nicht möglich und das Uebel ist in der Regel so unbedeutend, als dass die Kinder deshalb Wechen

lang einer consequenten Cur unterworfen werden müßten. Mit Eintritt der warmen Jahreszeit vergehen die Peruvianen meist spottlos. Gegen das lästige Hautjucken haben sich Bepinselungen mit concentrirter Höllensteinlösung oder Jodtinctur als das erspriesslichste erwiesen. Als Volksmittel werden verschiedene Fette und Salben, gleiche Theile Talg und Brauntwein etc., besonders auch der Tischlerleim, von dem man zuweilen frappante Wirkung sehen kann, empfohlen.

Die toxischen, missfärbigen Geschwüre, welche im zweiten Grade aus den Blüthblasen entstehen, widerstehen der Heilung garman Zeit. Sie müssen öfter mit Höllenstein canterisiert und mit Digestivsalbe so lange fet verbunden werden, bis schöne rothe Granulationen im Niveau der gesunden Haut sich zeigen. Aller Druck muss natürlich fern gehalten werden.

Diese wären im wesentlichsten die Hautkrankheiten, welche in der Form oder Behandlung von denen Erwachsener sich unterscheiden. Alle übrigen, z. B. Favus, Ichthyosis, Pityriasis, Lichen, Zoster, Urticaria, Pellagra etc. verhalten sich bei Kindern ebenso wie bei Erwachsenen, weshalb sie hier keine weitere Berücksichtigung finden können. Von einzelnen entschieden dyskrasischen wird in den Abschnitten von der Syphilis und der Scrophulosis nach speciell gehandelt werden.

Es lag ursprünglich im Plane dieses Werkes, auch den Krankheiten der Bewegungsorgane, der Knochen und Muskeln ein eigenes Capitel zu widmen. Bei genauer Prüfung ergab sich aber, dass der größte Theil derselben rein chirurgisch-orthopädischer Hilfe bedarf, und dass die hierauf sich verlegenden Spezialisten schon eine grosse Literatur geschaffen haben. Wir müßten deshalb entweder sehr ausführlich werden oder uns begnügen, einen einfachen Anzug der neueren Chirurgie und zahlreichen orthopädischen Aufsätze zu liefern, und ziehen es daher vor, lieber gleich auf diese zu verweisen. Es gehörte in dieses Capitel die Hemmungs- und Missbildungen an Händen und Füßen, der Klumpfuß, Plattfuß, Pferdefuß, die Verkrümmungen der Wirbelsäule, die traumatischen Luxationen und Fracturen.

Bei der Beschreibung der Dyskrasien wird die Veränderung der Knochen durch Rhachitis und Scrophulosis gegeben werden.

8. Capitel.

Allgemeine Erkrankungen der Säftemasse. Dyskrasien.

1) Rhachitis. Englische Krankheit, Zweiwuchs, doppelte Glieder.

Unter Rhachitis versteht man eine Entwicklungskrankheit des Sceletus, als deren Hauptsymptom eine Abnahme der Kalksalze in den Knochen zu betrachten ist. Die ersten genaueren Angaben datiren aus der Mitte des siebenzehnten Jahrhunderts und wurden von den

englischen Aerzten Whistler, Best und Glisson gemacht. Es gingen nämlich um diese Zeit aus den verschiedensten Gegenden Englands Berichte über eine neue Kinderkrankheit ein, zu deren genauerer Erforschung eine Commission, bestehend aus den genannten Aerzten, gewählt wurde.

Seit jener Zeit wurde die Einsicht in den rhachitischen Process nur um wenig klarer, bis endlich vor 35 Jahren Elsässer die Rhachitis des Schädels entdeckte. Die pathologische Anatomie wurde durch die Untersuchungen Kölliker's, Virchow's und Hermann Meyer's bedeutend aufgeklärt und bereichert.

Pathologische Anatomie.

Zum richtigen Verständniß der rhachitischen Veränderungen muss das physiologische Wachsthum der Knochen in Kürze recapitulirt werden. Jeder Röhrenknochen wächst in die Länge und in die Dicke. In die Länge wächst er, indem sich zwischen dem Epiphysenknochen und dem Ende des Knochens immer neue Schichten von Knorpelzellen bilden, in welche sich dann Knochenmasse ablagert. In die Dicke wächst er in der Weise, dass sich unmittelbar unter dem Periost aus dem Gewebe, womit die Beinhaut an die Knochenoberfläche gekittet ist, neue Schichten von Knochenmasse ansetzen. Da das Wachsthum in die Dicke viel unbedeutender ist und langsamer von Statten geht als das in die Länge, so sind auch Störungen des physiologischen Wachsthums an den Knorpelenden viel auffällender und leichter ersichtlich.

Während der Knochen an seiner Aussenseite sich nach allen Richtungen vergrößert, indem sich neue Gewebselemente ansetzen, nimmt in dessen Innerem auch der Raum der Markhöhle an Umfang zu. Wir haben also nach aussen fortwährend Knochenneubildung, nach innen Knochenresorption. Der Femur eines Kindes kann mit Leichtigkeit in die Markhöhle desselben Knochens eines Erwachsenen hineingelegt werden, so dass, bis das Kind ausgewachsen ist, der ursprüngliche Kinderknochen jedenfalls vollständig regenerirt wird.

Das physiologische Wachsthum eines Knochens besteht also darin, dass

- 1) an seiner Oberfläche sich neue Gewebselemente ansetzen,
- 2) in denselben sich alsbald Verknöcherung einstellt und
- 3) im Centrum des Knochens Resorption stattfindet.

Das Wesen der Rhachitis besteht aber einfach darin, dass der erste und dritte Act vollkommen normal, der zweite jedoch nur unvollständig oder gar nicht von Statten geht, wodurch verschiedene, sehr auffällige Veränderungen seiner Farbe, Form und Consistenz zum Vorschein kommen.

Was die Farbe betrifft, so zeichnen sich die rhachitischen Knochen besonders durch dunklere Röthe, welche am Schädelknochen sogar in's Blaurothe spielen kann, aus. Je röther der Knochen, um so länger und intensiver hat der rhachitische Process schon gedauert. Auch an ein und demselben Skelet sind nicht alle Knochen gleichmäßig geröthet, sondern die einen sind dunkler, die anderen heller gefärbt, woraus allein schon hervorgeht, dass die Rhachitis kein einfacher, chemischer Process ist, sondern auf einem complicirteren, pathologisch vitalen Vorgange beruht.

Kein rhachitischer Knochen behält seine normale Form. Alle scharfen Kanten stumpfen sich hierbei ab, die Röhrenknochen verkürzen sich in allen Fällen, resp. wachsen nicht weiter mehr in die Länge, schwellen an den Epiphysen kolbig an, was am besten an den Sternalenden der Rippen zu studiren ist und krümmen sich nach verschiedenen Richtungen. Es kommen an den Röhrenknochen einfache Krümmungen z. B. regelmässig an den Rippen vor, sehr häufig aber erzeugen sich besonders an den Extremitäten wirkliche Fracturen oder genauer gesagt Knickungen. Wie wir bei der Untersuchung des Knochengewebes es noch ausführlicher schildern werden, enthalten nämlich bei vorgeschrittener Rhachitis die äusseren Knochenschichten so wenig Kalksalze, dass sie gar nicht mehr im Stande sind, vollständig zu brechen.

Die inneren, der Markhöhle zunächst gelegenen Partien des Knochens, welche schon vor Eintritt der Rhachitis verstanden waren, können allerdings brechen und brechen wegen ihrer Verdünnung in Folge der von innen fortschreitenden Resorption auch sehr häufig, die äusseren weichen jedoch, welche nur knicken aber nicht sich trennen können, gestatten kein Auseinanderweichen der Bruchenden. Die nach Art eines Federkiesels oder einer Weidenruthie geknickten Knochen der Extremitäten heilen dann immer in einem stumpfen Winkel, was durch das Ubergewicht der Flexoren sich erklärt. Die Spitze des Winkels am Vorderarm sieht in diesem Falle nach aussen und vorne, die des Oberarms fast gerade nach aussen, die des Oberschenkels nach vorne und aussen, und die der Tibia, welche gewöhnlich nahe am Fussgelenk knickt, gerade nach vorne.

Durchsägt man nach vollendeter Heilung eine solche Intrusion der Länge nach, so findet man an der convexen Fläche nur compacte, an der concaven eine breite Schichte spongiöser Substanz. Die Markhöhle ist an der Stelle des Bruchs durch dicke Knochenwucherungen, die sich später wohl wieder verdünnen, aber niemals mehr vollständig verschwinden, gänzlich verschlossen. Wir werden bei der Symptomatologie noch ausführlicher auf die Formveränderungen der einzelnen Scapelltheile zurückkommen.

Sehr auffallend ist die Abnahme der Consistenz bei rhachitischen Knochen. Man kann ohne besondere Anstrengung leicht Einschnitte, bei sehr entwickelter Krankheit sogar vollständige Durchschnitte machen, ohne dass das Messer hindurch Scharren bekäme. Diesem wären die grösseren pathologisch anatomischen Merkmale eines rhachitischen Knochens.

Untersucht man nun ein so erkranktes Skelet genauer, so ergeben sich folgende, an allen Knochen mehr oder weniger erkennbare Veränderungen: Das Periost ist dicker als gewöhnlich, an vielen Stellen mäßig getrübt, von rosenrother Farbe. Versucht man dasselbe von Knochen abzuheben, so bleiben kleine, zuweilen selbst grössere, dunkelrothe Knochenfragmente daran hängen, und der Knochen ist immer dunkelroth und von besonders rauher Oberfläche. Man beobachtet dieses Verhalten des Periosts am deutlichsten an dem Stirnbein bei Craniotabes. Das Schädeldach lässt sich in diesem Falle sehr leicht durchsägen oder gar mit dem Messer abschneiden, an dem hinteren Partien jedoch kann die Säge gar nicht in Anwendung kommen, in-

dem die zur Dünne eines Kartenblattes geschwundenen Stellen nachgeben, der Säge anweichen und bei fortgesetzten Sägezügen unregelmäßig zerreißen. Aus der vorderen Hälfte des Durchschnittes, den Stirnbeinen, sickern kleine Tropfen eines häutigen Serums aus, der Durchschnitt der Seldäfen- und Parietalknochen ist schon trockner und der des Hinterhauptes ist von einer hellroten Farbe ohne eine Spur häutigen Serums. Die Stirnbeine sind immer etwas, oft um das Doppelte, verdickt, ebenso die Seitenwandbeine, vornehmlich ihre vordere an die Kronenwabt anstossende Parthie, die hintere hingegen ist ebenso dünn verdünnt als normal. Gegen die Lambdannaht und auf dem Durchschnitt des Occiput trifft man häutige, bewegliche Stellen von gelbröthlicher Farbe. Der übrige nicht ganz geschwundene Knochen ist untermhältnissmässig dünn, von heller Farbe und enthält gar keine spongiöse Substanz. Hält man das Schädeldach gegen das Licht, so überblickt man mit einem Blicke die Ausdehnung und den Grad der Verdünnung, den die Basis des Schädels, die Cranistabes erreicht hat.

Betrachtet man das Schädeldach von innen, so findet man lediglich am Hinterhaupte den Impressiones digitatae ähnliche Eindrücke, die jedesmal einem Gyrus entsprechen und eine Verdünnung der Knochen-substanz, einen Knochenschwund bedingen. Zuletzt berühren sich die dura mater und das Pericranium, wodurch im getrockneten Präparate die knöchernen Hüllen durch einfache, häutige Membranen unterbrochen erscheinen. Zuweilen sieht man in diesen, den getrockneten Fontanellen gleichenden Membranen noch einzelne weisse, undurchsichtige Punkte, die sich bei näherer Untersuchung als Reste der noch nicht ganz resorbirten Knochenerde herausstellen. Ellisser hat in seiner bahnbrechenden Abhandlung „der weiche Hinterkopf“ eine Schädelkappe mit circa 30 Löchern abgebildet, was schon zu den exquisitesten Fällen gerechnet werden muss. Das Pericranium ist überall, wo es die Löcher überzieht, sowie in deren Umgebung undurchsichtig und verdichtet. Taf. VI. Fig. 4.

Der ganze Process des weichen Hinterkopfes lässt sich in zwei Acten zusammenfassen:

- 1) Die gewöhnliche, mangelhafte Phosphatablagerung in den äusseren Knochenschichten des ganzen knöchernen Schädels und
- 2) Resorption der durch die Schwere des Gehirnes gedrückten, erweicheten Knochenparthieen des Hinterhauptes.

An den Epiphysen der Röhrenknochen sind weitere charakteristische Merkmale zu beobachten. Auf einem Längsdurchschnitt durch den aufgetriebenen Gelenkkopf, z. B. des Oberschenkel, sieht man eine viel mächtigere Knorpelschichte als im Normalzustande Taf. VI. Fig. 1—3a und die Lamie zwischen Knochen und Knorpel ist statt gerade sehr verschieden wackig und wellenförmig, Taf. VI. Fig. 1—3b. Die Spitzen der vom Knochen in den Knorpel sich erhebenden Wellen sind stark incisirt und markiren sich scharf von dem bläulichen Knorpel ab. Die mikroskopische und chemische Untersuchung der breiten, bläulichen Uebergangsschichte zwischen Knochen und Knorpel lehrt, dass wir es mit einem in der Verkalkung zurückgebliebenen Knochen zu thun haben, in welchem sich gar keine Knochenkörperchen und überhaupt nur geringe Spuren von Kalkablagerung finden.

An den Diaphysen der Röhrenknochen treten ebenfalls bedeutende

Veränderungen auf. Das Periost ist beträchtlich verdickt und lässt sich nicht glatt vom Knochen abziehen, sondern reißt immer wieder an seiner Innenfläche haftende, poröse Knochenfragmente mit. Unmittelbar unter dem Periost finden sich breite, weißliche oder rüthliche Schichten, an welchen man einen fein porösen, himmelsteinartigen Bau erkennt.

Nach Virchow stoßen die Balken dieser himmelsteinartigen Masse als senkrechte Radien auf der Knochenfläche. Noch tiefer sieht man diese Radien durch eine erst weisse und dorbere Linie von Rindenschicht, welche der Knochenoberfläche parallel ist, unterbrochen. Dann folgt eine neue Lage himmelsteinartiger, rüthlicher Masse mit stärkeren Radien, die wieder durch eine compactere Parallellage durchsetzt wird. So wiederholen sich diese Schichtungen verschieden oft, nur werden, je näher der Markhöhle, die Radien der spongioösen Lage immer dicker und ihre Zwischenräume grösser und rüthler, während die Parallellagen compacter und fester werden.

Der rachiitische Röhrenknochen ist unmittelbar unter dem Periost am weichsten und porösesten und wird gegen das Centrum zu immer fester. Aus der Verdickung des Periostes und dem Weichbleiben der äusseren Schichten erklärt sich auch der sonderbare Verlauf der Fracturen und die Unmöglichkeit, hierbei wirkliche Verwachsung der Bruchenden und Crepitation zu entdecken. Dies sind die wesentlichsten Angaben über die pathologische Anatomie der Knochenveränderung. Am ausführlichsten und gründlichsten werden dieselben von Virchow geschildert in dessen Archiv Bd. 5.

Die chemische Untersuchung rachiitischer Knochen hat stets eine bedeutende Verminderung des phosphorsäuren und kohlensauren Kalks ergeben, so dass die Knochenmasse statt $\frac{2}{3}$ oft nur $\frac{1}{3}$ des getrockneten Knochens ausmacht. Im Harn hingegen findet man die Phosphate um das Drei- bis Fünffache vermehrt.

Man hat sich diese Zunahme der Phosphate im Harn und die Abnahme in den Knochen leicht zu denken, als ob in den Knochen schon deponirte Salze wieder gelöst und dann durch den Urin ausgeschieden würden. Die in den Knochen schon ausgeschiedenen Salze bleiben in denselben, nur eine geringe Quantität mag in Folge der Resorption zunächst der Markhöhle wieder in den Kreislauf kommen — die neuen Vergrösserungen aber im Länge- und Dickendurchmesser erhalten keine Knochenmasse mehr und die mit den Nahrungsmitteln eingeführten Kalksalze finden deshalb keine Verwendung im Organismus, sondern werden sogleich durch den Harn wieder ausgeschieden.

Warum die Ablagerung der Kalksalze in die Knochen mit einem Male total aufhört, ist noch in ein vollständiges Dunkel gehüllt, nur so viel ist gewiss, dass wir es mit keiner einfachen chemischen Wiederauflösung des schon fertigen Knochens durch eine Säure zu thun haben, indem sonst das Gewebe desselben an allen Stellen, an der Peripherie und im Centrum gleich arm an Knochenmasse sein müsste, was durchaus nicht der Fall ist. Die der Markhöhle der Röhrenknochen näher liegenden Schichten sind viel compacter und weisser als die peripherischen.

Untersucht man das Skelet mehrjähriger Kinder, welche der Rachitis überstanden haben, so findet man die Knochen noch mässig

sch gekrümmt, den Schädel gross, sein Dach verdickt und die einzelnen Knochen auffallend schwer an Gewicht. Alle die weiche, spongiöse Knochenmasse, welche sich während der Rhaschitis angesetzt hatte, ist zu dichtem, compactem Knöchengewebe geworden und es übersteigt diese nachträgliche Ossification an Härte noch die normale Knochenbeschaffenheit, weshalb man sie auch Sclerosis und in den exquisitesten Fällen sogar Eburnatio genannt hat.

In den übrigen Organen findet man keine constanten Veränderungen, nur die Lungen zeigen in allen Fällen von beträchtlicherer Thoraxrhachitis erworbene Atelektase und starken Bronchialcatarrh, wofür schon im Capitel der Lungenkrankheiten pag. 254 ausführlicher gesprochen wurde. Die Muskeln sind blass und welk und lassen an verschiedenen Stellen, namentlich auch am Herzen beginnende Fettdegeneration erkennen. Die Leber zeigt häufig einen beträchtlichen Reichthum an Fett.

Symptome.

Die Rhaschitis entwickelt sich meist ziemlich acut, und zwar zuerst bis des Kopfes, immer vor Schluss des ersten Lebensjahres, dann die der Rippen einige Wochen nach beginnender Schädelrhachitis erkennbar und zuletzt die der Extremitäten, des Beckens und der Wirbelsäule.

Man hat früher ein eigenes Vorläuferstadium angenommen und hiesi gestörte Verdauung, Skoro der ersten Wege und überhaupt fehlerhafte Beschaffenheit der Excrete mit allgemeinem Unwohlsein gerechnet. Es muss hiagegen erinnert werden, dass man vor Entdeckung des weichen Hinterkopfes durch Elsässer 1834 die Anfangszeit der Rhaschitis gar nicht gekannt hat, und dass nun die meisten Zeichen des Vorläuferstadiums weit in die Krankheit selbst hineinfallen.

Die Rhaschitis ist eine sichtbare und greifbare Krankheit, und es ist deshalb nötig, die bei Lebzeiten sich ergebenden Veränderungen der einzelnen Körpertheile näher zu untersuchen.

A. Rhachitis des Schädels.

Die Schädelrhachitis mit ihrer eigenthümlichen Erscheinung des weichen Hinterkopfes ist eine Entdeckung Elsässers. Vor Veröffentlichung der Elsässer'schen Arbeit hatte unbegreiflicher Weise kein Arzt eine Abnung von den so grossen und leicht zu untersuchenden Veränderungen des Hinterkopfes. So sagt z. B. Neumann: Nie erweichen die Kopfknochen durch Rhachitis, im Gegentheil, sie wachsen sogar oft auf Kosten anderer Körpertheile; Miescher: Alle Knochen erweichen, nur der Kopf nicht, vielmehr entstehen an ihm anderweitige Veränderungen, sein Wachsthum nimmt nämlich über die Maassen zu; Schnitzler und Wolff: Die Kopfknochen erweichen nie, sie wachsen sogar, scheinbar auf Kosten des Wachsthums aller anderen Theile.

Ueber die allgemeinen Veränderungen am rhachitischen Schädel ist Folgendes zu berichten:

Die grosse Fontanelle, welche sich bei einem normalen Kinde spätestens bis zum Schlusse des zweiten Jahres schliesst, bleibt hier 3—4 Jahre offen und kann sogar bis in's sechste knorpelige Textur behalten. Die Pfeilnaht, die wir sonst schon zu Ende des ersten Jahres geschlossen finden, ist oft im dritten Jahre noch nicht ver-

wachsen. Die Kränznaht bleibt statt vier Monate zwei Jahre, und die Lambdanaht statt drei Monate $1\frac{1}{4}$ Jahr geöffnet. Rapa hat genaue Messungen des Schädels angestellt; die Längen- und Querdurchmesser zeigten nur geringe Abweichungen vom Normalen, allein das eigenthümliche, eckige Hervorstehen der Stirn- und Scheitellöcher raubt dem Schädelsgewölbe die gewöhnliche Kugelform und gibt ihm eine viereckige, unbeholfene Gestalt (*tête carrée*).

Längs der Kränznaht bildet sich nach Ablauf der Krankheit gewöhnlich eine Vertiefung, die dem Schädelhabe, von oben betrachtet, die Form eines Flaschenkürbisses verleiht und von einer Hypertrophie der Stirnbeine herrührt. Es entstehen überhaupt durch die Klammern mannigfache Gruben und Höcker, die der Cranioscopie ein weites Feld der Discussion eröffnen können.

Der weiche Hinterkopf kommt schon vom dritten Lebensmonat an vor und wird nur selten bei Kindern, welche das zweite Jahr überstanden haben, mehr aufgefunden. Constante Vorboten lassen sich nicht angeben. Es haben wohl viele Kinder einen Bronchial oder Darmcatarrh vorher durchgemacht, andere aber erfreuen sich bis zum Eintritt der Craniotabes des besten Wohlbefindens, sind gut genährt, fröhlich und munter.

Die Krankheit beginnt mit profusen Kopfschweissen, die oft das ganze Kissen durchnässen, und zugleich macht sich eine gradatim zunehmende, nächtliche Unruhe bemerklich. Kinder, die sonst mehrere Stunden ununterbrochen im Schlafe lagen, wachen nun alle Viertelstunden mit Weinen, Reiben des Kopfes und Bohren in das Kissen auf. Eine Lageveränderung des Kopfes beruhigt sie schnell, doch immer nur auf kurze Zeit. Das beständige Reiben verräthet eine complete Kallheit des ganzen Hinterhauptes.

Nach einiger Zeit nimmt auch bei Tage die Weinerlichkeit und Unzufriedenheit zu, und aufmerksame Kindermütter beobachten bald, dass das ganze Unbehagen sich nach den verschiedenen Stellungen des Kopfes richtet. Die Kinder schreien nämlich unter Reiben und Bohren mit dem Kopfe beständig, wenn man sie horizontal auf beide Arme stützt, um sie zu füttern oder einzuschlafen, werden hingegen schnell wieder ruhig, wenn man sie aufhebt und das Hinterhaupt von allem Drucke befreit. Sie lassen sich dann mit grosser Wohlbelagen füttern und ziehen es auch vor, das Gesicht auf die Schulter der Wärterin gestützt, mit freiem Hinterhaupte einzuschlafen. Die meisten Kinder werden in dieser Lage sogleich ruhig; etwas ältere drehen sich in ihrem Bettchen gerne auf den Bauch und bohren mit der Stirn in's Kissen.

Bei näherer Besichtigung des Schädels fällt der schwache Harwuchs überhaupt und die Kallheit des Hinterhauptes insbesondere auf. Das Hinterhaupt ist meist abgeflacht und die Tubera sind eckiger als gewöhnlich. Zum Behufe einer genaueren, manuellen Untersuchung nimmt man das Hinterhaupt auf beide Hände und beginnt nun mit den Fingerspitzen zu tasten.

Ich untersuche die ganze Hinterhauptsgegend vom Lambdastachel bis zu den Zitzenfortsätzen mit allmählicher Beugung der Fingerspitzen zweimal. Das erste Mal darf der Vorsicht halber nur ein ganz gelinder Druck mit flachem Finger ausgeübt werden, um, wenn gross

sehr weiche Stellen sich vorfinden, keine zu grosse Gewalt auf das ungeschützte Gehirn auszuüben. Das zweite Mal berge ich die Finger etwas mehr und drücke nun derb auf alle einzelnen Stellen des ganzen Occiput und der Parietalknochen. Durch dieses Verfahren wird auch die kleinste linsengrosse Verdünnung und Eindrückbarkeit sicher und rasch entdeckt.

Die eindrückbaren Stellen finden sich am häufigsten, linsen- bis linsengross, in der Nähe der Lambda- und dem hinteren Theile der Pfeilhaut vor und unterbrechen zuweilen die Contur der Nähte. Nur die Protuberantia externa oss. occipit. bleibt immer verschont. Die erkrankten Knochenparthien sind elastisch, lassen ihre ursprüngliche Convexität in eine ebenso grosse Concavität verwandeln und fühlen sich wie ein Kartenzblatt auf hohler Unterlage oder eine aufgeblasene, getrocknete Schweinsblase an. Der Schmerz ist bei einer nicht zu vehementen Untersuchung von keiner Bedeutung.

Als häufigste Complication sind Krämpfe der verschiedensten Muskelparthien zu erwähnen. Am öftesten und gefährlichsten ist der Spasmus glottidis, dessen tatsächlicher, jedoch keineswegs physiologisch erklärter Zusammenhang mit Craniotabes schon pag. 232 ausführlich erörtert wurde.

Ausser am Schädeldache macht die Rhaschitis sich hauptsächlich noch an den Kieferknochen bemerkbar. Die Zähne bleiben im Wachsthum zurück, so dass die Kinder zwölf und achtzehn Monate alt werden, bis die ersten Schneidezähne durchbrechen. Nachdem dieselben endlich zum Vorschein gekommen, werden sie alsbald wieder schwarz und zertrümmelt wegen Mangels an Schmelz. Fehlt der Schmelz vollständig, so verschwindet auch der Zahn bis zum Niveau des Zahnbettes, zuweilen fehlt er nur an der Spitze und es begrenzt sich nur die Schwärze da, wo der Schmelz anfängt. Die physiologischen fünf Zahnperioden (pag. 11) halten die rachitischen Kinder niemals gehörig ein. Am Schlusse einer jeden Zahnperiode ist die Zahl der Zähne bekanntlich eine gerade. Wenn demnach ein Kind länger als acht Wochen auf einer ungeraden Zahl von Milchzähnen stehen bleibt, so kann man mit Bestimmtheit eine Unterbrechung der begonnenen Zahnperiode annehmen, und diesen Befund bei Abwesenheit anderer Ursachen, chronischer Darmstärche, foliöser Krankheiten etc., auf Rhaschitis beziehen. Zur Zeit der zweiten Dentition ist die Rhaschitis längst abgelaufen, weshalb an den bleibenden Zähnen dergleichen Erscheinungen nicht beobachtet werden.

Das stellenweise Fehlen des Zahnschmelzes bei älteren Kindern soll nach Angabe mehrerer Autoren vom Gebrauche der Queckilberpräparate, namentlich des Calomel, beruhen. Sollte sich in Wirklichkeit statistisch nachweisen lassen, dass die Mehrzahl dieser Kinder Calomel bekommen haben, so müsste in Zukunft die Indication desselben in engere Grenzen gezogen werden.

R. Rhaschitis des Thorax.

Schon Glisson und seine Zeitgenossen erkannten in der Hühnerbrust richtig den rachitischen Process, und die späteren Autoren beschäftigten sich viel mit ihrer Entstehungsweise, so dass wir viel ausführlichere Angaben über die Thoraxrachitis als über Craniotabes haben.

Sie stellt sich gewöhnlich etwas später als der weiche Hinterkopf ein, und es erkranken an ihr noch viele Kinder, die letzteren glücklich entgangen sind und schon aufrecht getragen werden. Deutlich greifbare Veränderungen beobachtet man selten bei Kindern unter sechs Monaten, während man die Craniotabes oft schon im dritten Lebensmonat nachweisen kann. Wenn einzelne Compenden lehren, die Hühnerbrust erstände vom ersten bis vierten Jahre, so ist das so zu verstehen, dass man auch noch vierjährige Kinder mit diesem Uebel zu Gesicht bekommt. Nach vollendeter erster Dentition von aber bei einem bisher intacten Kinde keine Rhachitis mehr auf.

Das erste Symptom der Rhachitis der Rippen ist ein deutlicher Schmerz bei Berührung oder Druck auf die Thoraxwandung. Die Wartfräusen klagen häufig: „Das Kind schreit jedesmal, wenn wir es auch noch so sanft aufheben.“ Man gibt gewöhnlich von ärztlicher Seite auf solche Angaben nicht viel, weil die meisten derselben auf Vorurtheilen und unrichtigen Anschauungen beruhen. Die Häufigkeit dieser Klagen fiel mir jedoch schon vor langer Zeit auf und ich überzeugte mich selbst zu wiederholten Malen, dass viele Kinder zwischen dem fünften und zehnten Lebensmonate plötzlich schmerzliche Schreie ausstossen, wenn man sie mit beiden Händen unter die Achseln greift und sanft aufhebt. Sobald man sie hinlegt, beruhigen sie sich schnell wieder. Man braucht sie übrigens gar nicht aufzuheben, ein leichter Fingerdruck in die Achselhöhle oder die Seitenfläche des Thorax überhaupt genügt zur Erzeugung des Schmerzes. Hebt man ein solches Kind, mit einer Hand den Hals, mit der anderen das Becken stützend, sanft auf, so bleibt es ruhig, als ob es auf dem Kissen läge, und gestattet einen schmerzlosen Wechsel seiner Unterlage.

Zu dieser Zeit ist am Sternalende der Rippen, auf der Grenz zwischen Rippenknorpel und Knochen, noch gar keine oder nur eine unbedeutende Anschwellung zu fühlen. Erst nach einigen Wochen treten die Sternalenden der Rippen köllig abgerundet hervor und sind dem Finger, später auch dem Auge deutlich erkennbar. So entstehen an beiden Seiten des Thorax am Ende der Rückenknorpel zwei regelmässige Reihen von Knöpfen, der sog. rhachitische Rosenkranz. Die ausserlich schon deutlich fühlbaren Knöpfe ragen an der Innenfläche der Rippen als noch viel grössere, erbkige Knoten in das Brustum hinein.

Haben diese Anschwellungen der Sternalenden einmal längere Zeit bestanden, so erfolgt in allen Theilen eine Missbildung des Thorax. Das ebenfalls weich werdende Sternum entfernt sich mehr und mehr von der Wirbelsäule und wölbt sich nach aussen, der Schwertfortsatz wird sehr beweglich, steht nach aussen und begrenzt eine tiefe Grube im Scrobicula cordis. Bei den höchsten Graden der Hühnerbrust gehen die Rippenknorpel unmittelbar hinter dem Brustbein gerade nach hinten, so dass sie verlängert die Querfortsätze der Wirbelsäule treffen würden, und die Rippen bilden an ihrem vorderen Ende statt einer Convexität eine Concavität.

Der Durchmesser des Thorax wird kleiner von einer Seite zur andern und grösser von vorne nach hinten, wie aus einem schematischen Querschnitt Taf. V. Fig. 2 erhellt. Der Querschnitt des Thorax nimmt die Gestalt einer Birne, deren Stiel in das Ster-

zum gelacht wird, an. Der rachitische Rosenkranz findet sich hauptsächlich von der zweiten bis achten Rippe, die falschen Rippen werden rechts durch die Leber, links durch den Magen und die Milz mächtig herausgedrückt. Der Bauch ist in Folge des constanten Meteorismus und einer Verkürzung und Krümmung der Wirbelsäule zu einer grossen Kugel angeschwollen, auf welcher der Thorax gleich einer dreiseitigen abgestumpften Pyramide, eine Kante gerade nach vorne gerichtet, aufsteht. Die Wirbelsäule krümmt sich in sitzender Stellung am meisten und es tritt desshalb auch in dieser Position die Kugelform des Abdomens am auffälligsten hervor. Legt man diese Kinder auf den Bauch und hebt sie in dieser Lage mit zwei Händen auf, so verschwindet die Krümmung nach aussen vollständig und die Wirbelsäule nimmt wieder ihre normale Form an. Bei Vernachlässigung und mehrjährigem Bestehen der Rachitis tritt endlich auch bleibende Bogen-, niemals Angularverkrümmung der Brustwirbel nach hinten und seitwärts ein.

Die Entstehung der Hühnerbrust erklärt sich theils durch den Druck der äusseren Luft auf die weichen Rippen, theils durch den Zug des Diaphragmas, dem dieselben als Insertionen dienen. Nach Verlust der gehörigen Festigkeit können die erkrankten Rippen den fortwährenden Zerrungen nach innen nicht mehr widerstehen.

Durch die Rachitis des Thorax entsteht also 1) eine Veränderung der Form der Rippen und 2) was als das Wichtigere zu betrachten ist, ein Stillstand im Längenwachsthum und somit unabweichend eine Verkleinerung des Brustraumes. Die Erkrankung der Lungen, die erworbene Atelektase hat hierin ihren trüffigen Grund, wie solches schon ausführlich pag. 254 erörtert worden ist.

Die Prognose richtet sich ausschliesslich nach der Erkrankung der Lungen. Wenn ein grosser Theil derselben atelectatisch, anwegsam geworden, so genügt natürlich ein unbedeutender Catarrh im restirenden, normalen Gewebe, die grösste Athemnoth, Erstickungsanfälle und den Tod herbeizuführen. In der That ist auch in diesem Umstande die gewöhnlichste Todesursache rachitischer Kinder, wie schon Ramberg, Guersant und Andere bemerkt haben, zu suchen.

C. Rachitis des Beckens und der Extremitäten.

Das Becken verkrümmt sich erst, wenn das rachitische Kind gehen kann, und zwar entweder in Folge einer Scoliosis oder einer Ungleichheit der unteren Extremitäten nach Art der Beckenverschiebung bei Coxarthrocace. Die wichtigsten Consequenzen dieser Veräufierung für das weibliche Geschlecht finden in der Geburtshilfe eine genügende Erörterung. —

Die Rachitis der Extremitäten wird zuerst an einer Anschwellung der Epiphysen des Radius und der Ulna am Handgelenke erkannt. Die Anfangszeit fällt etwas später als die der Rippen, in die letzten Monate des ersten Lebensjahres. Den Grad der rachitischen Erkrankung erkennt man immer am deutlichsten am Handgelenk, weil hier die Epiphysen im Normalzustand fast gar nicht prominiren und bei ihrer oberflächlichen Lagerung leicht untersucht werden können.

In der Leiche findet man die unteren Extremitäten ebenso stark rhachitisch als die oberen, da aber hier auch bei gesunden Kindern am Knie- und Fußgelenk bedeutende Verdickungen vorkommen, so verursacht die Rhachitis keine so auffallende Formveränderung als an Handgelenken. Wenn es freilich einmal zu Krümmungen und Knickegängen gekommen, so erkennt man die Rhachitis der unteren Extremitäten schon am Gange, ohne die Kinder vorher erklären zu müssen. Die Knöpfe an den Enden der rhachitischen Röhrenknochen stellen eigentlich deren Längenwachsthum vor. Es setzt sich an den Epiphysen immer neuer Knorpel an, die Verkröcherung der neu angesetzten Masse kommt aber nicht zu Stande und so wird der weiche Knorpel durch den Zug der Muskeln und den Druck, welchen die Knochen auf einander ausüben, breit gedrückt. Die Knochentrennung wird in der Folge immer ausgesprochen, indem sich nun wieder neuer Knorpel in der vor gegebenen Richtung ansetzt.

Aus diesem Aufhören des Längenwachthums resultirt ein verhältnismäßiges Kleinbleiben aller Röhrenknochen. Dasselbe giebt sich am deutlichsten an den Rippen zu erkennen und hat eine Obsolescenz grösserer Lungenparthien, die erweichte Atelektase, zur Folge. Die Verkürzung der unteren Extremitäten ist nach Jahre lang nach bestandener Rhachitis bemerkbar, und solche Kinder sind immer kleiner als ihre gesunden Altersgenossen.

Die einfachen Verkrümmungen gleichen sich im Laufe der Jahre wieder aus, die Hüftverkrümmung kann sich vollständig wieder auflösen und die krummen Säbelbeine können wieder nahezu gerade werden. Die Infracturen aber hinterlassen eine lebenslängliche Formveränderung.

Was die Functionen der rhachitischen Extremitäten betrifft, so bleiben dieselben sehr zurück. Solche Kinder lernen erst im zweiten oder dritten Lebensjahre stehen und noch später laufen. Zuweilen kommt es vor, dass Kinder, welche schon allein stehen konnten, die Rhachitis noch acquiriren. Ihre Beinchen sind dann nicht mehr im Stande, die Körperlast zu tragen, und solche Patienten schmerzhaft erst nach vielen Monaten ihre Geh- und Stehveruche wieder auf.

Die Rhachitis ist nahezu die einzige Krankheit, welche die Kinder so langsam auf die Beine kommen lässt. Mögen die Kinder im ersten Lebensjahre auch noch so kränklich gewesen sein, sobald sie sich einmal erholt haben und nicht rhachitisch geworden sind, was freilich sehr häufig sich ereignet, fangen sie dennoch spätestens mit achtzehn Monaten an zu stehen.

Die Entstehung der Infracturen konnte ich einmal genau beobachten. Ein vier Monate altes Kind bekam Convulsionen, ich untersuchte das Skelet genau und fand die Röhrenknochen gerade, jedoch einen rhachitischen Rosenkranz und am Handgelenke angeschwollene Epiphysen. Nachdem sich die Convulsionen in der Nacht gelöst hatten, waren am folgenden Tage ein Vorderarm und ein Unterschenkel, beide am unteren Dritttheil, in einen stumpfen Winkel geknickt, die Umgebung etwas geschwollen und insofern schmerzhaft. Die Bruchenden crepirten natürlich nicht, waren jedoch in geringem Grade beweglich. Die Bezeichnung „Bruchenden“ passt streng genommen hier nicht, indem gar keine vollständige Continuitätstrennung, sondern nur eine Knicung zu Stande gekommen ist.

So viel von den Symptomen, welche durch die Veränderung der Knochen bedingt werden. Ausser diesen besonders charakteristischen Zeichen finden sich aber auch noch andere nicht minder constante in anderen Organen. Mit dem Erscheinen der Rhachitis oder einige Zeit nachher treten regelmässig heftige Kopf-, dann allgemeine Schwellen ein, in Folge deren mehrfache Hautkrankheiten sich entwickeln. Es bilden sich wirkliche Sudamina, oder noch häufiger die sog. Sudamina ruhs, ganz kleine, trübe Bläschen mit rothem Hofe, welche so dicht stehen, dass oft der ganze Rumpf und die Bogenlinie der Extremitäten geröthet und feinblöckerig erscheint. Später, wenn die Kinder anfangen abzunehmen, erbläut die Haut, bedeckt sich mit einem kleinartigen, squamösen Exanthem und die Schweisssecretion sistirt fast vollständig.

Die Bänderapparate, namentlich das Kapselband des Hüftgelenkes, sind ausserordentlich erschlafft, so dass die Kinder leicht ihre Füße in's Gesicht bringen können und mit besonderer Verliebe die Zehen in den Mund nehmen.

Im Bereich der Respirationorgane finden sich sehr häufig die Glottiskrämpfe, deren schon bei der Craniotabes gedacht wurde, und constant Bronchialcatarrhe, welche bei zunehmender Carnification einzelner Lungenpartirien sich ebenfalls beträchtlich steigern.

Die Verdauung kann während der ganzen Krankheit sehr wohl intact bleiben; stellen sich aber Diarrhöen ein, so verschlimmert sich sowohl der Knochenprocess als das Allgemeinbefinden in bedenklicher Weise. Es ist eine merkwürdige Erscheinung, dass kleine, hochgradig rhachitische Kinder mit verminderter Esslust dennoch den Leberthran vertragen und während dessen Anwendung sogar eine bessere Verdauung bekommen.

Noch einige Worte über den Zusammenhang unserer Krankheit mit Tuberculose und Scrophulose. Man pflegte früher die Rhachitis „die Scrophulose der Knochen“ zu nennen und betrachtete sie als eine der vielen Localisationen der scrophulösen Dyscrasie. Erst Ruff bewies durch zwanzig Krankengeschichten und Sectionen rhachitischer Kinder, dass die Mehrzahl derselben gar nicht scrophulös war, und seit jener Zeit lernte man mehr und mehr die Rhachitis als eine selbständige Allgemeiterkrankung betrachten.

Sie ist nach meinen mannigfachen Beobachtungen an vielen Hunderten von Fällen eine ganz unabhängige Krankheit, die man in einem gewissen Alter und unter gewissen Bedingungen fast willkürlich an jedem Kinde, an einem mehr, an andern weniger hervorrufen kann. Scrophulöse Kinder acquiriren sie nicht öfter als gesunde, und wenn in Mischen nur selten in einem Individuum Rhachitis und Scrophulose vereint vorkommen, so ist das ein Beweis, dass die Mehrzahl der Kinder dieses Alters nicht scrophulös ist.

Aetiologie.

Ueber die Ursachen der Rhachitis existiren auffallend wenig sichere Daten. Bei einer grösseren Zahl von Kranken ist die Erblichkeit nicht zu verkennen. Ich kenne mehrere Familien, deren Kinder bei aller möglichen Sorgfalt und rationalen Prophylaxis stets in einem gewissen Alter rhachitisch werden und Jahre lang es bleiben. Vater und Mutter zeigen gewöhnlich die eigenthümliche rhachitische Schädelform mit den

stark prägnirenden Stirn- und Scheitelbeinhöckern. Elsässer und Andere führen ebenfalls viele sichere Beispiele hiefür an. Von Seite des Vaters ist mir schon öfters Syphilis, die jedoch längst abgelaufen war, gestanden worden. Vielleicht kann auf diese Weise die Rhachitis mancher Kinder aus der besitzenden Classe erklärt werden.

In anderen Fällen sieht man dieselbe auf acute Krankheiten, Masern, Pneumonie, Diarrhöe etc. schnell und mit Bestimmtheit sich entwickeln.

Von äusseren Ursachen lässt sich nur eine einzige mit Bestimmtheit behaupten, nämlich der Mangel an frischer Luft, der von allen Beobachtern einstimmig als häufigstes Causalmoment angegeben wird. Hieraus erklärt sich auch, warum die Rhachitis am häufigsten und exquisitesten im Frühling, am seltensten im Herbst beobachtet wird.

Der lange Aufenthalt im geschlossenen, meist schlecht ventilirten Zimmer zur Winterzeit hat sie veranlasst, der Aufenthalt unter freiem Himmel während des Sommers sie wieder geheilt. Aus gleichem Grunde kommt die Rhachitis in südlichen Climates fast gar nicht vor. Es muss jedoch bemerkt werden, dass auch diese Annahmen keine allgemeine Geltung haben. In meinem jetzigen Wohnorte Dorpat kommt Rhachitis auffallend selten vor und zeigt sich nur in den mildesten Formen, während sie in München, das zehn Breitengrade nördlicher liegt, zu den häufigsten Vorkommnissen zählt.

Prognose.

Die Rhachitis als einfache Knochenveränderung ist niemals gefährlich und kommt in vielen Fällen nach Beendigung der ersten Dentition zum Stillstand und schliesslich zur Heilung. Ihre Complicationen aber sind höchst pernicios und durch sie wird ein grosser Theil der rhachitischen Kinder hinweggerafft.

Schon gleich im Beginne der Rhachitis bei kaum bemerkbarem weichen Hinterkopfe stellt sich häufig der Spasmus glottidis ein und tödtet die Mehrzahl der davon befallenen Kinder. Bei zunehmender Thoraxrhachitis ist die Verödung einzelner Lungenlappen unvermeidlich, indem die Lungen sich vergrössern, der Brustkorb aber sich nicht erweitert, sondern durch das Hineintragen des rhachitischen Rosenkranzes vielmehr kleiner wird. Wenn diese Verödung oder Carnification oder erworbene Atelektase grösseren Umfang gewinnt, so entsteht beträchtliche Athemnoth, und eine leichte, catarrhalische Erkrankung des restirenden, gesunden Gewebes führt fast regelmässig zum Tode.

Die Knicungen und Verdickungen der Rohrknochen endlich können bleibende Deformitäten, Verkürzung einer oder der anderen Extremität, Beckenverengerung und Verschiebung und beträchtliche Functionsehrungen veranlassen.

Behandlung.

Vor der Einführung des Leberthranes in die Therapie war eine Unzahl von Mitteln in Gebrauch. Man empfahl vornehmlich Cori. Aurant., Rad. Gentian. rubr., Herb. Absinth., Rassa lig. Quassia, Calam. aromat., China, Colombo und Eucenpräparate. Ausserlich wurden Bäder, Waschungen und Räucherungen mit allen möglichen

aromatischen Kräutern und deren Präparaten angewendet. Später kam, hauptsächlich von Feiler und Wendt angeregt, die Farberrethe in Gebrauch, deren rother Farbstoff bekanntlich in den Knochen theilweise abgelagert wird. Eine directe Einwirkung auf den Knochen ist somit nicht abzuleugnen, allein die Veränderung der Farbe bringt keine Zunahme des Kalkes mit sich.

Meissner glaubte bemerkt zu haben, dass die Vaccination die Fortschritte der Rhachitis aufhalte, was Raza jedoch entschieden und zwar mit Recht verneinte. De la Fontaine meinte dasselbe von der Krätze!

Andere kamen auf den Gedanken, es fehle wirklich an Material zur Knochenbildung und versuchten die Einführung desselben durch den Darmkanal. In dieser Richtung machte Wurzer mit Phosphorsäure Versuche, die ganz erfolglos blieben, und in neuerer Zeit machte Benecke den phosphorsauren Kalk als Antirachitisicum geltend. Die Berichte über die jetzt allenthalben damit angestellten Experimente hatten keineswegs günstig, und man ist jetzt ziemlich allgemein davon zurückgekommen.

Im Jahre 1824 endlich wurde von Schütze, Schenk und Tourtual in Deutschland auf den Leberthran aufmerksam gemacht, während die Franzosen ihn erst 5 Jahre später durch Brétonneau, dem ein Laie aus Holland darüber berichtete, kennen lernten. Seit dieser Zeit haben sich die günstigen Berichte über das *Ol. jecot.* Asell. in einer Weise gehäuft, dass alle bisher angeführten Mittel hiedurch verdrängt worden sind.

Ueber den eigentlich wirksamen Stoff im Leberthran ist schon viel gestritten worden, die Einen glauben, er wirke einfach als Respirationsmittel durch seinen Fettgehalt, Andere suchen seine Wirksamkeit in den Spuren von Jod und Brom, Andere endlich in seinen Fettsäuren und den Beimischungen faulender Leberbestandtheile, welche in jedem Leberthran sich finden.

Da die Versuche mit reinen Fette, sowie auch die mit kleinem Dosis Jod oder Brom nicht den gewünschten Erfolg hatten, so scheint vorerhand die letzte Ansicht die stichhaltigste zu bleiben.

Man gibt den braunen Leberthran am besten pur, in steigender Dosis, zuerst nur einige Tropfen, dann kaffeebüffel-, später eسلöffelweise, 1—2 Mal im Tage. Die meisten Kinder gewöhnen sich in wenigen Tagen so gut daran, dass sie ihn als Leckerbissen betrachten und mehrere Eسلöffel voll auf einmal austrinken, wenn sie über das Leberthrandöschen kommen können. Der Genuss des Thranes allein heilt die Rhachitis sogar bei sonst ungünstigen Verhältnissen. Durch mögliche Verbesserung der Wohnung und Nahrung wird die Cur jedenfalls beschleunigt und gesichert. Es ist hierbei Folgendes zu bemerken:

Frische, reine Luft ist vor Allem nöthwendig. Kinder in feuchten, dampfen Wohnungen, welche im Winter viele Wochen lang nicht gelüftet werden, acquiriren die Rhachitis am schnellsten und stärksten, und auf diese Individuen hat auch der Leberthran nur eine langsame, nicht constante Wirkung.

Als zweites Adjuvans ist eine sorgsame Hautpflege anzuführen. Die Kinder müssen täglich ein Bad mit aromatischen Kräutern be-

kommen und die gekrümmten Glieder werden ausserdem täglich mit Brautwein gewaschen.

Auch kleine Kinder mit Craniotabes vertragen meistens den Leberthein gut, die Unruhe derselben wird am besten durch kalte Waschungen des Kopfes, welche alle 2—3 Stunden repetirt werden, beseitigt. Das von Klüssner angegebene Kopfkissen, in dem ein hirschenförmiges Loch mit nach unten gerichteter Spitze sich befindet, gewährt manchen Vortheil. Wegen der starken Transpiration sollen rachitische Kinder niemals auf Federn, sondern immer auf Rohhaaren, Stroh oder Seegras liegen.

Kinder, welche noch an der Brust sind, sollen möglichst langlebte gestillt, nebstbei aber mit Brei gefüttert werden. Die Kalzmilch ist für Kinder bis zu drei Jahren das beste, durch nichts zu ersetzende Nahrungsmittel und muss so reichlich wie nur immer möglich gegeben werden. Ein französischer Arzt Bernard gibt an, dass in Montbrun-les-Bains, Dauphiné, die Frauen, um sich vor neuer Empfängnis zu schützen, junge Hunde an die Brust legen. Diese Thiere wären dann regelmässig rachitisch, durch Saugen an einer Hündin aber wieder geheilt. Bernard liess nun auch rachitische Kinder von Hündinnen säugen und glaubt hiemit in 7 Fällen 6 Mal einen günstigen Erfolg erzielt zu haben.

Eine orthopädische Behandlung lässt sich während der Krankheit nicht durchführen, erst nach Ablauf derselben können passende Maschinen und Verbände, wie sie jetzt von den Spezialisten in grösster Mannigfaltigkeit gefertigt worden, in Anwendung kommen.

Grössere rachitische Deformitäten können zuweilen noch bei Erwachsenen durch richtig berechnete Aussägung von Knochenkeilen und Anlegung eines passenden Vorbandes beseitigt werden.

2) Tuberculosis und Scrophulosis.

Ueber den Unterschied zwischen Tuberculosis und Scrophulosis wurde schon viel debattirt. Die Einen betrachten diese beiden Zustände als vollkommen identisch, die Anderen finden wieder, dass gar keine Aehnlichkeit zwischen ihnen besteht.

Es kommt nur darauf an, von welchem Standpunkte aus man den Vergleich anstellt. Von pathologisch-anatomischen Standpunkte aus kann mit Bestimmtheit behauptet werden, dass die Coxarthrose und die scrophulösen Gelenkentzündungen, der Windstoss, die Spinditis, die Erkrankungen der Conjunctiva und Cornea, die Otorrhoeen und die scrophulösen Hautkrankheiten gewöhnlich auf keiner Tuberculosis der ergriffenen Theile beruhen. Der Kliniker aber sieht viele hundert-, ja tausendmal, dass die eben genannten Erkrankungen 1) keineswegs locale sind, sondern theils alternirend, theils an verschiedenen Stellen zugleich auftretend vorkommen, 2) dass solche Kinder immer von tuberculösen Eltern stammen und 3) dass sie nach Ablauf der scrophulösen Affectionen, welche gewöhnlich gegen die Zeit der Pubertät hin verschwinden, mehr oder weniger deutlich tuberculös werden.

Der Kliniker also kann nicht anders, er muss einen innigen Zusammenhang zwischen den beiden Dyskrasieen annehmen. Der pathologische Anatom aber, der mehr mit den fertigen Krankheitsproducten

als deren Entstehung sich abgibt, kann sehr wohl die entstandenen Veränderungen gesondert betrachten. Doch weist auch die pathologische Anatomie in sehr vielen Fällen den materiellen Zusammenhang nach. Man findet nämlich fast bei allen Kindeleichen, welche scrophulöse Veränderungen, Knochen- oder Lymphdrüsenkrankung zeigen, auch irgendwo im Inneren, gewöhnlich in den Bronchialdrüsen, einen oder einige grosse gelbe käsige Tuberkel, welche als die Wurzel, als der Herd der mehrfachen, peripherischen, scrophulösen Erkrankungen anzusehen sind.

Nach dieser Constatirung des Zusammenhanges können wir nun übergehen zur Betrachtung A) der Tuberculosis und B) der Scrophulosis.

A) Tuberculöse Dyskrasis.

Da der ganzen Anlage dieses Lehrbuches entsprechend die Krankheiten nach den einzelnen Organen und nicht nach dem Wesen der pathologischen Veränderungen zusammengefasst worden sind, so ist auch der Tuberculosis schon mehrfach gedacht worden. Wir können deshalb, um Wiederholungen zu vermeiden, auf frühere Abschnitte verweisen. Die Tuberculosis der Lungen findet sich pag. 265, die der Bronchialdrüsen pag. 266, die des Gehirnes pag. 310, die der Gehörgänge pag. 337, die der Mesenterialdrüsen pag. 205, die der Nieren pag. 407, die tuberculöse Peritonitis pag. 201 abgehandelt. Es erübrigt nun mehr die Besprechung der allgemeinen Symptome der Tuberculosis und ihrer Aetiologie. Die Behandlung kann schliesslich mit der der Scrophulosis zusammengefasst werden. Die allgemeinen Anschauungen des Tuberkels aber, seine Entstehung und Rückbildung, werden in Ziemssen's Handbuch der spec. Pathologie Band V. von Rühle und Rindfleisch so klar und durchsichtig abgehandelt, dass wir auf dieselben lediglich zu verweisen brauchen.

Allgemeine Symptome der Tuberculosis.

Wenn die Tuberculosis einzelne Organe besonders intensiv befällt, so treten natürlich die Functionstörungen derselben deutlicher hervor und verdrängen die der Dyskrasis eigenthümlichen Symptome, wie dies besonders häufig bei Tuberculose der Lungen, des Gehirnes und des Peritoneums beobachtet wird. Sehr gewöhnlich aber, wenn dieses Prävaliren eines einzelnen erkrankten Organes weniger ausgeprägt ist, treten folgende, ziemlich constante, allgemeine Symptome auf.

Die Gesichtsfarbe ist im Allgemeinen blass, fahl und anämisch, die Wangen zeigen häufig eine einseitige circumscripte Røthe, welche nach wenigen Stunden wieder schwindet. Wenn grosse Circulationsstörungen in den Lungen oder sehr voluminöse Bronchialdrüsen zugegen sind, so kann auch Cyanose entstehen, wozu gewöhnlich bald das Ende erfolgt. Der Gesichtsausdruck tuberculöser Kinder ist meist wehmüthig traurig, die trägen Bewegungen der Augenlider und des Bulbus, dessen Sclera entschieden bläulich wird, verleihen ihm etwas überschwängliches.

Das Fieber, bestehend in Erhöhung der Hauttemperatur und beschleunigtem Pulse, ist ein constantes Symptom bei allgemeiner Tuberculose. Man muss unterscheiden zwischen der gewöhnlichen, oft exacerbirenden Gefässanregung der chronisch Tuberculösen und zwischen

den hectischen Fieber, das im letzten Stadium sich einstellt und bis zum Tode währt. Alle tuberculösen Kinder haben oft, namentlich gegen Abend, heisse trockne Stirne und Hände, vermehrten Durst und eine allgemeine Erhöhung der Hauttemperatur, nach einigen Stunden aber verschwinden diese Symptome sämtlich und kehren oft Wochen lang nicht wieder. Bei diesem vorübergehenden Gefässerfüllungsleiden leidet die Ernährung der Kinder nicht wesentlich und sie können auch vollständig sistiren, wenn keine neuen tuberculösen Insulte eintreten.

Ganz anders verhält sich das hectische Fieber. Der Puls, anfangs hart, später klein und leicht zu unterdrücken, beschleunigt sich hierbei bis zu 150 und mehr Schlägen, jeden Abend tritt eine Exacerbation ein, niemals aber mehr ein vollständig fieberloser Zustand. Dieses Fieber kann Monate und selbst Jahre lang dauern, ist in letzteren Fälle natürlich weniger intensiv, führt eine Abmagerung bis zum Sceler herbei und verlässt die Kinder nicht mehr bis zum Tode. Dem Gefühle nach steigt die Hauttemperatur gegen das Ende zu nicht mehr im geraden Verhältnisse zur Pulsbeschleunigung, sondern sinkt vielmehr an den Prominenzten unter die normale. Das Thermometer zeigt aber hohe Temperaturen bis zum lethalen Ausgange.

Am Anfang der Tuberculosis, oder wenn das kranke Kind noch nicht lange genug beobachtet wird, kann dieses Fieber leicht zu Verwechslungen Veranlassungen geben. Die abendlichen Exacerbationen können eine Intermitteus simuliren, welche Täuschung durch den mangelhaften Erfolg grösserer Gaben Chinin leicht aufgeklärt wird. Zuweilen schwankt die Diagnose mehrere Wochen lang zwischen acuter Tuberculosis und Typhus, was bei Kindern um so leichter möglich ist, als der Kindertyphus bei weitem weniger ausgesprochene Symptome hat, wie der der Erwachsenen. Sind die tuberculösen Lungensymptome etwas vorherrschender, so ist man auch häufig im Zweifel, ob nicht eine abnorm verlaufende Pneumonie das anhaltende Fieber unterhalten könnte.

Die Ernährung leidet bei allen tuberculösen Kindern beträchtlich und es tritt eine erschreckende Abmagerung ein, welche jedoch diagnostisch von geringerer Bedeutung ist, da alle fieberhaften, länger dauernden Kinderkrankheiten dieselbe ebenfalls veranlassen. Nur die acute Tuberculosis kleiner Kinder unter einem Jahre macht hiervon eine Ausnahme. Es behalten nämlich die Kinder, namentlich wenn sie an der Mutterbrust sind, ihre Fettpolster fast bis zum Tode, die anhaltend hohe Temperatur und der fortwährende Husten, mit welchem viel weisser Schaum aus dem Munde befördert wird, lassen schon bei Lebzeiten die Diagnose aller Wahrscheinlichkeit nach auf Tuberculosis acuta stellen, und die Section bestätigt in den meisten Fällen diese Wahrscheinlichkeitsdiagnose.

Bildet sich bei grösseren tuberculösen Kindern Soor der Mundhöhle, so kann man fast mit Gewissheit ein baldiges lethales Ende prognosticiren. Die Zunge bietet wenig charakteristisches. Der Appetit ist selbst bei *Febria hectica* oft noch sehr gut, man bemerkt übrigens nicht, dass diese Kinder weniger abmagerten und länger lebten als andere, welche an anhaltender Dyspnoe leiden. Diarrhöen sind häufig, beruhen jedoch nur selten auf tuberculösen Darmschwären, sondern meist auf einfachen Catarrhen der Darmschleimhaut.

Die Haut bleibt in der chronischen Tuberculosis niemals normal.

sie verliert ihre ursprüngliche Glätte und wird in Folge der Abnahme des Unterhautfettes welk und runzlich. Häufig stellt sich am Rumpf und Halse eine klobenartige Abschuppung ein, welche auf einige Zeit verschwindet, bald aber wiederkehrt und sich zuweilen mit Pityriasis versicolor complicirt. Die stark desquamirten, rauen Hautstellen schwitzen wenig, die übrigen dafür um so beständiger. Am Kopfe namentlich dringt der Schweiß in grossen Tropfen hervor, so dass die Haare und das Kopfkissen häufig ganz nass werden, Sudamina werden demgemäss vielfach beobachtet.

Allgemeine Hautwassersucht kommt bei einfacher Tuberculose nicht vor, nur um die Knöchel herum und auf dem Fesserrücken finden sich im letzten Stadium leichte Oedeme. Bei kleinen Kindern sind diese Oedeme sichere diagnostische Anhaltspunkte, indem sie der Tuberculose fast ausschliesslich ankommen und die physikalische Untersuchung der Brusthöhle gewöhnlich keine genügende Aufklärung gibt. Zuweilen entsteht ein partielles Oedem des Gesichtes und der oberen Extremitäten, was auf locale Circulationsstörungen zurückzuführen ist. Man hat beobachtet, dass stark vergrösserte Bronchialdrüsen einen Druck auf die V. Cava descendens ausüben und somit Stauung in deren Gefässgebiet verursachen können.

Die chronische Tuberculose behält entweder ihren Charakter bis zum Tode bei und die Kinder sterben an den Folgen des Fiebers, der Abmagerung und der Erschöpfung, oder es wird das lethale Ende noch durch acute Miliartuberculose und Hydrocephalus acutus beschleunigt.

Die Prognose darf auch bei ziemlich vorgeschrittener Tuberculose nicht unbedingt lethale gestellt werden, indem es Fälle gibt, in welchen trotz aller schlechter Zeichen noch einmal Stillstand und nach Jahre langem Siccithum endlich wieder vollkommene Ernährung und Fortentwicklung eintritt.

Aetiologie.

Keine Krankheit ist so bestimmt erblich als die Tuberculose, und diese Erblichkeit lässt sich in vielen Fällen so evident nachweisen, dass ich fast vermute, sie ist die einzige und allein wahre Ursache der Dyskrasie. Die Kinder bringen keine vollendeten Tuberkeln mit auf die Welt, und man findet sie bei Sectionen Neugeborener meines Wissens niemals. Aber schon in den ersten Lebenswochen kann die Tuberculose sich vollkommen entwickeln, so dass man bei einem Kinde, das nur 2—3 Monate gelebt hat, miliare, zuweilen auch sogar grosse gelbe Tuberkel finden kann.

Die Grade der Intensität sind sehr verschieden je nach der Art der körperlichen Constitution. Ist nur der eine Theil der Eltern tuberculös, der andere aber aus einer vollkommen gesunden Familie, so brauchen durchaus nicht alle Kinder dieser Ehe tuberculös, nicht einmal scrophalös zu werden. Es geht mit der Erblichkeit der Tuberculose wie mit der äusseren Körperbeschaffenheit. Wenn der Vater schwarze Haare und braune Iris, die Mutter blonde Haare und blaue Iris hat, so bekommen die Kinder gewöhnlich kein Gemisch dieser Farbenrancen, sondern meist schlägt ein Theil derselben ganz dem Vater, ein anderer ganz der Mutter nach. Ist nun der Vater tuberculös, die

Mutter aber gesund oder umgekehrt, so kann es sehr wohl sein, dass ein Theil der Kinder ganz gesund, ein anderer ganz tuberculös wird. Häufig bemerkt man jedoch einerseits eine Abschwächung der Dyskrasie, welche in milderer mehr scrophulösen Formen sich aussert und andererseits bei den scheinbar gesunden Kindern leichte scrophulöse Affectionen und eine Neigung zu Bronchial-Catarrhen, chronischer Rhinitis und polytomöser Conjunctivitis.

Durch Kreuzung zwischen Starktuberculösen, Schwachtuberculösen und Gesunden entsteht nun eine Menge von Abstufungen, und bei der unendlichen Verbreitung, welche die Dyskrasie jetzt erfahren hat, wird es nur wenige Familien geben, welche von aller Neigung zur Tuberculose, von allen dieselbe andeutenden scrophulösen Symptomen gänzlich frei geblieben wären. Die Hauptschwierigkeit, welche man es überwinden hat, wenn man die Entstehung der Tuberculose nur durch Erblichkeit zu erklären strebt, ist die, dass eben leichtere Grade von Tuberculose, einzelne beschränkte, vielleicht schon verkalkte Tubercel nicht zu diagnosticiren sind. Man findet ja oft genug bei Sectionen der kräftigsten, wohlgenährtesten Individuen, welche an einer beliebigen acuten Krankheit gestorben sind, in einer Lungenapfel oder den Bronchialdrüsen die Reste eines früheren tuberculösen Processes, von dem Niemand etwas gemerkt hatte. Es kann deshalb auch niemals bestimmt behauptet werden, dass keine hereditäre Anlage zugegen, und dass in einem gegebenen Falle die Tuberculose lediglich durch andere, äussere Ursachen bedingt sein müsse.

Zu den äusseren Veranlassungen der Tuberculose rechnet man allgemein: schlechte Luft, Aufenthalt in engen, nicht ventilirten, staubigen Zimmern, feuchte Wohnung und schlechte Kost, wovon man namentlich den ausschliesslichen Genuss von Schwarzbrot und Karoffeln und die Enthaltung der Fleischkost versteht. Wenn man aber an einer grossen Armenpraxis, wie sie mir seit vielen Jahren gewohnt, seine Erfahrungen bezüglich dieser äusseren Veranlassungen resumirt, so stellt sich deutlich heraus, dass oben unendlich oft hiedurch keine nachweisbare Tuberculose erzeugt wird, und andererseits, dass bei vollständigem Mangel dieser äusseren Ursachen dieselbe sehr häufig gefunden wird.

Am frappantesten gestalten sich die Verhältnisse, wenn Kinder von verschiedenen Eltern in einer Familie zusammen aufwachsen, was man in München sehr häufig findet, indem die illegitimen Kinder theils bei ihrer Mutter bleiben dürfen, sondern in die Kost gegeben werden müssen. Hat nun die Familie, welche das Kostkind aufgenommen hat, ebenfalls Kinder, so leben alle Kinder mit einander unter ganz denselben Bedingungen. Sie schlafen in demselben Zimmer, sie essen aus derselben Schüssel, sie bekommen, resp. verrichten die Hauptpflege in gleichem Maasse, und dennoch wird viele Dutzend Mal beobachtet, dass das Kostkind vollkommen gesund bleibt, während die eigenen Kinder das ganze Jahr hindurch an scrophulösen Affectionen in Behandlung stehen, oder dass der umgekehrte Fall eintritt. Wenn sich nun diese Thatsachen so oft repetiren, dass jeder beschäftigte Arzt ganze Reiben davon aufzählen kann, so wird der Glaube mehr als schwankend gemacht, und die Tuberculose müsste bei der grossen Masse von Proletariat, welches in den Ställen beisammen wohnt, noch

viel häufiger vorkommen, als diess in der That der Fall ist. Es müssten ganze Häuser und selbst Strassen, in welche diese armen Leute eingepfercht sind, tuberculös sein, eine Beobachtung, die meines Wissens noch in keiner Stadt gemacht worden ist.

Für Kinder, welche den Keim der Tuberculosis in sich tragen, mögen diese äusseren Ursachen von grosser Bedeutung sein und die Art sowie die Anzahl der einzelnen Insulte vergrössern und verschlimmern. Wo aber der erstere nicht vorhanden, da entwickeln sich die Kinder wohl langsamer, bleiben blass, mager und klein, zeigen jedoch keine Tuberculose, nicht einmal Scrophulose.

Betrachten wir die Sache von der Rehrseite. Bei den Kindern der wohlhabenden Bevölkerung fehlen die äusseren Ursachen und es müssten also um so viel weniger wohlhabende Kinder tuberculös sein, als arme Kinder diess durch ihre schlechten Verhältnisse geworden sind. Nun sind aber, soweit der allgemeine Ueberblick reicht (in Procenten lassen sich diese Verhältnisse nicht berechnen), die Kinder wohlhabender Leute durchaus nicht seltener tuberculös als die der Armen, vielmehr scheint die Krankheit besonders häufig und verheerend in dem ersteren Stande vorzukommen. Aus dieser Anschauung resultirt ebenfalls, dass auf die Kost, Wohnung und Hauptpflege bei Weitem weniger Gewicht zu legen ist als auf die hereditäre Anlage. Meine Ansichten über die Uebertragbarkeit der Tuberculosis der Kühe (Perlsucht) auf den Menschen durch den Genuss der Milch habe ich schon im allgemeinen Theil, künstliche Ernährung, pag. 38, näher entwickelt.

Wenn die äusseren Ursachen bezüglich der Erzeugung von Tuberculosis in ganz gesunden Individuen von nur geringer Bedeutung sind, so muss doch zugestanden werden, dass sie ein mächtiges Agens werden, wo hereditäre Anlage vorhanden. Viel wichtiger jedoch in dieser Beziehung sind vorausgegangene andere Krankheiten, namentlich Masern, Syphilis, Keuchhusten und Typhus. Nach diesen acuten Processen entwickelt sich bei Kindern, welche früher dem Anscheine nach ganz gesund waren, plötzlich Tuberculose. Am häufigsten stösst sie sich nach Masern ein, wo sie eine so gewöhnliche Folge ist, dass die Annahme gerechtfertigt erscheint, es erkrankte gar kein mit hereditärer Anlage behaftetes Kind an Masern, ohne hierauf nicht wirklich tuberculös oder wenigstens scrophulös zu werden. Diese nach Masern eintretende Tuberculose zeichnet sich vor der spontan entstehenden auch dadurch aus, dass bei ihr ein Stillstand und endlich sogar entschiedene Besserung viel häufiger zu beobachten ist, als bei letzterer.

B) Scrophulöse Dyskrasie.

Man versteht unter Scrophulosis eine Reihe entzündlicher Processen auf der Haut und den Schleimhäuten, an den Sinnesorganen des Gesichts und des Gehöres, in den Lymphdrüsen, an den Knochen und Gelenken, welche pathologisch-anatomisch gar keinen Zusammenhang haben, in ihrem Verlaufe jedoch von einfachen traumatischen Entzündungen dieser Theile sich wesentlich unterscheiden und selten ganz vereinzelt, sondern meist an mehreren Körperstellen zugleich oder nach einander vorkommen.

Die Untersuchung der erkrankten Theile ohne Berücksichtigung des gesammten Organismus ergibt häufig schon solche Eigenthümlich-

keiten, dass man mit Bestimmtheit zum entzündlichen Process den Beiwert „*serophalous*“ einsetzen kann. Es gilt diese namentlich für einzelne Erkrankungen der Augen, für die verschwärenden Lymphdrüsen und die Knochen- und Gelenkkrankheiten, während die meisten Hautausschläge, die Schleimhautcatarrhe und der Öhrenfluss erst durch die Hartnäckigkeit ihres Verlaufs und die gleichzeitige Complication mit deutlichen serophalösen Affectionen anderer Organe als dyskrasisch erkannt werden können.

Die Gegner der serophalösen Diathese, welche ihr Auge gegen den so nahe liegenden und täglich zu beobachtenden innigen Zusammenhang der oben genannten Affectionen hartnäckig verschliessen, berufen sich namentlich darauf, dass die Dyskrasie im Blute nicht nachgewiesen sei. Unbegreiflicher Weise vergessen sie hierbei, dass man überhaupt noch in gar keiner Dyskrasie, weder in der Syphilis, noch im Krebs, noch in der Tuberculosis etwas Specifisches im Blute hat finden können; dass aber hier Allgemein-erkrankungen vorliegen, hat doch noch jeder denkende Arzt zugestanden.

Vom klinischen Standpunkte ist an folgenden Sätzen festzuhalten:

- 1) Es gibt gewisse, chronische Entzündungen, welche einen innigen ätiologischen Zusammenhang haben.
- 2) Die daran erkrankenden Kinder stammen, zum grössten Theil nachweisbar, von tuberculösen Eltern und
- 3) Diese Kinder werden sehr häufig nach Eintritt der Pubertät, wenn die serophalösen Erscheinungen zurückgetreten, selbst wieder tuberculös.

Es erscheint demnach die Serophalosis als der Anfang, vielleicht auch als eine Abschwächung der Tuberculosis. Nach meinen Beobachtungen, die leider wegen des schwierigen Nachweises der ilterlichen Tuberculosis niemals zu präcisen Zahlen führen können, kommt sie hauptsächlich in Familien vor, wo ein Theil der Eltern gesund, der andere aber tuberculös ist. Wo Vater und Mutter tuberculös sind, gehen die Kinder meistens in den ersten Lebensjahren an wahrer Tuberculosis zu Grunde und überspringen diese mildereren Uebergänge.

Was die allgemeinen Symptome, den sogen. serophalösen Habitus, betrifft, so sind die meisten hiefür angegebenen Zeichen nur die einfachen Folgen der örtlichen Processen und beruhen nicht auf gewissen erblichen Constitutional-anomalien. Es ist diess auch der Grund, warum die Schilderungen des sogen. serophalösen Habitus nicht in ein Bild zusammengefasst werden, sondern in zwei Formen, der erethischen und der torpiden, gegeben werden müssen.

Bei genauerer Prüfung reduciren sich diese beiden Formen auf höchst rare Angaben. So sollen die erethisch serophalösen Kinder einen gracilen Körperbau, schwache Musculatur, scharfes Fassungsvermögen, zarte Gesichtsbildung, schöne Augen, bläuliche Sclera und erweiterte Pupillen haben. Der torpide Serophalohabitus hingegen soll zu erkennen sein an groben Gesichtszügen, grossem Kopfe, breiten Kinnbacken, aufgeschwollener Nase und Oberlippe, gerötheten Augen, geschwellenen Lymphdrüsen und grossem Bauche.

Es sind ungesugener Weise in diesen Schilderungen allgemeine constitutionelle Veränderungen mit örtlichen Krankheitsprocessen zusammengeworfen worden. Die allgemeinen Charaktere sind höchst un-
 bestimmend.

eintritt und überdies vollkommen unrichtig, die örtlichen, geschwollene Nase und Oberlippe, geröthete Augenlider, Drüsenhypertrophien und metroestisch aufgetriebener Unterleib sind allerdings Theilerscheinungen der Scrophulosis, allein sie sind nicht so constant, dass sie den Habitus bedingen können und ihr Fehlen oder Wiederverschwinden beweist noch lange nicht, dass die Kinder nicht mehr scrophulös sind.

Die Kinder können ihren scrophulösen Habitus, ihre Adenitis meibomiana, ihre geschwollene Nase und Oberlippe, welche eben nur local durch chronischen Catarrh der Nasenschleimhaut und dessen ätzendes Secret bedingt sind, sehr wohl vollkommen wieder verlieren und nach einigen Monaten dieselben oder andere scrophulöse Affectionen wieder acquiriren. Es wird also, je nachdem diese localen Entzündungen gerade zugegen oder verschwunden sind, der Habitus vorhanden sein oder nicht.

Was nun die örtlichen Processen anlangt, so sind sie sämmtlich durch langwierigen Verlauf, häufige Recidive und hartnäckigen Widerstand gegen alle Localbehandlung mit Cauterisationen, Umschlägen und Salben aller Art ausgezeichnet. Sie bieten grösstentheils so charakteristische Symptome, dass sie eine gesonderte Betrachtung verdienen.

a) Haut.

Am häufigsten finden sich hier die nässenden Ausschläge, Eczem, Impetigo und Ecthyma.

Die Furunculosis, welche ebenfalls nur Kinder tuberculöser Eltern befallt, wurde schon pag. 468 eingehend besprochen.

Unter Eczema versteht man eine Hautentzündung, bei welcher ein flüssiges Exsudat unter die Epidermis anschwitzt und in Form von kleinen, dicht aneinander stehenden Bläschen eine grössere Fläche der Haut einnimmt. Je nachdem der Grund und die zunächst gelegenen Hautparthien schwach oder stark geröthet und geschwellen sind, unterscheidet man Eczema simplex und rubrum. Wenn die Bläschen grösser werden und von Eiter strotzen, bezeichnet man diese Abart als Eczema impetiginoides. Es sind hier natürlich keine besonderen Formen anzunehmen, sondern es können sehr wohl an einem Individuum zu gleicher Zeit oder wenigstens nach einander alle drei Formen beobachtet werden.

Symptome.

In allen Fällen bilden sich durch Platzen und Eintrocknen der Bläschen und Pusteln gelbe Krusten, welche durch nachdringendes flüssiges Exsudat immer wieder abgehoben werden, worauf dann der frühere Eintrocknungsprocess in derselben Weise von Neuem beginnt. Am behaarten Theile des Kopfes werden die Krusten wegen des Anklebens an die Haare beträchtlich dicker als an unbehaarten Körperstellen. Zuweilen wird die Secretion so bedeutend, dass aus einzelnen Rissen und Sprüngen der vorhandenen Krusten grosse Perlen eines trüben Serums aussickern und sogar abfliessen können. Dieses Exsudat erodirt auch ferner gelegene, bisher ganz verschonte Hautstellen und es kann daselbst ebenfalls ein nässender Ausschlag entstehen.

Das Eczem hat weder mit dem Follikel- noch dem Drüsenapparate speciellen Zusammenhang, sondern ist eine reine Cutisentzündung; am

häufigsten kommt es bei scrophulösen Kindern am Kopfe und im Gesichte vor (Kopfgrind, Tinea capitis, Pterigo) verschont übrigens gar keine Hautstelle gänzlich. Es kommt gewöhnlich in 4—8 Wochen spontan zur Heilung und dauert nur höchst selten länger als ein halbes Jahr an ein- und derselben Stelle fort.

Wenn es einige Tage bestanden hat, so schwellen regelmäßig die nächst gelegenen Lymphdrüsen an, besonders die des Halses, indem, wie schon bemerkt, das Exzem am häufigsten am Kopfe sich etablirt. Diese Drüsenanschwellungen haben das Eigenthümliche, dass sie fast niemals in Eiterung übergehen, sondern nach Heilung des Ausschlages sich wieder gänzlich verkleinern oder auch schwach andirrt noch längere Zeit fortbestehen können.

Das Exzem heilt ohne Substanzverlust, nur bleibt an den nicht behaarten Stellen eine dunklere Pigmentirung der Haut zurück, welche nach einigen Monaten jedoch sicher schwindet. Recidive kommen sehr häufig vor.

Behandlung.

Es soll hier nur von der örtlichen Behandlung die Rede sein, indem die allgemeine am Schlusse des ganzen Abschnittes folgen wird. Nach meistar tausendfachen Beobachtung genügt die einfache Reizlichkeit und, für die behaarten Stellen, die Enttörrung der Haare vollkommen zur Heilung. Selbst diese letztere Proccdur ist nicht dringend nöthwendig, sondern beschleunigt nur das Ahtrocknen und ist eine grosse Wohlthat für die Kinder, welche durch die mit den Haaren dick verklebten Krusten im höchsten Grade belästigt werden.

Eiele Mütter entschlossen sich aber höchst ungern dazu, ihren Töchtern die Haare abzuschneiden. Die Kinder werden durch das Waschen und Ankämmen der verklebten Krusten allerdings viel gequält, allein es ist nicht zu verkennen, dass auch bei dieser irrationellen, zweifelsohn sogar grausamen Behandlung endlich ein Zeitpunkt eintritt, wo keine neue Exsudation mehr erfolgt und nach Abfall der gänzlich vertrockneten Krusten eine normale Haut zum Vorschein kommt.

Die Entfernung der Krusten wird am besten vorgenommen, wenn man sie erst mit Öl trinkt, worauf sie weich werden und schmerzlos weggenommen werden können. Es lässt sich nicht verhindern, dass die Kinder kratzen, den hiedurch entstehenden beträchtlichen Hautreiz aber kann man mildern, wenn man ihnen die Fingernägel zweimal die Woche so kurz als möglich schneidet.

Unter Impetigo versteht man ein Exzem mit besonders grossen Bläschen, ohne Hamentzündung, bei welcher sich auf gerötheten Grunde grössere Pusteln erheben, die zu dicken, gelben oder braunen Krusten vertrocknen. Die Exsudation dauert unter den Krusten fort, leidet es eipar, und es liegt für einige Stunden das geröthete Corium zu Tage, das jedoch schnell wieder mit neuen Krusten sich bedeckt. Der Verlauf, die übrigen Symptome und die örtliche Behandlung unterscheidet sich in nichts von Exzem.

Unter Ecthyma und Rupia versteht man vereinzelt grosse Pusteln, welche nur vorübergehend braune Krusten verursachen und gewöhnlich in tiefe Geschwüre übergehen. Der Entzündungshef ist meistens unbedeutend, wird aber, wenn die Cachexie sehr ausgespro-

ist, livid-bläulich-roth. Die nach dem Abfallen der Krusten entstehenden Geschwüre liefern fast gar kein Secret, sind nahezu trocken, heilen aber nichtsdestoweniger nur sehr langsam und bestehen häufig bis zum Tode fort. Es kommt dieser Ausschlag nur bei mageren, atrophischen Kindern vor.

Behandlung.

Man muss versuchen, durch reizende Salben, Ung. digestivum oder Sabinac, oder durch leichte Bestreichungen mit Hollerstein mehr Reaction in die torpiden Geschwüre zu bringen. Die örtliche Behandlung bleibt aber in der Regel erfolglos, wenn nicht eine constitutionelle Besserung erzielt werden kann. Die hier angezeigten Mittel sollen am Schlusse angeführt werden.

Ausser diesen Bläschen- und Pustelausschlägen ist namentlich noch der Scrophulosis eigen die fressende Flechte, der Lupus.

Symptome.

Der Lupus kommt bei Kindern in allen vier Formen vor, welche die Dermatologie lehrt. Wir haben 1) einen *L. exfoliatus*, 2) *L. tuberosus*, 3) *L. exulcerans* und 4) *L. serpiginosus* oder *ambulans*.

Der *Lupus exfoliatus* besteht in kleineren und grösseren Hauthypertrophien von glänzender, abgeschliffener Oberfläche, welche fortwährend sich abschuppen und häufiges Hautjucken verursachen. Die Farbe dieser Hypertrophien schwankt zwischen der rosenrothen bis zur blauenrothen. Die Härte ist charakteristischer als die Hervorragung über das Niveau der gesunden Hautparthieen.

Der *Lupus tuberosus* unterscheidet sich von der ersteren Form nur durch stärkere Prominenz der Knoten, welche durch Aggregation zu grossen, blaurothen Tumoren anschwellen können und zuweilen sehr hart, zuweilen aber auch schwach fluctuirend sich anfühlen. Die Abschuppung und die Farbe verhält sich wie bei dem ersteren.

Der *Lupus exulcerans*, auch *phagedaenicus* genannt, entsteht selten primär als solcher, sondern entwickelt sich aus einer der beiden oben beschriebenen Formen. Er charakterisirt sich durch ein hartes Cuticelsufat, welches rasch schmilzt und tiefe, unebene Geschwüre zurücklässt. Diese Geschwüre sondern keinen dickflüssigen Eiter, sondern eine bräunliche Jauche ab und heilen ausserordentlich langsam, sie greifen besonders in die Tiefe und verschonen nicht einmal die Knochen. Die Krusten, welche von Zeit zu Zeit durch eine momentane Abnahme der Secretion sich bilden, werden gewöhnlich bald wieder abgestossen.

Der *Lupus serpiginosus* endlich zeichnet sich aus durch Bildung tiefer Geschwüre, welche durch immer neue Exsudation in die Geschwürsränder grösser und grösser werden, während die erst ergriffenen Stellen sich contrahiren, abflachen und zur Heilung anschicken. Die Narben bleiben stets vertieft, weiss, strahlig, und die Substanzverluste, namentlich wenn der Lupus an der Nase oder den Augenlidern gesessen hatte, sind sehr entstellend.

Diese sämtlichen vier Formen finden sich niemals bei gesunden Kindern, sondern nur bei dyscrasischen, und zwar hauptsächlich bei

ausgesprochen scrophulösen, seltener bei syphilitischen. Ihr Sitz ist vorzugsweise im Gesicht, am häufigsten an der Nase, dann an den Wangen und den Lippen, viel seltener finden sie sich am Rumpfe und den Extremitäten.

Der Verlauf ist ein sehr chronischer und die Heilung lässt man Jahre lang auf sich warten, die Substanzverluste sind immer beträchtlich und die Narben das ganze Leben durch zu erkennen.

Behandlung.

Die örtliche Behandlung des Lupus, namentlich fressender Form, ist von größter Wichtigkeit. Es ist dringend notwendig, dem Fortschreiten des Uebels durch systematische Cantharisation ein Ziel zu setzen. Der Hollensteinstift ist für diese Fälle nicht eingreifend genug, man muss zur Arsenik- oder Chlorzinkpaste greifen. Das Dupuytren'sche Arsenikpulver (98 oder 99 Theile Calomel und zwei oder ein Theil weisser Arsenik) ist besonders geeignet zu oberflächlichen Aetzungen, nicht zu nahe am Munde und der Nasenhöhle. Es wird in Pulverform $\frac{1}{2}$ – $\frac{3}{4}$ Linie dick auf die gereinigte Geschwürsfläche gestreut und mit einer Schichte von Gummipulver bedeckt, wodurch bei Feuchtwerden der Paste eine feste Verklebung entsteht. Nach 8–10 Tagen fällt die Paste ab, muss aber meistens einige Male repetirt werden.

Weniger gefährlich wegen möglicher Vergiftung und dennoch sehr zuverlässig wirkt die Chlorzinkpaste. Man mischt ein Theil Chlorzink mit 2–3 Theilen Stärkmehl und bringt nun mit einigen Tropfen Wasser die Paste auf das gereinigte Geschwür. Das Chlorzink ist ebenso tief als die Dicke der aufgelegten Schichte ist. Nach Abfällen des Schorfes müssen die Aetzungen so lange erneuert werden, bis schöne granulirende Flächen erzielt worden sind. Thiersch behandelt den Lupus sehr glücklich mit einer Lösung von rothweisser Thonerde, welche er mit Charpie als Verbandmittel so verdünnt benutzt, dass nur geringe Schmerzen dadurch entstehen dürfen. In neuester Zeit ist durch die Einführung des scharfen Löffels eine grosse Umwälzung in der örtlichen Behandlung des Lupus hervorgerufen worden und es scheint durch denselben in der That alle die genannten Artamittel entbehrlich zu werden.

Ohne interne Behandlung mit Leberthran, welche Jahre lang fortgesetzt werden muss, kann auch durch die stärksten Aetzungen kaum ein vorübergehendes Zehnen bewirkt werden. Es bedarf keiner besonderen Erinnerung, dass die Auftragung des Chlorzinks ohne Chloroformnarkose kaum durchführbar ist.

b) Schleimhäute und Sinnesorgane.

Wir fügen hier die Veränderungen der Sinnesorgane gleich zu die der Schleimhäute überhaupt an, weil bei den scrophulösen Erkrankungen der Organe des Gesichtes und Gehöres sich regelmäßig und hauptsächlich deren Schleimhaut theilnimmt.

Die Schleimhaut des Mundes und des Ernährungsschlauches zeigt keine charakteristische scrophulöse Erkrankung. Die bei scrophulösen Kindern so häufigen und langwierigen Bronchialcatarrhe sind viel wahr-

scheinlicher durch wirkliche Lungentuberculose als durch Scrophulose bedingt. Im urspeciischen Systeme kommen ebenfalls keine besonderen Veränderungen vor, in der Vagina aber findet sich bei scrophulösen Kindern oft eine langwierige Leucorrhöe, deren genauere Schilderung schon pag. 428 gegeben wurde.

Deutlich scrophulöse Localisationen etabliren sich nur auf der Schleimhaut der Nase, des Auges und des Ohres.

Nase.

Sehr häufig kommt in den Nasenlöchern an der Uebergangsstelle der Schleimhaut zur Cutis ein nässender Ausschlag, Eczem oder Impetigo, vor, in Folge dessen die ganze Schleimhaut sich verdickt und ein äussendes Secret in grösserer Menge liefert. Die Nasenlöcher werden durch immer dickere Krusten endlich ausgefüllt, die ganze Nasenspitze schwillt an, und das über die Oberlippe herunterfliessende scharfe Secret verursacht eine chronische Rötzung und Infiltration dieser Hautpartie. Die Anschwellungen der Nase und Oberlippe kommen so häufig vor, dass man aus ihr den scrophulösen Habitus zu entnehmen pflegt.

Wem allerdings nicht geleugnet werden kann, dass so beschaffene Kinder stets scrophulös sind und noch weitere scrophulöse Erkrankungen aufweisen, so geht hieraus noch keineswegs hervor, dass Kinder, welche keine geschwellene Nase und Oberlippe haben, nicht auch scrophulös sind. So häufig ist diese Affectio in keinem Falle, dass man sie mit dem dyskrasischen Habitus identificiren könnte.

Die Heilung liest viele Monate, selbst Jahre auf sich warten, und nach endlichem Verschwinden des Ausschlages bleibt noch lange Zeit die Infiltration der Cutis zurück. Mit Lupus, Polypenbildung und eitriger Coryza, Ozaena, haben diese einfachen Eczeme nichts gemein und gehen auch nicht in solche Zustände über.

Die scrophulöse Ozaena, Stinknase, besteht in einem eitrigen Nussigen Ausfluss aus einem oder beiden Nasenlöchern und unterscheidet sich von der eben geschilderten Schleimhauterkrankung durch den nie fehlenden penetranten Geruch des abfliessenden Eiters. Sie ist ebenfalls sehr langweilig, sistirt zuweilen einige Wochen und kehrt hierauf mit früherer Heftigkeit wieder. Es liegt ihr meistens eine Periostitis eines Theils der Nasenhöhlenwandung zu Grunde, auch wird zuweilen das Abgehen kleiner Knochenstückchen beobachtet. Es erklärt sich hieraus hinlänglich der intensive Geruch des Eiters und der chronische Verlauf.

Behandlung.

Wenn die Kinder schon etwas grösser und vernünftiger sind, leisten Injectionen mit kaltem Wasser oder mit schwachen Adstringentien vorzügliche Dienste. Die Weber'sche Nasendouche ist hier allen andern Injectionen vorzuziehen. Bei kleinen Kindern, welche sich gegen diese Procedur gewaltig sträuben, muss man sich damit begnügen, eine schwache Salbe aus rothem Präcipitat (0,2—4,0 Fett) mittelst eines dünnen Boudouquets einzuführen. Die allgemeine Behandlung bleibt auch hier wieder die Hauptsache.

Auge.

An den Lidern verschwären häufig die Meibom'schen Drüsen. Es bilden sich mehrere Hordeola, welche theils in Eiterung, theils in Infiltration übergehen. Die nächstgelegenen Theile des Auges sind hierbei geschwollen und exacerbiren schnell in Folge der Anstauung des vermehrten Secretes. Diese Erkrankung dauert ebenfalls viele Monate und endet häufig mit theilweisem oder gänzlichem Verlust der Cilien.

Am häufigsten jedoch localisirt sich die Dyskrasie auf der Conjunctiva bulbi.

Bei der Conjunctivitis serophulosa entstehen auf der Skleroticalbindehaut fast regelmässig Phlyctänen, flache, weissgelbe Erhebungen, von der Grösse eines Stockendekkopfes bis zu der einer Linse, welche von dick angelagerten, blutrothen Gefässen umgeben sind. Die Hauptmasse der Gefässe geht gewöhnlich in Form eines strangartigen Bündels von einem Augenwinkel gegen die Phlyctäne zu. Da diese Phlyctänen nur bei serophulösen Kranken vorkommen, so scheinen sie nur höchst wahrscheinlich miliäre Tuberkelkrusten der Conjunctiva zu sein. Ich hatte noch nie Gelegenheit, solche Phlyctänen am lebenden Kinde auszuschneiden und mikroskopisch zu untersuchen, auf welche Weise allein diese Frage zum Andrag kommen könnte.

Nach einigen Tagen platzen die Phlyctänen und collabiren, die zuführenden Gefässe verkleinern sich und verschwinden bald darauf gänzlich. Wenn der Process vollständig abgelaufen, ist durchaus kein bleibender Nachtheil für das Auge, noch ein sichtbarer Rückstand mehr zu bemerken. Anders gestalten sich die Verhältnisse, wenn die Cornea ergriffen wird.

Die Keratitis serophulosa stellt sich dar entweder als einfache Weiterentwicklung der Gefässe der Skleroticalbindehaut auf die Cornea, so dass zu einzelnen Stellen oder an der ganzen Peripherie der Hornhaut radiale Gefässchen in ihren Rand hineingehen, oder es bilden sich an irgend einer Stelle der Cornea grössere oder kleinere Geschwüre.

Diese Hornhautgeschwüre entstehen ebenfalls aus Pusteln, welche den Phlyctänen der Sclera entsprechen, dieselben platzen aber hier ungemein schnell und man sieht in kurzer Zeit nach Beginn des Leidens keine Pustel auf der Cornea, sondern einen Substanzverlust, eine kleine, weiche Grube, in deren Umgebung die Cornea rauhlag oder nützig getrübt ist. Die so entstandenen Geschwüre, deren sich oft mehrere zugleich befinden, bedürfen nun längere Zeit bis zur vollständigen Vernarbung. Die Stelle, wo sie saassen, sieht anweilen aus wie abgeschliffen — Facettenbildung, — die rauhige Trübung des Geschwürgrundes aber und seiner Umgebung verliert sich erst nach vielen Jahren oder bleibt Zeit Lebens sichtbar — Mucula corneae. —

Bei stark dyskrasischen Individuen können die Geschwüre tiefer und immer tiefer greifen und endlich perforiren. Wenn das Geschwür central gewessen, so dass nach Abfluss des Wassers der vorderen Augkammer die Perforation nicht durch die Iris verlagert werden kann, tritt gewöhnlich Phthisis bulbi ein. War das Geschwür aber mehr peripherisch, so fällt die Iris vor, bedeckt sich mit Exsudat und die Kinder kommen mit einer verzerren Pupille davon, wodurch das Seh-

vermögen nur wenig behindert wird. Es bleibt hier an der Verwachsungsstelle der Iris mit der Cornea ein weisser Fleck mit einem schwarzen, centralen Punkte übrig, von welchem aus sich nachträglich ein Staphyloom entwickeln kann.

Die Perforation scrophulöser Hornhautgeschwüre ereignet sich übrigens selten, es perforirt kaum eines von hundert und unter den perforirten Geschwüren tritt der günstige Ausgang der Iriröthelung noch verhältnissmässig oft ein.

Sehr charakteristisch für die scrophulöse Augenentzündung ist der Biphthalmospasmus, der Krampf der Lider. Derselbe ist bedingt durch eine grosse Lichtscheu, welche nur in den äusserst seltenen Fällen fehlt. Die Kinder öffnen das leidende Auge den ganzen Tag nicht, sie suchen am Tage dunkle Ecken und Kammern auf, halten die Hände vor das Gesicht und verhindern so gut als möglich das Einfallen der Lichtstrahlen. Wenn auch zugestanden werden muss, dass willfährige, fremdliche Kinder sich auf vieles Zureden oft entschliessen, das Auge zum Behuf einer ärztlichen Besichtigung momentan zu öffnen oder sich wenigstens gütwillig öffnen zu lassen, so verursacht doch in anderen Fällen das einfallende Licht eine so heftige Reizung, dass mit dem besten Willen des Kindes eine Eröffnung des Auges unmöglich ist. Man kann wohl ein solches Kind fixiren lassen und mit grosser Gewalt beider Hände die Lider aus einander reissen, es entsteht aber hierdurch immer eine kleine Blutung am äusseren Augenwinkel und eine beträchtliche Schwellung der Lider.

Therapeutisch bringt dieses gewaltsame Aufreissen keinen Nutzen, indem die Behandlung dieselbe bleibt, ob Geschwüre vorhanden sind oder nicht, wohl aber öffentlichen Schaden durch die beträchtliche Schwellung und unvermeidliche Quetschung der Lider. Wichtiger kann dies Verfahren für die Prognose sein; denn man kann den tiefbetrübten Eltern mit Bestimmtheit eine vollkommen günstige Prognose stellen, wenn gar kein oder nur ein peripherisches Hornhautgeschwür entdeckt wird.

Die Lichtscheu steht nicht immer im geraden Verhältnisse zur materiellen Veränderung der Cornea, die erstere ist oft im höchsten Grade vorhanden und die letztere nichts destoweniger unbedeutend. Die Thränensecretion ist bei der Lichtscheu immer profus und die vielen Thränen verursachen gemeinschaftlich mit den mechanischen Reibungen und dem fortwährenden Zuklappen des Auges bald einen ständigen Bläschenanschlag der ganzen Gesichtshälfte.

Die scrophulösen Augenentzündungen recidiviren ausserordentlich häufig, ja man kann beinahe sagen, regelmässig. Es dauert mindestens ein halbes Jahr, oft aber viele Jahre, bis die armen Kinder endlich dazu kommen, sich ihres Lebens wieder gehörig freuen zu können. Die heftigen, anhaltenden Schmerzen, von welchen diese Affectionen begleitet werden, bedingen gewöhnlich auch etwas Fieber und Appetitmangel, worauf eine sichtliche Abmagerung des ganzen Körpers sich einstellt.

Eigenthümlich ist die Veränderung der Cilien bei chronischen scrophulösen Entzündungen. Sie entwickeln sich zuerst zu einer besondern Länge und Dicke, verlieren aber dabei ihre einfach geschwungene Bogenform und werden wellenförmig, fast geknickt. Später fallen diese

entarteten Wimpern sämtlich aus und werden für die ganze Lebenszeit durch Boize, spärlich stehende ersetzt.

An den scrophulösen Ophthalmien zielt man am allerersten auf das Alterniren der verschiedenen localen Ausdrücke der Dyskrasie. Trotz aller örtlichen und allgemeinen Behandlung können sich die Hornhautgeschwüre viele Monate hindurch mehren und verschlimmern, da tritt plötzlich ein Eczem am Kopfe, eine Otorrhoe, eine Bronchitis oder eine scrophulöse Kuschenerkrankung ein und die hartnäckige Augenentzündung ist in wenigen Tagen vollkommen verschwunden. Lichtscheu, profuse Thränensecretion und Gefäßinjection sind wie weggeblasen, es restirt nichts als die Trübung der Hornhaut, welche mit Ausnahme des verminderten Sehvermögens nicht weiter belästigt.

Behandlung.

Trotz aller rationalen und irrationalen, schmerzhaften und schmerzlosen, alten und neuen Mittel, welche die Ophthalmologen in grosser Menge angebraucht haben, besteht noch keine Behandlungsweise, welche deutlich abkürzend und mildernd auf den Verlauf dieses widerwärtigen Uebels einwirkt.

Man verbietet das Zubinden des Auges mit einem grossen Tuche und gestatte nur das Verhängen mit einem gewöhnlichen Augenfläpchen. Alle Salben und Einträufelungen in das Auge mit adstringirenden Augenwässern sind, so lange Röthung und Schmerz besteht, schädlich und vermehren die Reizung. Es passt in diesem entzündlichen Stadium nichts besser als lauwarmes, destillirtes Wasser, womit stündlich das Auge leicht geduscht oder übergossen werden kann. Durch Kälte und kaltes Wasser wird in den meisten Fällen Schmerz und Röthe vermehrt.

Das Bestreben der Kinder, dem Lichte sich gänzlich zu entziehen, darf nicht unterstützt werden. Sie sollen mit einem einfachen Augenfläpchen, Umbraculura, versehen in einem nicht verdunkelten Zimmer sich aufhalten. Einigen Nutzen sieht man von der täglich einmal zu wiederholenden Einträufelung einer concentrirten Atropinlösung (0,06—8,0 Wasser) und von dem innerlichen Gebrauch des Belladonna-extractes, wovon in 24 Stunden 0,63 gegeben werden kann. Die Untertauchungen des Kopfes in kaltes Wasser haben eine entschieden günstige, jedoch nur einige Stunden währende Wirkung auf den Blinksparasmus. Die Manipulation kann nur unter heftigem Sträuben der Kinder und deren Eltern vorgenommen werden, und die gewöhnliche Folge ist, dass sie sich zur zweiten Untertauchung nicht mehr erfinden. Ich bin deshalb schon seit Jahren von dieser etwas brutalen Behandlung abgestanden und kann von keiner Verschlechterung meiner jetzigen Resultate berichten.

Wenn die Kinder nicht ausgesprochen tuberculös sind, was in der Regel nicht der Fall ist, so vertragen sie Einreibungen mit grazer Salbe sehr gut, und man bemerkt bei dieser Behandlung einen ziemlich günstigen, wenn auch nicht immer schnellen Verlauf. Die graze Salbe wird auf die Stirne eingerieben, täglich 1,0—2,0, worauf ein breites Band über die Stirne gebunden werden muss, weil die Kinder sie sonst überall hinschmieren, und die Augenentzündung sich verschlimmert, wenn graze Salbe auf die Conjunctiva kommt.

Gegen grosse Schmerzen, Schlaflosigkeit und allgemeine Aufregung ist Morphinum ein souveränes Mittel. Ich lasse stets 0,03 in 90,0 Wasser lösen und gebe von dieser Lösung nach Bedarf kaffeeöffelweise. Ueble Nebenwirkungen kann man von so kleinen Dosen Morphinum nicht wahrnehmen, wohl aber von den ebenfalls schmerzstillenden Butyrcin, welche früher oft in Gebrauch gezogen wurden und durch consecutive Anämie viel Schaden anrichteten.

Bei hartnäckigem Verlaufe und Abwesenheit alles Hautauschlages sieht man zuweilen durch Erzeugung von Brechweinsteinpusteln eine rasche, auffallende Besserung des Angenhodens eintreten. Die Autenrieth'sche Salbe ist jedoch zur Erreichung dieses Zweckes ein ganz ungeeignetes Präparat. Die Kinder jucken sich an den eingeschrübten Hautstellen und reiben sich dann mit ihren verunreinigten Fingern die Augen, wodurch sie ihre Ophthalmie sichtlich verschlimmern. Ich bediene mich seit Jahren einer Mischung aus 1 Thl. Tartar. satiat. und 3 Thls. Emplast. citrin., welche in der Grösse eines Thalers messerrückendick auf lange Heftpflasterstreifen gestrichen und am Nacken befestigt wird. Nach vier Tagen wird dieser Verband abgenommen, worauf eine Menge grosser und kleiner Pusteln zum Vorschein kommt. Wenn diese Pusteln sich nach einigen Tagen zur Heilung anschicken, so kann man sie durch Ung. Sahinac noch lange offen erhalten.

Gegen die Blepharitis und Adenitis meibomiana bedient man sich austrocknender oder schwach reizender Salben. Es ist hier namentlich der weisse Präcipitat (0,1–0,3 auf 4,0 Fett) und das Ung. Zinci zu empfehlen.

Wie schon erwähnt, haben alle diese örtlichen Mittel keine entschiedene, deutliche Wirkung und die Hauptsache bleibt immer eine Jahre lang fortgesetzte, umsichtige, allgemeine Behandlung.

Ohr.

Die Scrophulosis liefert das Hauptcontingent für Ohrenkrankheiten; namentlich die chronischen Otorrhöen, die Ausgänge der Otitis externa und interna, dann die Knochenkrankungen des Gehörganges und des Felsenbeines kommen fast nur bei Kindern tuberculöser Eltern vor und sind combinirt oder alternirend mit anderen Localisationen der Dyskrasie. Die hierher gehörigen Zustände sind pag. 389–397 bereits ausführlich geschildert.

c) Lymphdrüsen und Unterhautzellgewebe.

Bei scrophulösen Kindern kommen ausserordentlich häufig Drüsenanschwellungen vor, welche meistens durch benachbarte Haut- oder Schleimhautrekrankungen veranlasst sind. Weitaus am häufigsten schwellen die Lymphdrüsen des Halses, seltener die in der Achsel- und Inguinalgegend an.

Man unterscheidet in der pathologischen Anatomie die einfache Hypertrophie und die Tuberculosis der Lymphdrüsen. In Praxi lässt sich dieser Unterschied nicht aufrecht erhalten. Man kann oft genug sehen, dass ein Kind in Folge eines Exzemes am Kopfe Drüsenanschwellungen am Halse bekommt, und dass diese Drüsen, welche ursprünglich einfach hypertrophisch waren, nach länger gehauem Exzeme dennoch in Eiterung übergehen und tuberculösiren. Die Trennung der scrophu-

Uebers Drüsen von den tuberculösen ist kaum möglich, indem der Uebergang der ersteren Form in die letztere allmählig geschieht und nicht durch präcise Symptome sich äussert.

Pathologische Anatomie.

Zahlreiche Exstirpationen vergrösserter Drüsen und massigste Leichenuntersuchungen haben ergeben, dass an demselben Individuum einfache Hypertrophieen und tuberculöse Infiltrationen der Lymphdrüsen vorkommen können.

Bei den einfachen Hypertrophieen ist die Veränderung der Structur nur unbedeutend. Je länger sie bestanden, um so fester, dicker wird die Substanz. Die Oberfläche ist meist sehr gefässreich, auf dem Durchschnitt kann man durch Druck einen trüben Saft entleeren, welcher unter dem Mikroskop die bekannten Drüsenelemente, wie Kerne, wenig Zellen und einzelne Bindegewebestränge erkennen lässt. Zuweilen findet man auch kleinere und grössere Hohlräume mit klarem Inhalt im Drüsenparenchym zerstreut vor.

Die tuberculösen Drüsen sind immer zugleich auch vergrössert und zeigen auf dem Durchschnitt entweder kleine, lysirte graue Miliartuberkel oder es ist schon zur Bildung grösserer gelber Tuberkel und Tuberkelaggregate gekommen. Im höchsten Grade des Uebels ist fast das ganze Drüsenparenchym verschwunden und durch Tuberkelmasse verdrängt worden. Erweichung ist der gewöhnliche Ausgang der Drüsentuberculose, Verkalkung scheint bei Kindern sehr seltener zu sein. Bei fortgeschrittener Erweichung entzündet sich das Parenchym und nächstgelegene Zellgewebe, es kommt zum Abscess und zu dem bekannten, so langsam heilenden, fistulösen und unterminirten Geschwüren.

Symptome.

Der häufigste Sitz der Drüsentuberculose ist am Halse, und fast niemals erkrankt eine einzelne Drüse, sondern in der Regel stülzt man grössere Convolute zu beiden Seiten des Halses, unter dem Kinn, hinter und unter dem Ohre. Wenn die Drüsen ganz langsam und ohne Schmerzen sich vergrössert haben, so bleiben sie gewöhnlich ziemlich beweglich, im entgegengesetzten Falle und namentlich, wenn sie in Eiterung übergehen, werden sie prall und unbeweglich. Erst alsdann in allen Fällen ein lebhafter, auf Druck zunehmender Schmerz ein, die Hautdecke wird immer röther und dünner, bricht endlich auf und es entleert sich dann ein flockiger, dünnflüssiger Eiter, mit welchem zuweilen grössere Tuberkelkörper ausgeschieden werden. Gewöhnlich brechen mehrere Drüsen an verschiedenen Stellen zugleich oder nacheinander auf, und die Eiterung ist stets ausserordentlich langwierig. Es entstehen ganz eigenthümliche Geschwüre mit callösen, gewulbten Rändern und speckigem Grunde, aus welchem einzelne Drüsen höckerig hervorragen.

Endlich nach vielen Monaten erweichen die callösen Ränder, die Geschwüre reinigen sich und heilen freilich nur unter Bildung entstellender Narben zu. Merkwürdig ist, dass das Allgemeinbefinden dabei gewöhnlich gar nicht leidet, sondern die Kinder blühend aussehen und gedeihen, vorausgesetzt, dass die Tuberculose auf die Drüsen beschränkt

bleibt und nicht gleichzeitig die Lungen ergreift. Der Verlauf ist, die entstehenden Narben abgerechnet, in der Mehrzahl der Fälle ein günstiger, und es stoßen sich, wenn einmal alle Geschwüre vollkommen geheilt sind, gewöhnlich keine neuen Anschwellungen und Vereiterungen mehr ein.

Was die Complicationen betrifft, so gesellt sich nach Lebert's bekannten Untersuchungen bei $\frac{3}{4}$ aller Kranken scrophulöse Ophthalmie dazu oder geht voraus, $\frac{1}{2}$ der Fälle compliciren sich mit Knochenkrankheiten, $\frac{1}{4}$ mit Hautkrankheiten, ebenfalls $\frac{1}{4}$ mit Gelenkkrankheiten und $\frac{1}{4}$ mit oberflächlichen Geschwüren und Abscessen. Nach den Angaben desselben Autors ist die Drüsentuberculose zwischen dem 1.—5. Lebensjahre sehr selten ($\frac{1}{12}$ seiner Fälle), häufiger zwischen dem 5.—10. Jahre ($\frac{1}{3}$), am häufigsten zwischen dem 10.—15. Jahre (fast $\frac{1}{2}$ seiner sämtlichen Fälle). Vom 15.—20. Jahre ist die Frequenz auch noch bedeutend, $\frac{2}{3}$. Von da an wird die Krankheit immer seltener; denn die Tuberculose ergreift nach dieser Zeit viel häufiger die Lungen als die Lymphdrüsen.

Die Lymphdrüsentuberculose ist an und für sich ungefährlich, die Tuberculose der Lungen stellt aber nach Eintritt der Pubertät sehr gewöhnlich sich ein und es muss deshalb prognostisch immer die Gefahr auch angedeutet werden.

Behandlung.

Bei der einfachen und der entzündlichen Drüsenhypertrophie muss vor allem das causale Moment berücksichtigt werden. So lange die sie verursachende scrophulöse Haut- oder Schleimhauterkrankung noch besteht, verkleinern sich die Drüsen niemals. Erst wenn dieselbe geheilt ist, und die Drüsenanschwellung noch nicht geschwunden sind, kann man versuchen, sie durch Bepinselung mit Jodinctur, 2—3 Mal wöchentlich, zu beseitigen. Einfache Drüsenanschwellungen schwinden auf solchen längeren Gebrauch der Jodinctur, tuberculöse entzünden sich aber hiedurch schneller und kommen rascher zum Ausbruch. Es darf jedoch dieser letztere Process nicht als ein ungünstiges Ereigniss betrachtet werden, indem die tuberculösen Massen auf diese Weise wirklich aus dem Körper eliminirt werden und nicht weiter resorbirt werden können.

Die tuberculöse Erweichung geht zuweilen erstaunlich langsam von Statten, löst aber fast niemals aus, indem Verkalkung im kindlichen Alter so gut wie gar nicht vorkommt. Alle Reizmittel der Haut scheinen sie zu befördern, und es ist deshalb rationell, solche anzuwenden. Es gehören hierher alle die Haut reizenden Salben und Pflaster, deren in der Volksmedizin eine grosse Menge existirt.

Die einmal aufgebrochenen Geschwüre werden nach den allgemein gültigen Grundsätzen der Chirurgie behandelt. Wenn die Heilung gar zu lange auf sich warten lässt, kann durch rothe Präcipitatsalbe ein wirklicher Fortschritt erzielt werden. Gegen einfache Indurationen ist Jod das souveräne Mittel. Nur muss man mit dessen innerlichem Gebrauch sehr vorsichtig sein, indem die immer zu vermuthende Lungentuberculose hierauf zuweilen schädliche Fortschritte macht. Am geeignetsten ist der längere Gebrauch Jod- und Brom-haltiger Mineralwässer, unter welchen die Heilbronner Quelle obenan steht. Örtlich

kann man durch fortgesetzte Bepinselungen mit Jodtinctur hypertrophische Drüsen bald verkleinern, jedoch nur selten ganz zur Schwunde bringen.

Von Exstirpation der Drüse kann erst die Rede sein, wenn die entzündlichen Erscheinungen längst geschwunden und nur einzelne Drüsen hypertrophisch geblieben sind. Im entgegengesetzten Falle läßt man zu gewärtigen, dass die Operationswunde, statt zu heilen, den Charakter eines scrophulösen Drüsengeschwürs mit den bekannten callösen Rändern annimmt.

b) Knochen.

Entzündung der Beinhaut. (Periostitis scrophulosa.)

Die Entzündung der Beinhaut ist nicht selten Ausdruck der Scrophulose oder Theilerscheinung anderweitig scrophulöser Leiden, und tritt entweder als acute Entzündung auf oder hat einen chronischen, schleichenden, mitunter sehr heimtückischen Verlauf. Umwandlung einer ursprünglich chronischen Periostitis in eine acute hat nur in manchen Fällen zu beobachten Gelegenheit.

Die Erkrankung erstreckt sich bald in mehr oder weniger grosser Ausbreitung über einen Theil des Knochens, bald befällt dieselbe die Beinhaut eines Knochens in ihrem ganzen Umfange. Der Sitz sind vorzugsweise die langen Röhrenknochen der Extremitäten (Tibia, Femur, Humerus) und compacte Knochen, selten werden spongiöse Knochen ergriffen.

Der anatomische Charakter der acuten Periostitis, welche in ziemlich gleicher Häufigkeit wie die chronische vorkommt, ist ausgezeichnet durch lebhafte Injection der Knochenhaut, meist in Form einer gleichmässigen Röthung, durch Schwellung, Auflockerung und schwammiges Aussehen: späterhin ist das Periost mit einer schleimigen zähhäufigen Exsudationsflüssigkeit durchsetzt und leicht abzuschieben. Bei der schleichend auftretenden Periostitis ist die Hyperämie geringer, mehr in Form einer streifigen oder fleckigen Röthe, die Beinhaut stellt eine speckige, grauöthliche oder grauweisliche Masse dar, die sich weniger leicht vom Knochen und den benachbarten Weichtheilen abtrennen lässt. Letztere wie das veränderte Periost selbst enthalten bei längerer Dauer häufig Knochenplättchen oder kleine Knochenlamellen von neugebildeter Knochensubstanz, da Neubildung dieser stets bei Periostitis von einiger Dauer eintreten pflegt.

Die weiteren Veränderungen, welche das entzündliche Periost bei Scrophulösen eingeht, sind folgende:

Vollständige Zortheilung und Rückkehr zur normalen Textur ist äusserst selten; etwas häufiger, doch im Ganzen ebenfalls selten, kommt bleibende Verdickung und Volumszunahme mit Organisation der Entzündungsprodukte zu stabilem Gewebe vor, überwiegend häufig ist der Ausgang in Eiterung oder Jauchung. Es bildet sich bei letzteren Vorgängen in dem entzündlichen Periost, sowie zwischen Periost und Knochen Eiter, es entstehen in den benachbarten Weichtheilen nicht selten Abscesse, die sich mit dem Eiterherde am Knochen vereinigen und so eine grössere Höhle bilden können. Ist Aufbruch nach Aussen erfolgt und war die Periostitis auf einen kleineren Um-

fang beschränkt, so kann wohl Heilung und Vererbung erfolgen, doch sind diese seltene Vorkommnisse, in der Regel ist das Periost auf eine grössere Strecke vom Knochen weggehoben und unterminirt, letzterer ausserhalb der zu seiner Existenz notwendigen Ernährungsverhältnisse gebracht worden, so dass die nächste Folge Necrose des Knochens ist. In anderen Fällen nimmt unter dem fortdauernden Einflusse der Scrophalose die Eiterung den Charakter der Jauchung an, welche auch auf dem unterliegenden Knochen sich erstrecken und in demselben den gleichen Process — Caries — hervorrufen kann. (S. Caries und Necrose.)

Seltener als die scrophalöse Knochenentzündung hat die scrophalöse Knochenhautentzündung die Bedeutung der Tuberculose, indem als Entzündungsproduct tuberculöse Massen zum Vorschein kommen. Die Symptome der scrophalösen Knochenhautentzündung sind im Allgemeinen die der Periostitis überhaupt und verschieden je nach dem acuten und chronischen Verlaufe. Im Anfange besteht meist ein stichlicher nicht genau umschriebener Schmerz welcher sich längs des Knochens ausbreitet und eigenthümlich dumpfer Natur ist, bei Druck sich verstärkt. Bald wird der im Beginne nur zeitweise vorhandene Schmerz anhaltender, stärker, besonders bei schlechten Witterungsverhältnissen, häufig auch zur Nachtzeit. Das leidende Glied schwillt je nach dem Charakter der Entzündung schneller oder langsamer an, die Haut wird prall gespannt, kann nicht mehr in Falten erhoben werden; die Anschwellung ist in den ersten Stadien hart und derb, tritt Eiterung ein, so entsteht an einer oder mehreren Stellen Weichheit, deutliche Fluctuation, und der Aufbruch erfolgt, nachdem die Cutis blauröthlich gefärbt wurde, die Epidermis sich erhoben hatte. Aus den entstandenen Oeffnungen, die sich oft rasch vergrössern, wuchern schwammige Granulationen, welche oft bei Berührung bluten. Der aus ihnen zum Vorschein kommende Eiter richtet sich in seiner Beschaffenheit nach den in der Tiefe verlaufenden Processen. (Caries oder Necrose.)

Das Allgemeinbefinden nimmt bei chronischem Verlaufe, wenn dasselbe nicht durch gleichzeitige, anderweitige, scrophalöse Affectionen gestört ist, manchmal wenig Antheil; bei acutem hingegen sowie bei Eiterbildung ist dasselbe in Form von Fieberschwebungen wohl immer ergriffen, welche bei ausgebreiteter reichlicher Eiterung bei der ohnehin häufig vorhandenen Schwäche des Individuums zum hektischen Fieber sich ausbilden können. Dasselbe erliegt mit Aufreihung des Kranken.

Die Diagnose wird nach der angegebenen Symptomatologie keinen besonderen Schwierigkeiten unterliegen.

Die Prognose ist wegen der so häufig nachfolgenden Necrose oder Caries ungünstig zu setzen, ebenso kann die Periostitis, ehe noch diese Processen sich deutlich ausbilden, durch die reichliche Eiterung dem Leben des Kranken gefährlich werden.

Therapie.

Die Behandlung hat sich im Anfange auf zertheilende Mittel zu erstrecken, obwohl diese nur in wenigen Fällen zu dem gewünschten Ziele führen werden; nächstdem sind bei grösster Ruhe des kranken

Gliedes schmerzstillende Medicamente (innerlich gegeben und örtlich applicirt) in Gebrauch zu ziehen; Cataplasmen heben die Schmerzen in der Regel am schnellsten und dauerndsten, besonders bei beginnender Eiterbildung. Kann diese constatirt werden, so ist mit Einschnitt nicht zu zögern, da durch den meist rasch zunehmenden massenhaften Eiter das Periost immer weiter losgewühlt und der Knochen in gewissen Strecken ausser Ernährung gebracht wird.

Entzündung des Knochenmarkes. (Osteomyelitis, Endostitis)

Die Entzündung des Knochenmarkes — in dem Markkanale — der Röhrenknochen kommt bei scrophulösen Individuen vor, und zwar in bedeutender Häufigkeit. Der pathologisch-anatomische Befund dieser Erkrankung ist: Hyperämie mit dunkelrother Färbung des Markes, neben welcher sich noch hie und da kleine Blutextravasate finden, und folgende Eiterbildung, anfänglich in kleinen zerstreuten Herden, die sich mehr und mehr ausbreiten, während die Hyperämie nachlässt. Das Mark erhält eine schmutzig braun gelbe Färbung, wird zerflüssend, die Knochenwände erscheinen entweder missfärbig mit Granulationen und Jauche durchsetzt, in fortschreitender Resorption begriffen, werden caries, oder bei rascher Zunahme der Eiterung des Markes werden dieselben ihres Blutzufusses beraubt und fallen der Necrose anheim (Caries und Necrosis centralis). Die Erkrankung kann nach und nach den Knochen in seiner ganzen Dicke befallen, das Periost in Mitleidenschaft ziehen und die nämlichen Processus hervorgerufen, welche bei der Entzündung des Knorpelgewebes und ihren Ausgängen näher betrachtet wurden. Auch hinsichtlich der Symptomatologie und der Therapie kann auf diese Erkrankung verwiesen werden.

Eine bei Scrophulösen häufiger in die Erscheinung tretende Entzündung des Knochenmarkes ist diejenige, bei welcher das Mark in dem Markraume und den Knochenmaschen vom Röhrenknochen, besonders der kleinen Knochen der Hand und des Fusses, sich entzündet zeigt; dabei ist stets Entzündung des Periostes vorhanden. Der Process, welcher in seinen späteren Stadien als Osteoporosis, Osteospongiosis, Spina ventosa bekannt ist, verhält sich in seinen ersten Perioden in der Weise, dass man sämtliche Maschenräume und die Markhöhle mit dunkelrothem, blut- und zellenreichem, selbst maximal öterig zerflüssendem Marke gefüllt findet, während das Periost hyperämisch, geschwollen sich erweist. Im weiteren Verlaufe findet im Inneren des Knochens durch entzündlichen Vorgang eiterige Schmelzung und Resorption von Knochensubstanz statt, wodurch die Markräume eine abnorm grosse Weite erlangen, während sich ausser von gleichfalls entzündeten Perioste her unregelmässige dünne Knochenlamellen bilden, die ebenfalls zum Theil wiederum durch den von ihnen bei fortschreitenden Resorptionsprocess zerstört werden. Auf diese Art kann der Knochen in bedeutendem Masse vergrössert sein, während seine Substanz doch abgenommen hat, indem das Innere aus ganz grobmächtigen, grossen Räumen oder unregelmässigen Zellen besteht, gleichsam als wäre der ganze Knochen stark aufgeblasen worden (daher die Benennung: Spina ventosa, Windleien). Eine Trennung

in Markhöhle und mackiges Gewebe ist im entwickelten Zustande nicht mehr möglich.

Die Erkrankung kommt bei scrophulösen Kindern häufig an den Händen und Füßen, und zwar an den Mittelland- und Mittelfussknochen oder den Phalangen vor, welche oft eine unförmliche Ausdehnung erhalten und grossz kolbige oder rundliche Geschwülste darstellen (Ähnlichkeit mit Eakchondromen in den Fingern, mit welchen der in Rede stehende Process auch darin übereinstimmt, dass bei ihm in der Regel die Gelenke frei bleiben.) Aufbruch erfolgt nicht immer, nämlich häufig fehlt derselbe, während im Falle eines Aufbruchs zwar zahlreiche Fistelöffnungen bestehen können, dieselben jedoch meist klein sind.

Therapie.

Durch den Gebrauch der passenden gegen die Grand-Krankheit gerichteten Mittel, sowie durch Bäder der leidenden Glieder (entweder in lauem oder mit Alkalien versetztem Wasser) und einem länger fortgesetzten Compressivverband erfolgt nicht selten Heilung mit nur geringer Deformität. Die chirurgischen Eingriffe sind auf das Ausziehen allenfalls vorhandener, loser Knochensplitter zu beschränken.

Entzündung des Knochengewebes. (Ostitis scrophulosa.)

Die Entzündung des Knochengewebes kommt bei scrophulösen Kindern häufig vor und hat ihren Sitz hauptsächlich in spongiösem Knochengewebe (den unregelmässigen und kurzen Knochen der Extremitäten, in den Epiphysen langer Knochen, den Wirbeln etc.), doch kommt dieselbe auch in glatten, compacten und Rohrknochen vor, wie überhaupt kein Knochen des Skelettes ausgenommen ist.

Unter mehr oder weniger deutlicher Hyperämie, die sich bis zum Austritte von Blut steigern kann, bildet sich an irgend einer Stelle des Knochengewebes ein Entzündungsherd, der rasch an Ausbreitung gewinnt, oder es sind deren mehrere entstanden, welche sich vereinigen. Die Knochenräume strotzen von einer fettig-gallertigen Flüssigkeit, die bald durch Granulationen ersetzt wird, die grossen Reichthum an Zellengliedern zeigen; die Maschen des Knochengewebes werden grösser, indem knöcherne Substanz durch die Wucherung der Granulationen zur Resorption gebracht wird (Osteoporose). Der Knochen selbst erscheint an den entzündeten Stellen voluminöser, obgleich seine Masse nicht zugenommen hat, im Gegentheile weniger geworden ist. Besonders auffallend gibt sich dieses Verhältniss, wenn die Entzündung nahe der Oberfläche des Knochens ihren Sitz hat, kund. Häufig bemerkt man, wenn die Entzündung auch in der Tiefe des Knochens ist und denselben nicht bis zur Oberfläche einnimmt, dass die benachbarten Weichtheile bereits Abscessbildung erkennen lassen.

Eine bei Scrophulösen häufig vorkommende, besonders die spongiösen Knochen und Epiphysen befallende Form der Entzündung ist die tuberculöse. Es bilden sich unter Hyperämie entweder ein oder mehrere Herde von rundlicher Form oder eine gleichförmige Infiltration der Knochenmassen mit einem halbdurchscheinenden, graugelblichen, gallertigen Exsudate. Sind einzelne Herde vorhanden, so

sind dieselben hier und da mit einer Art Balg umgeben, welcher jenseits Exsudat gleichsam einkapselt, bei den weiteren Veränderungen desselben jedoch schwindet. Es tritt bald Erweichung ein, die Heerde bekommt eine gelbliche Färbung, in einer dickflüssigen, breiartigen Masse finden sich bröcklige käsige Theile und bei rascher Vergrößerung nicht selten kleine Knochenfragmente. Durch diesen Vorgang entstehen Höhlen im Knochen, welche durch Zusammenstossen mehrerer oft rasch eine bedeutende Grösse einnehmen können, so dass der Knochen morsch wird und gleichsam in sich zusammenbricht. Heilung kann in den ersten Stadien durch Resorption des flüssigen Inhaltes der Herde und Verkreidung oder Verkalkung des Restes derselben entstehen, während sich in der Nähe desselben Verdichtung des Knochengewebes bildet, wodurch Abkapselung manchmal zu Stande kommt; häufiger ist aber Durchbruch und Entleerung des tuberculösen Eiters mit Fortdauer des Processes als tuberculöse Caries, die dann ihre verschiedenen Metamorphosen durchläuft (s. Caries).

Die tuberculöse Infiltration befallt entweder einen ganzen Knochen (z. B. Wirbel) oder einen Theil desselben; oder es findet sich in dem von grüngelblichem Entzündungsprodukte durchsetzten Knochen gelbliche Streifen und Flecken, die sich rasch vergrössern, zusammenfliessen und aus eitriger mit bröcklichen Körnchen vermischter Flüssigkeit entstehen, die bald den Charakter der eitrigen jauchigen, sauren annimmt. Unter ihrem Einflusse geht das Knochengewebe in grösseren und kleineren Partikeln zu Grunde und findet sich zuweilen in dem zum Vorschein kommenden jauchigen Fluidum. Geht der Process weiter, so kann er auch auf das Periost übergreifen, Zerstörung, Verjauchung und Absterben desselben bedingen. In anderen, selteneren Fällen begrenzt sich die Krankheit nach Abkapselung der infiltrirten Partien, und es tritt Heilung ein durch Ausfüllung der Lücken mit Granulationen, ausgehend von einer benachbarten, noch gesunden Knochenpartie oder vom Perioste und dessen Nachschleift. Die Ausgänge der Entzündung der Knochensubstanz, nachdem dieselbe längere oder kürzere Zeit als solche bestanden hat, sind:

1) Zertheilung. Vollkommene Zertheilung ist bei Scrophuliden nur äusserst selten und nur bei Entzündungen weniger umfangreicher Knochenpartien beobachtet worden. —

2) Eiterung mit nachfolgender Heilung ohne Uebergang in Caries. Der Uebergang in Eiterung findet ziemlich häufig statt, seltener ist jedoch die Heilung, nachdem Aufbruch und Entleerung stattgefunden hat, meistens erfolgt dann unter dem Einflusse der krankhaften Diathese Verjauchung und langwierige Caries. Die Knochenräume sind bei diesem Ausgange ausgedehnt, vergrössert und voll von Eiter, es bilden sich durch Zugrundegehen des massigen Knochengewebes kleinere und grössere Höhlen; ein Process, welcher so weit führen kann, dass sich an Knochen nur eine Höhle befindet, welche von einer gewöhnlich immer dünner werdenden Knochenhülle und dem Perioste begleitet ist. — Knochenabscess. — Hat sich der Eiter einen Weg bis zu den Weichtheilen gebahnt, so kann er dieselben entweder, besonders wenn in diesen bereits auch Abscessbildung nach vorhergegangener Entzündung stattgefunden hat, in gerader, dem Sitze der Erkrankung entsprechender Richtung durchbrechen oder er wandert

eine Strecke zwischen denselben fort und erscheint in mehr oder weniger grosser Entfernung von der Ursprungsstelle. Der Eiter ist gelb oder gelblich weiss, ohne üblen Geruch, meist etwas dünn, ohne ätzende Eigenschaften. Derselbe soll eine grössere Menge phosphorsaurer Kalks ($\frac{2}{3}$ — $\frac{1}{3}$) enthalten, als der in Weichtheilen gebildete Eiter ($\frac{1}{5}$ — $\frac{1}{10}$). Nach Entleerung desselben hört, nachdem der Ausfluss noch längere oder kürzere Zeit angehalten hat, die Eitorung in günstigen Fällen auf, die Oeffnungen schliessen sich, die Höhle füllt sich mit Granulationen, in welchen mit der Zeit Knochenneubildungen auftreten.

3) Caries.

4) Necrose.

Beide Entzündungsausgänge bieten so beträchtliche Eigenthümlichkeiten, dass sie gesondert betrachtet werden müssen. Die Symptome der Knochen-Entzündung sind verschieden, je nach dem Sitze und der Ausbreitung derselben und je nachdem die Weichtheile in den Entzündungsprocess gezogen sind. Die Schmerzen fehlen nie, Bisweilen sind sie fix, in anderen Fällen ausstrahlend.

Die Anschwellung des leidenden Theiles ist ebenfalls verschieden, und es ist in der Regel schwierig zu entscheiden, wie viel der Anschwellung den Weichtheilen, wie viel der Anschwellung dem Knochen und seinem Perioste zukommt. Die Haut ist meist sehr empfindlich, geröthet, besonders wenn Abscesse durchbrechen drohen; solche Abscesse entstehen nicht selten, ohne mit dem Leiden des Knochens in Berührung zu stehen, in den Weichtheilen, brechen auf, vernarben wieder und lassen unregelmässige, vertiefte Stellen zurück.

Das Allgemeinbefinden kann bei chronischer Knochenentzündung nur wenig gestört sein und erst bei beginnender Eiterung durch Fieberscheinungen etc. Theil nehmen; bei acut auftretender Ostitis fehlen immerwährendes Fieber, Abmagerung, Kraftlosigkeit, Störung des Schlafes, Appetitmangel und Diarrhöen selten.

Behandlung.

Bei langsamem Verlaufe und bei mässiger Schmerzhaftigkeit kann man zum Zwecke der Rückbildung Jodsalben, Mercurialpflaster (wenn das Allgemeinleiden letzteres Mittel erlaubt) oder Vesicatores, Haarseile als Ableitungsmittel anwenden, bei acutem Vorgange müssen, da die Schmerzen in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle sehr heftig sind und dabei an eine Zertheilung etc. nicht zu denken ist, neben absoluter Ruhe des Gliedes schmerzstillende Mittel gebraucht werden: Cataplasmen, eine grössere öfters wiederholte Anzahl von Blutegeln; bei heftiger Exacerbation Eis, kalte Irrigationen, Mittel, welche besser vertragen werden, als diese nach der gewöhnlichen Ansicht der Fall ist.

Sind die Knochenabscesse nach aussen aufgebrochen, so erleichtert die Behandlung, dass dem Eiter gehöriger Ausfluss gegeben wurde: Auspritzen der Fistelgänge und der Höhle etc.

Caries, Ulceratio ossis.

Verwärtung des Knochens.

Caries entwickelt sich bei scrophulösen Individuen am häufigsten aus einer primären Knochenentzündung eines oder mehrerer Knochen,

und zwar überwiegend häufig in spongiosen Knochen, seltener ist sie in Folge von Periostitis durch Uebergreifen der Verschwärung der Beinhaut auf den Knochen bedingt. Die Caries breitet sich demnach vom Centrum gegen die Peripherie von innen nach aussen (*Caries centralis*, *C. profunda*) oder von aussen nach innen, von der Peripherie gegen das Centrum aus, *Caries peripherica*, *C. superficialis*. Bald ist dieselbe circumscript und stellt so das eigentliche Knochengeschwür dar, bald diffus, bald nur auf einzelne Theile des Knochens, bald auf den ganzen Umfang desselben sich erstreckend, *Caries partialis* und *totalis*.

Die Caries entwickelt sich nach den erwähnten Entzündungserscheinungen dadurch, dass die Granulationen eine röthlich-bräunliche Flüssigkeit absondern, welche im Verein mit den zerfallenden Fettsellen und den nur spärlich vorhandenen Eiterkörperchen die Jauche darstellen, mit welcher sich die Maschenräume füllen; dann kommt allmählig Schwund der Knochenbalken zum Vorschein, wodurch der erkrankte Knochen weich, zusammendrückbar wird, bis derselbe durch die Schicht für Schicht fortschreitende Zerstörung vollständig verschwindet.

Häufig geht aber die Knochensubstanz nicht allein durch allmählichen Schwund und Zerfall zu Grunde, sondern auch durch Necrose, indem noch an und für sich normale Knochenheile, welche den caritösen Stellen zunächst liegen, oder bereits ulcerirende Partien einer Ernährung gebracht werden, absterben und kleinere oder grössere Sequester bilden (*Caries necrotica*).

Die Verschwärung des Knochens breitet sich auch auf die umgehenden Theile, welche in der Regel schon durch die vorhergehende Entzündung in Mitleidenschaft gezogen wurden, aus: das Periost erfährt Zerstörung durch Verjauchung der Weichtheile, besonders das Zellgewebe wird da, wo das Periost zerstört ist, von Verschwärung ergriffen, es bilden sich in ihm grössere und kleinere Eiterherde, Fistelgänge und endlich erfolgt nach Perforation der cuticulösen Haut Durchbruch nach Aussen, worauf die caritöse Jauche abfließt. Häufig findet man in den Weichtheilen, besonders in der Nähe des Periostes, Osteophytenbildungen.

Das Secret ist meist dünnflüssig, von faulem, widrigem Geruche (faulendem Fleische ähnlich) mit Knochenpartikelchen oder bei tuberculöser Caries mit käsigen Krümchen und Flecken (sowie ebenfalls mit Knochenstückchen) vermischt. Um die Fistelöffnung wachsen weiche, schwammige Granulationen, welche den Eingang in dieselbe häufig verlegen und bei der Berührung sehr leicht bluten. Die Fistelgänge laufen in der Regel in gerader oder schiefer Richtung gegen den erkrankten Knochen, doch manchmal auch erst nach mehreren Biegungen, selbst Knickungen, indem die Jauche nicht direkt, sondern erst auf Umwegen zur Körperoberfläche gelangt. Je nach dem Verlaufe der Fistelgänge kommt man leichter oder schwieriger mit der Sonde zur erkrankten Knochenstelle und fühlt dieses rauh, aneben, wie warmsüchtig und leicht eindrückbar. (Die Sonde färbt sich häufig durch die Schwefelverbindungen der Jauche schwarz, ebenso die mit ihr letzteren in Berührung kommenden Bleipflaster etc.)

Das Allgemeinbefinden leidet bei Caries wenig, im Falle Meistens vom Körperstamme entferntere Knochen ergriffen sind. In andern

Fällen, z. B. Wirbelcaries etc., ist dasselbe in höherem Grade alterirt (s. Spondylarthrosis). Heilung ist in der grössten Mehrzahl der Beobachtungen nicht möglich, wenn nicht die zu Grunde liegende Dyskrasie gestilgt ist, und auch dann schreitet oftmals die Caries noch weiter bis zur Zerstörung des befallenen Knochens fort, auch wohl noch auf benachbarte übergreifend. — Soll Heilung zu Stande kommen, so muss die Jauchebildung und der Schwund der Knochensubstanz sistiren, die Granulationen werden dann fester, consistenter, faserreicher; von ihnen, wie von den benachbarten Gebilden, vorzüglich dem verdickten Perioste, beginnt dann Verknöcherung, durch welche der Substanzverlust ausgeglichen wird.

Die Diagnose ergibt sich, ebenso wie die Prognose, grösstentheils aus dem Erwähnten. Kann man auch mit der Sonde den carösen Knochen wegen complicirten Verlaufes der Fistelgänge nicht erreichen und die Diagnose ganz sicher feststellen, so wird die Beschaffenheit des Eiters, das Aussehen der Oeffnungen der Fistelgänge, die ganze Entstehungsweise im Einklang mit der Localität der Natur der Knochentheile — spongiose Knochen — und dem Allgemeineiden genügenden Aufschluss geben.

Behandlung der Caries.

Der Verband geschieht am besten durch feuchte Compressen oder feuchte Charpieballen und Binschehen, welche fleissig erneuert werden, während das betreffende kranke Glied so gelagert wird, dass der Abfluss am leichtesten vor sich geht. Bei Blutungen aus den schwammigen Granulationen können diese mit Hollenstein bestupft und mit leichten Adstringentien verbunden werden. Oertliche Bäder sind empfehlenswerth und sollen, wo immer die Oertlichkeit ihre Anwendung gestattet (Hand, Fuss etc.), gebraucht werden. Man verordnet am häufigsten ausser den Warmwasserbädern der Reizlichkeit wegen alkalische und schweflige Bäder, denen man bei grosserer Schmerzhaftigkeit narcotische Aufgüsse zusetzen kann.

Allgemeine Bäder sind ebenfalls von Nutzen, doch darf kein zu grosser Schwäcchegrad vorherrschend und mit dem Bade nicht etwa Gefahr verbunden sein (z. B. bei Wirbelcaries). Abscess, die unmittelbar mit der Beinhaut oder dem Knochen in Verbindung stehen und deutliche Fluctuationen zeigen, sind zu eröffnen, Congestions-Abscesse so wenig und so spät als möglich anzugreifen.

Hinsichtlich operativer Eingriffe kann bei Caries die Resection kleinerer und grösserer Knochenparthien, die Amputation oder Exarticulation in Betracht kommen. Doch richten sich die Indicationen hierfür so genau nach dem einzelnen Falle bezüglich seines localen Leidens und seines Allgemeinzustandes gegenüber dem Nutzen, den ein operatives Verfahren gewähren kann, dass keine allgemeineren Anhaltspunkte aufgestellt werden können.

Brand, Absterben einer Knochenparthie.

Necrosis.

Die Necrose des Knochens kann bei der Scrophulose zu Stande kommen durch Entzündung des Periostes, der Knochensubstanz oder

des Markes, wobei der Knochen, durch Lösung des Periostes oder der Markhaut, durch Unwegsamkeit seiner Gefässe in Folge von Verstopfung oder Druck massenhafter Exsudate ausser seine gewöhnlichen Ernährungsverhältnisse gebracht, absterben muss. Auf diese Weise können alle Ursachen und Veranlassungen zur Caries auch Necrose herbeiführen.

Die Necrose befällt gewöhnlich nur einen Theil des Knochens, und zwar entweder die äussere Knochenlamelle als *Necrosis externa* (*N. superficialis*), oder die innere Lamelle einer Markhöhle oder eines Stückes schwammiger Knochensubstanz in der Tiefe als *Necrosis interna* (*N. centralis*); sie kann auch den Knochen in seiner ganzen Dicke, selbst in seiner vollkommenen Totalität betreffen (*Necrosis totalis*).

Die Necrose kommt zwar bei der Scrophulose an allen Knochen vor, jedoch sind gewisse Knochen überwiegend häufig ergriffen, besonders die Diaphysen langer Röhrenknochen (Tibia, Femur, Humerus, Ulna, Radius), nächstdem die platten Schädelknochen. Im Verein mit Caries kommt sie in den spongösen Knochen vor, ausserdem werden diese seltener von Necrose ergriffen. Der Vorgang der Necrose gestaltet sich nach dem Sitze einigermaßen verschieden.

a) Bei centraler Necrose (*Necr. interna*) findet sich das ausser Ernährung gebrachte, abgesonderte Knochenstück — der Sequester — in einem von Granulationen ausgekleideten Räume — Sequesterkapsel, Todtenlade, — die Wände dieses Raumes bestehen aus altem Knochen und aus neuem, der sowohl in der Markhöhle als auch der Oberfläche des Knochens durch die hier entstehenden Entzündungsprocesse gebildet wurde und nach und nach in den compacten Zustand übergeht; der Knochen erscheint dadurch dicker, plumper. Von der Sequesterkapsel entstehen Oeffnungen in verschiedener Anzahl, welche mit Granulationen ausgekleidet sind und, im Hohlwege sich fortsetzend, nach Aussen münden — Cloaken.

Die Oeffnungen am Knochen sind rund, oval, von verschiedener Grösse, aussen mit einem Granulationenwalle umgeben; aus ihnen kommt, so lange der Sequester seinen Sitz in der Kapsel hat, Eiter zum Vorschein, und wenn sie auch vorübergehend zuheilen, brechen sie doch in der Regel bald wieder auf.

Wird der Sequester entfernt, so füllt sich das Cavum durch Granulationen und sofort durch compacte Knochenmasse — vorausgesetzt, dass der Allgemeinzustand nicht sehr herabgekommen ist, — und die Fistelgänge schliessen sich meist mit Hinterlassung veralteter Einziehungen.

b) Bei *superficialer Necrosis* — in Folge von Periostitis — ist der Sequester in der Regel in keine vollständige Kapsel eingeschlossen. Derselbe gibt die günstigsten Bedingungen zur Heilung, da er leichter ausgestossen oder entfernt werden kann, die Scheide, in der derselbe lag, wird mit Granulationen ausgefüllt und die Oeffnung schliesst sich zu einer auf dem Knochen aufsitzenen Narbe.

c) Bei *Necrosis totalis* kommt es ebenfalls selten zur Herstellung einer vollständigen Todtenlade durch die periphere Knochen-Neubildung an der Grenze des Sequesters, sondern dieselbe ist mangelhaft, durch Lücken unterbrochen, die Weichtheile sind von Fistelgängen meist von beträchtlicher Grösse und Weite durchzogen. Ist der Knochen

abgestossen, so wird die grosse Lücke durch fortgesetzte Granulationsbildung von der Sequestralläche, dem Perioste und sonstigen Weichgebilden ausgefüllt, in welchem freilich bald langsam, bald schneller sich Knochensubstanz neu entwickelt.

d) Die Necrose ganzer Knochen kommt bei Scrophulose an der Hand und dem Fusse bisweilen vor und ist stets Folge einer intensiven Periostitis und Ostitis. Der aus dem ganzen Knochen bestehende Sequester zeigt daher meist Spuren der Entzündung, ist zuweilen sogar in hohem Grade carios osteoporotisch und lagert in einer weiten, mit Eiter und Jauche gefüllten Höhle. Nach Entfernung des Sequesters kann sich die Höhle mit Granulationen füllen, und aus dem verdickten Perioste und den Weichtheilen können neue Knochenspannen sich bilden.

Ueber die Symptomatologie der Necrose gilt wesentlich das bei der Betrachtung der Periostitis und Ostitis Angegebene. Ist Ausbruch der Geschwulst erfolgt, oder ist dieselbe geöffnet worden, so gelangt man, wenn der Process bereits zur Necrose vorgeschritten ist, durch die Oeffnung auf den abgestorbenen Knochen. Derselbe bietet in den meisten Fällen bei der Berührung einen härtlichen Ton, fühlt sich glatt und fest an, doch ist derselbe auch, z. B. bei der totalen Necrose spongioser Knochen, rauh, uneben, brüchig, einen dumpfen Ton beim Anstossen gebend. In solchen Fällen ist die Unterscheidung zwischen Caries und Necrosis sehr schwierig, zumal da das Secret der Sequesterkapsel auch ein jauchehaftes sein kann.

Was die Prognose betrifft, so ist diese am günstigsten bei oberflächlicher Necrose, bedenklicher ist dieselbe, wenn der Sitz in der Tiefe und die Krankheit weit ausgedehnt ist, insbesondere sich durch die ganze Dicke eines Knochens erstreckt. Die Heftigkeit und Ausdehnung der Entzündung, weiterhin der Eiterung, lassen bei scrophulösen Individuen die Gefahr des heftigen Fiebers nahe treten. Um so wichtiger ist, dass bei derartigen Fällen in der Regel nur durch operative Eingriffe geholfen werden kann, die an und für sich nicht gefahrlos sind.

Die Behandlung soll ausser der Bekämpfung der zu Grunde liegenden Dyskrasie vorzüglich darauf gerichtet sein, dass die Ausstossung oder künstliche Entfernung des Sequesters möglichst bald vor sich gehe. Bei oberflächlicher Necrose ist dieser Indication leicht Genüge zu leisten, man hat entweder den sich bildenden Abscess zu öffnen oder die bereits bestehende Oeffnung zu erweitern und den Sequester, vorausgesetzt, dass er vollständig gelöst ist, ausziehen; sollte dies nicht der Fall sein, so ist Abwarten unter einem geeigneten einfachen Verbands jedem eingreifenden Verfahren, Brennen, Ätzen, Ausschneiden vorzuziehen. Bei der eingekapselten Necrose (der centralen und häufig der totalen) hat man mechanische Hindernisse, welche die Ausstossung des Sequesters unmöglich machen oder wenigstens auf lange Zeit verzögern, durch mechanische Eingriffe zu beseitigen, da das längere Verweilen zu den ungünstigsten Zufällen Veranlassung geben kann. Die Mittel zur Befreiung des Sequesters aus der ihn umschliessenden Sequestralkapsel bestehen in einer hinlänglichen Eröffnung letzterer mittelst des Trepan, des Osteotoms, kleiner Stichsäge, oder des Meissels und Herausnahme des toten Knochenstückes mit der Kornzange etc. Die Ausfüllung der Höhle mit Granulationen,

die Vernarbung u. s. w. wird unter einem einfachen Deckverband abgewartet und durch zweckmäßige Behandlung des Allgemeinlebens zu beschleunigen gesucht.

Entzündung der Wirbel bei Scrophulösen. Spondylitis.

Tuberculöse, destructive Wirbelentzündung, Tuberculose der Wirbel, Spondylarthrose^{*)}, *Malum Potii*, *Kyphosis paralytica*.

Dieses bei scrophulösen Kindern so häufig vorkommende Uebel entsteht entweder ohne alle nachweisbare äussere Ursache als Erscheinung der Scrophulose, wird aber auch in manchen Fällen durch traumatische Einflüsse: Stoss, Fall etc., bei scrophulösen Individuen hervorgerufen. Das Wesen der Krankheit ist Entzündung eines oder mehrerer Wirbelkörper mit dem Charakter der tuberculösen und die entschiedene Neigung zur Jauchung und ulcerösen Zerstörung der Knochen. In der Regel tritt die Erkrankung in der Form der infiltrirten Tuberculose — nach dem oben beschriebenen Vorgange — auf, seltener als abgekapselter Tuberkelknoten, und zwar meistens in der Mitte oder nahe der Mitte des Wirbelkörpers. Seltene Fälle sind diejenigen, in welchen der Wirbelbogen, Quer- oder Schrägfortsatz das primär Ergriffene sind, noch seltener die Gelenkfortsätze. Die Zwischenwirbelscheiben erfahren zwar auch Zerstörung, allein erst secundär, wenn die Erkrankung auf dieselben überschreitet oder die Wirbelkörper zusammenkröchen. Letzteres geschieht, nachdem der Körper des Wirbels ganz oder zum grössten Theile infiltrirt ist, wenn sich durch Schmelzung der Tuberkelmassen Cavernen gebildet haben, so dass der Wirbel der Last der oberhalb liegenden Theile nicht mehr Widerstand leisten kann. Die Knickung erfolgt ammeist nach rückwärts (*Kyphosis*, *Pott'scher Buckel*), ist aber in der Regel mit einer mehr oder weniger bedeutenden Seitenkrümmung verbunden (*Scoliosis*, *Kyphosis scoliotica*), wie entsteht meist allmählig, seltener schnell (bei sehr rascher Erweichung, bei einem auf die kranke Stelle wirkenden Trauma etc.), und geht notwendiger Weise mit Veränderungen im Rückenmarkskanal und seinem Inhalte einher: Hyperämie, Entzündung und Erweichung der Rückenmarkshäute und des Rückenmarks, Compression dieser Theile, ohne dass jedoch in allen Fällen heftigere Erscheinungen zum Vorschein kommen, in manchen sind im Gegentheil dieselben sehr gering. Der Nervus sympathicus muss bei Knickung der Wirbelsäule eine Zerrung erfahren, doch ist über die dadurch bedingten Symptome nichts sicheres bekannt.

Die erkrankten Wirbel erzeugen und unterhalten in der Nachbarschaft einen Entzündungsprocess, welchem bald reichliche Eiterung folgt. Es bilden sich Eiteransammlungen, die zuweilen als Senkungsabscess an der vorderen Fläche der Wirbelsäule nach abwärts sich erstrecken und sich über die Schenkelbeuge oder in das kleine Becken herabbeugen können. Auch nach rückwärts — an der Rückfläche — kommen solche Abscessen, die oft sehr bedeutende Grösse erreichen

^{*)} Der Name Spondylarthrose, der für diese Krankheit gebräuchlichste, ist nicht gut gewählt, da die Theilmahme der Wirbelgelenke erst eine secundäre ist, diese auch ganz frei bleiben können.

können, zum Vorschein; schliesslich erfolgt ein Durchbruch in den Wirbelkanal. Die Abscesse enthalten dünnflüssigen Eiter oder Jauche, mit zersetzten oder zerfallenen Tuberkelmassen gemischt, auch wohl kleine Knochenfragmentchen und Brandreste; der Inhalt hat meist einen sehr intensiv üblen Geruch, färbt Seiden schwarz etc. (S. Caries.)

Mit der Zerstörung der Wirbel kann andererseits in den benachbarten Theilen Knochen-Neubildung verbunden sein, und man findet auch häufig die nächsten Wirbel oder die Zwischenräume zwischen den Bögen und Fortsätzen mit zackiger, unregelmässiger Knochenentstanz besetzt und ausgefüllt. Spontane Luxation von Wirbeln ist ausser bei den beiden obersten Halswirbeln sehr selten beobachtet worden.

Die ersten Zeichen der Krankheit beziehen sich auf die Wirbelsäule und bestehen in schmerzhaften Gefühlen, von dieser ausgehend. Kleinere Kinder sind unruhig, bösen Aeusserungen von Unbehaglichkeit, weinen bei Berührung des Rückens oder schneller Bewegung, grössere vermeiden diese sorgfältig und klagen über bald fixe, bald wandernde Schmerzen an der erkrankten Stelle oder deren Nachbarschaft.

Schon bei den ersten Angaben über Schmerzhaftigkeit ist eine genaue Untersuchung des Rückens und der Wirbelsäule nicht ausser Acht zu lassen; dieselbe muss durchtastet, percutirt werden, und der Kranke soll verschiedene Körperbewegungen machen, wodurch häufig der Sitz des Schmerzes genauer ermittelt werden kann. Nebst diesen örtlichen Symptomen finden allgemeine Erscheinungen bei einigermaßen vorgeschrittenem Uebel nie: es entstehen Appetitlosigkeit, Fieberbewegungen, Schläfrigkeit, Abnahme der geistigen Fähigkeiten.

Im weiteren Verlaufe sieht man wichtige örtliche Veränderungen entstehen, nämlich: die Krümmung der Wirbelsäule nach hinten und zur Seite, mit welcher Hand in Hand eine Deformität des Thorax geht, indem die Rippen auf der Seite der Krümmungsconvexität weitere Abstände bilden, als auf der concaven Seite. Dabei zeigen sich in den weiteren Erscheinungen Modificationen je nach der Localität, welche die Erkrankung einnimmt.

1) Die Spondylitis thoracica beginnt in der geschilderten Weise, dabei klagen die Kinder über Schmerzen in den Beinen, über Kribbeln und über das Gefühl von Ameisenlaufen in den Waden und Schenkeln, über Druck in der Herzgrube und dem Unterleibe, es gesellen sich nicht selten krampfartige Affectionen in den genannten Theilen hinzu, Verstopfung und Schwierigkeit der Harnentleerung. Bewegungen der Wirbelsäule werden sorgfältig vermieden, der Hals wird möglichst nach rückwärts gezogen und verkürzt, so dass der Kopf zwischen den Schultern zu stecken scheint, die Ellbogen werden an den Leib gehalten und die Hände auf die Schenkel gestützt. Hierauf kommen Senkungsabscesse, es stellen sich Lähmungserscheinungen ein, die allgemeinen Symptome nehmen die Bedeutung des heftigen Fiebers an, nicht selten von amyloider Nierendegeneration begleitet, und der Tod erfolgt nach längerer oder kürzerer Zeit. Doch kann der Kranke, wenn sich die Kräfte desselben nicht in zu hohem Grade erschöpft haben, in allen Stadien des localen Leidens mit dem Leben davon kommen, freilich mit einer unheilbaren Verkrümmung der Wirbelsäule und des Thorax, zuweilen auch mit Lähmungserscheinungen der unteren Ex-

trinitäten, des Mastdarms und der Blase, die in der Regel ebenfalls jeder Behandlung Trutz bieten.

2) Spondylitis cervicalis, Angina Hippocratis.

Je weiter die Erkrankung nach abwärts gegen die Brustwirbel aus ihrem Sitz hat, um so mehr hat das Krankheitsbild Ähnlichkeit mit dem eben erwähnten, nur kommen noch die Erscheinungen von Seite der oberen Extremität in Form von spasmodischen bis zu paralytischen Störungen in Betracht, je weiter nach aufwärts gegen das Hinterhaupt zu, um so mehr zeigen sich Symptome von Seiten der Schling-, Stimm- und Brustorgane. (Daher auch die alte Benennung Angina Hippocratis.) Bei dieser Form findet sich häufig Anschwellung der Nackengegend von bisweilen bedeutender Grösse, so dass dadurch selbst die Knickungsstelle der untersuchenden Hand verdeckt bleiben kann. Diese Schwellungen sind meist fest, prall, derb, und haben zu der Benennung „Tumor albus nuchae“ (analog dem Tumor albus der Gelenke) Veranlassung gegeben. Am gefährlichsten ist der Sitz der Krankheit am ersten und zweiten Halswirbel, weil es an dieser Stelle leicht zur Compression der Medulla oblongata, und wegen der Wichtigkeit dieses Organes zum sofortigen tödtlichen Ausgang kommen kann. Ursache ist die grosse Beweglichkeit der Gelenkverbindungen, sobald nur das Ligamentum transversum Atlantis zerstört oder bedeutender alienirt ist.

Die Bewegung des Kopfes ist schmerzhaft, dieselbe wird möglichst gemieden und der Nacken und Hals steif gehalten, oder bei Bewegungen der Kopf und der Nacken mit der Hand gestützt. Die Kopfschmerzen sind meist lebhaft und foltern den Kranken besonders bei Nacht vielfach, die Schlingbeschwerden nicht selten sehr beträchtlich, besonders wenn die Krankheit zur Bildung der Retro-Pharyngeal-Abocess vorgeschritten ist, die den Kranken die Einführung von Speise und Trank sehr erschweren, da sie eine bedeutende Grösse erreichen können. Diese Form der Wirbelcaries tödtet bei einiger Intensität der Erkrankung entweder durch die oben erwähnte Luxation der oberen Halswirbel, oder durch Uebergreifen derselben auf die Hirnhäute und das Gehirn, oder unter colliquativen Erscheinungen. Leichtere Grade können zur Heilung gelangen: in der Regel mit bleibender oder schwer zu verbessernder Difficultät in der Haltung des Kopfes. (Eine Art des Caput obstip. leitet ihre Entstehung von dieser Krankheit ab.)

3) Spondylitis lumbalis und sacralis.

Der Sitz dieser Form, der bei scrophulösen Kindern am wenigsten häufig auftretenden, ist der untere Abschnitt der Lendenwirbelsäule, das Kreuzbein, in seltenen Fällen auch eine benachbarte Partie des Darmbeines. Den eigentlichen Schmerzen gehen nicht selten unangenehme Empfindungen — in der Form der Lechia — in den Schenkeln voraus. Das Kind liegt mit angezogenen Schenkeln seitwärts im Bette, kann sich nur mühsam erheben, wobei es die Gesäß- oder Hüftgegend mit den Händen stützt. (Einige Aehnlichkeit mit Coxitis.) Eitersonkungen finden in das Becken statt und können sich durch Hülflöcher oder Mastdarm entleeren, selten kommen sie in der Leisten-gegend zum Vorschein. Lähmung der Sphincteren des Mastdarms und der Harnblase ist bei dem tiefen Sitze selten, weil die diesen Organen zugehörigen Nerven bereits oberhalb des Krankheitsalters

sich befinden. Das Leben ist durch die Eiterung mit ihren Folgen bedroht, auch ist schon öfters letzale Meningitis oder Myelitis beobachtet worden.

Behandlung.

Die Therapie sollte ausser der Bekämpfung der Dyskrasie vorzüglich darauf gerichtet sein, die Ausbreitung der Erkrankung auf edle Gebilde, Hirn, Hirnhäute, Rückenmark, zu verhindern. Sorgsam muss jede mechanische Gewalt und jeder Insult auf die Wirbelsäule besonders — aus erwähnten Gründen —, wenn die Krankheit in dem obersten Abschnitte derselben sich befindet, vermieden werden. Daher ist, so lange der Krankheitsprocess noch nicht vollständig abgelaufen ist, ruhige horizontale Lage auf dem Rücken, oder wenn dies nicht möglich ist, in einer Seitenlage auf einer gut gepolsterten Matratze anzuordnen und der Patient allenfalls durch Vorrichtungen in derselben zu erhalten. Der entschiedene rationelle Vorschlag, durch eine anhaltende Banchlage der zunehmenden Verkrümmung der Wirbelsäule mechanisch entgegen zu arbeiten, scheint meistens an der Ungeduld der Kleinen. Um den Kindern den Genuss der frischen Luft nicht zu entziehen, sind dieselben, wo es nur immer ermöglicht werden kann, auf ihrem Lager in das Freie zu bringen.

Gegen die heftigen Schmerzen ist Wasser mit Narcotico's, innerlich oder örtlich in Form von Opium, Morphinumalbe angewendet, mit Ableitungen zu verfahren. Von Vortheil sind kleine Vesicantien, eingeisender, jedoch ebenfalls gegen die Schmerzhaftigkeit nicht selten von Vortheil, ist das Haarseil.

Senkungsabscesse sind, so lange sie nicht voluminös sind, möglichst lange nicht zu öffnen, da die Erkrankung nach deren Eröffnung meist raschere Fortschritte macht; haben dieselben einen grossen Umfang erreicht, gehen sie mit heftigen Schmerzen einher, steht Aufbruch nach Rötzung und Entzündung der Haut in Bälde doch zu erwarten, so kann die Entleerung vorgenommen werden.

c) Gelenke.

Gelenkentzündungen finden sich bei scrophulösen Individuen sehr häufig als Theilerscheinung der allgemeinen Erkrankung, ohne dass eine weitere äussere Ursache nachzuweisen wäre, und sind in der Regel mit anderweitigen Erscheinungen der Scrophulose verbunden. Anatomisch unterscheiden sich diese Entzündungen durch nichts Wesentliches von anderen, durch Traumen, rheumatische Einflüsse etc. entstandenen, bekommen jedoch eben durch das Allgemeinleiden, welches ihnen zu Grunde liegt, hinsichtlich ihrer Erscheinungen einen eigenthümlichen Charakter. — Sie beginnen und verlaufen entweder acut oder chronisch, und nehmen entweder ihren Ursprung von den das Gelenk bildenden Knochenenden oder von der das Gelenk auskleidenden Membran der Synovialhaut — (manchmal von beiden zugleich) — und stellen auf diese Weise in ersterem Falle das klinische Bild der Arthrose, in letzterem dasjenige der fungösen Entzündung (des Tumor albus) dar.

I. Arthrocace.

Die spongiosen Gelenkenden werden von Entzündungen befallen, welche nach der bei Ostitis etc. beschriebenen Weise ihren Ausgang in Suppuration und Caries nehmen. Es tritt Vereiterung, Verjauchung ein, die Knochenrinde wird in den carösen Processen gezogen, perforirt, es entstehen in den umgebenden Weichtheilen Abscesse, während gegen die Gelenkhöhle hin nach Zerstörung der knorpeligen Theile der Eiter oder die Jante sich Bahn macht und in derselben rasch suppurative Entzündung hervorruft. Nach Zerfall der knorpeligen Gelenküberzüge und Destruction der Synovialhaut und des Bandapparates ragen die carösen Gelenkenden der Knochen in das erweiterte mit Jante gefüllte Cavum, wobei nicht selten Abstoßung einzelner Knochenpartikeln stattfindet. Lagerveränderung der Gelenkenden ist bei der Aufhebung des zusammenfügenden Apparates sehr leicht möglich.

Diese Art der Entzündung befallt vor Allem häufig das Hüftgelenk.

II. Fungus articularis.

In anderen Fällen findet sich vorzugeweise die Synovialmembran erkrankt. Dieselbe zeigt sich in den Anfangsstadien der Entzündung gelockert, injicirt, mit kleinen Hervorragungen — Granulationen — bedeckt, von flüßigen oder warzigen Ansehen, späterhin wachsen die Granulationen zu zottigen, kolbigen, verästigten, in die Gelenkhöhle ragenden Excreescenzen, die Membran ist verdickt, infiltrirt, mit Eiter durchsetzt. Ebenso nimmt auch die Nachbarschaft des Gelenkes an der Entzündung Theil: das Zellgewebe, die Gelenkhänder etc. sind gallertartig oder speckig infiltrirt, mit üppigen Bindegewebswucherungen in Form schwammiger Massen durchzogen. In Folge von Abscessbildung werden die Weichtheile nicht selten von Fistelgängen durchbohrt, die sich häufig bis in die nächste Nähe des Gelenkes begeben, um nach Durchbrechung der Kapsel entweder von Aussen nach Innen oder in umgekehrter Weise in dasselbe zu münden. Das Unterhautzellgewebe ist meist serös infiltrirt und im Zustande der Hypertrophie, die Haut gespannt und, so lange kein Aufbruch erfolgt ist (eine Erscheinung, welche öfters lange auf sich warten lässt), weißlich glänzend; daher die ältere Benennung *Tumor albus*. Die in der Nähe des Gelenkes befindlichen Muskeln werden meist verk, atrophisch und erstarrten fettig. Die Gelenkknorpel werden entweder von den fungösen Wucherungen überzogen und gehen in denselben unter oder sie zerfallen durch den abnormen Inhalt der Gelenkhöhle rasch und zerfallen zu einer pulpösen, fettigen Masse. Die Knochen nehmen im weiteren Verlaufe ebenfalls Theil, und zwar werden dieselben in der Mehrzahl der Fälle carös, so dass im Endresultate diese Form der Entzündung mit der ersten die größte Aehnlichkeit zeigen kann. Bei beiden hat man nicht selten Gelegenheit, in der Umgebung des Gelenkes, entweder an den knöchernen Parthieen oder in den Weichtheilen, neugebildete Knochensubstanz in Gestalt von unregelmässigen Hervorragungen, Splittorchen etc. zu finden.

In selteneren Fällen geht die Entzündung gleichzeitig vom Knochen und der Synovialis aus: es kommt jedoch hierbei nicht sowohl zu

nassenhaften Wucherungen, von letzterer entspringend, sondern es wird meist rasch Eiter in die Gelenkhöhle productirt. Im Uebrigen ist das Verhalten der Weichtheile etc. das Gleiche.

Die fungöse Entzündung kommt hauptsächlich am Kniegelenke zur Beobachtung.

Symptome.

Die serophalöse Gelenkentzündung kann als eine acute, selbst sehr acute auftreten und als solche verlaufen oder späterhin in den chronischen Zustand übergehen; der Beginn kann jedoch auch chronisch sein, der fernere Charakter chronisch bleiben oder die Entzündung sich zur acuten steigern. Bei letzterer treten — wenn nicht etwa eben anderweitige durch Serophalose bedingte febrile Erscheinungen verlaufen sind — Frostschauer, abwechselnd mit Hitzegefühl, Appetitlosigkeit, grosse Unruhe auf, mit welchen Symptomen entweder sogleich oder in kurzer Zeit darauf Schmerzen im erkrankten Gelenke und in dessen Nachbarschaft nicht selten bis in ziemlich weite Entfernung sich kund geben. Dieselben sind anfangs meist intercurrentend, dumpf, bei Bewegungen und Druck sich steigend, werden jedoch bald anhaltend intensiv und erfahren bei Bewegungsversuchen des ergriffenen Gelenkes häufig eine derartige Steigerung, dass die Kinder laut aufschreien. Deshalb hat auch das entzündete Gelenk sehr häufig eine gewisse Tendenz, eine bestimmte Lage anzunehmen, und zwar eine solche, welche die um das Gelenk herumliegenden Bänder und Muskeln in das grösstmögliche Gleichgewicht bringt und so wenig als möglich Spannung verursacht, weil die dadurch vermiedene Zerrung der Theile den Schmerz noch am ehesten erträglich macht. So z. B. wird der Schenkel bei Coxitis in Flexion, Adduction und massige Rotation nach Innen, beim entzündeten Ellenbogengelenk der Vorderarm in die Mitte zwischen Pron- und Supination gedreht. Oertlich zeigt sich in der Regel bald Anschwellung der Gelenkgegend, die entweder auf diese beschränkt ist oder sich in weiterer Ausdehnung verbreitet, eine runde, spindelförmige, unregelmässige Gestalt und Form hat, weich und teigig, oder hart, prall, fest, dorb ist und erst späterhin Weichheit und Fluctuation erkennen lässt.

Die Haut ist bald geröthet, gespannt, mit kleineren und grösseren Gefässen (besonders Venennetzen) durchzogen, in ihrer Temperatur erhöht, heiss, oder sie bietet keine Farbenveränderung dar, lässt sich in mehr oder minder grosse Falten erheben, ist ohne vermehrtes Wärmegefühl. Kommt es zum Aufbruch der in der Tiefe und im Gelenk entstandenen Entzündungsproducte, so röthet sich die Haut, wird nicht selten bläulich gefärbt, die Epidermis hebt sich ab. Nach der natürlichen oder künstlichen Eröffnung lassen in der Regel die Schmerzen einige Zeit nach, so dass die Patienten ruhiger werden, dieselben beginnen jedoch in Bälde wieder, wenn auch nicht leicht mehr in dem bedeutenden Grade. In der weiteren Folge gestaltet sich das Krankheitsbild verschieden, je nachdem die Krankheit den acuten Verlauf durchläuft oder sich dem chronischen nähert. Im ersteren Falle erfolgt in der Regel der Tod einige Zeit nach dem Aufbruche unter den Erscheinungen eines pyämischen oder Consumptionsfiebers; beim zweiten Falle kann das Sechsthum lange Zeit dauern und der Tod

erst späterhin durch Erschöpfung oder bei einer neuen Exacerbation der Entzündung eintreten; oder es kann der Process sich zum Günstigen wenden und einen der zu erwähnenden anderweitigen Ausgänge nehmen.

Die chronische Form der Entzündung beginnt meist mit mässigem Fieber, der Schmerz ist in der Regel ebenfalls anfangs gering und wird nur durch ausgedehntere Bewegungen, durch stärkeren Druck auf das Gelenk gesteigert oder erfährt bei kaskalter Witterung eine Vermehrung. Auf diese Weise kann der Process einen längeren Zeitraum durchmachen, bis Anbruch eintritt, wobei dann die Erscheinungen sich ändern, je nachdem eine ausgebreitete Entzündung auftritt oder die Krankheit auch jetzt noch ihren chronischen Charakter beibehält. Ist erstere Thatsache der Fall, so können nach dann noch alle Symptome einer neuen Gelenkentzündung mit rapidem Verlaufe zum Vorschein kommen. Nebst den erörterten ungünstigen Ausgängen kann die Gelenkentzündung, besonders wenn dieselbe auf die geeignete Weise allgemein und local behandelt wird, folgende Resultate darbieten:

1) Genesung ohne bedeutendere Störung der Function des Gelenkes. Dieser Ausgang setzt voraus, dass die Erkrankung keinen zu hohen Grad erreicht hat, dass die Gelenkknorpel und Bänder keine ausgebreitete Zerstörung erfahren haben. Da jedoch diese günstigen Vorbedingungen nur in wenigen Fällen gegeben sind, so gehört dieser Ausgang auch zu den selteneren.

2) Heilung, jedoch mit Beeinträchtigung der Function des Gelenkes, indem der entzündliche Process bereits derartige Veränderungen gesetzt hat, dass eine vollständige Wiederherstellung nicht mehr ermöglicht werden kann. Es kommt in derartigen Fällen, wenn die knorpeligen und knöchernen Theile verhältnissmässig weniger gelitten, die Kapsel, die Gelenkbänder und umliegenden Weichtheile hingegen grössere Zerstörung erfahren haben und der Heilungsprocess mit Zusammenziehungen, Verwachsungen, Anklebungen einhergegangen ist, zur Steifigkeit mit gehinderter Bewegung (falsche Ankylose), oder wenn auch die knöchernen Theile und die Knorpel intensiver ergriffen worden und bei der Heilung durch Knochenneubildung gegenseitig verwachsen sind, zur wahren Ankylose. Letzteres Resultat herbeizuführen nach eine Reihe von Operationsverfahren, während Heilung mit wenigstens einiger Beweglichkeit für gewisse Fälle vortheilhafter ist und ebenfalls durch operative Verfahren von den Chirurgen angestrebt wird. Die falsche Ankylose gibt nicht selten in der eben erwähnten Absicht Veranlassung zu operativen Eingriffen, während wiederum die wahre Ankylose, wenn sie mit bedeutenden Deformitäten verbunden ist, Gegenstand normaler Behandlung wird.

3) Heilung jedoch mit Lageveränderung der das Gelenk zusammensetzenden Knochen, wenn im Laufe der Entzündung, nach Zerstörung der Halthänder und Befestigungsmittel, sowie nach Eröffnung der Gelenkkapsel, durch irgend einem, meist geringfügigen Anlass, Ausweichen eines oder mehrerer Knochen aus der natürlichen Lage erfolgt ist (Luxatio spontanea). Hat eine derartige Lagenerkrankung länger bestanden, so wird sie selten ein erfolgreiches Object für chirurgische Eingriffe geben, nur bis und da wird bei abgelaufener Entzündung und bei nicht zu lange bestehender Lageveränderung ein solches Verfahren mit günstigem Resultate vorgenommen werden können.

Therapie.

Die Behandlung zerfällt in zwei Theile: 1) in eine allgemeine gegen die Grundkrankheit und 2) in eine örtliche gegen die Localaffection gerichtete.

In letzterer Beziehung ist eine vollkommen ruhige und passende Lage des kranken Theiles von grösster Wichtigkeit und erste Bedingung jeder Behandlung, die von Erfolg gekrönt sein soll. Es ist bereits darauf aufmerksam gemacht worden, dass die Kranken instinktiv eine gewisse Lage des Gliedes aufsuchen und beibehalten, da jedoch diese Lage und Stellung des betreffenden Gelenkes im Laufe der Entzündung meist eine bleibende wird, dieselbe aber in manchen Fällen für die Function ungünstig erscheint, so muss möglichst darauf gesehen werden, dass die Lagerung eine solche ist, welche beim Ausgang in Ankylose die Gebrauchsfähigkeit in nicht zu hohem Grade beeinträchtigt. Der Kranke gewöhnt sich in der Regel bald an die dem Gliede gegebene Richtung, wenn dieselbe auch von der durch ihn selbst aufgesuchten entgegengesetzt sich verhält.

So lange die Entzündung noch besteht, muss ununterbrochen Ruhe eingehalten werden, und erst nach Abkuss derselben darf unter Anwendung jeder Vorsicht und unter möglichster Schützung des Gliedes mit Bewegungen begonnen werden.

Gegen die Schmerzen sind Narcotica sowohl innerlich, als äusserlich in Form von Morphiumsalbe etc. anzuwenden, und haben dieselben einen bedeutenden Grad erreicht, so hat man sich nicht vor dem Gebrauche der Kälte, selbst der Application des Eises zu scheuen.

Als zertheilende, Resorption befördernde Mittel hat man vielerlei empfohlen; am meisten werden die Jodpräparate (Jodkalisalbe, Richter'sche Jodlösung zum Einpinseln; Jod. pur., Kali hydriod. ana 4.0 Glycerin 8.0) angewendet; Quecksilberpräparate erfordern viel Vorsicht.

Jobert empfiehlt neuerdings das salpetersaure Silber als ein treffliches Mittel bei chronischen Gelenkentzündungen. Man beginnt mit einer Salbe aus salpetersaurem Silber 4.0 auf 30.0 Fett und lässt davon zweimal täglich in der Menge von 2.0—4.0 einreiben, allmählig steigt man mit dem salpetersauren Silber bis zu 12.0 auf 30.0 Fett. Als Ableitungsmittel sind Haarseile, Fontänen, Moxen, das Glüheisen angewendet, besonders hat letzteres durch Rust grossen Ruf sich erworben. — Doch entspricht der Erfolg bei Weitem nicht immer den gehieften Erwartungen.

Gegen die Dykrasie sowohl als gegen die örtliche Affection finden vielfach Bäder ihre Anwendung, dieselben sind jedoch nur unter der Voraussetzung zu gebrauchen, dass dem Kranken die Lagerveränderung und die Bewegung nicht grösseren Schaden verursachen würde, als das Bad Nutzen stiften möchte. Vorzüglich sind es Jod- und Brombäder, welche sich eines gewissen Rufes erfreuen; ihrer Einfachheit und Wohlfeilheit wegen verdienen Bäder mit Kochsalz empfohlen zu werden. Hier schliesst sich die Priessnitz'sche Methode bei Gelenkleiden Scrophuliser an, welche zwar in ihrer ganzen Ausdehnung über den Körper wegen der geringen Menge von Kräften, die das Kind bei der erschöpfenden Cur zu veranlagen hat, zu verwerfen ist, jedoch lokal an dem kranken Gelenke volle Berücksichtigung verdient. Bei

vorhandener Eiterung ist für guten Abfluss des Eiters, sowie für einfachen nicht reizenden Verband der Fistelöffnungen zu sorgen. Bei Abscessen, die sich in der Nachbarschaft des Gelenkes entwickeln, gegen die Haut vordrängen, braucht mit der Eröffnung nicht gezögert zu werden, hingegen sollen solche Eiteransammlungen, welche mit dem Gelenke zusammenhängen oder nach Durchbohrung der Gelenkkapsel bis unter die Haut gelangt sind, möglichst spät geöffnet werden, wenn die Kräfte des Kranken im Sinken sind, da der Process dann in der Regel rascher seinem lethalen Ende zugeht.

Tritt Vereiterung im Gelenke ein und ist bei der geeigneten localen und allgemeinen Behandlung nicht zu hoffen, dass sich Ankylose bildet, sondern verschlimmern sich die Zufälle und ist heftige Consumption zu befürchten, so kommen die chirurgischen Eingriffe als letzte zur Lebensrettung mögliche Mittel in Frage, vorausgesetzt, dass der Zustand des Kranken — worüber natürlich jeder einzelne Fall Aufschluss geben muss — überhaupt noch ein operatives Verfahren zulässt. Bei denselben kann es sich um Entfernung der kranken Knochentheile — Resection — oder um Wagnahme des kranken Gliedes, Amputation oder Exarticulation, handeln (vergl. darüber die einzelnen Erkrankungen der Gelenke).

Bei vollkommen chronisch gewordenen Gelenkentzündungen eignet sich in manchen Fällen die Druckverhände um das betreffende Glied mit oder ohne gleichzeitige Anwendung von Resorption befördernden Mitteln, besonders Jodpräparaten. Die Compression kann durch Leinwand- oder Flasellbinden ausgeübt, oder in dieser Absicht ein Gyps- oder Kleisterverband um das Gelenk applicirt werden, wodurch dieses auch am besten in der gewünschten Lage erhalten wird. Fistelgänge und Geschwüre um das Gelenk geben keine Contraindication, der Verband ist dann mit Fenstern, Oeffnungen zu versehen und öfters zu erneuern. Bieten Ankylosen, in so fern sie den Gebrauch des betreffenden Gliedes in bedeutenderem Grade behindern, Veranlassung zur Behandlung, so wird man je nach der Natur derselben einfachere und gelindere, oder gewaltzamere und selbst operative Verfahren einzuschlagen haben. Zu ersteren sind zu rechnen: Locale und allgemeine Bäder, Douche, Fomentationen, unterstützt durch passive Bewegungsvorrichtungen, Apparate und Maschinen, die successive wirken; zu letzteren gehören die gewaltsamen Zerreißen und Extensionen, entweder mit Hilfe von Maschinen — oder in der Narcose nach dem Vorgange von Langenbeck. Als erleichternder Act kann die subcutane Durchschneidung von verdickten aponeurotischen, sehnenigen Gebilden, Bändergewebsträngen etc. vorausgeschickt werden. Als operative Eingriffe werden bei knöcherner Ankylose die einfache Durchschneidung des Knochens oder die Ausschneidung oder Resection von verschieden gestalteten Stücken vorgenommen.

Die scrophulöse Entzündung im Hüftgelenke.

(Coxitis scrophulosa, Coxarthrosea, Coxalgia, Morbus Coxarum, Laxatio spontanea. Freiwilliges Hinken.)

Diese Krankheit kommt unter den Gelenkentzündungen bei Weitem am häufigsten vor und befällt die scrophulösen Kinder in den ver-

schiedenen Lebensaltern, sehr oft zur Zeit der zweiten Dentitionsperiode. Dieselbe geht meist von den knöchernen Theilen des Gelenkes — am häufigsten vom Hüftgelenkkopf — aus, seltener von der Synovialmembran oder den umgebenden Weichtheilen und breitet, je nachdem der Verlauf einen acuten oder chronischen Charakter hat, Verschiedenheiten in ihren Stadien. Bei der acuten Entzündung entstehen schnell im Hüftgelenke und dessen Nachbarschaft heftige Schmerzen, welche sich vorzugsweise an der inneren Seite des Schenkels bis zum Knie ausbreiten und bei Berührung des Hüftgelenkes oder bei Bewegungsverzichten sich vermehren. Letztere werden sorgfältig gemieden, die Schenkel gegen den Unterleib angezogen und etwas nach Innen gewendet. Die Schmerzen nehmen meist bei Nacht zu und stören den Schlaf oft vollkommen, dabei sind in der Regel lebhaftes Fieberbewegungen vorhanden, welche die Kräfte auffallend rasch herabbringen. Das Stehen und Gehen ist dem Kinde höchst beschwerlich oder auch ganz unmöglich, es stützt dabei das ganze Gewicht des Körpers auf die gesunde Extremität, zieht die Hüfte der leidenden Seite in die Höhe und droht auszufallen. Die Gegend des Hüftgelenkes, besonders die Hinterbacke erscheint mehr oder weniger angeschwollen, die Falte derselben meist tiefer stehend; beide Extremitäten sind entweder gleich lang oder die kranke Extremität scheint etwas verkürzt oder verlängert. Zertheilt sich die Entzündung nicht — der seltenere Fall —, so geht sie unter heftiger Verschlimmerung der allgemeinen und örtlichen Zufälle in Eiterung über; es kommen Abscesso in der Nähe des Hüftgelenkes oder in einiger Entfernung von demselben zum Vorschein, communiciren mit der im Gelenke gesammelten Eitersammlung, brechen nach Rißung der äußeren Haut auf und geben zu einer intensiven Eiterung und Jauchung Veranlassung. Bei rasch fortschreitender Zerstörung der knöchernen Theile, wodurch der Gelenkkopf kleiner, der Pfannenraum größer wird und also ein räumliches Missverhältniß zu Stand kommt, kann der Schenkelkopf sich leicht dislociren und zu einer wirklichen Veränderung seiner Längenverhältnisse gegenüber dem anderen Veranlassung geben. Das Fieber nimmt bald nach dem Ausbruche den Charakter des hektischen an, die Kräfte sinken, die Kinder magern bedenkend ab, die Muskeln der Hüfte und des Oberschenkels werden schlaff. Oft unterliegen nun die Kinder dem fortdauernden Consumptionsfieber, welches auch mit pyämischen Erscheinungen einhergehen kann, und sterben, indem der ganze Process nur sehr kurze Zeit gewährt haben kann — nur in seltenen Fällen mindert sich die Eiterung, es stossen sich Knochenstücke los und die Abscessöffnungen schließen sich.

Beim chronischen Verlaufe der Hüftgelenkentzündung bemerkt man im Anfange ein oft nur ganz unbedeutendes Schleppen oder Nachschleifen der Extremität beim Gehen des Kindes, dabei stellt sich leichte Ermüdung mit Klagen über Schwäche und Steifheit im Beine ein, der Gang wird bei stärkeren Anstrengungen unsicher, wobei das Körpergewicht ebenfalls meist auf der gesunden Beckenseite und Extremität ruht. Der Schmerz ist nicht bedeutend und nicht anhaltend, ist meist vage im Schenkel herumziehend und gleicht dem rheumatischen; nicht selten ist derselbe am Morgen vorhanden, schwindet im Laufe des Tages und zeigt sich Abends unter leichten Fiebererscheinungen wieder. Am Hüftgelenke bemerkt man wenig Krankhaftes. Lässt man

den Patienten die kranke Extremität in die Höhe heben, so bemerkt man hier und da schon eine geringe Rotationsbewegung des Schenkels nach Innen nebst leichter Adduction desselben. Diese Zufälle können bei schleichendem Verlaufe des Uebels Monate (selbst Jahre) lang dauern, wechseln wohl auch häufig in Besserung und Verschlimmerung.

Nach einem gewissen Zeitraume ändert sich, ohne dass oft eine bestimmte äussere Ursache nachzuweisen wäre, das Krankheitsbild und neigt sich mehr und mehr der acuten Form zu. Es stellen sich die bekannten Schmerzen im Knie ein, welche meist sehr heftig sind, ohne jedoch durch die Berührung und durch Druck vermehrt zu werden. Die Knieschmerzen hat man durch Reizung der äussersten Hautzweige des Nerr. obturator. oder des Saphenus internus zu erklären gesucht. Der Gang wird stärker beeinträchtigt, es entsteht Hinken, der Fuss berührt nur mit der Spitze den Boden, während das Gewicht des Körpers auf dem ausgestreckten, gesunden Beine zu ruhen kommt. Beim Sitzen wird nur die Hinterbacke der gesunden Seite auf die Unterlage gebracht und will der Patient irgend einen Gegenstand vom Boden aufheben, so beugt derselbe nur das gesunde Knie, während die kranke Extremität steif gehalten wird.

Im weiteren Verlaufe treten Symptome ein, welche zu den verschiedensten Annahmen und Deutungen Veranlassung gegeben haben und deren bereits oben Erwähnung gethan wurde: nämlich eine Verlängerung oder Verkürzung des kranken Schenkels im Vergleich zu anderen, ohne dass eine Lageabweichung der das Gelenk zusammensetzenden Knochen vor sich gegangen wäre. Man nahm früher hauptsächlich an, dass der Schenkelkopf durch das Exsudat aus der Pfanne heraus gedrückt würde, wodurch Verlängerung des Schenkels zum Vorschein käme oder dass derselbe durch stärkere Muskelcontraction in die Pfanne gepresst und dadurch die Verkürzung der Extremität herbeigeführt würde. Es hat sich jedoch mit aller Evidenz herausgestellt, dass die angenommene Verkürzung oder Verlängerung keine reelle, wirkliche, sondern nur eine scheinbare ist, bedingt durch das Herabsinken der Beckenhälfte der kranken Seite, oder durch das Verschieben des Beckens auf der leidenden Seite nach aufwärts mit nachfolgender Krümmung der Wirbelsäule. Um diese Verhältnisse genau zu erörtern und um nicht in sehr leicht mögliche Täuschungen zu verfallen, muss man genaue Messungen anstellen und zu diesem Zwecke beide Spinae anteriores superiores im Liegen des Kranken in eine gerade Linie bringen, auf welche eine vom Schwertfortsatz des Brustbeins direkt nach abwärts gezogene rechtswinklig auffällt. Dann sucht man die beiden Extremitäten in ganz gleiche Lagerungsverhältnisse zu setzen, und misst dann mit einem aus fessam Materiale gearbeiteten Massstabe, von der Spina bis zum Condylus internus tibiae und Malleolus internus.

Die Krankheit kann auch in diesem Stadium zum Stillstand und zur Heilung gelangen: es schwinden dann auch die Erscheinungen der Verlängerung oder Verkürzung, vorausgesetzt, dass in der Configuration des Beckens und der Wirbelsäule nicht sehr wesentliche Veränderungen vor sich gegangen sind, welche die gerade Stellung des Beckens nicht mehr gestatten.

Macht hingegen die Krankheit weitere Fortschritte, so tritt eine

mehr oder weniger bedeutende Anschwellung in der Gesäß- und Hüftgelenkgegend ein, die Haut röthet sich, es zeigt sich Weichheit und Fluctuation, welchen Erscheinungen in der Regel bald Aufbruch folgt. Dieser findet jedoch nicht immer in der Nähe des Gelenkes statt, der Eiter kann sich vielmehr weit nach abwärts einen Weg bahnen und in der Kniegelenkregion oder noch weiter abwärts zum Vorschein kommen. Wird die Gelenkkapsel vom Eiter durchbrochen, so geschieht dies meist an der hinteren oder unteren Seite, woselbst einerseits jene die geringste Dichtigkeit zeigt, andererseits auch der stärkste Andrang des Gelenkkopfes, besonders wenn man dem Kranken die Lagerung der Extremität selbst überläßt, stattfindet. Gar nicht so selten bemerkt man, dass der Eiter aus der Gelenkhöhle durch die Communicationstelle mit dem Schleimbeutel unter dem Muscul. Iliopsoas in letzteren und von da aus in die Beckenhöhle dringt, wiewohl er auch durch Perforation des Darmbeines von der Glutälmuskulatur aus in den Beckenraum gelangen kann. Die durch den Durchbruch der äusseren Haut gebildeten Fistelöffnungen sind meist von schwammigen, leicht blutenden, das Niveau der Haut überragenden Granulationen umgeben, nicht selten bilden sich auch entsprechend der Perforationsstelle ausgebreitete Geschwüre in der Haut und dem Unterhautzellgewebe.

Bei fortgeschrittener Zerstörung der Knochensubstanz an den das Gelenk zusammensetzenden Knochen entsteht Verkleinerung des Schenkelhalses und Vergrößerung des Pfannenraumes, also ein räumliches Missverhältnis, welches die Grundbedingung zu der sog. Luxatio spontanea ist, die mit wirklicher Verlängerung oder Verkürzung des Schenkels im Vergleiche zu dem gesunden einhergeht. Die Ausweichung des Schenkelkopfes oder des Restes desselben selbst erfolgt bei vorgeschrittenem cariesem Process oft sehr leicht durch die Veränderung der Lage im Bette, durch Aufheben des Kranken, durch energische Contracturen der Streckmuskeln und kann verschiedene Richtungen einschlagen. Am häufigsten findet jedoch die Luxation nach oben und hinten auf die äussere Fläche des Darmbeines statt, weil der Kopf durch die Lage des Schenkels meist gegen den hinteren Pfannenrand drückt und dessen caries Zerstörung am ehesten vollendet ist, auf welche Art der Gelenkkopf ein oft ausserst geringes Hinderniss zu überwinden hat. Wird die Stelle des Darmbeines, welches dem abweichenden Schenkelkopf entspricht, auch in diesen Process gezogen, so kann Durchbruch der Darmbeinfläche und Eindringen des Kopfes in die Beckenhöhle vor sich gehen, obwohl diese Möglichkeit auch ohne Luxation durch Zerstörung des Bodens der Pfanne stattfinden kann.

Neben dieser gewöhnlichen Form der Ausweichung des Hüftbeinkopfes sind auch solche in das Foramen ischiadicum oder obturatorium auf den horizontalen Schambeinast, wiewohl seltener beobachtet worden. Abtossung des kranken Kopfes und Elimination desselben durch eine grössere Fistelöffnung hat die Erfahrung gezeigt: im günstigsten Falle kann durch diesen Vorgang die Heilung, freilich mit grösserer Differenzität, eingeleitet und ermöglicht werden.

Erfolgt Stillstand des Uebels und Genesung von dem in Rede stehenden Leiden nach geschehener Luxation, so bleiben die Folgen derselben in der erwähnten Weise zurück und stören den Gebrauch

der Extremität meist in hohem Grade. In glücklichem Falle wölbt sich in weiterer Zeit eine Art von Gelenkhöhle neben der alten, in welcher der Kopf einige Beweglichkeit hat, meist aber ist derselbe in seiner neuen Stelle durch Adhäsionen, Verwachsungen festsetzend.

Häufiger ist jedoch die Ausweichung des Schenkelkopfes Vorhanden der letzten Stadien der Krankheit. Die Eiterung wird immer grösser, die Haut wird nicht selten in grösseren Partien necrotisch, die Extremität durch Gerinnungen in den Eysen oder mechanischen Druck zu dieser ödematös. Das Fieber nimmt mehr und mehr den hektischen Charakter an, es entstehen Frostschauer bis zu Schüttelfrösten und die Kinder sterben unter dem Bilde allgemeiner Consumption.

Bei der neuen Form der Hüftgelenkentzündung, sowie bei der ausgebildeten Krankheit unterliegt die Diagnose nicht der mindesten Schwierigkeit: bei dem chronischen Verlaufe hingegen kann sie in den Anfangsstadien entweder mit anderen Processen verwechselt oder ganz übersehen werden. Verwechslung mit rheumatischen Affectionen, mit Hüftweh sind im Anfang der Krankheit nicht unmöglich, doch wird eine genaue Beobachtung der geschilderten Symptome, das Fehlen von Erscheinungen, den genannten Processen eigenenthümlich, bald die richtige Diagnose treffen lassen, wenn auch nicht das Allgemeinbild schon aufmerksam machen müsste.

Therapie.

Bei der Coxitis ist vor Allem auf strengste Ruhe der unteren Extremität und des Hüftgelenkes zu sehen und zwar soll dieselbe in gestrecktem Zustande bei fixirtem Becken gelagert sein. Zu diesem Zwecke bedient man sich mit Vortheil der Verbrände, wie dieselben für Schenkelhals- oder Schenkelfracturen angegeben wurden, am besten mit zwei Schienen für die äusseren Seiten der beiden Extremitäten, welche bis gegen die Schultern reichen, durch ein Faubert vereinigt sind, während für das Becken ein Kissen oder Gurt an Apparate angebracht ist. So sehr sich die Kinder anfangs gegen diesen Apparat wehren und sträuben, besonders wenn sie schon eine Zeit lang die von ihnen selbst aufgewählte gebogene adducirte Lagerung des Schenkels inne gehabt hatten, so leicht gewöhnen und vertragen sie denselben, besonders wenn man denselben anfangs nur einige Zeit lang anlegt und dann erst allmählig weiter steigt, bis er fast immer gebrauchet wird.

Auch der Gypse- oder Kleisterverbrände bedient man sich mit Vortheil zur Ruhighaltung der Gelenkgegend und der Extremität: besonders mögen dieselben bei leichteren Fällen gebraucht werden, da sie der Verschiebung des Beckens, wie dieselbe in schweren fast immer eintritt, nicht genug Widerstand entgegensetzen.

Man hat in neuerer Zeit auch die Resection des Gelenkkopfes mit Vortheil ausgeführt. Durch die Zerstörung der Gelenkhäuter und der Kapsel wird die Operation bedeutend erleichtert, so dass man mit einem einfachen Längsschnitt meist ausreicht, durch welchen man dann in der Regel sogleich den Schenkelkopf erreicht und denselben mit einer gewöhnlichen oder der Kettenäge abtrennt. Andere Operationsmethoden gründen sich auf Anlegung eines drei-eckigen, halbmondförmigen Lappens, obwohl sich keine bestimmte Schnittföh-

rung wegen der bestehenden Fistelgänge angegeben lässt, sondern jeder Fall seine eigenen Vorschriften gibt.

Ist die Heilung mit Ausziehung des Schenkelkopfes erfolgt, so hat die bedeutende Differtilität und Behinderung des Gebrauches des Schenkels zu Heilversuchen geführt. Man hat, wenn die Lutation nicht zu lange bestand, die Einrichtung unter den notwendigen Vorsichtsmaassregeln zu erreichen gesucht und dadurch in manchen Fällen wenigstens eine bessere Richtung des Schenkels erzielt, die sich unter längerer Anwendung von Maschinen noch vervollkommnete.

Die scrophulöse Entzündung im Kniegelenke.

Genarthroscie, Genualgia, Tumor albus genu, weisse Kniegeschwulst.

Der Ausgangspunkt dieser Krankheit sind entweder die knöchernen Theile des Gelenkes und vorzugsweise die Gelenkknochen des Oberschenkels, seltener der Kropf des Schloosheines oder — und zwar häufiger — die Synorialsapsel mit oder ohne die Gelenkhäuter. Die Erscheinungen sind verschieden, je nachdem das Leiden akut oder chronisch auftritt. Im ersteren Falle können dieselben äusserst rapid und stürmisch sich zeigen und in kurzer Zeit mit Versitterung des Gelenkes und selbst tödtlich endigen — im letzteren sind sie häufig anfangs fast unmerklich und steigern sich erst nach und nach.

Symptome.

Das Leiden beginnt mit dem Gefühle von Steifigkeit und etwas gehinderter Bewegungsfähigkeit im Gelenke, die Beugung fällt schwerer, während das Strecken meist weniger behindert ist. Frühzeitig erkennt man die Anschwellung des Gelenkes, die durch vergleichende Messungen leicht festzustellen ist und durch welche die Gelenke zu beiden Seiten des Patellarbandes, sowie die Kniekehlen ausgefüllter, voller erscheinen. Die Temperatur des Gelenkes ist meist etwas erhöht. Mit dem Fortschreiten der Erkrankung stellt sich allmählig der Unterschenkel mehr und mehr in Beugung zum Oberschenkel, die Bewegungen sind schmerzhafter, namentlich jetzt auch die Beugung. Es entstehen Schmerzen auch ohne Bewegungsversuche: dieselben, anfangs dumpfer Natur, gewinnen nach und nach an Lebhaftigkeit und breiten sich bis zum Fuss aus, die Geschwulst wird grösser, fühlt sich meistens eigenthümlich elastisch an, ohne jedoch das Gefühl von Fluctuationen zu geben, die Haut behält ihre Farbe, ist meist gespannt und glänzend. Beginnt Eiterung in der Gelenkhöhle, Abscessbildung in dem Umfange des Gelenkes, so nimmt das Volumen desselben noch zu, die Haut röthet sich und man bemerkt in dem Grade, als sich die Eiteransammlung der Haut nähert, deutliche Fluctuation, meist mit starker Vermehrung der Schmerzen, die dem kranken Kinde nicht selten jede Ruhe rauben. Aufbruch erfolgt entweder im Umfange des Gelenkes oder der Eiter senkt sich längs des Unterschenkels herab und kann in manchen Fällen erst in der Gegend des Fussgelenkes zum Vorschein kommen; übrigens ist Aufbruch an jeder Stelle des Unterschenkels, jedoch sehr selten an der vorderen Fläche beobachtet worden. Auch eine Strecke weit nach aufwärts am Oberschenkel ist der Eiter, begünstigt durch die Lage der Extremität, zum Vorschein

gekommen. Schreitet der Process mit carlöser Zerstörung des Gelenkknochen und Ulceration der Kapsel und umgebenden Weichtheile fort, so kann ebenfalls Lageveränderung der das Gelenk zusammensetzenden Knochen erfolgen und zwar betrifft dieselbe meist den Unterschenkel, der eine ganze oder theilweise Abweichung aus seiner Lage darstellt.

Auf jeder Stufe der genannten Veränderungen im Krankheitsverlaufe kann der Process stille stehen und zur Heilung gelangen, wobei je nach der Grösse der anatomischen Störungen mehr oder weniger bedeutendere Beeinträchtigung der Bewegung und Configuration des Gelenkes zum Vorschein kommen wird. Meist erfolgt — wenn nicht die Behandlung diesen Ausgang verhütet hat — die Heilung mit Verwachsung der Gelenkenden: in günstigeren der Behandlung leichter zugängigen Fällen mit der Bildung von Bindegewebsadhasionen, tendinösen Strängen etc. (bei Entzündungen von der Synovialhant ausgehend und ohne bedeutendere Störung in den Korpelüberzügen); in ungünstigen und zur durch tiefere mechanische Eingriffe zu beseitigenden durch Zusammenheilen und Verwachsen der knöchernen Theile (nach Abstoosung der Gelenkkorpel und carlöser Entzündung der Knochen). Falsche und wahre Ankylose des Kniegelenkes.

Nimmt die Krankheit, ohne Stillstand zu zeigen, ihren weiteren Verlauf und tritt sie in die letzten Stadien, so zeigt der Unterschenkel oedematöse Anschwellung, die Jauchung ist meist sehr profus, die allgemeinen Erscheinungen werden immer bedenklicherer Natur und der Tod tritt in der schon mehrmals erwähnten Weise ein.

Therapie.

Bei der Behandlung gelten die erörterten Grundsätze; hinsichtlich operativer Eingriffe wird wohl hauptsächlich die Amputation des Oberschenkels in Betracht kommen, da die Resection des Gelenkes schon wegen der grossen Knochenflächen, die in neue Eiterung versetzt werden müssen, und bei den geringen Ansichten zur Heilung kaum ausgeführt werden wird.

Die serophulöse Entzündung des Fussgelenkes.

Tumor albus articuli pedis. Podarthrose.

Der gewöhnliche Anfang dieser ziemlich häufig vorkommenden Erkrankung ist ein meist ganz mässiger, dann nach und nach intensiver werdender fixer Schmerz, entweder an der Vorderseite des Fussgelenkes oder an einer der seitlichen Gegenden, seltener die ganze Gelenkparthie einnehmend. Die Bewegung ist anfangs wenig gehindert, bald aber wird sie in der Weise beeinträchtigt, dass der Fuss etwas nachschleift, an Sicherheit im Tritte verliert, wobei dann gewöhnlich jeder falsche Tritt, jedes Antossen an einen festeren Gegenstand, selbst das Auftreten auf feste Körper (Steine) als Schmerz im Gelenk empfunden wird. Bald zeigt sich auch eine elastische, von normaler Haut überzogene Anschwellung am Fussgelenke, wodurch die Räume unter den Knöcheln angefüllt und die ganze Gelenkgegend voluminöser gemacht wird. Der Schmerz ist anhaltender, dumpf oder reinend, sich über den Fuss ausbreitend.

Im weiteren Verlaufe wird die Haut geröthet, die Anschwellung weicher, es kommt an einer oder mehreren Stellen zu Fluctuation in Folge von Eitersammlung entweder direkt aus dem Fussgelenke oder durch einen in der Umgebung entstandenen Abscess, dem dann bald Communication mit der Gelenkhöhle folgt. Vor dem Aufbruche haben die Schmerzen ihre höchste Höhe erreicht: ist jener erfolgt, so lassen dieselben meist an Intensität nach. Durch die Fistelöffnungen, deren sich manchmal eine bedeutendere Anzahl um das Gelenk herum befindet, gelangt man mit der Sonde leicht in die geöffnete Gelenkhöhle oder auf cariose Knochenstücke, den Unterschenkel- oder Fusswurzelknochen angehängt, während sich aus denselben meist sehr übelriechender, missfarbiger Eiter, der auch mit Bröckelehen und Stückchen von Tuberkelmasse und mit Knochenpartikeln durchsetzt sein kann, entleert. Die ist wirklich sehr zahlreichen Oeffnungen verdanken ihren Ursprung Abscessen, die in den Weichtheilen um das Gelenk herum entstehen und meist bis zur erkrankten Gelenkhöhle sich fortsetzen.

Der Fuss bekommt im weiteren Verlaufe, wenn die Krankheit nicht stille steht, eine unförmliche Gestaltung, indem der vordere Theil meist abmagert, die Gelenkgegend klumpig vergrößert erscheint, dabei ist derselbe nach Art des Pferdefusses durch die Achillessehne in die Höhe gezogen. In der Regel nimmt die Erkrankung einen langsamen Verlauf mit acuten und subacuten Steigerungen, heilt manchmal mit Diffornität und bleibender Beeinträchtigung der Bewegung, kann aber auch mit tiefen Störungen des Allgemeinbefindens durch Jauchung und Entkräftigung zum Tode führen.

Therapie.

Ausser um die Amputation des Unterschenkels, welche bei dieser Form in Betracht kommen kann, handelt es sich vorzugsweise noch um die Resection des cariosen Fussgelenkes, wenn die Krankheit nur die untersten Gelenktheile des Unterschenkels und den oberen Theil des Astragalus ergriffen hat.

Die serophulöse Entzündung des Ellbogengelenkes.

Olecranonarthrocace.

Das Ellbogengelenk ist bei der Serophulose nicht selten Sitz der Entzündung, und zwar geht dieselbe bald von der Synovialmembran aus und ergreift die knöchernen Gelenkenden, bald hat sie ihren Sitz zuerst in der spongösen Substanz der das Gelenk bildenden Knochen. Die Krankheit beginnt in der Regel mit einer leichten Erschwerung der Bewegungen im Gelenke und mit gelinden Schmerzen: beide Erscheinungen nehmen an Intensität zu, während sich um das Gelenk herum eine Anschwellung bildet, die anfangs ziemlich derb und elastisch ist, nach und nach weicher wird und an einer oder mehreren Stellen aufreicht.

Der Vorderarm ist mehr oder weniger zum Oberarm gebeugt, dabei in einer Mittelstellung zwischen Pro- und Supination. Die ganze Extremität bietet nicht selten ein eigenthümliches Ansehen, indem der Vorderarm atrophisch ist, der Oberarm auch durch die Unthätigkeit seiner Muskulatur abmagert, während die Gelenkgegend spindel- oder

kugelförmig angeschwollen erscheint. Durch die Fistelöffnungen kann man sich durch Stöchenuntersuchungen über die Zerstörung im Gelenke in der Regel genauer überzeugen, da dieselben meist keinen langen Gang bilden und direct gegen den Knochen führen.

Die allgemeinen Erscheinungen sind je nach dem chronischen und acuten Verlaufe in der mehrfach erwähnten Weise verschieden, heftiges oder pyämisches Fieber entwickelt sich aus dieser Art der serophulösen Entzündungen seltener als aus den bisher beschriebenen, kommt jedoch ebenfalls vor. Gelingt die Krankheit zur Heilung, so erfolgt diese mit mehr oder weniger bedeutender Deformität und Ankylose; Abweichungen der einzelnen Knochen aus ihrer gegenseitigen Lage erfolgen auch bei grösserer Zerstörung nicht häufig; am häufigsten ist Luxation der Ulna nach Hinten oder Ausweichen des Radialköpfchens nach Innen zu.

Therapie.

Ausser der Amputation des Oberarmes, die bei sehr heftigen, das Leben bedrohenden Entzündungen des Ellenbogengelenkes in Frage kommen kann, ist die Resection der carösen Knochen zu erwähnen, die nicht selten bei erschöpfender Eiterung zur Lebensrettung oder Abkürzung des krankhaften Processes im Gelenke vorgenommen wurde. In der Regel wird ein Längsschnitt parallel mit dem inneren Rand des Oberarmes und zwei Finger über ihm beginnend und nach abwärts ziehend zur Entfernung der Knochen genügen; ist diese nicht der Fall, so wird eine complicirtere, sich meist nach der Gegenwart der Fistelöffnungen richtende Schnittführung nothwendig sein. Bei allen Operationsmethoden ist auf die Erhaltung des Nervus ulnaris gehörende Rücksicht zu nehmen.

Allgemeine Behandlung der Tuberculöse und Serophulöse.

Bei dem grossen Gewichte, das nach meiner Ansicht auf die hereditäre Anlage zu legen ist, kann weniger von einer Verhütung des Ausbruches der Dyskrasie als von der Erzielung eines möglichst frühen, günstigen Verlaufes der verschiedenen Localisationen die Rede sein.

Sorgfältige Abhaltung aller Verdauungsstörungen und der Aufenthalt in gut ventilirten Räumen sind die zwei Hauptpunkte, auf welche der Arzt bei Kindern tuberculöser Eltern zu dringen hat.

Die Kinder müssen lange Zeit an der Brust einer gesunden Amme bleiben. Die Entwöhnung geschehe mit der grössten Vorsicht. Später sind hauptsächlich die blühenden Speisen zu meiden. Die Hauptnahrung sei in den ersten zehn Lebensjahren Milch und Milchspeisen, Fleischsuppe, weiches Fleisch, junge, zarte Gemüse, viel rothes Obst. Kartoffeln sind nicht zu häufig, das Brod nur wohl ausgebacken zu gestatten. Als Getränke brauchen die Kinder nichts als frisches Wasser. Kleine Quantitäten Bier können keinen Schaden bringen, Wein und andere Spirituosen aber sind strenge zu meiden.

Zum Frühstück eignet sich der Eichelkaffee, sobald die Kinder ihn aber nicht mehr gerne nehmen, darf nicht zum wirklichen Bohnenkaffee übergegangen werden, sondern die Kinder trinken dann wieder die pure Milch.

So lange die sich einstellenden scrophulösen Erscheinungen fieberlos sind, darf von dieser Ernährung keineswegs abgegangen werden, stellt sich Fieberbewegung ein, so verbietet sie der Instinkt, welcher bei Kindern noch viel deutlicher als bei Erwachsenen hervortritt, von selbst. —

Was die Wohnung solcher Kinder betrifft, so ist ein sonniges Schlaf- und Wohnzimmer, möglichst gross und ventilirbar, dringend indicirt. Die Kinder müssen im Sommer den ganzen Tag, im Winter wenigstens zwei Stunden täglich im Freien sein. Häufige, lauwarme und noch besser kalte Waschungen und Bäder schützen am besten vor Erkältungen und den so häufigen Bronchialkatarrhen. Seebäder, auch Soolenbäder, sind für scrophulöse Kinder von besonderem Vortheile.

Im Sommer sollen sie auf dem Lande leben, im Winter in grossen geräumigen Zimmern. Der Aufenthalt in warmen Klimaten während der kalten Jahreszeit hat zwar den grossen Vortheil, dass die Kinder dort viel mehr im Freien sein können, da aber dieser Ortswechsel alle Jahre vorgenommen werden muss, wenn die Kinder nicht in den folgenden Wintern beträchtlichen Schaden nehmen sollen, so werden sie dadurch von frühester Jugend an an ein unstilltes Leben gewöhnt und betrachten sich selbst als ewige Patienten. Dass solche Treibhauspflanzen keiner freien Zukunft entgegengehen, bedarf kaum einer weiteren Versicherung.

Unter den Arzneimitteln gebührt ohne Zweifel dem Leberthran die erste Stelle. Contraindicirt ist dasselbe bei fieberhaften Zuständen, bei Appetitmangel und bei Diarrhöe, welche letztere Symptome er in der heissen Jahreszeit häufig selbst erzeugt. Ausserdem wird er von allen scrophulösen und auch ausgesprochen tuberculösen Kindern Jahre lang mit grösstem Vortheil genossen.

Man gibt ihn am besten 1—2 Stunden nach dem Frühstück, zu $\frac{1}{4}$ —1 Esslöffel und lässt etwas Kaffee nachtrinken oder reicht ein kleines Stückchen Zucker. Bei den meisten Kindern ist es obigenfalls gar nicht nothwendig, durch besonders wohlthunende Dinge eine Belohnung für den genossenen Leberthran eintreten zu lassen, indem er ihnen gewöhnlich gar nicht zuwider ist und sie selbst daran erwidern, wenn er einmal vergessen wird. Man thut gut, sogleich beim Beginn der Cur die Angehörigen aufmerksam zu machen, dass nur durch einen Jahre lang fortgesetzten Gebrauch eine Besserung erzielt werden könne und dass man viele Monate ihn fortgeben müsse, wenn auch Anfangs keine Veränderung oder gar eine Verschlimmerung eintreten sollte.

Bei gutgenährten, übrigens stark scrophulösen Kindern kann man dem Leberthran kleine Dosen Jodtinctur, 1—2 Tropfen auf 300 beifügen. Zur länger fortgesetzten, internen Jodbehandlung möchte ich jedoch niemals rathen. Jod- und bronchialige Quellen, in erster Reihe die Heilbrunn, dann die Kreuznach, sind bei scrophulösen Kindern also Bronchitis von sehr wohlthätiger Wirkung, bei mageren Kindern mit veralteter Bronchitis jedoch entschieden contraindicirt.

Wird nun der Leberthran nicht vertragen oder kann er unmöglich genommen werden, so muss man ein Surrogat für ihn suchen. Also das zweckmässigste erscheint der Wallnussblätterthee, wovon man täglich 2—3 Tassen trinken lässt. Hopfenabrad oder Calmeaufguss

werden auch von manchen Kindern genommen, von vielen andern aber wegen zu grosser Bitterkeit refusirt. Bei vorherrschender Blässe der Lippen und der Schleimhäute müssen eisenhaltige Mineralwasser oder leichtverdauliche Eisenpräparate, z. B. die Tinet. martis pomat. in Anwendung kommen.

Jede schwächende Behandlung, mag sie nun in Blutentziehungen oder Brechmitteln, Abführmitteln, Antimonialien oder Mercurialien bestehen, bringt in allen Fällen eine Verschlimmerung der Dyskrasie und ist deshalb gänzlich zu meiden.

Traurig endlich sind die Erfolge, welche die chirurgischen Eingriffe an scrophulösen Knochen erzielen. Gewöhnlich entstehen an den Knochenwunden von Neuem dieselben Knochenkrankheiten, wegen deren die Operation vorgenommen worden, und trotz aller Pflege und Schmerzen wird der Process nur wenig hierdurch abgekürzt.

3) Hereditäre Syphilis.

Syphilitische Eltern erzeugen Kinder, welche entweder mit den Zeichen der Seuche geboren wurden oder wenigstens in den ersten Lebensmonaten solche zum Vorschein kommen lassen. Prognostisch ist es wichtig zu unterscheiden, ob die Kinder die entwickelte Syphilis mit auf die Welt bringen oder erst nach einiger Zeit daran erkranken.

Kinder, bei denen im Mutterleibe die Syphilis ausgebrochen, werden meist zu früh und todt geboren oder sterben, wenn sie lebend mit Pustulaklassen zur Welt gekommen sind, schon bald nach der Geburt. Jene Kinder aber, welche von syphilitischen Eltern stammend, scheinbar gesund geboren werden und erst nach Wochen oder Monaten die Zeichen ererbter Syphilis erkennen lassen, genessen unter geeigneter Behandlung sehr häufig und können sich ohne alle weiteren dyskrasischen Erscheinungen vollkommen weiter entwickeln.

Bevor wir auf die ätiologischen Fragen genauer eingehen, erscheint es zweckmässig, zuerst sämtliche zur hereditären Syphilis gehörenden Veränderungen zu analysiren.

Symptome.

Die angeerbte Syphilis gibt sich zu erkennen: 1) auf der Haut, 2) auf den Schleimhäuten, 3) im subcutanen Zellgewebe, 4) in den Muskeln und Knochen und 5) in den drüsigen inneren Organen.

ad 1) Haut.

Die syphilitischen Hautausschläge (die Syphiliden) theilen sich 1) in maculöse und squamöse, 2) papulöse und 3) pustulöse und bullöse.

Zur ersteren Form gehört die

Roseola syphilitica. Man versteht hierunter kleine bis bohnengrossen Flecken von bräunlich kupferiger Farbe. Sie beginnen über grösseren Strecken der Körperoberfläche zugleich als blassgelbe oder röthlichgelbe Flecken, anfänglich ohne Veränderung der darüber liegenden Epidermis und ohne Verhärtung noch Erhebung über die gesund gebliebenen Hautstellen. Mit der Zeit erheben sie sich jedoch etwas, bekommen eine kupferige Farbe und sehen aus wie abgeschliffen,

oder bedecken sich in anderen Fällen mit feinen weissen Schuppen. In Folge einer antisyphilitischen Behandlung verschwinden sie spurlos, geschieht jedoch nichts dagegen, so infiltriren sie sich mehr und mehr, die darüber liegende Epidermis wird entweder faltig oder vertrocknet oder es fängt die Cutis an zu nässen und sich mit gelben Schorfen zu bedecken.

An Hautparthien, welche fortwährend mit Fäces verunreinigt werden, also an dem Nates, der Schenkelbeuge und den unteren Extremitäten, kommt es oft zu Excoriationen und endlich auch zu tiefen schymaloidischen Geschwüren.

Die vererbte Haut behält auch niemals ihre normale Farbe und Glätte. Sie vertauscht die rosenrothe Färbung mit einer rauchgrauen, was am auffallendsten am Gesicht und zwar auf der Stirne zu beobachten ist. In Folge der bei Syphilis niemals ausbleibenden Abmagerung wird die Haut an vielen Stellen faltig und runzlig. Die Handteller und Fusssohlen bleiben selten intact, es kommt hier bald zu einer beträchtlichen Desquamation und bei Kindern, welche oft einen schmerzigen Schnuller mit den Händen halten, zu tiefen Excoriationen der Handteller. Diese Verläufe der Syphilis für die letztgenannten Hautstellen ist diagnostisch von besonderer Wichtigkeit, indem die übrigen, nicht syphilitischen Ausschläge gerade diese Theile unversehrt lassen.

Die zweite Form, die papulöse, besteht fast niemals für sich allein, sondern ist entweder mit der ersten oder mit der dritten Form, der bullösen complicirt. Die syphilitischen Papeln (Lichen oder Strophulus syphiliticus) sind von bräunlicher Farbe, hart, ohne Rote der Umgebung, stehen meistens zerstreut und finden sich ebenfalls am häufigsten in den Handtellern und Fusssohlen. Sie sind nicht charakteristisch genug, dass man auf sie allein ohne alle weiteren Symptome die Diagnose der Syphilis stellen könnte. Wird keine Behandlung eingeleitet, so bleiben sie lange unverändert, nehmen an Zahl mehr und mehr zu, werden an vielen Stellen verkrustet und stellen dann grössere oder kleinere unregelmässige Geschwüre dar. Wird aber eine passende Behandlung eingeleitet, so schwinden sie in kurzer Zeit vollständig, was sich aus der geringen anatomischen Veränderung hinlänglich erklärt.

3) Die dritte Form, die bullöse und pustulöse, ist die bösartigste und kommt nur bei hohen Graden der Dyskrasie vor. Sie wird repräsentirt durch den

Pemphigus syphiliticus.

Man versteht darunter gelbe, gelbgrüne oder bräunliche Eiterblasen von der Grösse eines Hanfkornes bis zu der einer Bohne. Ihr Inhalt ist trüb, eitrig, reagirt alkalisch, und ihre Umgebung ist nur in schmalen Umkreise geröthet. Sie stehen meist isolirt, confluirer nur an wenigen Stellen und finden sich am sichersten wieder auf den Handtellern und Fusssohlen.

Nach einigen Tagen sinken diese Eiterblasen entweder ein und vertrocknen zu einer dünnen Kruste, oder sie platzen, der Inhalt fliesst ab und die hochgeröthete Cutis wird nach Abstossung der Epidermis sichtbar. Die nachfolgende Wundsecretion ist äusserst gering, so dass es nicht einmal zur Krustenbildung kommt und die bedeckenden Klei-

dingstücke nur wenig befeuchtet werden. Zu tieferen Ulcerationen kann es schon aus dem einfachen Grunde nicht kommen, weil die Kinder nicht lange genug am Leben bleiben, sondern rasch collabiren und ohne alle weiteren Erkrankungen lediglich unter den Zeichen der Lebensschwäche zu Grunde gehen.

Die Prognose kann bei diesem bullösen Exantheme mit grosser Bestimmtheit festst. gestellt werden. Kinder, welche die ausgebildeten Pusteln mit auf die Welt bringen, sterben schon einige Tage nach der Geburt wieder, entwickeln sich dieselben erst etwas später, zwischen dem 3.—8. Tage des Lebens, so können die Kinder ein Paar Wochen leben, sterben hierauf aber auch fast alle, vorausgesetzt, dass wir es mit einem Pemphigus syphiliticus und nicht mit einem P. contagiosus, benignus zu thun haben. Nach Zeissl's reicher Erfahrung ist die angeborene Syphilis, welche sich fast ausschliesslich als Pemphigus manifestirt, unbedingt tödtlich.

Eigenthümlich ist, dass in der übergrossen Mehrzahl dieser Fälle die Syphilis vom Vater stammt, und dass die sorgfältigste Untersuchung der Mutter gewöhnlich zu keinem positiven Resultate führt, so dass schon öfter der Zusammenhang dieses Exanthemes mit der Syphilis bezweifelt worden ist. Die Zweifel entstanden hauptsächlich in Gehäusen, wo die betreffenden Väter natürlich nur selten zu ermitteln sind, während man in der Privatpraxis die früheren und jetzigen Gesundheitsverhältnisse des Vaters erforschen kann. Es stellt sich in letzteren Fälle heraus, dass regelmässig der Vater an sekundärer Syphilis leidet oder wenigstens gelitten hat. Man hat sogar schon öfter beobachtet, dass, nachdem der Vater einer vollständigen, antisyphilitischen Kur sich unterworfen hat, die hierauf erzeugten Kinder normal und ohne alle Zeichen von Syphilis zur Welt kamen und sich in der Folge gesund blieben.

Ausser diesem charakteristischen Pemphigus kommen bei syphilitischen Kindern auch noch in späterer Zeit eiterhaltige Pusteln vor, welche jedoch auf hartem, rothem Grunde stehen und nach dem Platzen tiefe speckige Geschwüre zurücklassen (Ethyriapusteln).

Am charakteristischsten für die erst nach der Geburt ausbrechende Syphilis sind die Hautgeschwüre und Rhagaden, welche mit besonderer Vorliebe die Mundwinkel, die Lippenränder, den Ansatz und die Genitalien bedecken. Die Lippengeschwüre sind flach, haben einen gelben, wenig indurirten Grund und halten sich anfangs genau an die rote Linie, welche die Lippen umsäumt. Erst später verlassen sie diese ihre ursprüngliche Stelle und greifen über auf die nächstgelegenen Hautpartieen, namentlich die Unterlippe und das Kinn, wo durch die Speien und durch den Schnuller die Epidermis abradirt erweicht und erodirt ist.

Unter Rhagaden versteht man Einrisse der Lippen in der Richtung der natürlichen Hautfalten. Sie entstehen zuweilen in ganz gesunden Lippen, gewöhnlich aber sind vorher die eben geschilderten Geschwüre vorhanden, durch deren Krusten die Lippen spreizt werden, und bei starker Ausdehnung, wie sie durch jedes Geschrei bedingt wird, einreissen. Die kleinen Einrisse werden nun durch den Geschwürseiter verunreinigt und es kommt zu ziemlich tiefen gelben Einschnitten, welche bei jeder Zerrung von Neuem bluten und aus demselben Grunde auch ausserordentlich langsam heilen.

Dieselben Rhagaden finden sich auch, jedoch viel seltener als am Mund, an den Nasenlöchern, am After und an der Vulva der Mädchen, und ausweilen auch an dem inneren Augenwinkel. Die der Lippen sind deshalb noch von besonderer Bedeutung, weil durch sie eine sichere direkte Infection von einem syphilitischen Säugling auf eine gesunde Amme vermittelt wird.

Was schliesslich die Hautsecretion betrifft, so kommen zuweilen bei syphilitischen Kindern übelriechende Schweisse am ganzen Körper, namentlich aber am Kopfe, vor. Dasselbe verschwinden, sobald die Dyskrasie getilgt ist.

ad 2) Schleimhäute.

Die erste Erscheinung der hereditären, einige Wochen nach der Geburt entstehenden Syphilis ist eine Schwellung der Nasenschleimhaut. Die so erkrankten Kinder athmen immer mit offenem Munde und schnarchen während des Saugens. An der Aussen Seite der Nase ist keine Veränderung zu bemerken, die Schleimhaut der Nasenlöcher aber erscheint geröthet und geschwollen. Nachdem diese Schwellung einige Tage bestanden, stellt sich eine eiterige Secretion ein, *Coryza syphilitica*, der Eiter ist anfangs schleimig und wird später blutig, faulartig, worauf er auch die Oberlippe ansetzt. Die alsdann weiterfressenden Geschwüre können endlich auch die Knochen ergreifen und Necrose und Exfoliation des Vomer, der Muscheln und des Siebbeins verursachen. Wenn anders die Kinder so intensive Syphilis überleben, so sinkt zum mindesten hierauf die Nase ein und es bleibt das Gesicht Zeit lebens eingestellt.

Auf der Mundschleimhaut und auf der Zunge entstehen dieselben flachen Geschwüre wie an den Lippenrändern, sie gehen niemals mehr in die Tiefe und verarben leicht, wenn eine entsprechende Behandlung eingeleitet worden ist.

Die Rhagaden und Geschwüre am Mastdarm, an der Vulva und dem Präputium wurden schon erwähnt. Leucorrhoea und Ulceration der Vagina kommt ziemlich oft vor. Die Otorrhoe und Ophthalmoblennorrhoe syphilitischer Kinder unterscheiden sich nur durch ihre grosse Intensität von denen der nicht syphilitischen. Bei dieser Ophthalmoblennorrhoe erweicht beiderseits die Cornea in kürzester Zeit und der Process endet höchst traurig mit Phthisis des Augapfels.

ad 3) Subcutanes Zellgewebe.

Bei vielen syphilitischen Kindern entwickeln sich Gummata im Unterhautzellgewebe, welche keinen Zusammenhang mit den Lymphdrüsen haben. Mögen die erweichten Gummata mit der Lancette geöffnet werden oder spontan aufbrechen, in allen Fällen wird die Eröffnungsstelle geschwellig und vernarbt erst nach längerer Zeit mit starker Pigmententwicklung. Sehr häufig beobachtet man Nagelverschwämungen, *Oncchia*, zugleich an mehreren Fingern und Zehen. Auch diese Processen sind sehr langwierig, besonders wenn die Finger mit dem Schnaller viel in Berührung kommen, der neue Nagel wird dann gewöhnlich höckerig, unförmlich.

Die Lymphdrüsen in der Nähe syphilitischer Geschwüre schwellen wohl consensuell an, gehen aber selten in Eiterung über. Im All-

gemeinen kann man sagen, dass der Lymphdrüsenapparat der Kinder durch Syphilis viel weniger afficirt wird, als durch Scrophulosa und Tuberculosa.

ad 4) Muskeln und Knochen.

Bei intensiver, in den ersten Wochen nach der Geburt sich entwickelnder Syphilis kommen auch Paralysen der oberen, seltener der unteren Extremitäten vor. Diese Lähmungen erstrecken sich nicht immer über ganze Extremitäten, und sind auch nicht immer vollständige, indem zuweilen eine schwache Bewegungsfähigkeit einzelner Muskelgruppen zurückbleibt.

Die Knochen betheiligen sich selten an der hereditären Syphilis. Man hat die angeborene Fragilitas ossium, bei der sämtliche Rippenknochen auf die geringste Gewalt zerbröckeln, und welche natürlich nur bei todtegeborenen oder bald nach der Geburt sterbenden Kindern vorkommt, mit Syphilis der Eltern in Zusammenhang gebracht.

Es ist dieser Process übrigens ausserordentlich selten, und bei den bisher bekannten Fällen wurde der Nachweis der Syphilis durchaus nicht immer in genügender Weise geliefert.

Periostitis und Necrose einzelner Knochenparthieen, bei secundärer Syphilis der Erwachsenen ein sehr gewöhnlicher Process, kommt bei hereditärer Syphilis der Neugeborenen nur selten vor.

ad 5) Drüsige innere Organe.

Die Abscesse in der Thymusdrüse, von denen schon pag. 288 die Rede war, werden mannigfach bezweifelt, indem die physiologischen Hohlräume, die sich bei Resorption dieser Drüse bilden, von Abscessen kaum zu unterscheiden sind.

Die Veränderungen der Leber wurden pag. 192 schon ausführlich beschrieben. In den Lungen, der Milz und den Nieren hat man ebenfalls gumöse Geschwülste specifischer Natur gefunden. Es kommen die damit behafteten Kinder meist schon mit blassem Exanthem zur Welt und sterben regelmässig nach wenigen Tagen.

Verlauf und Ausgänge.

Sobald die ersten Zeichen der hereditären Syphilis aufgetreten sind, was mit Ausnahme des angeborenen Pemphigus erst 1–6 Monate nach der Geburt zu geschehen pflegt, so magert das Kind ab, wird unruhiger und bekommt abhald das charakteristische, rauchige Aussehen. Die künstlich aufzufütternden Kinder erliegen gewöhnlich der Anämie oder einem dazutretenden Darmcatarrh. Die Brustkinder genesen bei geeigneter Behandlung ziemlich regelmässig. Je später die Syphilis sich einstellt, um so günstiger ist die Prognose, je früher, um so ungünstiger.

Aetiology.

In der grossen Mehrzahl der Fälle stammt die hereditäre Syphilis vom Vater, nicht von der Mutter. Ist die Mutter secundär syphilitisch, so kommt die Schwangerschaft fast niemals zu ihrem normalen Ende, sondern es erfolgt Abortus oder mindestens Frühgeburt. Es ereignet

sich diese zwar auch bei secundärer Syphilis des Vaters, jedoch viel seltener, die Schwangerschaft verläuft hier gewöhnlich normal, das Kind aber kommt entweder mit Pemphigus syphiliticus schon zur Welt, oder läßt die oben beschriebenen Zeichen der hereditären Syphilis in den ersten sechs Monaten des Lebens erkennen.

Wenn der Vater an secundäre Syphilis leidet, so kann die Mutter ganz intact bleiben und dennoch ein syphilitisches Kind gebären, ja es kann sich die Empfängnis und Geburt solcher Kinder sogar mehrmals repetiren, ohne dass die Mutter im geringsten infectirt würde. Diese oftmals constatirte Thatsache ist um so merkwürdiger, als das fötale Blut doch direct mit dem mütterlichen communicirt und der Fetus den specifischen Pemphigus schon im Mutterleibe acquirirt.

Von der Mutter stammt die Syphilis nur, wenn sie vor oder während der Schwangerschaft primär infectirt und hierauf secundär wird. Wenn die Mutter erst in den letzten drei Monaten ihrer Schwangerschaft primär infectirt wird, so soll die Frucht unversehrt bleiben. Die Ansteckung eines gesunden Kindes durch primäre Schanlippengeschwüre, mit denen es während des Geburtsaktes in Berührung kommen kann, erscheint sehr unwahrscheinlich. Die Kinder sind mit einem dicken Vernix caseosus bedeckt, und haben an keiner Körperstelle Epithimierungsverläufe erfahren; sie müssten in diesem Falle vor dem Ausbruche der allgemeinen Syphilis zuerst auch ein primäres, syphilitisches Geschwür bekommen, was man kaum jemals beobachtet haben wird.

Eine weitere, höchst merkwürdige Thatsache ist, dass ein syphilitisches Kind, dessen Dykrasie bei ganz intacter Mutter lediglich vom Vater stammt, seine Mutter durch Saugen niemals ansteckt, während eine gesunde Amme, welcher man ein solches Kind an die Brust legt, in der Regel infectirt wird. Es resultirt hieraus der therapeutisch wichtige Grundsatz, dass man die syphilitischen Kinder sehr wohl durch ihre eigene Mutter, aber niemals durch eine Amme stillen lassen darf, indem die letztere nach geschehener Infection mit Recht gegen den Arzt klagend auftritt.

Der Weg, auf welchem ein syphilitischer Säugling eine gesunde Amme ansteckt, ist nicht immer deutlich nachweisbar. Am einfachsten gestaltet sich das Verhältniss, wenn die Lippengeschwüre des Kindes mit einer wundten Stelle an der Brustwarze der Amme in Berührung kommen. Es wird zweifeln beobachtet, dass die Brust der Amme unversehrt bleiben und sich alsbald Symptome allgemeiner Syphilis einstellen. Umgekehrt kommt es auch vor, dass eine syphilitische Amme auf ein gesundes Kind die Syphilis übertragen kann, ohne dass die Brustwarzen derselben erkrankt wären. Man braucht zur Erklärung dieser Fälle keineswegs seine Zuflucht zur Milch zu nehmen. Mir scheinen Berührungen mit der Mundhöhle oder mit den Fingern, welche die syphilitischen Parthiesen kurz vorher berührt haben, viel näher zu liegen.

Es ist keineswegs nothwendig, dass ein secundär syphilitischer Vater immer syphilitische Kinder erzeugt. Eine erhebliche Anzahl solcher Kinder bleibt vollkommen frei von aller Dykrasie. Am wenigsten empfänglich sind die Kinder eines Vaters, dessen Syphilis schon sehr inveterirt ist, die Haut und die Schleimhäute verkrusten und sich als tertiäre Syphilis in den Knochen localisirt hat.

Behandlung.

Der Mercur wirkt bei der Syphilis der kleinen Kinder am besten auf cutanem Wege. Ich gebe schon seit mehreren Jahren keine Quecksilberpräparate mehr innerlich — die beliebtesten sind hier das Calomel und der Mercurius solubilis Hahnemannii —, sondern lasse auf gesunde Hautstellen, welche sich immerhin noch in genügender Ausdehnung finden, täglich 0,5–1,0 grm Salbe tüchtig einreiben. Wenn die Salbe Abends eingerieben, kann man, ohne die Cur zu beschleunigen, am andern Abend ein Bad geben lassen, wozu sofort von Neuem geschaut werden muss.

Die örtlichen Geschwüre behandelt man am besten mit Chamillen-Ölöpfchen, wo solche sich anbringen lassen, die Rhagaden und Lippen- geschwüre bessern sich auf mehrmalige Hollensteinstriche wachsend. Die Bäder mit Sublimat, wovon 1,0–4,0 auf ein Bad genommen werden soll, sind kostspielig, für das Kind und dessen Wärterpersonal geföhrlich und bei unsichtig geleiteter Schmierkur vollkommen zu entbehren. Der interne Gebrauch des Jades kann bei kleinen Kindern selten lange genug fortgesetzt werden, indem dadurch häufig Verdauungsstörungen und ein rasch fortschreitender Marasmus entstehen.

Die Diät sei möglichst nahrhaft. Am sichersten genossen die Kinder, welche an der Brust ihrer eigenen Mutter genährt werden. Bei künstlich ernährten Kindern ist die Hauptaufgabe, durch sorgfältig bereite Kost und schleimige Getränke Diarrhöe zu verhüten. Wenn diese geschieht, so überstehen viele Kinder die Syphilis.

Sach-Register.

Die Ziffern bezeichnen die Seiten.

A.

- Acidus 293.
 Ader, Hitzungsfehler desselben 158.
 Aigue 27.
 — Jena Milch 21.
 Angina tonsillaris 106.
 Apyrexia infantum 229.
 Arterien, Krankheiten derselben 397.
 Arteritis umbilicalis 34.
 Anthracosis 521.
 Ascari lumbricoides 189.
 Asche 293.
 Asphyxia neonatorum 41.
 Asthma Millari 229.
 — thymicum 230.
 Absterilis pulmonum 94, 251.
 Atrophia papillae corporis 387.
 — areolaris 419.
 Auge, Bildungsfehler desselben 385.
 Augenrindenfalte, angeborene 355.
 Aussaatzeit, Cardien 20.

B.

- Babaziti 429.
 Bauchfell, Krankheiten desselben 201.
 Baisenscherh 410.
 Ballen 424.
 Batrocephalus infus 153.
 Belgische Nierenkrankheit 402.
 Benschelbrühen, Tuberculose desselben 392.
 Benschitis 229.
 Brandwunde, Entzündung desselben 64.
 Bifidus 118.

C.

- Cagat saccharinum 33.
 Caries 513.
 Cataracta nucharis 387.
 Cataracta aetiae mediae 383.
 — benachteiligt acutus u. chronicus 229.

- Calamitas aristata 171.
 — — während der Den-
 tition 100.
 Catarrh der Mundschleimhaut 81.
 Catarrhus ventriculi 129.
 Cephalothymia 51.
 Chorea asiatica 175.
 Chorea infantum 341.
 — major 399.
 Colica 121.
 Coloboma iridis 181.
 Colostoma 33.
 Coma 474.
 Congelatio 475.
 Conjunctivitis hemorrhica 66, 101.
 — serpyllaria 102.
 Convulsiones während der Dentition 85.
 Coryza 295.
 Craniophora 323.
 Cruris amplexus 523.
 Crustaceae 481.
 — bei Laryngismus stridulus 223.
 Cryptocladia 425.
 Cyclops 386.
 Cystitis 410.

D.

- Durchleitung der Nagebühren 90.
 Dentitionbeschwerden 97.
 Desquamation bei Scharlach 437.
 Diathese 125.
 Dysenteria, Krankheiten desselben 74.
 Diphtheritis der Mundhöhle 82.
 — Albuminurie in Folge der-
 selben 84.
 Diphtheritis — Myocarditis in Folge der-
 selben 84.
 Dysenteria 147.
 Dyskrazien 476.
 Dyspepsia 118.
 Ductus arterialis Botalli 2.
 — communis Botalli 1.

E.

- Eclampsia infantum* 356.
Ecthyma 438.
Ectopia vesicae urinariae 408.
Emphysema pulmonum 357.
 Engliche Krankheit 476.
Encephalitis simplex und purulenta 327.
Encephalocele 337.
Epidemiditis 238.
Esterina folliculosa 344.
Euterion 185.
 Entzündung von der Mutterkorn 37.
Erysipelas 412.
Epicanthus 388.
Epilepsia 372.
Erysipala 411.
Erythema 396.
Erythema 118.
Erethiz. Geschwülste 397.
 Ernährung 475.
 Ernährung der Kinder 36.
 — — — künstliche 38.
Erysipelas 409.
Erythema tessellatum 465.

F.

- Facialislähmung 357.
 Fallbeck 372.
Fabry interstium 197.
Falliter 184.
Fistula ani 156.
Fistula coli compressa 114.
Fistulenta 121.
Floor albus 428.
 Fontanelle, deren Vergrößerung 3.
 — — — Verkleinerung 3.
Fornix ovale 2.
Frauen 359.
Furthia 467.
Fragus arcticus 521.
Furunculosis 468.
 Furunkel bei Typhus 172.

G.

- Gangraena pulmonum* 363.
Gastritis toxica 190.
Gastroenteritis 131.
 Gehirn, Bildungsfehler desselben 342.
 Gehirndruck 337.
 Gehirnentzündung 325.
 Gehirnhautentzündung 326.
 Gehirnkrankeheiten 319.
 Gehirnentzündungen 340.
 Gehirnerkrankung 339.
 Gehörorg. Verstopfung desselben 339.
 — — — Atresia, Obstruction 339.
 Gehörorg. Bildungsfehler desselben 339.
 Geisteskrankheiten 383.
 Gelbsucht der Neugeborenen 67.
 Gesichtsausdruck 18.
 Gesichtsteile, Krankheiten derselben 385.
Gonorrhoea 380.

H.

- Hämorrhoid* 361.
Hämorrhagia vaginalis 431.
Hämorrhoiden, deren Bildungsfehler 428.
 — — — Steine derselben 415.
Hämorrhoidenfistula der Neugeborenen 5 407.
Hämatocyste 74.
 Haut, deren Krankheiten 433.
Hautflege 446.
Hautlanger 118.
Hämatocyste 185.
Hepar adiposum 194.
Hepaticus pulmon. 241.
Hernia inguinalis 152.
 — — — umbilicalis 58.
Hern. angeborene Anomalien 292.
Hernienkrankheiten 292.
Histia spinalis congesta 348.
Histia, angeborener 58 u. 337.
Histia 501.
 Husten, Arten desselben 24.
Hystocoele 425.
Hydrocephalus 331.
Hydrocephalus acutus 310.
 — — — chronicus 332.
Hydropericardium 330.
Hydrothorax 347.
Hydrothorax 290.
Hypertrophia tonsillarum 119.
Hypopodia 419.

I.

- Icterus neonatorum* 68.
Hyperforia ani 159.
Incontinentia urinae 412.
Infarctus renalis 401.
Infectionskrankheiten 161.
Infectio 399.
Infection des Thorax 16.
Infection 467.
Infection 150.
Infection 150.
Infection toxica urinaria 428.
Infection cerebri 431.
Infection 410.

K.

- Keratitis scrophulosa* 362.
Keratitis 272.
Kiefersteine 45.
 Kleidung der Kinder 44.
Knochen-Scrophulose 397.
Kopfbildschwellen 50.
Krätze 418.
Krup 211.
Kubitus 38.

L.

- Lähmung* 357.
Larve 5.
Laryngismus stridulus 236.

Laryngitis 211.
 — catarrhalis 231.
 Larynx, Krankheiten desselben 211.
 Leber, Krankheiten desselben 192.
 — angeborene Anomalien 197.
 — Syphilis desselben 193.
 Leukorrhoe 428.
 Leichter Suppe 39.
 Lithias 415.
 Luftröhre, bei Schwindel des Neugeborenen 48.
 Lungen, Krankheiten desselben 239.
 Lungenblutungen 261.
 Lungenbrand 263.
 Lungenempyem 258.
 Lungenentzündung 249.
 Lungeninfarkt, hämorrhagischer 262.
 Lungenkrebs 271.
 Lungenstomatitis 267.
 Lupon 495.
 Lucilia speciosa 525.
 Lymphdrüsen, Sympliciosis desselben 565.

H.

Hägemerziehung 184.
 Hämorrh. 547.
 Hämatomtypen 159.
 Hämatomverfall 157.
 Hämorrh. 441.
 Hämorrh. neonatorum 64.
 Hämorrh. 422.
 Hämorrh., s. s. Histologie 4.
 Hämatomtypen, Krebs desselben 271.
 Hämatom 93.
 Hämatom neonatorum 64.
 Hämatom cerebralis 337.
 — spinale 343.
 Hämatom 77.
 Hämorrh., deren Chemie 32.
 — Nachweis von Medicamenten in denselben 34.
 Hämorrh., deren praktische Prüfung 35.
 — coagulante 41.
 Hämatom, optische 31.
 Hämatom bei Typhus 175.
 Hämorrh. Krankheiten desselben 196.
 Hämatom 358.
 Hämatom 441.
 Hämatom 462.
 Hämatom 161.
 Hämatom 16.
 Hämatom, Krankheiten desselben 74.
 Hämatom 412.
 Hämatom spinale 343.

K.

Kabel, Brand desselben 16.
 — Krankheiten desselben 34.
 Kalksteinen 2.
 Kalksteinung 57.
 Kalkstein 58.

Kalkstein, Uterus, derselben 16.
 Kalksteinung, Entstehung derselben 55.
 Kalksteinung, innerer 55.
 Kalkstein, peripherer 255.
 Kalkstein 471.
 — vascularis 306.
 Kalkstein 397.
 Kalkstein, Krankheiten desselben 256.
 — fremde Körper in denselben 211.
 Kalkstein 312.
 Kalkstein, Entstehung desselben 55.
 Kalkstein, Kinderscheit 41.
 Kalkstein des Kehlkopfes 229.
 Kalkstein, Krankheiten desselben 401.
 — Bildungsfelder 401.
 — Steine 407.
 — Cysten 404.
 Kalkstein 36.

L.

Laryngitis 127.
 Larynx, Krankheiten desselben 259.
 Larynx 112.
 Larynx, fremde Körper in denselben 260.
 Larynx 535.
 Larynx 422.
 Larynx, Krankheiten desselben 18.
 Larynx 566.
 Larynx scrophalosa 510.
 Larynx externa 380.
 — interna 384.
 Larynx variolosa 187.

P.

Palatum, Damm 74.
 Palatum 178.
 — dentale 226.
 Palatum, angeborene 418.
 — erworben 421.
 Palatum 163.
 Palatum, s. s. 469.
 — s. s. 537.
 Palatum, s. s. 418.
 Palatum des Thymus 17.
 Palatum, s. s. 19.
 Palatum der Thymusdrüse 30.
 Palatum 298.
 Palatum scrophalosa 507.
 Palatum 201.
 Palatum 272.
 Palatum arthralgia 55.
 Palatum, Krankheiten desselben 284.
 Palatum 284.
 Palatum hypostoma bei Typhus 170.
 — labialis 287.
 — labialis 286.
 Palatum 454.
 Palatum 532.
 Palatum des Thymus 196.

Polypbagia 134.
 Polypus ani 157.
 — ingens 77.
 Pseudokrupp 236.
 Puls der Kinder 15.

R.

Rachitis 476.
 Rachen 79.
 Rachenpharyngitis 111.
 Rhagades syphiliticae 538.
 Rhinorrhoen acuta 298.
 Rippenfortsatzbildung 284.
 Rose 466.
 Rosolia syphilitica 536.
 Rothlauf 466.
 Röttheln 453.
 Rubeola 453.
 Rückenmark, Entzündung desselben 543.
 Ruhr 147.
 Rups 495.

S.

Saules 476.
 Scharlach 433.
 Schaftblattern 462.
 Schärlich 435.
 Scheitel der Neugeborenen 46.
 Schilddrüse, Krankheiten derselben 217.
 Schlingen 298.
 Schrein der Kinder 23.
 Schwellen 92.
 Sclerema neonatorum 62.
 Scleritis cerebri 333.
 Schmerz des Kopfes 114.
 Stachel der Mundschleimhaut 85.
 Strophulus 490.
 Sonnenstich 371.
 Sore 92.
 Spasmus glottidis 229.
 Spina bifida 347.
 Spondylarthrosis 517.
 Spondylitis 517.
 Stichtasen 272.
 Stomatitis 86.
 Stomatitis catenulata 86.
 Strophulus syphiliticus 534.
 Struma 312.
 Struma colubina 382.
 Syphilis hereditaria 535.
 — der Organe 539.

T.

Taken maverici 144.
 Tarsus liti 126.
 — tarsometatarsalis 126.
 — albus 153.
 Teilungsclassen 207.
 Temperamenterungen 14.
 Tetanus neonatorum 59.

Thrombosen 323.
 Thyroström. Physiologisches 4.
 — Pathologisches 231.
 Thyroditis inflammatoria 317.
 Trichocephalus dispar 187.
 Trioma neonatorum 50.
 Tuberculosis 439.
 — der Lungen 362.
 — der Bronchialdrüsen 25.
 Tumor albus genu 539.
 — — articularis pedis 532.
 Tumor cerebri 772.
 Typhus abdominalis 102.

U.

Ulcus ventriculi perforans 152.
 Untersuchung der Kinder. Allgemeines
 Regeln 12.
 Urticaria 91.
 Uterus histologic 428.

V.

Vaccination 457.
 Vaginalblutung 432.
 Varicellae 462.
 Varicella 454.
 Variolae 462.
 Verlaufs, der Hesse 341.
 — der grossen 349.
 Verhütung 474.
 Verengung der Mundhöhle 77.
 Vermis caecus 4.
 Verstopfung 127.
 Völvetus 150.
 Vordrill, Entzündung desselben 420.

W.

Wachthum der Kinder 6.
 Wasserbruch 425.
 Wasserkopf, hitziger 339.
 — chronischer 332.
 Wasserkreis 91.
 Wechseljahre 197.
 Weibliche Gestalten, deren Bildungs-
 fähigkeit 427.
 — Bildung derselben 431.
 Wellenchen 74.
 Wermungen 382.
 Wurmkrankheiten 184.

Z.

Zähne, deren Durchbruch 10.
 Zellgewebeverhärtung 62.
 Zunge, allgemeine Untersuchung 23.
 Zungenbein 97.
 Zunge, Adhäsion 78.
 — Bildungsmängel derselben 77.
 — Vorfall 77.

Erklärung der Tafeln.

Tafel I.

- I. Placenta. II. Leber. III. Herz. IV. Nieren. V. Blase.
- 1) Aortabogen mit den aus ihm abgehenden Hauptästen.
 - 2) Ductus arteriosus Botalli.
 - 3) Arteria pulmonalis.
 - 4) Ductus venosus Arantii.
 - 5) Vena cava superior.
 - 6) Vena cava inferior.
 - 7) Venae pulmonales.
 - 8) Vena umbilicalis.
 - 9) Arteriae umbilicales.

Tafel II.

- Fig. 1 u. 2. Schematische Zeichnungen des Scheitellbeines zur Demonstration der physiologischen Vergrößerung der grossen Fontanelle, vide pag. 8.
- Fig. 3. Normale Frauenmilch nach Fink.
- Fig. 4. Normales Colostrum nach Fink.
- Fig. 5, 6 u. 7. Schematische Durchschnitte der verschiedenen Arten von Cephaloematom. Fig. 5 Cephaloematoma subperiosteum. Fig. 6 Cephaloematom. Fig. 7. Cephaloematom. Fig. 8. Cephaloematom.
- 1) Behaarte Kopfhaut.
 - 2) Galea aponeurotica.
 - 3) Periosteum.
 - 4) Schädelknochen.
 - 5) Dura mater.
 - 6) Knochenwalle (nur bei Fig. 5 möglich).
- Fig. 9. Schematischer Durchschnitt eines Nabelstümpfes. a) Der Stumpf. b) Der ihn umgebende Hautring.
- Fig. 9a u. b. Schematische Darstellung des sog. Fleischnabels. a) vor, b) nach dem Abfalle der Nabelschnur.

Tafel III.

- Fig. 1. Die Eindrücke der Zähne in die Zunge bei *Romaneae*.
- Fig. 2. Scorpilae.
- a) Mit Micrococci besetztes Planderepithel. b) Sporen. c) Tindallfäden mit Scheitelfäden und Einkerbungen.
- Fig. 3. A. Intrauterine Aufnahme eines Darmstückes. B. Schematischer Durchschnitt nach Förster. a) Das Intrauterine. b) und c) Das es anziehende Darmrohr. d) und e) Die Umschlagstellen. f) Das mit Micrococci besetzte Mesenterium.
- Fig. 4. Längsdurchschnitt des Krummdarmes und des Mastdarmes. 1) Kreuzbein. 2) Mastdarm. a) obere, b) mittlere und c) untere Partie des Mastdarmes. 3) Peritonäum. 4) Uterus. 5) Vagina. 6) Schamlippen. 7) Harnblase. 8) Perineum.

- Fig. 5, 6, 7, 8 u. 9. Schematische Durchschnitte von Imperforationen des Mastdarms und von dessen abnormen Ausbildungen. r) Rectum. a) Samenblase. u) Anusöffnung. b) Blase. v) Vaginum.
- Fig. 10. Schematische Zeichnung einer Extremität der Blase, nach Förster.
- Fig. 11, 12, 13 und 14. Schematische Darstellung der Hydroselen.
- Fig. 11. Hydrosela canalis vaginalis testiculi aperta.
- Fig. 12. Hydrosela fundi canalis testiculi clausa.
- Fig. 13. Hydrosela colli canalis vaginalis testiculi aperta.
- Fig. 14. Hydrosela colli canalis vaginalis testiculi clausa.
- a) Ein Stück Blase mit von innen gesehen. b) Öffnung canalis vaginalis.
- c) Hohl. d) Hydroselische Ausdehnung eines Stückes des Leichterkanals.

Tafel IV.

- Fig. 1–3. *Botrioccephalus latus*.
- Fig. 1. Kopf in natürlicher GröÙe.
- Fig. 2. Vergrößerter Kopf mit langem Hals.
- Fig. 3. Einzelne Stücke. Die Geschlechtsöffnung in der Mitte jedes Gliedes.
- Fig. 4–7. *Taenia Solium*.
- Fig. 4. Kopf in natürlicher GröÙe.
- Fig. 5 u. 6. Vergrößerter Kopf von der Seite und von oben gesehen.
- Fig. 7. Die Geschlechtsöffnung auf der Seite.
- Fig. 8–9. *Acanth haemorrhoides, spurius*.
- Fig. 8. Ein aufgeplantes Weibchen in natürlicher GröÙe mit vergrößerten Eingeweiden. Der blauschwarze Schlauch ist der Nahrungskanal. Die weißen Schlingen sind die Eierstöcke.
- Fig. 9. Das abgetrennte Schwanzende des Mänschens mit doppelter Röhre vergrößert.
- Fig. 10–13. *Oxyuris cruralis, Pirinastachys*.
- Fig. 10 u. 11. Weibchen in natürlicher GröÙe und vergrößert.
- Fig. 12 u. 13. Mänschen vergrößert und in natürlicher GröÙe.
- Fig. 14 u. 15. *Trichocephalus dispar, Poliochenium* natürlicher GröÙe.
- Fig. 14. Weibchen. Fig. 15. Mänschen.

Tafel V.

- Fig. 1 u. 2. Schematischer Durchschnitt eines normalen (1) und eines rachitischen kindlichen Thorax (2).
- 1) Rostum. 2) Rippenknorpel. 3) Rippenknorpel. 4) In den Brustkorb führende Rippen. 5) Interkostalräume. 6) Fünftes Rückenscheitel. 7) Herz. 8) Keilige, rachitische Ausbuchtung.

Tafel VI.

- Fig. 1. Rachitisches Rippenende nach Virchow.
- Fig. 2. Dessen Durchschnitt.
- Fig. 3. Durchschnitt eines rachitischen Oberarmknochen.
- Fig. 1, 2, 3. a) Rachitische Schichte der gewöhnlichen Knochenwachstums. b) Rachitische Ausbuchtung des jungen Knochens. c) Zickzack Wellenlinie zwischen Knorpel und Knochen.
- Fig. 4. Rachitischer Schädel. Größtenteils nach Eschsch. An den hellen Stellen ist die Knochenwunde geschwunden, dazu waren und Perostium fortsetzen sich.





Fig 1



Fig 2



Fig 3




Fig 6



Fig 7



Fig 8




Fig 9




Fig 3



Fig 4







15



18




19



20



21



22










Fig. 1.




Fig. 2.



Fig 1




Fig 2



Fig 4



Fig 3







Date Due

RJ4
880

Accession no.

YUL tr

Author

Vogel, A.

Lehrbuch der Kinder-
krankheiten. 8.Aufl.

Call no.

1880

